Г. У. 3. и 3.

БЮРО ПО МИКОЛОГІИ И ФИТОПАТОЛОГІИ УЧЕНАГО КОМИТЕТА.

KPATKIЙ ОЧЕРКЪ МИКОЛОГІИ

въ примъненіи къ изученію бользней растеній.

А. А. ЯЧЕВСКАГО.

Съ 57-ю рисунками, исполненными Г. Н. Дорогинымъ.

ОДЕССА. 1912.

Типографія подъ фирмою, Въстникъ Винодълія". Одесса, Большая Арнаутская улица, домъ № 38. (Harright)

T 1948M 5155

Г. У. 3. и 3.

БЮРО ПО МИКОЛОГІИ И ФИТОПАТОЛОГІИ УЧЕНАГО КОМИТЕТА.

KPATKIN OYEPKY MNKOJOLIN

въ примъненіи къ изученію бользней растеній.

А. А. ЯЧЕВСКАГО.

Raperr Dush A 6.31

ОДЕССА. 1912.

ОДЕССА.

Типографія подъ фирмою "Въстникъ Винодълія". Большая Арнаутская улица, домъ № 38. 1912. ,

КРАТКІЙ ОЧЕРКЪ МИКОЛОГІЙ

ВЪ ПРИМЪНЕНІИ КЪ ИЗУЧЕНІЮ БОЛЪЗНЕЙ РАСТЕНІЙ ВООБЩЕ и виноградной лозы—въ частности.

причины обнаружены могуть выработать мъры борьбыли А послъдніе годы, съ усовершенствованіемъ пріемовъ культуры и съ возрастающимъ стремленіемъ къ полученію возможно лучшихъ, какъ въ качественномъ, такъ и въ количественномъ отношеніи урожаевъ, вниманіе сельскихъ хозяевъ невольно обратилось на бользни и поврежденія воздылываемыхъ растеній, причиняющія нерѣдко такіе огромные убытки, съ которыми приходится серьезно считаться. Конечно, болъзни растеній существовали и раньше, какъ о томъ свидътельствуетъ древнъйшая литература, но еще очень недавно общее состояніе сельскаго хозяйства не давало возможности выяснить съ точностью причины неурожаевъ. Въ прежнее время при обнаруженіи болъзней и поврежденій растеній довольствовались болье или менье суевьрными догадками и предположеніями относительно причины ихъ появленія. но когда научныя изследованія съ несомненностью доказали, что въ природъ все происходитъ по строго опредъленнымъ законамъ, естественнымъ образомъ народилась мысль о точномъ изученіи причинъ замѣчаемыхъ явленій, а, съ другой стороны, при постоянно возрастающей конкуренціи, когда полученіе дохода на затраченные труды и капиталъ является вопросомъ жизни или смерти для цѣлой категоріи лицъ, само собою выдвинулась весьма серьезная задача обезпеченія урожая отъ случайныхъ факторовъ, обусловливающихъ его гибель или значительную убыль, иными словамио предохраненіи растеній отъ различныхъ болѣзней и поврежденій. Эта задача могла быть выполнена только послъ продолжительныхъ

и кропотливыхъ наблюденій, какъ надъ естественнымъ развитіемъ самихъ растеній, такъ и надъ тѣми причинами, которыя могутъ привести къ ненормальнымъ уклоненіямъ отъ этого естественнаго развитія и вызываютъ болѣзненныя явленія. Накопившійся матеріалъ по этимъ наблюденіямъ и составляєтъ науку о бользняхъ растеній или фитопатологію, представляющую громадный интересъ, какъ съ чисто теоретической точки зрѣнія, такъ и въ практическомъ отношеніи.

Исходя изъ того неоспоримаго положенія, что растеніе представляетъ собою живое существо и что болъзни его вызываются нарушеніемъ правильныхъ физіологическихъ функцій, спеціалисты по бользнямъ растеній или фитопатологи изучаютъ явленія, служащія причиной подобныхъ нарушеній, и, когда эти причины обнаружены, могутъ выработать мъры борьбы. Фитопатологія, хотя, сравнительно, новая наука, однако за послѣднее время значительно подвинулась впередъ и дала на практикъ весьма осязательные результаты. Конечно, не всъ болъзни теперь еще излечиваются, многія явленія пока не достаточно изслідованы, но тъмъ не менъе успъхи, достигнутые въ этой отрасли, заслуживаютъ самаго серьезнаго вниманія практиковъ; на основаніи многочисленныхъ статистическихъ данныхъ 1), можно считать, что отъ различныхъ болъзней пропадаетъ приблизительно, въ среднемъ, одна треть урожая. Если перевести это на деньги, то составится огромная сумма ежегодной потери, которая выразится для одного только государства или даже провинціи въ десяткахъ и сотняхъ милліоновъ. Между тъмъ установлено, что подходящими мъропріятіями можно довести эту потерю до 50/0; изъ сопоставленія этихъ цифръ совершенно ясно, что бороться съ болѣзнями растеній не только слѣдуетъ, но и необходимо, и что расходы, сопряженные съ этой борьбою, во всякомъ случав окупятся. Леченіе и предохраненіе растеній отъ заболѣваній удаются только при самомъ тщательномъ ознакомленіи съ причинами, вызывающими бользни, и, вслъдствіе этой согласованности, всь указанные спеціалистами пріемы должны быть въ точности исполнены, ибо только въ такомъ случав можно ожидать хорошихъ результатовъ.

Но, съ другой стороны, довольно трудно требовать отъ сельскихъ хозяевъ слѣпого исполненія совѣтовъ, цѣль которыхъ и самая польза ускользають отъ ихъ пониманія. При механическомъ исполненіи предписаній и подражаніи изв'єстнымъ формуламъ тотчасъ является небрежное отношеніе къ дълу и неръдко даже дълаютъ совершенно обратное тому, что слъдуетъ, а получающіеся при этомъ плачевные результаты обычно приписываются несостоятельности совътовъ. Совершенно иная, конечно, картина получается при сознательномъ примъненіи подобныхъ совътовъ. Усвоивъ себъ цъль методовъ борьбы и руководящіе принципы тъхъ или иныхъ пріемовъ, сельскій хозяинъ можетъ оцѣнить значеніе того или другого фактора въ дълъ борьбы и по своей собственной инціативъ примънять тъ способы, которые въ каждомъ данномъ случаъ окажутся наиболье соотвътствующими: въ случаъ-же возможной неудачи, онъ, не отрицая пользы леченія и не отчаиваясь, постарается, напротивъ, усовершенствованными пріемами достигнуть лучшихъ результатовъ. Въ виду сказаннаго становится понятнымъ стремленіе спеціалистовъ распространять свѣдѣнія о болѣзняхъ растеній въ общедоступной формъ, подготовляя такимъ образомъ почву къ всеобщему примъненію способовъ борьбы. Настоящая книжка имъетъ цълью ознакомить читателей со строеніемъ грибковъ, которые, какъ увидимъ дальше, являются весьма опасными вредителями нашихъ воздълываемыхъ растеній.

имьменнача имаение уджам под им

Наиболъе естественнымъ способомъ группировки болъзней растеній является распредъленіе ихъ по причинамъ, которыми онъ обусловливаются, и если принять такое подраздъленіе, то можно установить три основныя группы, а именно:

- І. Болъзни, обусловливаемыя почвенными и климатическими условіями.
- II. Болъзни, обусловливаемыя различными животными, по преимуществу—насъкомыми.
- III. Болѣзни, обусловливаемыя различными растеніями, по преимуществу—грибками и бактеріями.

Необходимо замътить при этомъ, что приведенная группировка даетъ возможность разобраться сравнительно легко въ

¹⁾ Ежегодники свъдъній о бользняхъ и поврежденіяхъ культурныхъ и дикорастущихъ полезныхъ растеній. СПБ., тт. I—VIII, 1903—1912 гг.

опредъленіи характера бользни, когда таковая обусловливается одной только причиной; но въ нъкоторыхъ случаяхъ на растеніе вліяетъ совокупность разнообразныхъ причинъ, дъйствующихъ совмъстно или въ извъстной послъдовательности, и тогда весьма важно установить связь между этими причинами, неръдко принадлежащими къ различнымъ группамъ. Такъ, напр., зеленая плъсень винограда (Cercospora Roësleri Sacc.), причиняющая довольно



Рис. 1. Раковое образованіе на побъгахъ виноградной лозы, обусловленное дъйствіемъ морозовъ.

значительный вредъ, развивается обыкновенно только на тъхъ лозахъ, которыя ослаблены дурнымъ уходомъ или неблагопріятными условіями почвы; разъ это установлено, то само собою разумъется, что при предохраненіи растеній отъ болъзни, всъ усилія должны быть направлены противъ тъхъ первоначальныхъ условій, которыя способствуютъ развитію грибка; такъ какъ жизненныя условія устанавливаютъ весьма сложныя взаимоотношенія между живыми организмами и между ихъ функціями, то опредъление причинъ поврежденій и болѣзней не всегда является легкимъ и требуетъ извъстнаго опыта и тщательнаго изслъдованія.

Почва и климатъ имѣ-ютъ такое важное значеніе

на развитіе растеній, что всякое уклоненіе отъ нормальныхъ почвенныхъ и климатическихъ условій непремѣнно влечетъ за собою различныя нарушенія, приводящія къ болѣе или менѣе серьезнымъ послѣдствіямъ. Мы знаемъ, напр., что при избыткѣ извести въ почвѣ, растенія и, въ особенности, виноградная лоза страдаютъ весьма

характерной бол \pm знью, изв \pm стной под \pm названіем \pm хлороза \pm 1) и выражающейся въ пожелтъніи листьевъ. Не менъе ръзко проявляется на виноградной лозъ дъйствіе ненормальныхъ климатическихъ условій. Достаточно упомянуть здісь о раковыхъ образованіяхъ на стволахъ лозы подъ вліяніемъ морозовъ, какъ они неръдко наблюдаются, между прочимъ, на пескахъ (стр. 6, рис. 1), на частые ожоги листьевъ и засыханіе цѣлыхъ гроздей подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей. Многія болѣзни, принадлежащія къ этой первой группъ, еще не достаточно изслъдованы и требуютъ дальнъйшихъ изысканій: нъкоторыя поврежденія, причину которыхъ не удается обнаружить, повидимому, относятся къ этой группъ: такъ, по новъйшимъ изслъдованіямъ Панателли²), бользнь "ронсэ" (roncet), характеризующаяся слабымъ ростомъ, короткими мездоузліями и разръзными листьями и наблюдаемая въ нашихъ виноградныхъ районахъ (напр., въ Бессарабіи), слъдуетъ приписать особеннымъ почвеннымъ условіямъ.

Въ большинствъ случаевъ, болъзни первой группы не имъютъ повальнаго характера и представляютъ собою переходящее явленіе; поэтому на нихъ на практикъ обращаютъ, сравнительно, мало вниманія. Но такое безразличное отношеніе едва-ли можетъ быть оправдываемо, такъ какъ при безпрепятственномъ развитіи онъ, несомнънно, становятся угрожающими и, кромъ того, ослабляя общее состояніе лозы, способствуютъ болъе широкому распространенію болъзней двухъ другихъ категорій.

Такъ, столь часто наблюдаемыя въ нѣкоторыхъ виноградныхъ районахъ Россіи градобитія, помимо непосредственныхъ, значительныхъ убытковъ, приносятъ еще вредъ въ томъ отношеніи, что въ произведенныхъ градинами ранахъ на ягодахъ, побѣгахъ или черешкахъ развивается паразитный грибокъ, причиняющій такъ называемую бълую гниль.

Между животнымъ и растительнымъ мірами существуютъ довольно тѣсныя и болѣе или менѣе сложныя взаимоотношенія. Мы знаемъ, что цѣлый рядъ высшихъ животныхъ, такъ называемыхъ травоядныхъ, пользуется исключительно растительной

Ячевскій, А. А.— "Антракнозъ и хлорозъ" (Библіотека Въстника Винодълія, № 9).

²⁾ Panatelli -, Beiträge zur Kenntniss der Roncetkrankheit oder Krautern der Rebe" (Zeitschr. für Pflanzenkrankheiten, 1912, S. 1).

пищей. Среди низшихъ животныхъ (насъкомыя, паучки, угрицы) имъется много такихъ, которыя точно также пользуются растительной пищей; нъкоторыя изъ нихъ (напр., саранча) поъдаютъ растенія или извъстныя части ихъ и затъмъ перекочевываютъ на другія растенія. Другія (клещики, тли) живутъ, постоянно или въ извъстныхъ стадіяхъ, на опредъленныхъ растеніяхъ; многія откладываютъ свои яички внутри тканей или на поверхности нъкоторыхъ



Рис. 2. Листъ груши, пораженный клещиками, вызывающими образованіе вздутій (естеств. величина).

органовъ растеній, вызывая тѣмъ самымъ образованіе различныхъ наростовъ или уродливостей (рис. 2). Такія низшія животныя приносятъ нерѣдко неисчислимый вредъ воздѣлываемымъ растеніямъ главнымъ образомъ потому, что онѣ развиваются обыкновенно въ огромномъ количествѣ и способны при своей многочисленности причинить, въ короткое время, большія опустошенія; классическимъ примѣромъ, въ данномъ случаѣ, является филлоксера, погубившая многіе обширнѣйшіе виноградные районы.

Болѣзни второй группы требуютъ основательнаго знанія условій жизни вредителей, и на этомъ основаніи ихъ изученіе входитъ въ область прикладной энтомологіи.

Переходя къ болѣзнямъ третьей группы, необходимо прежде всего замѣтить, что между различными растеніями могутъ также существовать болѣе или менѣе тѣсныя взаимоотношенія, которыя при нѣкоторой наблюдатель-

ности выясняются довольно отчетливо. Находясь, напр., на лугу, въ лиственномъ или хвойномъ лѣсу, можно убѣдиться, что цѣлыя группы растеній встрѣчаются почти неизмѣнно вмѣстѣ, придавая общему облику растительности опредѣленный, типичный характеръ. Такое сочетаніе растеній носитъ названіе сообществъ и является далеко не случайнымъ, а вытекаетъ изъ того,

что растенія, входящія въ кругъ этого сообщества, находятъ въ немъ наиболъе подходящія для своего развитія условія. • Но такое простое сожительство является лишь переходнымъ состояніямъ къ болѣе сложнымъ взаимоотношеніямъ; въ томъ-же лиственномъ или хвойномъ лъсу не трудно найти, на стволахъ и вътвяхъ живыхъ деревьевъ, различные виды лишайниковъ или мховъ, которые, однако, не извлекаютъ изъ этихъ деревьевъ пищи, а только пользуются ими для прикръпленія, получая такимъ образомъ надежную подстилку. Это такъ называемые эпифиты, которые, хотя, какъ сказано, не добываютъ пищи изъ этого субстрата, тъмъ не менъе ихъ развитіе на деревьяхъ и кустарникахъ слъдуетъ признать вреднымъ, такъ какъ они мъшаютъ свободному доступу воздуха и свъта къ вътвямъ и стволамъ и тъмъ самымъ замедляютъ нормальное развитіе растеній. Въ запущенныхъ виноградникахъ неръдко встръчаются старые стволы или пеньки виноградной лозы, заросшіе мхомъ; этого явленія допускать не слъдуетъ, примѣняя противъ него смазываніе стволовъ ранней весной $3^0/_0$ растворомъ желѣзнаго купороса.

Наконецъ, существуетъ еще цълый рядъ такихъ растеній, которыя для своего развитія должны непремѣнно пользоваться соками, извлекаемыми изъ другихъ растеній; это-такъ называемые паразиты или чужеядныя растенія. Для того, чтобы выяснить себъ это обстоятельсто, мы должны имъть въ виду, что всякое живое существо требуетъ для своего развитія извъстныхъ питательныхъ веществъ, среди которыхъ самое главное, необходимоеуглеродъ, составляющій, такъ сказать, основу всей органической жизни. Животныя добываютъ себъ этотъ углеродъ, питаясь такими веществами, въ составъ которыхъ онъ входитъ, т. е. растительными тканями (травоядныя) или животными тканями (хищники). Процессомъ дыханія часть этого углерода возвращается воздуху въ видъ углекислоты. Зеленыя растенія, въ свою очередь, добываютъ углеродъ непосредственно изъ воздуха, разлагая углекислоту при помощи особаго вещества — хлорофилла, придающаго ихъ тканямъ зеленый цвътъ. Такимъ образомъ устанавливается правильный круговоротъ въ природъ, вслъдствіе котораго углеродъ, находясь въ постоянномъ передвиженіи, служитъ развитію и созиданію послѣдовательно растеній и животныхъ и затѣмъ переходитъ, въ видъ запаснаго матеріала, въ воздухъ, чтобы снова поглощаться

новыми растеніями и т. д. до безконечности. Но существуєть еще цълый рядъ растеній, либо совершенно лишенныхъ хлорофилла (напр., грибы и бактеріи), либо имъющихъ его въ недостаточномъ количествъ, какъ нъкоторыя цвътковыя (напр., омела). Эти растенія сами собою не въ состояніи разлагать углекислоту воздуха и для своего существованія должны обращаться къ другимъ источникамъ. въ которыхъ они находятъ его въ переработанномъ видъ, въ каковомъ и присваиваютъ себъ. Подобными источниками служатъ всъ органическія тъла, какъ растительнаго, такъ и животнаго царства, въ живомъ или мертвомъ видъ; при этомъ мертвыя ткани разлагаются и уничтожаются, а живыя ткани подвергаются различнаго рода измъненіямъ, имъющимъ конечной цълью ихъ умерщвленіе и разложеніе. а совокупность этихъ измъненій составляетъ тъ бользненные признаки, съ которыми приходится бороться. Растительные организмы, поселяющіеся на мертвыхъ тканяхъ и причиняющіе ихъ разложеніе, носять названіе сапрофитовь, а ть, которые развиваются на живыхъ тканяхъ, извъстны подъ названіемъ паразитовъ или чужеядныхъ. Хотя такое подраздъленіе и кажется на первый взглядъ весьма естественнымъ, однако на практикъ примъненіе его встръчаетъ неръдко большія затрудненія, такъ какъ, съ одной стороны, многіе сапрофиты могутъ въ извъстныхъ случаяхъ превратиться въ паразитовъ, если ткани растеній или животныхъ ослаблены по той или иной причинъ и не въ состояніи противодъйствовать зараженію, а съ другой — и настоящіе паразиты продолжаютъ развиваться на ими-же умерщвленныхъ тканяхъ, превращаясь въ сапрофитовъ. Поэтому болъе удобно установить четыре подраздъленія вивсто двухъ, а именно: отого дво отоговандов вымося Ж вывых

- 1. Паразиты настоящіе или явные, живущіе только на живыхъ тканяхъ и отмирающіе вмѣстѣ съ ними; напр., повилика, заразиха, ржавчинные грибки.
- 2. Полупаразиты, сначала развивающіеся на живыхъ тканяхъ, а потомъ продолжающіе свое развитіе на умерщвленныхъ ими тканяхъ; напр., столь распространенная на виноградной лозъ болъзнь мильдью, причиняемая грибкомъ Plasmopara viticola Berl. et de Toni, который вызываетъ появленіе на листьяхъ коричневыхъ пятенъ, при чемъ развитіе грибка продолжается въ засохшихъ листьяхъ, въ которыхъ образуются особые органы грибка, предназначенные для перезимовки.

- 3. Сапрофиты настоящіе или явные, развивающіеся исключительно на мертвыхъ тканяхъ; сюда относятся, напр., всякаго рода плъсневые грибки, образующіе на хлъбъ, вареньъ и др. пищевыхъ продуктахъ зеленые, сърые или бъловатые налеты.
- 4. Полусапрофиты, которые, хотя и предназначены для развитія на мертвыхъ тканяхъ, однако при нѣкоторыхъ условіяхъ способны переходить и на живыя ткани.

Такимъ образомъ мы видимъ, что опасные вредители могутъ встръчаться въ трехъ группахъ: 1-й, 2-й и 4-й. При этомъ, однако, слъдуетъ имъть въ виду, что на ряду съ вредными паразитами имъются и такіе, которыхъ съ точки зрънія сельскаго хозяйства можно было-бы назвать и полезными; это ть, которые поражаютъ другихъ паразитовъ, уничтожая ихъ, и такихъ паразитовъ второго порядка довольно много, причемъ они въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже примъняются для борьбы съ вредителями, какъ животнаго, такъ и растительнаго царствъ, -- напр., для уничтоженія майскаго жука одно время пытались разводить въ большомъ количествъ одинъ паразитный грибокъ (Botrytis Bassiana), поражающій его личинки. Эти попытки не дали, впрочемъ, ожидаемыхъ результатовъ въ виду значительныхъ затрудненій, встръчаемыхъ на практикъ для искусственнаго зараженія. Существуетъ также цълый рядъ паразитныхъ грибковъ, поражающихъ паразитные-же грибки: такъ, мучнистая роса виноградной лозы (Uncinula spiralis Berk. et Curtis) часто поражается паразитнымъ грибкомъ Cicinnobolus Cesatii D. В., который мѣшаетъ ея распространенію.

Что-же касается сапрофитовъ, то хотя нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напр., плѣсневые грибки, часто повреждаютъ съѣстные припасы къ великой досадѣ нашихъ хозяекъ, однако ихъ слѣдуетъ считать полезными, такъ какъ они уничтожаютъ органическіе остатки и способствуютъ ихъ быстрому исчезновенію, играя, слѣдовательно, въ природѣ огромную, такъ сказать, санитарную роль. Безъ ихъ содѣйствія упомянутый выше круговоротъ углерода былъ-бы совершенно немыслимъ: въ скоромъ времени накопились-бы громадныя количества органическихъ мертвыхъ тканей, въ которыхъ сосредоточился - бы весь запасъ углерода, и жизнь должна была-бы прекратиться. Являясь, такимъ образомъ, необходимымъ звеномъ мірового зданія, многіе сапрофиты въ то же время оказываютъ непосредственную пользу человѣку въ его хозяйственномъ обиходѣ:

какъ извъстно, напр., все винодъліе основано на развитіи въ виноградномъ сокъ особыхъ сапрофитныхъ грибковъ (дрожжи), превращающихъ сусло въ вино.

Выше было уже упомянуто, что паразитами могутъ быть самыя разнообразныя растенія. Останавливаясь нѣсколько подроб-




Рис. 3. Вътвъ ивы, обвитая повиликой; b—редуцированные до степени мелкихъ чешуекъ листья, Bl—группа цвътовъ повилики; слъва рисунка—соединеніе паразита (Cuscuta) съ хозяиномъ W, H— присоски (гаусторіи); справа рисунка молодые прорастающіе зародыши повилики t.

нъе на этомъ вопросъ, слъдуетъ имъть въ виду, что нѣкоторыя, такъ называемыя, высшія растенія или цвътковыя, размножающіяся съменами. приспособлены къ паразитизму. Наиболъе типичнымъ представителемъ этихъ цвътковыхъ паразитовъ является повилика (Cuscuta): очень мелкія съмена повилики, распространяющіяся вътромъ, насъкомыми или другими способами, прорастаютъ весною въ почвѣ и даютъ ростки, которые, удлиняясь, обвиваютъ спиралью стебли, стволы или вътви подходящихъ растеній (рис. 3) и присасываются кънимъ при помощи осо-

быхъ присосковъ, помощью которыхъ молодое растеніе не только прикръпляется, но и извлекаетъ необходимые питательные соки, такъ

какъ основной стебелекъ, отъ котораго началось развитіе паразита, вскорѣ отмираетъ. Быстро разрастаясь, повилика образуетъ густое сплетеніе длинныхъ, красноватыхъ стеблей въ видѣ шнуровъ, на которыхъ вмѣсто листьевъ имѣются лишь небольшія чешуйки. На этихъ-же стебляхъ въ серединѣ лѣта появляются клубочки




Рис. 4. Пораженіе корней кустарниковъ Петровымъ крестомъ (Lathraea squamaria).

бъловатыхъ или розоватыхъ цвъточковъ, изъ которыхъ развиваются съмена. Повилика сильно ослабляетъ и даже губитъ тъ растенія, къ которымъ она присасывается. Извъстно нъсколько видовъ, встръчающихся на опредъленныхъ растеніяхъ, напр., клеверная повилика (Cuscuta epithymum Murr.), льняная повилика

(C. epilinum W.); хотя повилика встръчается преимущественно на травянистыхъ растеніяхъ, однако нъкоторые виды ея появляются также на кустарникахъ, -- между прочимъ, въ запущенныхъ виноградникахъ можно находить Cuscuta lupuliformis Kr., образующій своими сплетеніями непроходимыя дебри.

Изъ другихъ цвътковыхъ паразитовъ, нападающихъ на виноградную лозу, можно еще указать на виды Lathraea (L. clandestina, L. squamaria), которые развиваются на корняхъ (стр. 13. рис. 4) и истощаютъ кусты. Этотъ паразитъ указанъ во Франціи 1), но въ Россіи, насколько мнъ извъстно, на лозъ еще не обнаруженъ.

Нельзя не отмътить, что среди цвътковыхъ растеній паразиты составляютъ въ сущности самый ничтожный процентъ, тогда какъ




Рис. 5. Типы бактерій при увеличеніи въ 500 разъ.


среди низшихъ растеній, такъ называемыхъ споровыхъ, они въ извъстныхъ группахъ являются уже преобладающими, а именно: у грибовъ и, отчасти, у водорослей. Большинство водорослей снабжено хлорофилломъ и потому развивается нормально, какъ цвътковыя растенія, но есть между ними цълая группа, такъ называемыя, бактеріи, у которыхъ хлорофилла вовсе нътъ и которыя обречены, слѣдовательно, на сапрофитическій образъ жизни. Всъмъ из-

въстно, какую важную роль играютъ бактеріи въ эпидемическихъ заболъваніяхъ людей и домашнихъ животныхъ: холера, тифъ, туберкулезъ, сибирская язва, все это — бактеріальныя бользни, иначе называемыя бактеріозами. Аналогичные бактеріозы встрьчаются также у растеній, когда въ ихъ тканяхъ развиваются опредъленныя бактеріи, вызывающія появленіе болье или менье значительныхъ наростовъ, слизетеченій или просто загниваніе пораженныхъ органовъ. Бактеріи представляются въ видъ очень маленькихъ безцвътныхъ палочекъ или шариковъ (рис. 5), размножающихся преимущественно простымъ дъленіемъ. Вслъдствіе

виловь встранающихся на опредаленних

быстраго размноженія и чрезвычайной устойчивости ко всякаго рода неблагопріятнымъ условіямъ, какъ холодъ, засуха и т. д., онъ представляютъ большую опасность въ смыслъ массоваго распространенія причиняемыхъ ими бользней, что усугубляется еще

тъмъ обстоятельствомъ, что онъ легко переносятся воздушными теченіями вмъстъ съ пылью на болъе или менъе далекія разстоянія. Раститель-ные бактеріозы встръчаются сравнительно рѣже, чѣмъ бактеріозы у животныхъ, главнымъ образомъ, благопаря тому, что бактеріи не способны проникать въ растительныя ткани черезъ неповрежденную кожицу и могутъ поражать ткани только въ томъ случав, если таковыя предварительно обнажены, какъ то бываетъ, напр., при пораненіяхъ, уколахъ насъкомыхъ, треніяхъ и т. д. Бактеріозы встрѣчаются также у виноградной лозы, но Рис. 6. Наростъ на корняхъ виновъ общемъ они, по крайней мъръ у градной лозы, причиненный бакнасъ. особаго экономическаго значе-



теріями (въ уменьшенномъ видъ).

нія не имъютъ. Укажемъ, между прочимъ, на зобоватость корней (рис. 6), которая подобна той-же бользни у съмячковыхъ плодовыхъ деревьевъ и причиняется бактеріей Bacterium tumaefaciens.

грибницей (естеств. всличина). Ш КИХЪ, КОРИЧНЕВАТЫХЪ, ЭЛЛИП-

Наиболъе приспособленными къ паразитической жизни являются, несомнънно, грибы: среди нихъ мы и встръчаемъ самыхъ опасныхъ вредителей воздълываемыхъ растеній и въ частностивиноградной лозы. Поэтому грибы заслуживаютъ со стороны сельскихъ хозяевъ самаго большого вниманія, а ознакомленіе съ ихъ строеніемъ и особенностями имъетъ важное практическое значеніе. Но на дълъ выходить, что въ общежитіи понятія о грибахъ весьма неопредъленны. Въ большинствъ случаевъ создается представление о грибахъ по тъмъ сыроъжкамъ, шампиньонамъ, боровикамъ, березовикамъ и различнымъ поганкамъ, которые

¹⁾ Marsais: "Les Lathraea et la Vigne" въ Revue de Viticulture 1910, p. 770.

встрѣчаются въ нашихъ лѣсахъ. Между тѣмъ эти, такъ называемые, шляпочные грибы, составляютъ лишь незначительную часть обширной группы грибовъ, обнимающей болѣе 60,000 видовъ, не говоря уже про то, что шляпка и пенекъ, которымъ присваивается въ обыденной рѣчи наименованіе гриба, представляютъ лишь часть всего организма, наиболѣе развитую и потому бросающуюся въ глаза. Если внимательнѣе разсмотрѣть такой шляпочный грибокъ, напр., боровикъ (рис. 7), то не трудно убъдиться, что пенекъ своимъ основаніемъ прикрѣпленъ къ землѣ болѣе или менѣе многочисленными бѣлыми развѣтвленными ни-




Рис. 7. Боровикъ съ нитевидной грибницей (естеств. величина).

тями, которыя простираются въ почвъ на подобіе паутины. Обыкновенно на этихъ паутинистыхъ нитяхъ сидятъ нъсколько пеньковъ со шляпками. чъмъ и объясняется появленіе этихъ послъднихъ гнъздами. Продолжая наше наблюденіе, мы увидимъ, что на нижней поверхности шляпки боровика имъются вертикально расположенныя, мясистыя трубочки, которыя, при разсмотрѣніи подъ микроскопомъ, оказываются усъянными безчисленнымъ количествомъ маленькихъ, коричневатыхъ, эллипсоидальныхъ клъточекъ, легко

осыпающихся. Эти клѣточки, называемыя спорами, служатъ для размноженія гриба, — являются, слѣдовательно, зародышами. Исходя изъ этихъ наблюденій, мы уже можемъ составить себѣ нѣкоторое, болѣе точное представленіе о грибѣ: пенекъ и шляпка являются очевидно плодоносцами, т. е. такими органами, на которыхъ сосредоточиваются зародыши; паутинистыя-же развѣтвленія, несмотря на свою невзрачность, являются главной частью всего организма, отъ нормальнаго развитія которой зависитъ образованіе плодоносцевъ. Если сравнить теперь нашъ грибъ съ какимълибо высшимъ растеніемъ, напр., съ яблонью, то паутинистая

ткань, очевидно, будетъ соотвътствовать корнямъ, стволамъ и вътвямъ съ листьями; совершенно такъ-же, какъ на яблонъ бываетъ много яблокъ, на паутинистой ткани грибка имъются многочисленные пеньки со шляпками. Наконецъ, споры будутъ соотвътствовать съменамъ, такъ какъ изъ нихъ развиваются новые грибы. Такимъ образомъ, у грибовъ, какъ и у высшихъ растеній, можно отличить вегетативные органы, служащіе для






Рис. 8. Прорастаніе споръ Penicillium (увелич. 500 разъ).

питанія и разрастанія, и органы размноженія. Вегетативная часть у нашего боровика носить названіе *грибницы* или *мицелія* и является типичной для всей группы грибовь; дъйствительно, за очень немногими исключеніями (у низшихь грибовь класса Миксохитридіевыхь), у которыхь вегетативные органы, можно сказать, только намѣчены, у всѣхъ остальныхъ грибовъ, на какомъ-бы субстратѣ они ни развивались, всегда наблюдается нитевидная грибница и, слѣдовательно, присутствіе этой грибницы можно

считать однимъ изъ характерныхъ признаковъ группы грибовъ. Второй отличительный признакъ, это размножение спорами, которыя образуются на поверхности или внутри самыхъ разнообразныхъ плодоносцевъ, а иногда и непосредственно на нитяхъ (такъ называемыя гифы) грибницы. Здъсь будетъ кстати установить разницу между съменемъ и спорой. Съмя представляетъ изъ себя, въ сущности, растеніе въ уменьшенномъ видъ, такъ какъ въ немъ имъется корешокъ, стебелекъ, первые листочки (съмяполи) и верхушечная почка; при прорастаніи съмени всъ эти части только разрастаются. Спора ничего подобнаго не имфетъ,

а состоитъ только изъ одной клѣточки, обыкновенно очень незначительныхъ раз-







разъ); прорастающія споры Alternaria vitis.

мъровъ, которая, въ большинствъ случаевъ, при прорастаніи даетъ нитевидный ростокъ (стр.17, рис. 8), быстро удлиняющійся и развѣтвляющійся болъе или менъе правильно лучеобразно, образуя грибницу (рис. 9). Слѣдуетъ при этомъ имѣть въ виду, что при описаніи грибовъ часто употребляется терминъ многоклютная спора для такихъ споръ, которыя снабжены одной или нъсколькими перегород-

ками (стр. 18, рис. 10). Не трудно убъдиться, что у этихъ многоклътныхъ споръ, каждая отдъльная часть прорастаетъ вполнъ самостоятельно (рис. 10, справа) и, слъдовательно, представляеть изъ себя именно спору, вслъдствіе извъстныхъ условій не отдълившуюся отъ другихъ, сходныхъ съ нею.

Третій отличительный признакъ грибовъ, это, какъ уже отмъчено выше. - отсутствіе хлорофилла и связанное съ этимъ отсутствіе крахмала, столь распространенное у высшихъ растеній. Правда, нъкоторые, очень немногіе и, можно даже сказать, единичные грибы, имъютъ зеленую окраску, какъ, напр., виды Chlorosplenium, вызывающіе гниль древесины нѣкоторыхъ лиственныхъ породъ, сопровождаемую сильнымъ зеленымъ оттънкомъ пораженныхъ частей, но въ такихъ случаяхъ зеленая окраска происходить не отъ хлорофилльныхъ зеренъ, а отъ особыхъ красящихъ веществъ, такъ называемыхъ пигментовъ. Но большею частью грибы представляются весьма разнообразной окраски, кромъ зеленой, неръдко весьма яркой, въ особенности въ ихъ плодоносной части.

Основываясь на вышесказанномъ, мы можемъ теперь формулировать характерные признаки грибовъ, какъ организмовъ, принадлежащихъ къ растительному царству, размножающихся спорами, обладающихъ вегетативными органами въ видъ грибницы и лишенныхъ хлорофилла и крахмала. Такая характеристика позволить намъ отнести къ группъ грибовъ всъ тъ растенія, которыя представляють совокупность упомянутыхъ признаковъ, и въ это понятіе вовсе не входятъ соображенія о формъ плодоносцевъ, которые играютъ роль лишь при дальнъйшихъ, второстепенныхъ подраздъленіяхъ самой группы.

Все растительное царство дълится, какъ извъстно, на двъ группы: цвттковыя или высшія растенія и низшія или споровыя. Грибы, очевидно, относятся къ споровымъ. Эти послъднія, въ свою очередь, подраздъляются на три отдъла: слизевики или простъйшіе организмы, слоевцовые, вегетативныя части которыхъ имъютъ нитчатое строеніе, и архегоніатовые, которые отличаются присутствіемъ въ тканяхъ сосудистыхъ пучковъ и къ которымъ причисляются мхи и папоротники. Къ слоевцовымъ относятся водоросли и грибы, составляющіе двъ на столько близко соприкасающіяся группы, что существуєть предположеніе о происхожденіи послѣднихъ отъ первыхъ. Вопросъ о происхожденіи живыхъ организмовъ и о болѣе или менѣе близкихъ родственныхъ связяхъ между ними является чрезвычайно сложнымъ и, во всякомъ случаѣ, далеко не рѣшеннымъ; физіологическія особенности грибовъ въ связи съ приспособленіемъ ихъ къ паразитическому или сапрофитическому образу жизни наложили на нихъ весьма характерный отпечатокъ, выдѣляющій ихъ въ однородную, вполнѣ обособленную группу, но вмѣстѣ съ тѣмъ, близкое родство нѣкоторыхъ представителей ея съ другими, смежными группами не подлежитъ сомнѣнію; такъ, можно установить нѣкоторую связь грибовъ не только съ водорослями, но и со слизевиками и отчасти даже съ низшими животными.

Установивъ понятіе о грибахъ вообще, намъ остается теперь нъсколько подробнъе остановиться на ихъ морфологіи, т. е. на особенностяхъ ихъ строенія. Каждое растеніе, къ какой-бы группъ оно ни принадлежало, состоитъ изъ совокупности извъстныхъ частей или органовъ, имъющихъ опредъленное назначеніе. У высшихъ растеній, т. е. у цвътковыхъ, органы чрезвычайно разнообразны по строенію и строго приспособлены къ исполненію опредъленныхъ функцій; у низшихъ-же растеній, съ болъе простымъ строеніемъ, такого рѣзкаго раздѣленія труда между частями организма не замъчается и всъ жизненныя функціи исполняются всемъ организмомъ, составныя части котораго боле однородны. Тогда какъ у высшихъ растеній вегетативные органы доходять до чрезвычайной сложности и вмъсть съ тъмъ получаютъ спеціальное назначеніе для исполненія опредъленныхъ функцій, у низшихъ растеній, напротивъ, эти органы сравнительно мало развиты, болъе однообразны по строенію и не спеціализируются по функціямъ. Зато относительно органовъ размноженія мы видимъ совершенно обратное: въ то время какъ у цвътковыхъ образуются только одного рода съмена въ цвътахъ, у водорослей и у грибовъ наблюдается разнообразіе органовъ размноженія, приспособленныхъ къ тъмъ или инымъ условіямъ окружающей среды. Такимъ образомъ, мы встръчаемся въ растительномъ царствъ съ двумя направленіями, въ зависимости отъ условій жизни: цвътковыя растенія, предназначенныя къ болъе продолжительной индивидуальной жизни, снабжены такой организаціей, которая даетъ имъ возможность развиваться, хотя сравнительно медленно, но съ достаточной силой при использованіи всъхъ благопріятныхъ внъшнихъ условій. Жизненныя функціи распредъляются строго между различными органами, имъющими для этого опредъленное строеніе и приспособленными по своей внъшней формъ къ той роли, которую они призваны исполнять. При такомъ распредъленіи труда можетъ, конечно выработаться большая устойчивость и значительное сопротивление внъшнимъ разрушительнымъ дъйствіямъ, чъмъ и оберегается жизнь каждаго отдъльнаго индивидуума. У низшихъ растеній въ большинствъ случаевъ жизнь индивидуальная очень кратковременна и направлена лишь къ одной цъли: къ возможно быстрому и многочисленному созданію новыхъ поколѣній. Эта способность, какъ увидимъ дальше, доведена у грибовъ до положительно изумительныхъ размъровъ, благодаря чему они играютъ такую важную роль въ природъ, несмотря на простоту и хрупкость строенія, равно какъ и на сравнительно малый объемъ. Они въ полномъ смыслъ слова берутъ своей численностью и быстротой развитія.

Вегетативные органы у грибовъ представляются, какъ сказано было выше, въ видъ паутинистаго сплетенія нитей (гифъ), носящаго названія грибницы или мицелія. Эти гифы чрезвычайно тонки и для ихъ разсмотрънія небходимо пользоваться микроскопомъ; замътимъ при этомъ, что для измъренія микроскопическихъ предметовъ установлена особая мъра тысячная доля миллиметра, которая носитъ названіе микромиллиметра или микрона и обозначается для краткости греческой буквой μ . Такимъ образомъ, когда говорятъ, что какая-нибудь спора им \pm етъ 12 μ длины, то это значитъ, что длина ея равняется 12 тысячнымъ долямъ миллиметра. Грибныя гифы обыкновенно не превышаютъ въ діаметръ нъсколькихъ μ , но длина ихъ весьма различна: тогда какъ у нъкоторыхъ грибовъ грибница слабо развита, вовсе или почти неразвътвленная, у другихъ она сильно вътвится и достигаетъ размъровъ нъсколькихъ миллиметровъ, иногда сантиметровъ, а иной разъ-даже десятковъ сантиметровъ длины. Типичное развитіе и строеніе грибницы можно наблюдать у обыкновенной плъсени Mucor mucedo, встръчающейся на хлъбъ, вареньъ и т. д. въ видъ бълаго хлопьевиднаго налета. Если посъять одну спору этой плъсени въ отваръ сливъ или въ другой какой-либо питательной средь, то уже черезъ нъсколько часовъ наступитъ прорастаніе и разовется лучистая, безцвѣтная грибница (рис. 11). Разсматривая эту грибницу подъ микроскопомъ, мы увидимъ, что какъ-бы ни увеличились ея размѣры, она представляетъ изъ себя одну кльтку, состоящую изъ прозрачной, безцвѣтной оболочки и содержимаго, также безцвѣтнаго. Это и будетъ одноклътная грибница, т. е. такая, у которой не бываетъ поперечныхъ перегородокъ. Слѣдуетъ однако замѣтить, что въ тѣхъ случаяхъ, когда грибница сильно разрастается, то болѣе старыя ея части пустѣютъ и содержимое переходитъ отъ центра къ окраиннымъ




Рис. 11. Лучистая грибница Mucor mucedo (увелич. 1000 разъ).

частямъ; тогда пустыя и омертвѣлыя части отдѣляются отъ живыхъ поперечными перегородками. Содержимое грибницы состоитъ изъ протоплазмы и одного или нѣсколькихъ ядеръ. Кромѣ протоплазмы и ядеръ, представляющихъ собою живыя части клѣтки, встрѣчаются еще капли масла, кристаллы, вода и многочисленныя вещества, растворенныя въ этой водѣ; такіе растворы носятъ названіе клѣточнаго сока. Въ данномъ примѣрѣ

плъсневой грибницы, питаніе этой послъдней происходитъ всей поверхностью оболочки, черезъ которую переходятъ во внутрь питательные соки, сначала смъшивающіеся съ клъточнымъ сокомъ, а затъмъ всасываемые протоплазмой, причемъ указанные процессы весьма сложны и сопровождаются различными превращеніями питательныхъ веществъ путемъ вліянія на нихъ особыхъ элементовъ, выдъляемыхъ протоплазмой и извъстныхъ подъ названіемъ энзимовъ. Останавливаться на подробностяхъ питанія грибовъ здъсь нътъ возможности и мы ограничимся лишь указа-

ніемъ, что вся жизнедъятельность грибовъ, какъ паразитовъ, такъ и сапрофитовъ, объясняется именно способностью ихъ выдълять множество энзимовъ, задача которыхъ состоитъ въ превращеніи нерастворимыхъ питательныхъ веществъ, извлекаемыхъ изъ субстрата, въ растворимыя и удобоусваиваемыя соединенія. Такъ какъ энзимы имъютъ, вообще, очень ограниченный кругъ дъйствій, оказывая вліяніе только на опредъленныя вещества, то, въ зависимости отъ способности даннаго грибка выдълять тъ или иные энзимы, опредъляется его отношение къ субстрату,




Рис. 12. Присоски мильдью (часть грибницы при увеличеніи въ 1000 разъ).

и этимъ объясняется разборчивость многихъ грибовъ къ питательной средѣ: всеядныхъ грибовъ, развивающихся безразлично на любомъ субстратѣ, почти нѣтъ: только очень немногіе сапрофиты встрѣчаются на какихъ угодно средахъ, большинство-же грибовъ пріурочено къ опредѣленнымъ субстратамъ, и въ особенности паразиты развиваются только на извѣстныхъ растеніяхъ или животныхъ. Между прочимъ, почти всѣ паразиты виноградной лозы, за исключеніемъ корневой гнили, не пред-

ставляются опасными для другихъ возд \pm лываемыхъ или дикорастущихъ растеній 1).

У нъкоторыхъ грибковъ наблюдается особое осложнение въ питательныхъ функціяхъ, заключающееся въ томъ, что для




Рис. 13. Грибница *Guignardia* baccae при увелич. въ 500 разъ.

Одноклѣтная грибница встрѣчается лишь у небольшого коли-

чества, такъ называемыхъ, низшихъ грибовъ; въ большинствъ-же случаевъ грибница обладаетъ болъе или менъе многочисленными поперечными перегородками, отдъляющими другъ отъ друга вполнъ живыя части, заключающія протоплазму. Такая грибница носитъ названіе многоклютной. Обыкновенно между соприкасающимися клътками многоклътной грибницы нътъ сообщенія (стр. 24, рис. 13), но у нъкоторыхъ грибковъ, а именно у представителей подкласса базидіальныхъ, наблюдаются боковыя пряжки (рис. 14), устанавливающія сообщеніе между смежными клътками.

Многоклътныя грибницы чаще всего лишены присосковъ, но въ нъкоторыхъ случаяхъ, какъ, напр., у ржавчинныхъ грибковъ

или у мучнисто-росяныхъ, онѣ снабжены ими; у этихъ послѣднихъ грибница развивается всегда только на поверхностилистьевъ, побѣговъ или плодовъ, и присоски, проникающіе въ эпидермическія клѣтки пораженныхъ растеній, служатъ какъ для питанія паразита, такъ и для прикрѣпленія его къ субстрату. Многоклѣтная грибница можетъ быть безцвѣтной, прозрачной, но въ иныхъ случаяхъ она бываетъ окрашенной въ оливковый, коричневый или иной цвѣтъ.

Нитевидная грибница, какъ одноклѣтная, такъ и многоклѣтная, обыкновенно имѣетъ кратковременный срокъ жизни и отмираетъ послѣ развитія плодоносцевъ, въ каковомъ случаѣ ее можно сравнить съ однолѣтнимъ растеніемъ, тоже отмирающимъ послѣ цвѣ-




Рис. 14. Пряжки грибницы домоваго грибка (увелич. 350 разъ).

тенія и образованія сѣмянъ. Нѣкоторые грибы имѣютъ, однако, дэлголѣтнюю грибницу, какъ, напр., извѣстные ржавчинные или трутовики, грибница которыхъ распространяется въ древесинѣ годами и образуетъ ежегодно въ опредѣленное время новые плодоносцы; ихъ можно сравнить съ многолѣтними высшими растеніями. Но въ томъ и въ другомъ случаяхъ нитевидная грибница, вообще, весьма чувствительна ко всякаго рода внѣшнимъ условіямъ и прежде всего къ рѣзкимъ измѣненіямъ температуры или къ продолжительной засухъ. Этотъ, весьма серьезный для сохраненія видовъ грибовъ, недостатокъ въ значительной степени стушевывается спо-

¹⁾ Желающіе ближе ознакомиться съвопросомъобъэнзимахъ могутънайти необходимыя свъдънія во 2-мъ томъ моей книги: "Болъзни растеній" (СПБ. 1911).

собностью грибницы въ извъстныхъ случаяхъ претерпъвать нъкоторыя превращенія, слѣдствіемъ которыхъ является большая устойчивость къ внъшнимъ неблагопріятнымъ условіямъ. Во время этихъ превращеній грибокъ какъ-бы временно пріостанавливаетъ свое развитіе, которое съ наступленіемъ подходящихъ условій возобновляется, и поэтому такое состояніе характеризовано названіемъ




Рис. 15. Оидіи грибка Mucor racemosus анмоонода (увелич. 500 разъ).

стадіи покоя, каковая бываетъ четырехъ родовъ, а именно:

1. Оидіи. Въ извъстныхъ случаяхъ, вызываемыхъ преимущественно недостаткомъ питанія или неподходящими климатическими условіями, у многихъ грибовъ гифы распадаются на отдъльныя продолговатыя или эллипсоидальныя клътки, расположенныя четкообразно и способныя развиваться самостоятельно: если, напр., грибница плъсневого грибка Мисог racemosus развивается въ молокъ или другой подобной жидкости при недостаточномъ доступъ воздуха, то она очень скоро распадается на отдъльныя клътки (рис. 15), коополи вывон кмера воннена дения вы торыя носять название

оидіевь. Если оставить оидіи въ тъхъ-же условіяхъ, при которыхъ они образовались, то наблюдается очень характерный способъ ихъ размноженія, заключающійся въ томъ, что каждая клѣтка образуетъ одно или нъсколько вздутій, принимающихъ очень быстро размъры и форму маточной клътки и отдъляющихся отъ нея: этотъ способъ размноженія, извъстный подъ названіемъ

почкованія (рис. 16), продолжается можно сказать до безконечности и протекаетъ настолько быстро, что изъ одной клътки черезъ нъсколько часовъ можетъ образоваться безчисленное количество оидіевъ. Если теперь измѣнить условія среды, т. е. улучшить питаніе, доступъ воздуха и т. д., то изъ оидіевъ вырастаетъ новая нормальная грибница, по крайней мъръ, у нъкоторыхъ грибовъ. Есть виды, у которыхъ оидіи появляются сравнительно ръдко, такъ сказать - случайно, но извъстны также и такіе грибы, у которыхъ превращеніе грибницы въ оидіи является преобладающимъ до такой степени, что они почти совершенно теряють возможность развиваться въ другихъ стадіяхъ. Въ этомъ отношеніи въ особенности интересны, такъ называемые, дрожжевые или бродильные грибки, играющіе весьма важную роль какъ вообще въ природъ, такъ и въ примъненіи къ техникъ различныхъ производствъ. Эти грибки встръчаются въ изобиліи

на поверхности созрѣвающихъ ягодъ и плодовъ и размножаются затъмъ въ суслъ при выдълываніи вина. Обладая, несмотря на очень незначительные размъры, энергичной жизнедъятельностью, дрожжевые грибки вызываютъ быстрое превращение сахаристыхъ жидкостей въ спиртъ, сопровождаемое обиль-



нымъ выдъленіемъ углекислоты. Они слу- Рис. 16. Почкованіе дрожжатъ для приготовленія вина, спирта, пива, жевыхъ грибковъ (увелич. 350 разъ). кефира, кумыса и т. д. и находятъ себъ при-

мъненіе въ изготовленіи тъста. Встръчаясь во всъхъ субстратахъ, содержащихъ сахаръ, бродильные грибки очень часто развиваются совмъстно, неръдко мъшая другъ другу, вслъдствіе чего получаются весьма разнородные продукты броженія. Во избъжаніе этого теперь все чаще прибъгаютъ къ примѣненію чистыхъ культуръ дрожжей, устраняющихъ всякія случайности техническаго производства.

2. Хламидоспоры имъютъ то же происхождение, что и оидіи, развиваясь также отъ распаденія грибныхъ гифъ, но ихъ строеніе нъсколько сложнъе. Подъ вліяніемъ измъненій въ условіяхъ среды содержимое гифъ скопляется въ нѣкоторыхъ частяхъ, сгущается и окружается особой оболочкой, тогда какъ отдъляющія ихъ опустълыя части гифъ съеживаются (стр. 28, рис. 17) и такимъ образомъ получается цъпочка округлыхъ или эллипсоидальныхъ клътокъ, впослъдствіи освобождающихся совершенно и извъстныхъ подъ названіемъ хламидоспоръ; у большинства хламидоспоръ оболочка утолщенная, неръдко окрашенная въ желтый, оранжевый, коричневый и иные цвъта, часто шетинистая, сътчатая, бугорчатая и т. д. У нъкоторыхъ грибовъ хламидоспоръ вовсе нътъ или онъ, по крайней мъръ, не обнаружены, у другихъ онъ встръчаются лишь изръдка и случайно и, наконецъ, существуютъ такіе грибы, у которыхъ хламидоспоры составляютъ непремѣнное звено въ циклъ развитія каждаго индивидуума. Къ таковымъ принадлежать,



сеѕ (увелич.

между прочимъ, двъ группы грибовъ-головневые и ржавчинные, причемъ последніе даже развиваютъ послѣдовательно совершенно различные типы хламидоспоръ. Значеніе хламидоспоръ для сохраненія видовъ грибовъ огромное, такъ какъ большинство изъ нихъ приспособлено къ переживанію извъстнаго, болъе или менъе продолжительнаго, періода покоя, послъ котораго онъ продолжаютъ свое развитіе, т. е. такъ или иначе прорастаютъ. Если къ этому прибавить, что благодаря плотности содержимаго и толщинъ Рис. 17. Цѣ- оболочки эти хламидоспоры совершенно обезпечены доспоръгриб- во время періода покоя отъ вліянія какихъ-либо вредка Protomy- ныхъ условій окружающей среды, то становится понят-350 разъ). нымъ, насколько ихъ образованіе въ циклъ развитія грибка создаетъ для него весьма важное преимуще-

ство; во многихъ случаяхъ, какъ, напр., у ржавчинныхъ, хламидоспоры, образовавшіяся осенью, перезимовываютъ, не повреждаясь при самыхъ сильныхъ морозахъ, и прорастаютъ слъдующей весной; даже больше: неоднократно наблюдалось, что хламидоспоры ржавчинныхъ, оставленныя въ комнатъ и не подверженныя ръзкимъ климатическимъ условіямъ зимы, не прорастали и такимъ образомъ, въ данномъ случаъ, болъе или менъе значительные холода оказываются полезными. У головневыхъ грибковъ еще большая устойчивость: хламидоспоры могутъ сохраняться въ теченіе нъсколькихъ (3), а иногда и многихъ (10-17) лътъ и тъмъ не менъе, послъ столь продолжительнаго срока, не теряютъ способности къ прорастанію; холода, даже значительные, ихъ не повреждають: что-же касается высокихъ температуръ, то онъ могутъ безвредно переносить до 40 и болъе градусовъ по Реомюру. Если сопоставить эту изумительную устойчивость съ условіями разви-

тія нормальной грибницы, которая гибнетъ уже при 40 и при 300 по Реомюру, то не можетъ быть сомнънія въ томъ, что хламидоспоры значительно поддерживаютъ жизнеспособность тъхъ грибовъ, у которыхъ онъ появляются.




Рис. 18. Прорастаніе эцидіоспоръ линейной ржавчины въ грибницу (увелич. 1000 разъ).




Рис. 19. Хламидоспора, прорастающая въ базидію (увелич. 500 разъ).

При своемъ прорастаніи хламидоспоры могутъ либо раз-

вивать нормальную грибницу, какъ у нъкоторыхъ стадій ржавчинныхъ (рис. 18), либо образуютъ непосредственно извъстные плодоносные органы (рис. 19), либо, наконецъ, даютъ почкующіеся оидіи какъ у многихъ головневыхъ (рис. 20).

3. Ризоморфы. Хорошій примъръ ризоморфъ мы видимъ у опенка (Armillaria mellea), шляпочнаго гриба, растущаго группами на гніющихъ пняхъ хвойныхъ и лиственныхъ породъ, а также иногда на старыхъ стволахъ виноградной невагогрибка (увел, 350 разъ).



Рис. 20. Хламидоспора съпочкующимися оидіями у голов-

лозы (рис. 21). Отъ пеньковъ этихъ грибовъ между корой и древесиной простираются плотные, болъе или менъе толстые, вътвистые, цилиндрическіе или приплюснутые, коричневые или черные шнуры (рис. 22) съ бълой сердцевиной. Разсматривая эти шнуры подъ микроскопомъ, можно убъдиться, что они состоятъ изъ пучковъ сросшихся нитевидныхъ гифъ, причемъ тъ изъ нихъ, которыя находятся наружу, уплотнились и окрасились, составляя надежную обо-




Рис. 21. Плодовыя тъла опенка (въ 1/2 величину).

лочку. Ризоморфы простираются иногда по древесинъ или въ почвъ на значительную длину; они подвергаются безъ всякаго вреда сильнымъ холодамъ или продолжи-




Рис. 22. Ризоморфы опенка (естеств. велич.).

тельной засухѣ, а затѣмъ, если условія прорастанія становятся опять благопріятными, изъ поверхности выходять нормальныя гифы грибницы. При этомъ интересно еще отмътить, что ризоморфы можно разръзать на мелкіе куски и каждый кусочекъ будетъ прорастать самостоятельно.

4. Склероціи можно считать видоизміненіемъ ризоморфъ, въ томъ отношеніи, что въ состояніе покоя переходять не цѣлые участки грибницы, какъ въ предыдущемъ примъръ, а только нъкоторыя отдъльныя части, которыя уплотняются въ видъ клубочковъ

и принимаютъ снаружи черную или темно-коричневую окраску (рис. 23). На листьяхъ, стебляхъ и даже на яголахъ (рис. 24) виноградной лозы весьма часто встръчаются осенью и зимой склероціи грибка Sclerotinia Fuckeliana, въ видъ черныхъ округлыхъ или продолговатыхъ, шероховатыхъ бугорковъ величиною съ конопляное съмя. Скле-



роціи бываютъ у мно- Рис. 23. Чистая культура грибка Sclerotinia trifolioгихъ грибовъ, образуя гит, образующаго склероціи (фотогр. снимокъ). въ нъкоторыхъ слу-

чаяхъ, какъ и хламидоспоры, непремънную стадію развитія извъст-

склероціи являются шаровидными, продолговатыми, эллипсоидальными, очень твердыми, и при осмотръ ихъ подъ микроскопомъ обнаруживается одинаковое ихъ строеніе съ ризоморфами, т. е. уплотнение гифъ, изъ которыхъ наружныя образуютъ болѣе или менѣе окрашенную оболочку, а внутреннія представляютъ бълую сердцевину. Это во всъхъ тъхъ случаяхъ, когда склероціи развиваются на поверхности субстрата; но бываютъ случаи,




Рис. 24. Пораженіе виноградных в ягодъ грибкомъ Sclerotinia (естеств. велич.).

когда грибница, пронизывающая субстратъ, тоже уплотняется въ склероціи, который такимъ образомъ состоитъ уже изъ гифъ и изъ изсушенныхъ частей субстрата. Такъ, напр., въ южныхъ странахъ, въ лъсахъ около пней, образуются иногда огромные



Рис. 25. Прорастающій рожокъ спорыньи (въ увелич. видѣ).

склероціи величиною въ дътскую головку, состоящіе изъ плотнаго сплетенія гифъ одного трутовика и изъ частей земли, камней и тому подобныхъ предметовъ, включенныхъ среди гифъ: эти склероціи, извъстные въ Италіи подъ названіемъ грибного камня, съъдобны. Другіе подобные склероціи развиваются въ извѣстныхъ органахъ растеній: напр., плодовая гниль яблокъ, грушъ и другихъ съмячковыхъ превращаетъ упомянутые плоды въ коричневые и впо-

слъдствіи черные склероціи, происшедшіе отъ того, что гифы паразита сплетаются съ тканями плодовъ, не измѣняя ихъ наружной формы, и изсущаютъ ихъ; такое явленіе носитъ названіе мумификаціи.

Склероціи предназначены также для прохожденія извѣстнаго періода покоя, послѣ котораго они прорастаютъ, образуя по большей части плодовыя тъла соотвътствующаго грибка; если, напр., собрать рожки спорыный, представляющие склероции грибка Claviceps ригригеа, развивающагося въ завязяхъ ржи и другихъ злаковъ, и оставить ихъ на поверхности почвы или на глубинъ 1-2 сантиметровъ подъ землей въ теченіе зимы, то слѣдующей весной можно наблюдать прорастаніе этихъ склероціевъ, при чемъ изъ нихъ развиваются маленькія, округлыя головки на болѣе или менѣе удлиненныхъ ножкахъ (рис. 25). Сдълавъ тонкіе разръзы этихъ головокъ и разсмотръвъ ихъ подъ микроскопомъ, мы увидимъ, что въ нихъ имъются особыя вмъстилища (перитеціи), расположенныя въ большомъ количествъ по периферіи головокъ и содержащія сумки со спорами.


ръзать на мелкіе кусту вхат вкисте ов отбетунивен

Познакомившись съ вегетативными органами грибовъ въ ихъ различныхъ видоизмъненіяхъ, направленныхъ, какъ мы видъли,

отчасти къ предохраненію отъ ненормальныхъ, временныхъ условій окружающей среды, а также отчасти и къ размноженію, какъ при безконечномъ почкованіи оидіевъ, мы теперь можемъ перейти къ описанію органовъ разможенія, представляющихъ большое разнообразіе. Прежде всего можно различить три основныхъ типа органовъ размноженія, а именно: спорангій. сумка и базидія.

Спорангіемъ называется такое вмфстилище, въ которомъ споры располагаются въ неопредъленномъ количествъ. Въ самой простой своей формъ онъ представляется въ видъ шарообразнаго вздутія на концѣ гифы, именуемой въ такомъ случаѣ спорангіеносцемъ. Если наблюдать за упомянутымъ выше плъсневымъ грибкомъ Mucor mucedo (стр. 22, рис. 11), то, черезъ сутки или двое сутокъ послѣ прорастанія споры, можно видѣть, что нѣкоторыя гифы подымаются вертикально надъ поверхностью субстрата и вздува-

ются на концъ, причемъ эти вздутія постепенно увеличиваются и заполня ются многочисленными безцвътными эллипсоидальными одноклѣтными спорами. Оболочка этого спорангія чрезвычайно нѣжна и растворяется въ водѣ, причемъ споры такимъ образомъ освобождаются естественно при созрѣваніи (рис. 26). Разсматривая при увеличеніи въ 150 разъ такой спорангій, мы увидимъ, что верхняя часть гифы, несущей спорангій, вдавливается въ его полость болъе или менъе; эта вдавленная часть, Рис. 26. Спорангій вида Мисог встръчающаяся у многихъ видовъ, но- съ растворяющейся оболочкой ситъ названіе столбика. Присутствіе столбика, форма его, равно какъ и его



(увелич. 1000 разъ).

отсутствіе являются хорошими признаками для опредъленія видовъ и родовъ грибовъ.

Только-что описанныя споры плъсневаго грибка, выходящія изъ спорангія, разсѣиваются, конечно, только при помощи постороннихъ вліяній, не имъя возможности передвигаться самостоятельно. Но имфется цфлый рядъ такихъ грибовъ, споры которыхъ обладають способностью передвигаться самостоятельно въ жилкой средъ, что наблюдается у видовъ, приспособленныхъ къ водяной жизни или вообще къ сырой средъ. Здъсь мы видимъ, что оболочка спорангія сохраняется, и только въ одномъ какомъ-либо опредъленномъ мъстъ образуется небольшое отверстіе, изъ котораго содержимое спорангія выходитъ въ видъ отдъльныхъ комочковъ протоплазмы, почковидной или яйцевидной формы, снабженныхъ одной или двумя нитевидными, тонкими ръсничками (рис. 27). Эти ръснички обладаютъ очень быстрыми, едва уло-




Рис. 27. Зооспорангій и зооспоры вида *Saprolegnia* (увелич. 500 разъ).

вимыми колебаніями, обусловливающими передвиженіе споръ въ водѣ, въ теченіе приблизительно получаса. Такіе, спеціально приспособленные спорангіи, носять названіе зооспорангіевъ, а движущіяся споры называются зооспорами. Дальнѣйшая участь зооспоръ состоитъ въ томъ, что, послѣ указаннаго срока, движеніе ихъ, сначала быстрое, постепенно затихаетъ и, наконецъ, совершенно прекращается, рѣснички исчезаютъ, а самыя зооспоры округляются, облекаются въ оболочку и прорастаютъ какъ обыкновенная спора.

Какъ въ спорангіяхъ, такъ и въ зооспорангіяхъ споры и зооспоры образуются простымъ дѣленіемъ содержимаго спорангія на извѣстное количество отдѣльныхъ частей протоплазмы безъ всякаго посторонняго предварительнаго участія. Это—такъ называемые безполые спорангіи. Но существуютъ и такіе спорангіи, которые до образованія споръ подвергаются особому процессу совокупленія,

имѣющаго цѣлью созданіе настоящаго яйца или половой споры. Такіе половые спорангіи бывають двухъ типовъ. У нѣкоторыхъ грибовъ, на двухъ сосѣднихъ гифахъ образуются одинаковые по формѣ и по размѣрамъ спорангіи (стр. 35, рис. 28), которые приходятъ въ соприкосновеніе другъ съ другомъ, причемъ въ мѣстѣ соприкосновенія оболочка ихъ растворяется и содержимое сливается въ одинъ комокъ, облекающійся въ особую, большею частью

утолщенную и уплотненную оболочку. Совокупляющіеся спорангіи носятъ названіе *зиготовъ*, а полученная половая спора называется *зигоспорой*. У другихъ грибовъ совокупленіе происходитъ между

различными по формѣ и по величинѣ спорангіями, такъ что здѣсь вполнѣ опредѣляется половое различіе между этими спорангіями. Если сдѣлать тонкій разрѣзъ винограднаго листа, пораженнаго мильдью, и разсмотрѣть его подъ микроскопомъ, то при достаточномъ увеличеніи (350 или 500 разъ)




Рис. 28. Зиготы и зигоспоры вида *Mucor* (увелич. 1000 разъ).

обнаружится, что въ тканяхъ листа нѣкоторыя гифы вздуваются на концахъ, образуя шаровидные спорангіи. Одновременно съ этимъ, на тѣхъ-же гифахъ развиваются боковые, булавовидные

отростки, плотно прилегающіе къ конечнымъ спорангіямъ и пускающіе въ нихъ цилиндрическіе ростки, черезъ которые все содержимое переходитъ и сливается, послѣ чего въ большихъ спорангіяхъ образуется половая спора (рис. 29), носящая названіе ооспоры. У этой послѣдней оболочка твердѣетъ и плотнѣетъ; въ большинствѣ случаевъ она окрашена въ коричневый цвѣтъ и представляется либо гладкой, либо бугорчатой, щетинистой или сѣтчатой. Въ данномъ случаѣ большіе конечные спорангіи являются несомнѣнно женскими половыми органами и носятъ названіе




Рис. 29. Антеридій, оогоній и ооспора Пероноспораго грибка (увелич. 1000 разъ).

оогонієвъ, а маленькіе боковые спорангіи представляются мужскими половыми органами, именуемыми антеридіями. У нѣкоторыхъ видовъ къ одному оогонію прилегаетъ нѣсколько антеридієвъ;

число ооспоръ въ каждомъ оогоніи бываетъ различно въ зависимости отъ видовъ; въ извъстныхъ случаяхъ получается одна ооспора, въ иныхъ--- нѣсколько (рис. 30).

Какъ зигоспоры, такъ и ооспоры обычно прорастаютъ послъ извъстнаго. болъе или менъе продолжительнаго періода покоя. Если къ этому еще прибавить, что онъ, вслъдствіе плотности и утолщенія оболочки, являются весьма устойчивыми по отношенію къ различнымъ неудобнымъ условіямъ среды, то ихъ роль, въ смыслъ предохраненія вида отъ подобныхъ вредныхъ вліяній, можетъ быть приравнена къ роли хламидоспоръ, съ которыми

многія половыя споры имфють, впрочемъ, извъстное внъшнее сходство. Замътимъ, что половыя споры, въ большинствъ случаевъ,

образуются осенью и слу-

жатъ такимъ образомъ для перезимовки, прорастая слъ-




Рис. 30. Оогоній вида Achlya съ нѣсколькими ооспорами (увелич. 500 разъ).




Рис. 31. Сумка соспорами (увелич. 350



Рис. 32. Сумка съ отверстіемъ у вершины для выхода споръ (увелич. 500 разъ).

дующей весной. При прорастаніи получается или непосредственно грибница, или какіе-либо безполые органы размноженія какъ-то: спорангіи, зооспорангіи или конидіеносцы съ конидіями, о которыхъ ръчь будетъ впереди.

Сумка или аскуст представляетъ изъ себя безцвътный, прозрачный мъщечекъ, въ которомъ имъется всегда опредъленное для каждаго вида число споръ (называемыхъ также аскоспорами или сумкоспорами). Это число вообще кратное двухъ (2-4-16-32-64 и т. д.), но чаще всего 8. Сумки (стр. 36, рис. 31) бываютъ булавовилныя, цилиндрическія, мѣшковидныя, рѣже яйцевидныя или шаро-

видныя; при созрѣваніи, ихъ оболочка можетъ растворяться въ водъ какъ у спорангія, но по большей части для выхода споръ у вершины сумки образуется круглое отверстіе (стр. 36, рис. 32) съ клапаномъ или безъ такового, черезъ которое споры выбрасываются, неръдко съ большой силой, на значительное разстояніе.




Рис. 33. Одноклътная базидія (увелич. 500 разъ).

Внѣшнее отличіе сумокъ отъ


спорангія заключается, прежде всего, въ постоянномъ числъ споръ у первыхъ и въ томъ, что все содержимое спорангія идетъ

> безъ остатка на образованіе споръ, тогда какъ въ сумкъ часть содержимаго сохраняется между спорами въ видъ сильно переломляющаго свътъ вещества, которое называется эпиплазмой. Замъ-

тимъ еще, что въ спорангіяхъ, какъ половыхъ, такъ и безполыхъ, споры всегда одноклътны, между тъмъ какъ въ сумкахъ, въ зависимости отъ видовъ, встръчаются и одноклътныя, и двуили многоклѣтныя споры, весьма различной формы и окраски.

Базидія является цилиндрическимъ, груше-

Рис. 34. Базидія съ виднымъ или булавовид- Рис. 35. Базидія съ продольпоперечн. перегород. нымъ отросткомъ гифы, ными перегородками грибка senterica (ув. 500 разъ). на которомъ въ извѣст- Sebacina calca (ув. 500 разъ). ныхъ мъстахъ разви-



вается опредъленное число (большею частью 4, ръже-1, 2, 6 или 8) нитевидныхъ, болѣе или менѣе короткихъ ножекъ, называемыхъ стеригмами, на концахъ которыхъ отшнуровывается по одной шаровидной, яйцевидной или продолговатой однокл 1 тной, окрашенной или безцв 1 тной спор 1 , называемой базидіоспорой. Типичныя базидіи бывают 1 всегда однокл 1 тными (стр. 37, рис. 33); но существуєт 1 также ц 1 лая группа грибов 1 , у которых 1 в 1 базидіях 1 наблюдаются 1 перегородки, причем 1 из 1 каждой кл 1 тки выходит 1 по одной стеригм 1 . Такія многокл 1 тныя базидіи называются 1 перегородки у них 1 могут 1 быть поперечныя (стр. 37, рис. 34) или - же продольныя (стр. 37, рис. 35).

Сообразуясь съ описанными выше типами органовъ размноженія, грибы могутъ быть подраздълены на три основныя группы, принимая во вниманіе, что у каждаго вида наблюдается развитіе исключительно одного типа, устраняющаго остальные:

- $I.\ Cnopaнгiaльные\ грибы,\ у$ которыхъ образуются т $\mathfrak b$ или иные спорангiи.
- II. Сумчатые грибы или Аскомицеты, у которыхъ споры образуются въ сумкахъ.
- III. Базидіальные грибы или Базидіомицеты, у которыхъ споры образуются въ базидіяхъ.

Нъсколько дальше мы ознакомимся съ одной особенностью грибовъ, называемой плеоморфизмомъ и состоящей въ томъ, что у многихъ видовъ развивается несколько стадій размноженія въ извъстной послъдовательности, но при этомъ всегда одна изъ стадій принадлежить къ одному изъ вышеупомянутыхъ типовъ, а остальныя, такъ сказать, побочныя стадіи не могутъ быть подведены ни подъ одинъ изъ этихъ типовъ и составляютъ совершенно особую категорію, такъ наз., конидіальныхъ плодоношеній. Такимъ образомъ, у спорангіальныхъ грибовъ мы наблюдаемъ образованіе главной типичной стадіи въ видъ тъхъ или иныхъ спорангіевъ, и разныя конидіальныя стадіи, но здѣсь никогда не бываетъ сумокъ или базидій; у сумчатыхъ грибовъ главная стадія представлена сумками, которымъ предшествуютъ разнообразныя конидіальныя стадіи, но никогда не наблюдается ни спорангіевъ, ни базидій. Наконецъ, у базидіальныхъ имъются базидіи и въ нъкоторыхъ случаяхъ конидіальныя стадіи, но сумки и спорангіи отсутствуютъ.

Изслѣдуя теперь расположеніе органовъ размноженія на грибницѣ, мы обнаружимъ другіе признаки, могущіе послужить для группировки грибовъ въ опредѣленную систему.

У спорангіальныхъ грибовъ спорангіи образуютя свободно на концахъ развътвленій грибницы или среди гифъ и большею частью одиночно. Только изръдка и въ видъ исключенія у нъкоторыхъ видовъ спорангіи облекаются въ особое сплетеніе изъ безплодныхъ гифъ, образующихъ оболочку. Иногда также спорангіи скучиваются въ видъ четковидныхъ рядовъ и такимъ образомъ уже какъ бы намъчаются зачатки настоящихъ плодоношеній. Если же теперь обратимся къ сумчатымъ или базидіальнымъ, то получится совершенно обратное явленіе. Правда, нъкоторые,

болъе простые, представители этихъ двухъ группъ имъютъ сумки и базидіи, расположенныя безъ видимаго порядка на концахъ гифъ, но въ огромномъ большинствъ случаевъ здъсь наблюдается, во-первыхъ, явное стремленіе базидій и сумокъ къ извъстной сплоченности, во-вторыхъ, намъчается стремленіе такъ или иначе предохранить такимъ образомъ получающійся скученный слой сумокъ или базидій особыми покровами, состоящими изъ безплодныхъ гифъ, сочетаніе которыхъ



Рис. 36. Кармашки сливы въ естественную величину.

даетъ то, что называется плодоносцемъ или споровмъстилищемъ. Если мы возьмемъ, напр., на сливъ, пораженной, такъ наз., кармашками (рис. 36), одинъ изъ такихъ преобразованныхъ плодиковъ и сдълаемъ тонкій разръзъ бритвой, то, разсмотръвъ его подъ микроскопомъ при достаточномъ увеличеніи (въ 120—350 разъ) мы убъдимся, что болъзнь произошла отъ грибка, пронизывающаго своей грибницей весь плодъ, причемъ эта грибница развиваетъ на всей поверхности изуродованнаго плода плотный слой тъсно-скученныхъ, параллельно расположенныхъ булавовид-

ныхъ сумокъ (рис. 37). Подобный слой, придающій плоду характерную восковидную поверхность, носитъ названіе гименія или




Рис. 37. Гименіальный слой изъ сумокъ грибка, причиняющаго кармашки (увелич. 500 разъ).

гименіальнаго слоя; иногда онъ состоитъ исключительно изъ сумокъ или базидій, какъ въ предыдущемъ примъръ, или-же между сумками и базидіями имъются еще особые нитевидные или иного рода придатки, главное назначеніе которыхъ умфрить своей упругостью взаимное боковое давленіе, происходящее отъ чрезмърной скученности базидій или сумокъ. Такъ у сумчатыхъвесьма часто встръчаются между сумками нитевидные придатки, простые или развътвленные, называемые парафизами (рис. 38), причемъ неръдко концы этихъ парафизъ выдвигаются надъ поверхностью сумокъ, спле-

таются и сливаются въ болъе или менъе плотный, иногда окрашенный покровъ, служащій защитой для гименіальнаго слоя и извъст-




Рис. 38. Гименіальный слой сумчатаго грибка, состоящій изъ сумокъ и парафизъ (увелич. 500 разъ).

ный подъ названіемъ эпитеція. Въ базидіальныхъ гименіяхъ встръчаются иногда также парафизы, но чаще всего они здъсь замъняются другими,




Рис. 39. Гименіальный слой базидіальнаго грибка, состоящій изъ базидій и вздутыхъ цистидъ (увелич. 350 разъ).

весьма типичными образованіями въ видъ вздутыхъ, заостренныхъ или утолщенныхъ клѣтокъ, далеко выступающихъ надъ поверхностью гименія, называемыхъ *цистидами* (рис. 39).

Въ предыдущемъ примъръ грибка, производящаго кармашки сливы (Exoascus pruni Fckl.), мы имъли представителей той группы, которая, хотя и имъетъ гименіальный слой, однако лишена какихъ-либо оболочекъ или покрововъ, т. е. плодоносцевъ. Эта группа носитъ названіе голосумчатыхъ, которой у базидіальныхъ соотвътствуетъ группа голобазидіальныхъ. Но большинство сумчатыхъ и базидіальныхъ грибовъ образуетъ гименіальный

слой на поверхности или внутри хорошо развитыхъ плодоносцевъ, форма и строеніе которыхъ даетъ важныя указанія для систематики. Такъ, у сумчатыхъ можно отличить два типа плодоносцевъ: перитеціи (рис. 40), представля-




Рис. 40. Перитецій грибка *Guignardia baccae* на ягодахъ виноградной лозы въ разръзъ (увелич. 500 разъ).

ющіе собою шаровидныя или продолговатыя вмѣстилища, совершенно замкнутыя или снабженныя у вершины небольшими отверстіями и заключающія въ своей внутренней полости сумки. Такіе

сумчатые, у которыхъ имѣются перитеціи, причисляются къ группѣ пиреномицетовъ. У другихъ сумчатыхъ гименіальный слой расположенъ на внутренней, вдавленной поверхности мясистыхъ, восковатыхъ или студенистыхъ чашечекъ различныхъ размѣровъ (рис. 41), носящихъ названіе апотеціевъ. Такіе апотеціи могутъ быть сидячіе или-же на болѣе или менѣе удлиненной ножкѣ. Сумчатые, снабженные апотеціями, составляютъ группу дискомицетовъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ апотеціи представляются



Рис. 41. Чашечка апотеція дискомицета Sclerotinia Fuckeliana (увеличено).

въ видъ мясистой или студенистой шляпки на ножкъ, конической, округлой или неправильной формы, гладкой или извилистой, съ

верхней поверхности покрытой сплошь гименіальнымъ слоемъ (рис. 42). У многихъ пиреномицетовъ перитеціи образуются сво-

бодно на поверхности субстрата или внутри пораженныхъ тканей, выступая лишь своей вершиной или болъе или менъе удлиненнымъ хоботкомъ; это будутъ простые пиреномицеты въ отличіе отъ сложныхъ,



Рис. 42. Смарчокъ въ естественную величину.

Рис. 43. Ложа грибка изъ рода Valsa, образующія вздутія коры (естеств. велич.): справа - одна сумка и 2 споры грибка (увелич. 350 разъ).



Рис. 44. Хламидоспора вида Ustilago, прорастающая въ базидію съ поперечными перегородками (увелич. 500 разъ).

которые отличаются тъмъ, что изъ грибницы на поверхности субстрата или внутри его образуется сначала болъе или менъе плотное сплетеніе, сходное въ общемъ со склероціемъ и именуемое ложемъ или стромой; внутри этого ложа или, ръже, на его поверхности образуются болъе или менъе многочисленные перитеціи, которые такимъ образомъ являются тъсно - скученными (рис. 43).

> Переходя теперь къ базидіальнымъ грибамъ, слъдуетъ, прежде всего, выдълить Головневыхъ, отличающихся тъмъ, что грибница ихъ распадается на многочисленныя хламидоспоры, скопленіе которыхъ вызываетъ образование въ пораженныхъ частяхъ

растеній черной или оливковой пыли. Изъ этихъ хламидоспоръ

развиваются либо базидіи одноклѣтныя или съ поперечными перегородками (стр. 42, рис. 44), либо оидіи (стр. 29, рис. 20). Простота строенія выражается здісь въ томъ, что ність настоящаго гименіальнаго слоя и отсутствують плодоносцы. У остальныхъ базидіальныхъ наблюдается развитіе и того, и другихъ, причемъ дальнъйшее ихъ подраздъленіе основано на строеніи базидій, которое позволяеть установить двѣ группы: протобазидіальные, съ базидіями, снабженными поперечными или продольными перегородками, и автобазидіальные, съ одноклѣтными базидіями.

У протобазидіальных плодоносцы либо вовсе отсутствуютъ, какъ у ржавчинныхъ, либо представляютъ сравнительно несложное строеніе въ видъ студенистыхъ, неправильной формы комочковъ, какъ у дрожалокъ, или хрящеватыхъ, или кожистыхъ коростинокъ, какъ у Auricularia. Наоборотъ, у автобазидіальныхъ наблюдается большое разнообразіе и сложное строеніе плодоносцевъ: къ этой-же группъ относятся голобазидіальные, о которыхъ говорилось выше, но за исключеніемъ ихъ, всв остальные автобазидіальные имъютъ хорошо развитые плодоносцы, которые по расположенію базидій представляются двухъ типовъ: въ одной группъ базидіи располагаются на поверхности плодоваго тъла. — это будутъ Гименомицеты; въ другой — базидіи развиваются исключительно внутри плодоваго тъла, - это будутъ Гастромицеты.

Резюмируя теперь все сказанное, мы можемъ составить слъдующую схему классификаціи грибовъ:

- А. Спорангіальные грибы (спорангіи, зооспорангіи, половыя споры).
- а) Грибница вовсе отсутствуетъ и замъняется комочкомъ протоплазы (амебоидъ), обладающимъ во многихъ случаяхъ способностью передвигаться. Этотъ амебоидъ распадается на отдъльныя части (споры) или-же превращается въ зооспорангіи. Сюда относятся паразиты, живущіе внутри клѣтокъ питающаго растенія.

Классъ Миксохитридіевыхъ, раздъляющійся на 3 семейства. Примъръ: грибокъ Plasmodiophora brassicae W. (стр. 44, рис. 45), причиняющій килу капусты и другихъ крестоцвѣтныхъ.

б) Грибница хорошо развитая, но всегда одноклътная.

Тутъ различаютъ два подкласса:

Этотъ подклассъ раздъляется на 5 порядковъ:

1. *Миксохитридіевыя*, паразиты на инфузоріяхъ, водоросляхъ, ръже на высшихъ растеніяхъ (на пыльцъ, листьяхъ и стеб-

ляхъ; вызываютъ появленіе наростовъ, схожихъ съ килой).

- 2. Сапролегніевыя, паразиты на сѣянцахъ высшихъ растеній или сапрофиты на насѣкомыхъ, рыбахъ, ракахъ и на растительныхъ остаткахъ въ водѣ.
- 3. Пероноспоровыя, паразиты на высшихъ растеніяхъ. Примѣръ: Plasmopara viticola B. et T., причиняющій болѣзнь мильдью виноградной лозы.
- 4. Энтомофторовыя, паразиты на насъкомыхъ. Примъръ *Empusa muscae*, поражающій лътомъ домашнюю муху.
- 5. *Эндогоніевыя*, подземные сапрофитные грибки.

II. Половое размноженіе зиготами, дающими зигоспору. . . Зигомицеты.

Эту группу составляють почти исключительно сапрофитные, плѣсневые грибки, развивающіеся на разлагающихся органическихъ веществахъ; лишь немногіе виды являются паразитами на другихъ грибахъ, напр., на шляпочныхъ или на зигомицетахъ - же. Примѣръ: *Mucormucedo L.*, на хлѣбѣ, варенъѣ и т. д.

В. Сумчатые грибы.

а) Сумки образуются свободно на отдъльныхъ нитяхъ грибницы или въ видъ гименіальнаго слоя . . . Голосумчатые.

Рис. 45. Капустная кила въ

уменьшенномъ видъ.

Изъ четырехъ семействъ этой группы особеннаго вниманія заслуживаютъ семейство дрожжевыхъ (Saccharomyceteae), къ которому принадлежатъ различные виды дрожжей, и семейство экзоасковыхъ, представители котораго паразитируютъ на листьяхъ, плодахъ и вътвяхъ различныхъ растеній, вызывая утолщеніе и уродованіе листьевъ, измѣненіе формы плодовъ или, наконецъ, образованіе вѣдьминыхъ метелъ. Примѣръ: Exoascus pruni F., вызывающій появленіе кармашекъ у сливъ.

- δ) Сумки разбросаны или въ видѣ гименіальнаго слоя на поверхности или внутри плодоваго тѣла . . Π лодосумчатые.

Группа, выдъленная изъ пиреномицетовъ вслъдствіе отсутствія сплошного гименіальнаго слоя и состоящая изъ пяти семействъ; большинство представителей ея—сапрофиты. Нъкоторые живутъ подъ землей въ перегнойной почвъ; иные развиваются на различныхъ органическихъ остаткахъ и при томъ чаще всего въ конидіальныхъ стадіяхъ (Penicillium, Aspergillus), принадлежащихъ къ самымъ распространеннымъ плъсенямъ. Среди паразитовъ вниманія заслуживаетъ видъ Thielavia basicola, повреждающій корни различныхъ растеній.

Примъчаніе. Въ послѣднее время выяснилось, что имѣется цѣлая группа грибовъ съ многоклѣтной грибницей, но съ органами размноженія типа спорангіевъ или зооспорангіевъ. Присутствіе перегородокъ у грибницы рѣзко выдѣляетъ эти формы отъ остальныхъ спорангіальныхъ грибовъ и ихъ удобнѣе сгруппировать въ отдѣльное семейство Mesomycetineae, составляющее какъ-бы переходъ отъ высшихъ грибовъ къ низшимъ, принимая во вниманіе, что по присутствію спорангіевъ они приближаются къ спорангіальнымъ, а по наличности перегородокъ въ грибницѣ они имѣютъ тѣсное соприкосновеніе съ сумчатыми и базидіальными. Большинство Mesomycetineae—паразиты на высшихъ растеніяхъ, но особой опасности не представляютъ.

 Обширная группа, распадающаяся на 21 семейство и состоящая изъ сапрофитовъ и многочисленныхъ паразитовъ, въ особенности опасныхъ въ конидіальныхъ стадіяхъ.

Многочисленные представители этой группы распредѣляются между 13 семействами; большинство—сапрофиты и только очень немногіе—паразиты.

С. Базидіальные грибы.

Типичные паразиты, встръчающіеся въ различныхъ частяхъ пораженныхъ растеній, преимущественно въ цвътахъ.

- II. Гименіальный слой состоитъ изъ базидій, снабженныхъ поперечными или продольными перегородками . . . Протобазидіальные.
- 1) Плодовыхъ тълъ нътъ; на грибницъ образуются плотнымъ слоемъ хламидоспоры, изъ которыхъ развиваются базидіи съ поперечными перегородками. . . Семейство ржавчинныхъ.

Многочисленные представители этого семейства являются опасными паразитами на самыхъ разнообразныхъ растеніяхъ.

Сапрофиты на отмершихъ вътвяхъ различныхъ деревьевъ и кустарниковъ.

Сапрофиты на отмершихъ стволахъ и вътвяхъ древесныхъ и кустарныхъ породъ.

Небольшая группа сапрофитовъ на пняхъ, отмершихъ стволахъ и вътвяхъ различныхъ растеній.

III. Базидіи всегда одноклітныя. . . Автобазидіальные.

Это небольшое семейство заключаетъ въ себѣ паразитовъ различныхъ растеній, въ томъ числѣ паразита виноградной лозы на ягодахъ, обнаруженный Н. Н. Спѣшневымъ въ Туркестанѣ (Endobasidium clandestinum Spechnew).

- 2) Плодовыя тѣла всегда хорошо развиты . . . Плодобазидіальные.
 - а) Базидіи на поверхности плодоваго тѣла . Гименомицеты.
 - + Плодовыя тъла студенистыя . Dacryomycetineae. Сапрофиты, по внъшнему виду очень схожіе съ дрожалками.
 - ++ Плодовыя тъла мясистыя, кожистыя или деревянистыя, но не студенистыя.
 - 1. Гименіальный слой совершенно гладкій . *Телефоровые*.

Сапрофиты или полупаразиты.

Сапрофиты или полупаразиты.

- 3. Гименіальный слой трубчатый . *Трутовиковые*. Сапрофиты или паразиты на древесныхъ и кустарныхъ породахъ.
- - 5. Гименіальный слой пластинчатый . Пластинчатые.

Сапрофиты на перегнойной почвѣ, навозѣ или растительныхъ остаткахъ; иногда полупаразиты на растеніяхъ, преимущественно— древесныхъ. Сюда относится большинство съѣдобныхъ грибовъ.

б) Базидіи, расположенныя внутри плодоваго тѣла . Гастромицеты.

Сапрофиты на перегнойной почвъ или подземные.

1) Плодовых теле неть. Убанци расположены на гимен

Установивъ общую схему классификаціи грибовъ, намъ остается теперь разсмотръть, такъ называемыя, конидіальныя стадіи. Изслѣдуя подъ микроскопомъ различные грибки, можно убъдиться, что весьма часто споры образуются на простыхъ или развътвленныхъ, различнымъ образомъ, вътвяхъ грибницы, высту--пающихъ надъ поверхностью субстрата (рис. 46). Такой способъ образованія споръ, какъ уже упомянуто выше, не можетъ быть подведенъ подъ одинъ изъ трехъ типовъ, разсмотрѣнныхъ нами раньше, но по общему, внъшнему виду онъ нъсколько приближается къ базидіямъ и базидіоспорамъ; гифы, носящія споры, носятъ названіе конидіеносцевъ, а самыя споры, образующіяся на этихъ конидіеносцахъ называются конидіями. Сначала полагали,



dosporium herbarum Link. (увелич. 350 разъ).

что грибки, обладающіе подобнаго рода конидіальными плодоношеніями, являются вполнъ самостоятельными видами, но затъмъ, благодаря работамъ Де-Бари, Брефельда и многихъ другихъ, обнаружилось весьма любопытное свойство грибовъ развивать послѣдовательно на одной и той-же грибницъ различныя плодоношенія. Такъ, напр., если взять обыкновенную зеленую плъсень (Penicillium glaucum). Рис. 46. Конидіеносецъ легко развивающуюся на сыромъ хлѣбѣ, загнисъ конидіей грибка Cla- вающихъ плодахъ и т. д., то мы увидимъ, что зеленый налетъ состоитъ изъ скопленія многочисленныхъ конидіеносцевъ, дающихъ у сво-

ей вершины конидіи въ четковидныхъ рядахъ. Образованіе этихъ конидій продолжается нъкоторое время безпрерывно, но затъмъ, когда субстратъ объднъетъ питательными веществами и если ограничить свободный доступъ воздуха къ грибку, конидіеносцы постепенно отмирають и на грибниць, обыкновенно внутри субстрата, появляются перитеціи съ сумками и спорами. Такимъ образомъ, конидіеносцы и конидіи являются здѣсь лишь одной изъ стадій развитія сумчатаго грибка, предшествующей образованію перитеціевъ. Это свойство грибовъ развивать различныя стадіи въ извѣстной послѣдовательности весьма распространено, въ особенности, у паразитовъ и извъстно подъ

названіемъ плеоморфизма. У нъкоторыхъ грибовъ появляется даже нъсколько конидіальныхъ стадій. Образованіе тъхъ или иныхъ стадій, входящихъ въ циклъ развитія опредъленнаго грибка, зависитъ главнымъ образомъ отъ состоянія субстрата; такъ, въ большинствъ случаевъ, у паразитныхъ грибовъ наблюдается образованіе конидіальныхъ стадій на живыхъ тканяхъ растеній; затъмъ, когда эти ткани умерщвлены грибкомъ, конидіальныя стадіи исчезаютъ и на ихъ мъсто появляется уже совершенная стадія, въ видъ сумокъ или базидій; такое чередованіе находится также, до извъстной степени, въ зависимости отъ временъ года: конидіи образуются преимущественно въ теченіе всего вегетативнаго періода, т. е. весной и лътомъ, тогда какъ сумки и базидіи появляются поздней осенью, иногда лишь ранней весной послъ перезимовки и обезпечиваютъ, такимъ образомъ, сохраненіе вида изъгода - въ - годъ.

Взаимоотношенія конидіальныхъ плодоношеній между собою и къ остальнымъ стадіямъ требуютъ, конечно, весьма тщательнаго изслъдованія и стали обнаруживаться лишь послъ того, какъ для изученія грибовъ приступили къ примѣненію искусственныхъ, обеззараженныхъ культуръ, дающихъ возможность следить за развитіемъ даннаго гриба, начиная съ прорастанія споры. Благодаря этому, полная исторія развитія многихъ грибовъ можетъ считаться теперь вполнъ установленной, но, тъмъ не менъе, еще осталось не мало такихъ конидіальныхъ формъ, принадлежность которыхъ еще не удалось обнаружить, и эти формы составлаютъ группу такъ называемыхъ несовершенныхъ грибовъ (Fungi imperfecti), для которыхъ выработана особая система классификаціи, основанная на строеніи конидіальныхъ плодоношеній; слѣдуетъ однако имъть въ виду, что такая классификація является лишь временной, имъющей значеніе только для практическихъ цълей распознаванія формъ и не предрѣшаетъ никоимъ образомъ вопроса о дъйствительномъ родствъ этихъ формъ; иными словами тогда, какъ классификація прежде разсмотрѣнныхъ совершенныхъ стадій грибовъ стремится установить болье или менье тъсную связь между различными группами и видами и отчасти пытается разръшить вопросъ о происхожденіи организмовъ, т. е. объ ихъ филогенезисъ, классификація несовершенныхъ грибовъ представляется вполнъ условной и искусственной, основываясь лишь на

внъшнихъ сходствахъ. Это положение станетъ вполнъ яснымъ, если вспомнить, что весьма схожія между собою конидіальныя стадіи.




Рис. 47. Разрѣзъ черезъ ложе грибка Gloeosporium ampelophagum (увелич, 500 разъ).

какъ, напр., формы Fusarium. входятъ въ циклъ весьма различныхъ грибовъ, не имъющихъ между собою даже отдаленнаго родства.

Многочисленныя конидіальныя стадіи могутъ быть раздълены на три группы: поновновновно было

I. Гисвомицеты. Конидіи образуются на простыхъ или раз-




Рис. 48. Разръзъ пикниды грибка Phoma reniformis (увелич. 500 разъ).

вътвленныхъ конидіеносцахъ, образующихся на концахъ гифъ, безъ всякихъ покрововъ (рис. 46).

II. Меланконіевые. Конидіеносцы тъсно скучены и образують плотный гименіальный слой. безъ оболочекъ, прорывающійся на поверхность субстрата (рис. 47).



въ видѣ чашечки (увел. 500 разъ).

III. Сферопсидные. Конидіеносцы тъсно скучены и образуютъ болѣе или менѣе плотный гименіальный слой, заключенный въ хорошо развитыя вмъстилища, которыя по своему строенію сходны съ перитеціями (рис. 48) или съ апотеціями (рис. 49) и носять названіе пикнидъ. Въ этой группъ конидіи имъютъ спеціальное наименованіе стилоспоръ, причемъ, въ зависимости отъ ихъ размъровъ, отли-

Рис. 49. Разръзъ черезъ пикниду чаютъ макростилоспоры, имъющія сравнительно большіе размѣры (болѣе

15 μ длины и 3—4 μ ширины) и микростилоспоры, представляющіяся обыкновенно въ видѣ цилиндрическихъ или веретенообразныхъ палочекъ въ $3-10~\mu$ длины и $1-2~\mu$ ширины. Связь между пикнидами и нъкоторыми сумчатыми наглядно выражается уже тъмъ, что весьма часто въ пикнидахъ, развившихъ въ теченіе всего льта стилоспоры, къ концу льта или посль перезимовки появляются сумки опредъленнаго грибка и, такимъ образомъ, здъсь наблюдается превращение пикниды въ перитеции.

Дальнъйшія подраздъленія несовершенныхъ грибовъ въ предълахъ указанныхъ группъ основываются на строеніи вмъстилища (у Сферопсидныхъ), на способъ развътвленія конидіеносцевъ и формъ, строеніи и окраскъ конидій или стилоспоръ, которыя мо-



Рис. 50. Конидіеносецъгрибка Botrytis сіпетеа (увелич. 500 разъ).



Рис. 51. Конидіеносцы грибка Verticillium ampelinum (увелич. 500 разъ).



Рис. 52. Конидіеносцы грибка Trichothecium roseum Link. (увелич: 500 разъ).

Таблица наиболъе распространенныхъ родовъ несовершенныхъ грибовъ.

І. Гифомицеты.

- А. Конидіеносцы всегда свободные между собою, образующіе на поверхности субстрата бълые, оливковые, зеленые, розовые или коричневые налеты.
- 1. Конидіеносцы и конидіи безцвѣтные или очень слабо окрашенные при изслъдованіи подъ микроскопомъ (въ массъ они неръдко окрашены довольно ярко).
 - а) Конидіи одноклѣтныя.

Конидіеносцы простые, короткіе; конидіи одиночныя.

1) Ovularia Sacc.

Паразиты на листьяхъ различныхъ растеній.

Конидіеносцы простые, короткіе; конидіи въ ціпочкахъ. 2) Oidium Link.

Конидіальная стадія мучнисто - росяныхъ грибовъ съ грибницей на поверхности питающаго растенія.

Конидіеносцы развътвленные древовидно, слабооливковые Конидіеносцы развътвленные мутовчато (стр. 51, рис. 51).

4) Verticillium Link. б) Конидіи двуклѣтныя.

Конидіеносцы прямые, простые; конидін грушевидныя (стр. 51. рис. 52) 5) Trichothecium Link.



Видъ T. roseum Link. часто наблюдается въ качествъ сапрофита на плодахъ, ягодахъ и растительныхъ остаткахъ, покрывая ихъ розовымъ хлопьевиднымъ налетомъ.

> в) Конидіи съ двумя и болѣе поперечными перегородками.

> Конидіи двухъ или трехклѣтныя удлиненныя (рис. 53). . . 6) Ra-

mularia Unger.

Рис. 53. Конидіеносцы грибка Рати-Конидіи продолговатыя, многоlaria Tulasnei на листьяхъ земляники. клътныя . 7) Cercosporella Sacc.

Оба рода паразиты на различныхъ растеніяхъ, вызывая пятнистость листьевъ.

2. Конидіеносцы и конидіи окрашенныя въ оливковый, коричневый или черный цвътъ.

Конидіи одноклѣтныя или съ поперечными перегородками.

а) Конидіи одноклѣтныя или съ одной поперечной перегородкой. Конидіеносцы простые. Конидіи яйцевидныя или Паразиты на листьяхъ, плодахъ, рѣже вѣтвяхъ различныхъ растеній, причиняють, такъ называемую, паршу. Конидіальная ста-

дія Пиреномицетовъ видовъ Venturia.

б) Конидіи съ 1-3 поперечными перегородками, эллипсоидальныя, большею частью щетинистыя. Конидіеносцы простые или вътвистые (стр. 48, рис. 46). 9) Cladosporium Link.

Сапрофиты, и полупаразиты на растительныхъ остаткахъ или на ослабленныхъ частяхъ растеній.

- в) Конидіи съ 2 и болъе поперечными перегородками, продолговатыя, цилиндрическія или веретенообразныя.
- о. Конидіеносцы короткіе, паразиты и сапрофиты. ONOR CAMBAGAS SHOPE AND ASSOCIATION SACC.

оо. Конидіеносцы хорошо развитые.

Конидіи цилиндрическія, гладкія. 11) Cercospora Fresenius. Паразиты и сапрофиты. C. Roesleri Sacc. на листьяхъ виноградной лозы.

Конидіи щетинистыя, продолговатыя. Паразиты. 12) Heterosporium Klotzsch.




Рис. 54. Типы споръ различныхъ грибковъ:

- 1) Споры Phyllosticta viticola. 2) Phoma reniformis. 3) Coniothyrium diplodiella, 4) Ascochyt aampelina, 5) Diplodia viticola,
- 6) Septoria ampelina, 7) Sporormia intermedia, 8) Pestalozzia viticola и 9) Fusarium Zavianum (увелич. 350-650 разъ).

Конидіи съ поперечными и продольными перегородками.

- а) Конидіи булавовидныя, почкующіяся и образующія Сапрофиты на растительныхъ остаткахъ (стр. 18, рис. 10).
- б) Конидіи булавовидныя или продолговатыя, всегда
- В. Конидіеносцы образують болье или менье частыя сплетенія въ видѣ ярко окрашенныхъ студенистыхъ или восковатыхъ подушечекъ или бородавокъ.

Конидіи одноклѣтныя, маленькія, цилиндрическія, согнутыя. 16) *Tubercularia Link*.

Сапрофиты или полупаразиты, образують на вътвяхъ ярко-красныя, округлыя бородавки, выступающія изъ трещинъ коры.

- *II. Меланконіевые*. Конидіальныя подушечки, выступающія изътрещинъ кутикулы, маленькія, выпуклыя.
- а) Конидіи одноклѣтныя, безцвѣтныя, яйцевидныя или продолговатыя (стр. 50, рис. 47) . 17) Gloeosporium D. N.
 - б) Конидіи окрашенныя, продолговатыя, съ 2 или нъсколькими поперечными перегородками и съ нитевидными придатками (рис. 54.8) 18) Pestalozzia D. N.
- **III.** Сферопсидные (эдъсь разсматриваются только тъ представители этой группы, у которыхъ имъются пикниды въ видъ перитеціевъ).
- **А.** Стилоспоры одноклѣтныя, эллипсоидальныя, яйцевидныя или коротко цилиндрическія.
- 2. На отмершихъ или живыхъ вътвяхъ, стебляхъ, ягодахъ и плодахъ, не вызывая образованіе ръзко ограниченныхъ пятенъ (рис. 54.2). Стилоспоры безцвътныя 20) *Phoma Fries*. Сапрофиты или паразиты на различныхъ растеніяхъ.
- **В.** Стилоспоры эллипсоидальныя, яйцевидныя или продолговатыя, двуклѣтныя.

С. Стилоспоры одноклътныя или съ поперечными перегородками, цилиндрическо-удлиненныя или нитевидныя, часто изогнутыя, безцвътныя (стр. 53, рис. 54.6) . . 24) Septoria Fries.

Паразиты на листьяхъ, побъгахъ, стебляхъ, причиняя болъе или менъе ясно выраженную пятнистость.

Само собою разумъется, что плеоморфизмъ, къ тому-же пріуроченный и приспособленный къ окружающимъ условіямъ, является весьма цѣннымъ преимуществомъ для грибовъ, дающимъ имъ возможность распространяться, несмотря на многія препятствія, и размножаться въ тѣхъ огромныхъ размѣрахъ, которые представляются столь опасными для нашихъ культуръ; къ этому слѣдуетъ еще прибавить, что нѣкоторыя покоющіяся стадіи грибницы, съ которыми мы раньше познакомились, какъ оидіи и хламидоспоры, будучи предназначены не только для сохраненія вида, но, какъ мы видѣли, и для его размноженія, въ сущности по своимъ функціямъ, могли-бы быть приравнены также къ конидіальнымъ стадіямъ, входя въ циклъ плеоморфнаго развитія. Если теперь привести общую схему соотношеній различныхъ комбинацій, вызванныхъ плеоморфизмомъ и существующихъ въ природѣ, то получимъ слѣдующую таблицу:

І. Спорангіальные.

Типичный, основной способъ размноженія *спорангіями* Половые спорангіи. Безполые спорангіи. Зооспорангіи.

Побочные способы размноженія

Конидіи на свободныхъ конидіеносцахъ. Хламидоспоры. Оидіи.

Интересно при этомъ отмѣтить, въ этой группѣ, тѣсную связь, существующую между различными способами размноженія, выражающуюся въ нерѣдкомъ превращеніи однѣхъ стадій въ другія. Такъ, у грибка Plasmopara viticola лѣтомъ органами размноженія являются древовидно развѣтвленные конидіеносцы, выступающіе на нижней поверхности листьевъ лозы и образующіе на концахъ своихъ вѣтвей одноклѣтныя, яйцевидныя конидіи, которыя отдѣляются и разсѣиваются повсюду вѣтромъ; однако, при прорастаніи эти конидіи не даютъ ростка, а превращаются въ зоо-

спорангій, изъ котораго выходитъ нѣсколько зооспоръ, плавающихъ въ капляхъ воды.

II. Сумчатые. Основной типичный способъ размноженія — сумка съ сумкоспорами.

Побочные способы раз-

Конидіальныя стадіи гифомицетнаго типа.

Конидіальныя стадіи меланконіеваго типа.

Конидіальныя стадіи въпикнидахъ. Хламидоспоры. Оидіи.

III. Базидіальные. Основной, типичный способъ размноженія— базидія съ базидіоспорами.

Побочные способы размноженія.

множенія

Конидіальныя стадіи гифомицетнаго типа. Хламидоспоры. Оидіи.

Мы видимъ, что наиболъе одарены плеоморфизмомъ спорангіальные, у которыхъ въ особенности разнообразны типы спорангіевъ, и сумчатые, отличающіеся богатствомъ конидіальныхъ стадій, среди которыхъ меланконіевый и пикнидіальный типы принадлежатъ исключительно имъ однимъ. У Базидіальныхъ наблюдается въ общемъ нъкоторая регрессія по отношенію къ образованію конидіальныхъ стадій, встръчающихся сравнительно ръдко и довольно однобразнаго типа. Исключение здъсь составляютъ лишь Головневые, обладающіе всегда оидіями и хламидоспорами, и Ржавчинные, у которыхъ плеоморфизмъ выражается весьма своеобразно разнообразіемъ хламидоспоръ. Кромъ того, ржавчинные отличаются еще тъмъ, что у нихъ образуются также пикниды, чѣмъ эта группа приближается къ сумчатымъ. Что-же касается разнообразія хламидоспоръ, то оно состоитъ въ слѣдующемъ. Весной на листьяхъ растеній, пораженныхъ ржавчинными грибками. появляются скопленія четковидно расположенныхъ оранжевыхъ или безцвътныхъ хламидоспоръ, обыкновенно окруженныхъ общей оболочкой (перидіемъ) или парафизами въ видъ булавовидныхъ придатковъ. Это такъ называемая весенняя или эцидіальная стадія, обозначаемая обыкновенно цифрой І. Хламидоспоры этого

типа называются эцидіоспорами. Онъ въ большинствъ случаевъ сопровождаются пикнидами, развивающимися на верхней поверхности листьевь небольшими группами. Эцидіоспоры разсфиваются и прорастаютъ тотчасъ-же, если попадутъ на соотвътствующій субстратъ, причемъ развиваютъ новую грибницу, на которой появляются другого типа хламидоспоры — уредоспоры, обозначаемыя цифрой // и образующіяся поодиночно на концахъ короткихъ гифъ, выступающихъ, тъсными оранжевыми или коричневыми группами (уредо), на поверхности листьевъ или стеблей пораженныхъ растеній. Уредоспоры также способны тотчасъ-же прорастать и дають новые уредо. Къ концу лъта, на той-же грибницъ какъ и ІІ, иногда въ тъхъ-же группахъ, постепенно вытъсняя уредоспоры, появляются различной формы и строенія хламидоспоры третьяго типа — III, такъ называемыя телейтоспоры, которыя въ большинствъ случаевъ прорастаютъ уже слъдующей весной, образуя базидію съ поперенными перегородками и базидіоспоры (стр. 29, рис. 19), которыя при прорастаніи даютъ снова эцидіи и пикниды. Мы видимъ, что циклъ развитія ржавчинныхъ, хотя и довольно сложный, но основывается почти исключительно на образованіи различныхъ типовъ хламидоспоръ. Но здѣсь плеоморфизмъ осложняется еще одной интересной особенностью, а именно тъмъ, что І, какъ мы видъли выше, образуется на совершенно иной грибниць, чьмъ // и ///, которые развиваются на грибниць, происшедшей отъ прорастанія эцидіоспоръ. При этомъ имъются такъ называемые однодомные ржавчинные, которые проходять всь стадіи развитія на одномъ и томъ-же видъ питающаго растенія, но имъются также разнодомные или двудомные ржавчинные, которые развивають / и пикниды на одномъ видъ питающаго растенія и затъмъ эцидіоспоры заражають растенія совершенно другого вида, принадлежащаго по большей части къ весьма отдаленному семейству, на которомъ и образуются // и ///. Телейтоспоры съ этого послъдняго растенія дають базидіоспоры, способныя развивать / на первомъ растеніи. Типичнымъ, такъ сказать, классическимъ примъромъ разнодомнаго или двудомнаго ржавчинника является линейная ржавчина (Puccinia graminis Pers.), развивающая / и пикниды на барбарисъ, а // и /// на различныхъ злакахъ, причемъ барбарисъ и злаки взаимно заражаются. Разнодомность является пока почти исключительнымъ свойствомъ ржавчинныхъ грибковъ, такъ какъ помимо нихъ она обнаружена только у одного сумчатаго грибка (Sclerotinia heteroica Wor. Naw.), развивающаго свои хламидоспоры на листьяхъ голубики, а апотеціи на коробочкахъ багульника.

Въ настоящемъ изложеніи оказалось возможнымъ дать лишь самыя общія свѣдѣнія о классификаціи грибовъ, не вдаваясь въ частности, которыя завлекли-бы слишкомъ далеко. Лица, интересующіяся микологіей и желающія производить изслѣдованія и опредѣленія грибовъ самостоятельно, могутъ пользоваться подробнымъ микологическимъ очеркомъ, помѣщеннымъ во 2-мъ томѣ моей книги — "Болѣзни растеній" (СПБ. 1910) и во 2-мъ изданіи моего "Опредѣлителя грибовъ" (СПБ. 1912), съ многочисленными рисунками.

которыя вы большинствы случа. Прорастають уже слыдующей весной образуя базилю сь попереными перегородками и базилю-

Споры, независимо отъ своего происхожденія, предназначены къ прорастанію и къ возможно широкому распространенію, для каковой цъли грибы пользуются самыми разнообразными и подчасъ любопытными способами. Прежде всего, вниманія заслуживаетъ огромное количество споръ, выдъляемыхъ грибами въ сравнительно короткій періодъ дѣятельности ихъ плодоносцевъ. Такъ. въ одномъ пшеничномъ зернъ, пораженномъ мокрой головней (Tilletia tritici W.) насчитывается болъе 12 милліоновъ хламидоспоръ этого грибка. Въ одномъ дождевикъ (Lycoperdon bovista L.). имъющемъ приблизительно около 28 сантиметр. въ діаметръ, оказалось 7.000.000.000 споръ. Если взять какой-либо шляпочный пластинчатый грибокъ, напр., шампиньонъ и сръзать ножку у вершины, затъмъ помъстить шляпку на бумагу, прикрывъ ее стаканомъ или стекляннымъ колпакомъ, то черезъ нъсколько часовъ на бумагъ получится ръзкій отпечатокъ различной окраски. въ зависимости отъ взятаго вида гриба и представляющій собою точную передачу расположенія пластинокъ (стр. 59, рис. 55). Разсмотръвъ этотъ налетъ, изъ котораго образуется отпечатокъ, подъ микроскопомъ, при достаточномъ увеличении нетрудно убъдиться, что онъ состоитъ изъ скопленія базидіоспоръ, выдъляемыхъ базидіями, находящимися на поверхности пластинокъ въ видъ плотнаго гименіальнаго слоя. Подсчетъ споръ, полученныхъ такимъ образомъ отъ шампиньона въ теченіе 48 час., далъ цифру 1.800.000.000, т. е. въ часъ шампиньонъ выдѣлялъ 40.000.000 споръ. Другой пластинчатый грибокъ (Coprinus comatus Fr.), развивающійся на навозѣ, даетъ въ теченіе 48 час., когда происходитъ выдѣленіе и созрѣваніе споръ у нормальной шляпки, 5.240.000.000 зародышей, т. е. около 100.000.000 въ часъ. Такое огромное количество споръ вполнѣ обезпечиваетъ распространеніе и размноженіе вида, несмотря на различныя условія и вліянія среды, которыя въ большей или меньшей степени противодѣйствуютъ чрезмѣрному развитію однихъ организмовъ въ ущербъ другимъ. Дѣйствительно, въ природѣ все направлено къ сохраненію извѣстнаго равновѣсія между живыми организмами, необходимаго для соблюденія стройности всей міровой системы, и если

въ какой-либо данный моментъ опредъленный организмъ начинаетъ черезъ мъру размножаться, немедленно обнаруживаются различныя условія, служащія какъ бы тормазомъ. Мы видимъ, что въ данномъ случаъ грибы обладаютъ огромнымъ преимуществомъ передъ другими организмами, заключающимся въ развитіи, такъ сказать, несмътнаго количества споръ. Но это положительное для грибовъ свойство въ значительной степени уравновъшивается другими особенностями, а именно сравнительно слабой устой-




Рис. 55. Отпечатокъ, полученный отъ выдъленія споръ шампиньона (фотогр. снимокъ).

чивостью большинства грибныхъ споръ противъ крайнихъ климатическихъ условій температуры и влажности, недолгосрочнымъ сохраненіемъ жизнедѣятельности многихъ споръ и, наконецъ, болѣе или менѣе строгой приспособляемостью грибовъ къ развитію на опредѣленномъ субстратѣ. Къ приспособленію грибовъ къ извѣстнымъ субстратамъ мы еще вернемся, но здѣсь пока отмѣтимъ, что изъ этого огромнаго коли чества споръ лишь весьма ничтожный процентъ попадаетъ въ такія условія, при которыхъ возможно ихъ нормальное прорастаніе и развитіе новыхъ поколѣній; большин-

ство-же пропадаетъ или върнъене - достигаетъ цъли своего назначенія, а предназначено къ выполненію другихъ, побочныхъ задачъ, какъ, напр., служить пищей насъкомымъ и низшимъ животнымъ и т. д. ая атова и асован вн композанявая дей жим.

Логичнымъ послъдствіемъ развитія большого количества споръ является необходимость обезпечить ихъ распространеніе и въ этомъ отношеніи грибы также не менье хорошо одарены, принимая во вниманіе, что у многихъ видовъ споры, при отдъленіи отъ базидій или при выходъ изъ сумокъ, подбрасываются на довольно значительное разстояніе съ большой силой: это свойство даетъ возможность грибамъ либо самостоятельно разсъивать свои споры по сосъдству, либо способствовать занесенію ихъ воздушными теченіями, подхватывающими ихъ, такъ сказать, на лету. Если, найдя гдф - нибудь, во время экскурсіи, мясистыя апотеціи какого - либо Лискомицета, мы оставимъ ихъ нѣкоторое время въ покоъ, а затъмъ дохнемъ на нихъ, то увидимъ, что изъ вдавленной части чашечки подымается довольно густое облачко пыли. разсвивающееся въ воздухв. Это облачко представляетъ собою скопленіе споръ, внезапно выброшенныхъ изъ сумокъ, вслъдствіе вліянія на этихъ послѣднихъ струи теплаго, влажнаго воздуха, направленнаго на нихъ дыханіемъ.


Подготовляя, такимъ образомъ, наиболъе подходящія условія для разстиванія споръ, грибы, тти не менте, должны пользоваться посторонними факторами для болъе широкаго своего распространенія; и здъсь имъ приходится приспособляться къ извъстнымъ условіямъ, что неръдко влечетъ за собою созданіе нѣкоторыхъ морфологическихъ, характерныхъ и, во всякомъ случаъ, любопытныхъ особенностей.

Въ отношеніи къ способу распространенія споръ, грибы могутъ быть раздълены на три группы: анемофильные грибы. распространяющіеся исключительно или преимущественно при помощи вътра, зоофильные грибы, распространяющіеся при посредствъ животныхъ, главнымъ образомъ - насъкомыхъ и низшихъ, и, наконецъ, гидрофильные грибы, приспособленные къ распространенію водой. Наиболъе многочисленными являются анемофильные грибы, отличительной чертой которыхъ служатъ малые размъры и легкость споръ, чъмъ облегчается ихъ передвижение воздушными теченіями. Мы знаемъ, что воздухъ насыщенъ пылью.

осядающей на различные предметы. Если изследовать эту пыль. то окажется, что она состоитъ изъ самыхъ разнообразныхъ веществъ, какъ минеральныя частички, волоски животныхъ, инфузоріи, волокна людской одежды, пыльце различныхъ растеній, изъ многочисленныхъ бактерій и, наконецъ, изъ споръ различныхъ грибовъ; болъе тяжелыя частички, какъ минеральныя крупинки,

осядаютъ скорѣе, хотя и онъ переносятся часто на громадное разстояніе, чему служитъ доказательствомъ то обстоятельство, что въ съверной Франціи и даже въ Англіи въ воздушной пыли были обнаружены песчинки, происходящія изъ Сахары; что-же касается легкихъ частицъ, какими являются бактеріи и грибныя споры, то ихъ передвиженія, такъ сказать, безграничны и въ любой про-

можно находить разнообразныя споры, принадлежащія какъ сапно паразитамъ (рис. и 13) споры Мисог (увелич. 350 разъ). 56). При этомъ подоб-



- бѣ воздушной пыли 1) бактеріи, 2) споры Cladosporium herbarum, 3) споры Trichothecium roseum, 4) споры Uromyces pisi, 5) дрожжи, 6) споры Fusarium, 7) споры вида Septoria, 8) споры Penicillium, 9) споры Alternaria, 10) споры Puccinia, рофитамъ, такъ рав- 11) споры Phyllosticta, 12) споры Gleosporium
- ныя споры нисколько не теряють способности къ прорастанію, а иногда даже во влажномъ воздухъ наблюдаются уже проросшими; любопытно, что нъкоторыя споры, болъе тяжелыя и объемистыя, снабжены особыми приспособленіями, облегчающими ихъ передвижение въ воздухъ, какъ, напр., жгутиками или даже пустыми клътками, играющими роль пузырей для поддержки споры въ воздух (стр. 53, рис. 54.8). Грибныя споры встр вчаются въ воздух в на

всей земной поверхности, какъ въ долинахъ, такъ и на высокихъ горахъ, и во всякое время года, причемъ количество ихъ и составъ находятся въ зависимости отъ климатическихъ, временныхъ и періодическихъ, особенностей. Не вдаваясь здѣсь въ излишнія подробности, укажемъ только, что зимою обнаруживаются почти исключительно споры сапрофитовъ, тогда какъ во время вегетативнаго періода преобладаютъ различные паразиты. Послѣ небольшого дождя воздухъ обыкновенно оказывается почти совершенно освобожденнымъ отъ грибныхъ споръ, которыя очевидно увлекаются дождевыми каплями и осядаютъ, но если дождь продолжится, то наблюдается увеличение количества споръ, очевидно заносимыхъ воздушными теченіями, причемъ онъ, по большей части, оказываются проросшими. Вообще, изследование воздушной грибной флоры, помимо несомнъннаго научнаго интереса, даетъ намъ объясненіе, тъмъ внезапнымъ появленіямъ грибныхъ бользней, которыя неоднократно наблюдались въ различныхъ мъстностяхъ, казалось-бы, безъ всякой къ тому причины. Зная, что воздушныя теченія являются лучшими разсвивателями грибныхъ споръ на огромныя разстоянія, самое появленіе грибныхъ болъзней уже не можетъ оказаться загадочнымъ для насъ и мы всегда должны быть подготовлены къ ихъ нашествію.

Насъкомыя и низшія животныя распространяють грибныя споры двоякимъ образомъ: во - первыхъ, споры прикрѣпляются къ виъшнимъ покровамъ тъла этихъ животныхъ, что облегчается еще тъмъ, что у многихъ споръ имъются спеціальныя для этого приспособленія — въ видъ щетинокъ, бородавокъ, сътчатыхъ утолщеній, различныхъ крючковидныхъ придатковъ и даже студенистой оболочки (стр. 53, рис. 54.7), служащія для болье надежнаго прикръпленія. На разныхъ личинкахъ, паучкахъ, слизнякахъ не трудно обнаружить значительное количество грибныхъ споръ, которыя, при постоянныхъ передвиженіяхъ этихъ организмовъ, легко разсъиваются. Второй способъ распространенія грибныхъ споръ насъкомыми и другими низшими животными состоитъ въ томъ, что эти последнія поглощають споры. Многіе грибы выделяють различныя сахаристыя, иногда ароматическія жидкости, до которыхъ насѣкомыя и низшія животныя очень падки, и вмѣстѣ съ этими выдѣленіями поглощаются одновременно и споры; въ иныхъ-же случаяхъ и самыя споры являются лакомой приманкой. При этомъ

весьма интереснымъ является то обстоятельство, что прохождение споръ черезъ пищеварительные органы этихъ животныхъ не только не повреждаетъ ихъ, но даже, повидимому, способствуетъ ихъ прорастанію; по крайней мъръ извъстно, что споры многихъ шляпочныхъ грибовъ не удается проращивать, между тъмъ, какъ тъ же споры, прошедшія черезъ пищеварительные органы слизняковъ. прекрасно прорастають и дають грибницу. Впрочемъ, и высшія животныя могутъ также оказывать услуги грибамъ для прорастанія ихъ споръ; несомнѣнно, что споры, такъ называемаго, домоваго грибка (Merulius lacrymans Fries.), причиняющаго разрушеніе деревянныхъ построекъ, заносятся различными грызунами (какъ, крысы, мыши и др.), живущими въ подпольъ. Есть и такіе грибы, для которыхъ участіе въ распространеніи споръ высшими животными является даже совершенно необходимымъ: это своего рода симбіозъ, вызывающій извъстное приспособленіе грибовъ, какъ то наблюдается, напр., у такъ называемыхъ навозныхъ грибковъ; ихъ споры обыкновенно подбрасываются съ нъкоторой силой и, разсвиваясь по сосъдству, прикръпляются къ листьямъ и стеблямъ травы при помощи особыхъ, студенистыхъ придатковъ или оболочекъ (стр. 53, рис. 54.7). Травоядныя животныя. потдая траву, въ то же время поглощаютъ и прикръпленныя къ ней споры, которыя затъмъ прорастаютъ въ свъжихъ испражненіяхъ и даютъ тутъ - же новыя поколѣнія.

У гидрофильныхъ грибовъ обычныя неподвижныя споры уносятся водой. Такъ, напр., споры нѣкоторыхъ паразитовъ на листьяхъ могутъ увлекаться съ дождевыми каплями на нижележащіе листья и прорастать здѣсь; но у иныхъ грибовъ наблюдается и болѣе спеціальное приспособленіе къ этому способу распространенія — въ видѣ развитія выше описанныхъ зооспоръ (стр. 34, рис. 27), самостоятельно передвигающихся въ водѣ.

Наконецъ, нельзя не коснуться вліянія самого человѣка на распространеніе грибовъ; подобно тому, какъ нѣкоторыя сорныя растенія — въ родѣ крапивы, лопуха — заносятся имъ повсюду и сопровождаютъ его положительно вездѣ, гдѣ онъ поселяется, такъ и всякіе плѣсневые грибки, развивающіеся на съѣстныхъ припасахъ, тоже сопровождаютъ его повсемѣстно, вслѣдствіе занесенія споръ вмѣстѣ съ предметами домашняго обихода. Но такому же невольному занесенію подвергаются и споры различныхъ па-

разитовъ, и это стало въ особенности очевиднымъ за послъднее время, когда международныя сношенія значительно облегчились и усилились усовершенствованіемъ путей сообщенія и когда происходитъ оживленный обмънъ плодовъ, ягодъ, съмянъ, посадочнаго матеріала и т. д. Цълый рядъ грибныхъ бользней воздълываемыхъ растеній, еще недавно въ Европъ не существовавшихъ вовсе, занесенъ къ намъ изъ Америки; достаточно упомянуть о картофельной бользни (Phytophthora infestans D. B.), южно - американскаго происхожденія и завезенной въ Европу въ началъ XIX въка, а также объ американской мучнистой росъ крыжовника (Sphaerotheca mors uvae B. C.), завезенной къ намъ въ концъ XIX въка изъ Съверной Америки. Выписка всякихъ сортовъ и разновидностей растеній изъ далекихъ странъ, практикующаяся въ широкихъ размърахъ въ настоящее время, представляетъ огромную опасность развитія новыхъ грибныхъ болъзней, если эта выписка не обставлена извъстными предосторожностями въ смыслъ обеззараживанія или протравливанія посадочнаго матеріала или сѣмянъ. Ввозъ плодовъ и ягодъ имъетъ также нъкоторое значеніе, такъ какъ накопляющіеся отбросы служать очагами заразы; наконецъ, слъдуетъ имъть въ виду, что во многихъ случаяхъ упаковочнымъ матеріаломъ для всякаго рода товаровъ служатъ различные растительные остатки, на которыхъ тоже могутъ встръчаться споры паразитовъ. Прекращать обмѣнъ товаровъ изъ опасенія распространенія грибныхъ паразитовъ, конечно, нельзя, нона обязанности Правительства лежитъ учрежденіе дезинфекціонныхъ пограничныхъ станцій на подобіе той, которая основана въ Гамбургъ для наблюднія за ввозомъ растеній изъ Америки.

При томъ разнообразіи способовъ распространенія грибныхъ споръ, которое нами только что отмѣчено, едва-ли приходится изумляться обилію грибовъ и можно развѣ только высказать удивленіе, что существуютъ еще растенія, не подвергающіяся вліянію грибныхъ паразитовъ или мало отъ нихъ страдающія. Происходитъ это отчасти потому, что прорастаніе грибныхъ споръ имѣетъ мѣсто лишь при извѣстныхъ условіяхъ окружающей среды, отчасти вслѣдствіе того, что грибы приспособлены къ развитію на опредѣленномъ субстратѣ. Для каждаго даннаго вида существуютъ особыя условія влажности и температуры, при которыхъ прорастаніе споръ и дальнѣйшее развитіє грибка происхо-

дятъ наиболѣе благопріятно; это такъ называемый *оптимумъ* влажности и температуры. Точно также можно установить для каждаго вида извѣстныя предѣльныя нормы влажности или температуры, выше (максимумъ) или ниже (минимумъ) которыхъ развитіе грибницы или прорастаніе споръ пріостанавливается. Если установить для каждаго грибка оптимумъ, максимумъ и минимумъ влажности и температуры, —что, впрочемъ, уже сдѣлано для многихъ видовъ, то и выяснятся условія, при которыхъ возможно развитіе опредѣленной формы.

Только очень немногіе грибы среди сапрофитовъ (а также нъкоторыя исключенія среди паразитовъ, напр., Rosellinia necatrix, причиняющій корневую гниль) являются мало разборчивыми по отношенію къ субстрату, на которомъ они развиваются и могутъ разсматриваться, какъ всеядные; большинство-же грибовъ, въ особенности паразиты, строго пріурочены къ извѣстному субстрату и не могутъ развиваться въ другихъ средахъ. Степень приспособленности бываетъ весьма различная въ зависимости отъ вида грибка. Нъкоторыя формы проявляютъ весьма слабую приспособляемость, какъ, напр., Cladosporium herbarum Link., который развивается на вътвяхъ и плодахъ весьма разнородныхъ растеній, какъ-то: злаки, виноградная лоза, персики, розы и т. д. Въ иныхъ случаяхъ паразитъ поражаетъ безразлично всъ виды одного семейства, какъ, напр., Erysiphe graminis D. C., причиняющій мучнистую росу всякаго рода дикорастущихъ или воздълываемыхъ злаковъ: болъе ръзкую приспособляемость проявляютъ тъ грибы, которые развиваются исключительно на видахъ одного рода или на одномъ только видъ, какъ большинство паразитовъ виноградной лозы. Очевидно, что такое приспособленіе, чъмъ оно ръзче проявляется, создаетъ извъстныя затрудненія для размноженія грибовъ, но нельзя не указать при этомъ, что воздѣлываемыя растенія, представляющіяся болѣе или менѣе скученными въ значительномъ количествъ, находятся въ менъе благопріятныхъ условіяхъ, чъмъ обычно разбросанныя дикія растенія, такъ какъ занесеніе споръ грибковъ, поражающихъ однородныя насажденія, имфетъ мфсто почти безпрепятственно.

Большое значеніе для выясненія способовъ распространенія грибныхъ споръ имъетъ также недавно обнаруженное существованіе, такъ называемыхъ, біологическихъ формъ паразитныхъ

грибковъ. Если взять, напр., линейную ржавчину злаковъ *Puccinia graminis Pers.*, то оказывается, что уредоспоры этого грибка, взятыя съ пшеницы, не заражаютъ собою рожь, несмотря на то, что морфологически объ формы этой ржавчины на пшеницъ и на ржи ничъмъ не отличаются и представляютъ собою, несомнънно, одинъ и тотъ-же видъ. Въ виду этой, весьма важной съ практической точки зрънія, особенности приходится признавать наличность у одного и того-же вида извъстныхъ біологическихъ формъ, спеціально пріуроченныхъ къ опредъленнымъ питающимъ растеніямъ и не способныхъ заражать другія, даже близкія по своимъ признакамъ растенія. Теперь выясняется, что подобныя біологическія формы весьма распространены среди паразитовъ.

Не менъе важную роль въ дълъ распространенія паразитныхъ грибовъ играетъ способъ зараженія, и въ этомъ отношеніи наблюдается также большое разнообразіе. Прежде всего, многіе паразиты поражаютъ опредъленныя части растеній и не въ состояніи развиваться на другихъ органахъ; такъ, существуютъ грибки, развивающіеся только на листьяхъ (напр., Phyllosticta vitis Sacc. — на листьяхъ лозы), другіе встрѣчаются только на ягодахъ, иные на корняхъ (Roesleria hypogea). Есть грибы нъсколько менње разборчивые, какъ, напр., Plasmopara viticola, встръчающійся на листьяхъ, ягодахъ и зеленыхъ побъгахъ лозы. Возрастъ субстрата является во многихъ случаяхъ далеко не безразличнымъ; такъ, извъстны грибки, поражающіе только съянцы. тогда какъ другіе виды поражаютъ только взрослыя растенія. Интересно также отмътить, что не всъ части одного и того-же органа одинаково заражаются; новъйшія изслъдованія Plasmopara viticola показываютъ, напр., что споры этого грибка прорастаютъ и способны причинить зараженіе листьевъ лозы только въ томъ случаъ, если онъ попадутъ на нижнюю поверхность листьевъ, между тъмъ какъ на верхней поверхности онъ, въ большинствъ, случаевъ зараженія не причиняютъ. Наконецъ, на ряду съ настоящими паразитами, споры которыхъ при прорастаніи даютъ ростки, способные проникнуть самостоятельно чрезъ вполнъ здоровую кожицу, покрывающую листья, стебли или плоды, существуетъ еще цълая группа грибковъ, ростки которыхъ проникаютъ лишь черезъ случайныя пораненія кожицы, уколы насъкомыхъ, трещины отъ морозовъ и т. д.

Въ предыдущихъ строкахъ мы задались цълью выяснить тъ особенности строенія и физіологическихъ функцій самихъ грибовъ. которыя такъ или иначе регулируютъ распространеніе каждаго вида: при явленіяхъ паразитизма необходимо помнить, что для правильной ихъ оцѣнки слѣдуетъ выяснить взаимоотношенія паразита и субстрата всесторонне, не ограничиваясь наблюденіями надъ однимъ только паразитомъ. Дъло въ томъ, что если паразитъ вліяеть на пораженныя части растеній, вызывая въ нихъ извъстныя, болье или менье существенныя измъненія, то и субстрать, въ свою очередь, оказываетъ нъкоторое вліяніе на паразита, и отъ взаимодъйствія этихъ двухъ вліяній зависитъ степень пораженія и общій характеръ заболъванія. Разсматривая эту сторону вопроса, оказывается, что далеко не всъ растенія одного и того-же вида одинаково относятся къ пораженію какимъ-либо грибкомъ: въ то время, какъ нѣкоторыя разновидности почти вовсе не поражаются, другія, при совершенно одинаковыхъ условіяхъ, очень сильно заражены. Это общее явленіе для всъхъ паразитическихъ заболъваній объясняется особымъ свойствомъ, присущимъ самимъ растеніямъ: одни изъ нихъ проявляютъ устойчивость противъ зараженія грибками, тогда какъ другія, наоборотъ, очень воспріимчивы. Даже въ предълахъ одной разновидности или сорта можно обнаружить отдъльныя особи, весьма различно относящіяся къ извъстнымъ паразитамъ, и такимъ образомъ приходится признать, что различная воспріимчивость является до нѣкоторой степени индивидуальной особенностью. Причины различной устойчивости растеній довольно сложны и выясненіе ихъ завлекло-бы насъ слишкомъ далеко, но свойство это имъетъ огромное практическое значеніе, такъ какъ не подлежитъ сомнънію, что, только основываясь на немъ, окажется возможнымъ въ будущемъ вести правильную и успѣшную борьбу съ грибными паразитами, тѣмъ болѣе, что, по новъйшимъ изслъдованіямъ, устойчивость растеній можетъ быть значительно усилена путемъ селекціи, т. е. правильнаго подбора, и различныхъ культурныхъ пріемовъ.

VII.

Ознакомившись съ грибами, намъ остается теперь разсмотръть вкратцъ тъ болъзни и поврежденія растительныхъ тканей, которыя вызываются ихъ развитіемъ. Прежде всего, можно отмъ-

тить, такъ называемыя, абсолютныя забольванія, влекущія за собою въ болъе или менъе близкомъ будущемъ смерть пораженнаго растенія, и относительныя забольванія, не вліяющія на продолжительность жизни растенія, но повреждающія болѣе или менъе серьезно извъстныя его части. Собственно говоря, абсолютныя заболъванія сравнительно ръдко встръчаются у растеній, но,




Рис. 57. Пятнистость и продыравленность листьевъ сливы и вишни вслѣдствіе развитія грибка Clasterosporium carcophilum (фотогр. снимокъ).


съ точки зрѣнія практилѣванія имѣютъ огромное значеніе, такъ какъ послѣдствіемъ таковыхъ является обыкновенно весьма чувствительное понижение урожая. Кстати замътимъ, что не всегда возможно отмътить слишкомъ ръзкую грань между вышеназванными группами заболъваній; такъ, напр., мильдью виноградной лозы несомнънно относительная болъзнь, но, тъмъ не менъе, повторяясь изъгода-въ-годъ и мѣшая неръдко нормальному одеревенънію побъговъ, онъ настолько ослабляетъ кусты, которые подвергаются вліянію морозовъ, что они иногда черезъ нъсколько лътъ совершенно погибаютъ. Съ точки зрѣнія продолжительности поврежденій можно отличать острыя забольва-

нія, продолжающіяся не долго, какъ, напр., пятнистость листьевъ или ягодъ, и хроническія забольванія, носящія затяжной характеръ, какъ пятнистый антракнозъ, вызывающій на вътвяхъ виноградной лозы образованіе все углубляющихся и расширяющихся ранъ.

Переходя теперь къ типамъ поврежденій, вызываемыхъ паразитными грибками, можно наблюдать весьма разнообразныя проявленія, а именно:

- 1) Измѣненіе окраски пораженныхъ тканей, когда, напр., на листьяхъ или ягодахъ появляются различной окраски пятна.
- 2) Засыханіе ткани, когда подъ вліяніемъ развитія опредъленнаго грибка пораженныя части ткани отмираютъ; слъдуетъ имъть въ виду, что это явленіе во многихъ случаяхъ представляется нормальнымъ послъдствіемъ измъненія окраски; такъ, напр., при пораженіи ягодъ винограда черной гнилью (Guignardia Bidwellii V. R. или G. baccae Jacz.) сначала появляются темно-синія, черноватыя пятна, а затъмъ вся ягода быстро засыхаетъ. Пятнистость листьевъ также обыкновенно оканчивается засыханіемъ пораженныхъ тканей, которыя часто отваливаются, такъ что листъ оказывается продыравленнымъ (стр. 68, рис. 57).
- 3) Загниваніе тканей, когда пораженныя части растенія подвергаются разложенію. На вътвяхъ подобное разложеніе вызываетъ образованіе ранъ, а на ягодахъ наблюдается полное ихъ загниваніе, какъ при пораженіи винограда сърой гнилью (Sclerotinia Fuckeliana); обыкновенно въ процессъ разложенія, начатомъ паразитнымъ грибкомъ, принимаютъ участіе различные организмы, какъ сапрофитные грибки или бактеріи, которые, такъ сказать, довершаютъ дъло первоначальнаго вредителя.

Собственно этими тремя явленіями ограничивается вліяніе паразитныхъ грибковъ на виноградную лозу, но на другихъ растеніяхъ неръдко обнаруживаются болье сложныя поврежденія, связанныя съ измѣненіемъ формы и даже расположенія нормальныхъ органовъ; такъ, весьма часто наблюдаются гиперплазіи. т. е. образованіе различныхъ вздутій или наростовъ (рис. 1, 6 и 45); въ иныхъ случаяхъ форма пораженныхъ органовъ измъняется до неузнаваемости, какъ, напр., при образованіи кармашекъ изъ сливъ, пораженныхъ грибкомъ Exoascus pruni Fckl. (рис. 36). Наконецъ, случается, что развитіе грибка въ вътвяхъ вызываетъ въ извъстныхъ мъстахъ разрастаніе многочисленныхъ, тъсно скученныхъ развътвленій, извъстныхъ подъ названіемъ видьминыхъ метелъ.



Литература.

Краткій указатель русской литературы.

Бондарцевь, А. С.: "Грибныя бользни культурныхъ растеній". СПБ. 1912. Бородинъ, И. П.: "Краткій очеркъ микологіи". СПБ.

Бухгольць, Ф. В.: "Иллюстрированный опредълитель грибовъ средней Россіи". Гименомицеты. Ч. I и II. Рига. 1908. Ц. 5 р. 50 к.

Ростовцевь, С. И.: "Пособіе къ опредъленію паразитныхъ грибковъ по растеніямъ-хозяевамъ". М. 1908.

Его-же: "Фитопатологія. Бользни и поврежденія растеній". Изд. 3-е. М. 1908. Ячевскій, А. А.: "Бользни растеній". Въ трехъ томахъ.

Его-же: "Ежегодники свъдъній о бользняхъ и поврежденіяхъ растеній". 1903 — 1912. Восемь томовъ.

Его-же: "Микологическая флора Европейской и Азіатской Россіи". I томъ. Пероноспоровые. М. 1902.

II томъ. Слизевики. М.

Его-же: "Опредълитель грибовъ". Съ раскращенной таблицей и многочисленными рисунками въ текстъ. II-ое изданіе, исправленное и дополненное. СПБ. 1912. Ц. 3 руб.

оком Ватниванів пкамей

Краткій указатель иностранной литературы.

Brefeld: "Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Micologie". Пятналцать томовъ.

De Bary: "Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze". Leipzig. 1884. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg von Hennings, Lindau, Lindner, Neger. Leipzig.

Delacroix et Maublanc: "Maladies des plantes cultivées". Paris. 1900. Два тома. Duggar: "Fungous diseases of plants. Boston. 1911.

Engler und Prantl: "Natürliche Pflanzenfamilien". Die Pilze.

Migula: "Kryptogamenflora". Pilze. Gera.

Prillieux et Delacroix: "Maladies des plantes agricoles". Paris. 1895. Два тома.

Rabenhorst-Winter: "Die Pilze Deutschlands". Десять томовъ.

Saccardo: "Sylloge Fungorum". Двадцать одинъ томъ.

Sorauer: "Die Pflanzenkrankheiten". Berlin. 1908. Три тома.

Tubeuf: "Die Pflanzenkrankheiten". München.

Constantin et Dufour: "Nouvelle flore des champignons". 4-e édition. Paris. 1911.

Lindau: "Hilfsbuch für Sammeln parasitischer Pilze". Berlin. 1901.

Ero-же: "Kryptogamenflora für Anfänger". Berlin. 1911. Два тома.

Schröter: "Pilze Schlesiens". Breslau. 1908. Два тома.

Weinmann: "Hymeno-et Gasteromycetes hucusque in Imperio Rossico observatos". Petropolis. 1836. 1.6

Пособія пля собиранія и составленія коллекцій грибовъ.

Бондарцевь: "Знакомство съ грибными болъзнями растеній". СПБ. 1907. Бухгольць: "Краткое наставленіе для собиранія подземныхъ грибовъ".

Юрьевъ. 1900.

Ивановскій: "О собираніи растеній для гербарія Тобольской флоры. Руководственныя замѣчанія для начинающихъ". Изд. Тобольскаго Губернскаго Музея. 2-е изданіе. Тобольскъ. 1910.

Ячевскій: "Практическія указанія о сообщеніи матеріала для распознаванія грибныхъ болъзней растеній". СПБ. 1902.

Программы и наставленія для наблюденій и собиранія коллекцій. СПБ. 1896. Подшиваловь: "Какъ составлять коллекціи грибовъ". СПБ. 1911.

Сюзевъ, П. В.: "Наставленіе для собиранія и засушиванія растеній для гербарія". 3-е изданіе.

Ячевскій, А. А.: "О сохраненіи мягкихъ шляпочныхъ грибовъ для коллекцій и гербаріевъ" (Листокъ для борьбы съ бользнями растеній 1905 г., стр. 33).

Dammer: "Handbuch für Pflanzensammler". Stuttgart. 1891".

Herpell, G: "Präpariren und Einlegen der Hutpilze für das Herbarium". Berlin, 1888,

Sydow: "Anleitung zum Sammeln der Kryptogamen". Stuttgart. 1885.

Повременныя изданія по микологіи.

Annales Mycologici. Berlin.

Bulletin de la Société Mycologique de France. Paris.

Mykologisches Centralblatt. Jena.

Centralblatt für Bacteriologie. II часть. Berlin.

Mycologia. New-York.

Practische Blätter für Pflanzenbau und Pflanzenschutz. München.

Phytopathology. Jthaca.

Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. Stuttgart.

Bulletin du bureau des renseignements agricoles et des maladies des plantes. Rome.

Въстникъ Винодълія (1892—1912 г.г.) — разныя статьи, посвященныя описанію грибныхъ болъзней и борьбъ съ ними.

Коллекціи русскихъ грибовъ.

Бондарцевь: "Гербарій грибныхъ бользней". Изданіе Курскаго Земства.

Неводовскій: "Грибы Россіи". Образцы поврежденій съ краткимъ описаніемъ.

Серебрянниковъ и Траншель: "Русскіе грибы".

Jaczewski, Komaroff et Transchel: "Fungi Rossiae Exsiccati".

Ячевскій: "Грибные паразиты культурныхъ и дикорастущихъ полезныхъ растеній". Съ текстомъ и рисунками.

Кузнецовь: "Обмънный гербарій Юрьевскаго Ботаническаго Сада"

Карело-Финская База Анадемии Наун СССР БИБЛИОТЕКА

пособія для собиранія и составленія коллекцій грибовъ

					Стр.
I. Введеніе	Topic de la company	SHAP MERMO		Historia	3
II. Причины болъзней ра	стеній	REA RIMERT	SEE RUHE	2810	5
III. Описаніе вегетативны					
IV. Описаніе органовъ ра	азмноженія и	общая схе	ема кла	асси-	
фикаціи грибовъ .	NO A PRINCIPAL OFFICE	SHOULD SHOUL	STORE R	PRINCH DIO	32
V. Конидіальныя стадіи					
грибовъ	и ківифидор і	cranactic ans	B Ha	J) ,es	48
VI. Способы распростране					
VII. Вліяніе грибовъ на ра	астительныя	ткани		Division	67
Литература					
Оглавленіе	usammler . St.	Santia 197	andbus.H	inen	72
Отъ редакціи					
Опечатки	n der Kryptoga	zum Sammel	alcitung	A. W	72
	cra di-us kana				

ОТЪ РЕДАКЦІИ. Рисунки (57), помъщенные въ настоящей книжкъ, исполнены Г. Н. Дорогинымъ.

Замъченныя опечатки:

напечатано:	слъдуетъ:
Стр. 18, въ подписи подъ рис. 10, прорастающія споры	прорастающая спора
Стр. 29, въ подписи подъ рис. 20, (увел. 350 разъ).	(увел. 100 разъ).
Стр. 32, строка 18-19 сверху, параита	паразита
Стр. 37, въ подписи подъ рис. 35, calca	calcea
Стр. 38, строка 18 сверху, въ базидіяхъ.	на базидіяхъ.
Стр. 42, строка 1-я сверху, поверхности	поверхностью
Стр. 42, въ подписи подъ рис. 42, Смарчокъ	Сморчокъ
Стр. 42, въ подписи подъ рис. 44, Хламидоспора	Хламидоспоры прораста-
прорастающая	ощія видинивой здада
Стр. 43, строка 8 снизу, протоплазы	протоплазмы
Стр. 44, строка 4—5 снизу, Mucormucedo	Mucor mucedo
OMP IN CHCKHRISHIN	



Анадемии Науи СССР