Того-же автора:

Изданіе Лисного Департамента:

1. Зоологическія изслѣдованія на участкахъ Особой Экспедиціи Лѣсного Департамента. Работы 1894—95 годовъ (Отдѣльные оттиски у автора. Императ. Лѣсной Институтъ). 1 р. —

Изданія Департамента Земледълія:

2	2. Вредная дъятельность зайцевъ, крысъ и мышей (съ ри	сун-			
	ками); выдержка изъ 1-й работы. 1898			30	к.
3	3. Обзоръ мышеподобныхъ млекопитающихъ средней и юж	ной			
	Россіи (выдержка изъ предъидущей бротюры). 1898		-	10	к.
4	4. Обзоръ промысловыхъ охотъ въ Россіи. 1898		2 p.	50	к.
	 Черноморское побережье Кавказа въ сельскохозяйственн и промысловомъ отношеніи. Вып. І. Дельфиновый промыс 				
	у береговъ Кавказа. 1903		-	40	K.

Изданія А. Ф. Девріена:

Птицы Европы (Н. А. Холодковскій и А. А. Силантьевъ)	
$\mathrm{CLVII} + 59 + 635$ стр. текста и атласъ птицъ изъ 60 хромо-	
литографированныхъ таблицъ	_
Опредълитель европейскихъ птинъ	20 K

Издание В. Л. Нарышкина:

9. Фауна Падовъ, имънія В. Л. Нарышкина, Балашовскаго у., Саратовской губ. (Зоологическая часть естественно-историческаго изслъдованія имънія Пады, произведеннаго въ 1890—1891 гг. подъ общимъ руководствомъ проф. В. В. Докучаева). Складъ изданія у автора (Императ. Лъсной Институтъ). . . 1 р. 50 к.



ОБЫКНОВЕННЫЙ СВЕКОЛЬНЫЙ ДОЛГОНОСИКЪ

(Cleonus punctiventris Germ.)

и другіе виды долгоносиковъ,

ВРЕДЯЩИХЪ САХАРНОЙ СВЕКЛОВИЦЪ ВЪ ПРЕДЪЛАХЪ РОССІИ,

описаніе ихъ, образъ жизни и борьба съ ними.

Съ одной хромолитографированной таблицей и 28 рисунками въ текстъ.

составилъ


А. А. Силантьевъ,

преподаватель и ассистенть ИМПЕРАТОРСКАГО Лъснаго Института, и. об. старшаго спеціалиста Департамента Земледълія по прикладной зоологіи и промысловой охотъ.



С.-ПЕТЕРЬЭРГ Б.
Типографія М. Меркушева, Невскій пр.. № 8.
1903.





Нинолай Николевенть ТРОИЦКІЙ

ОБЫКНОВЕННЫЙ СВЕКОЛЬНЫЙ ДОЛГОНОСИКЪ

(Cleonus punctiventris Germ.)

и другіе виды долгоносиковъ,

ВРЕДЯЩИХЪ САХАРНОЙ СВЕКЛОВИЦЪ ВЪ ПРЕДЪЛАХЪ РОССІИ,

описаніе ихъ, образъ жизни и борьба съ ними.

Съ одной хромолитографированной таблицей и 28 рисунками въ текстъ.

СОСТАВИЛЪ

А. А. Силантьевъ,

преподаватель и ассистенть ИМПЕРАТОРСКАГО Лѣснаго Института, и. об.старшаго спеціалиста Департамента Земледѣлія по прикладной зоологін и промысловой охотѣ.



Нарило Филоная База: применя начи СССР

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. Меркушева, Невскій пр., № 8. 1903.

во по и пен пем в Просмето вымана Аналията езин Серго 1992 [1973 г.]

обынновенный свенопыный долгоносинъ

(Cleonus punctiveniris Germ.)

и другіє виды долгоносиковь,

япциха сахаеной свеклювини въ нее дълаху то

онивание ихъ, образъ живни и борьба съ ними.

Печатано по распоряженію Департамента Земледълія.

A. A. Cusanmoeso.

concerns HEREPATOPDERIC Appears the

Глава VI. Химическій методь борьбы со свекольнымь долгоносикомъ почоля у Оглавление. Вышки выпромя замином пульверизаторъ Вермореля 120; пульвериляторы Б. Плятца -121; колорадо — 122; креслообразный пульверизаторь — 124; eqT Me: Beneph M 1 Benmopens-125; Phrapo, Harria, Austгіа—129. Наконечники: Вермореля—130: Сенека и Калля—війоклирацІ Глава I. Описаніе вредящихъ свеклѣ долгоносиковъ . . V—VII Обыкновенный свекольный долгоносикъ—Cleonus punctiventris Germ.—1; Cl. foveicollis Gebl.—10; Cl. fasciatus Müll.—13; Cl. piger Scop.—14; Cl. tigrinus Panz.—15; Cl. cinereus Schrank— 16; Cl. ophthalmicus Rossi-17; Tanymecus palliatus Fabr.-18; Otiorhynchus ligustici L. — 19; Liophloeus tessellatus Müll.—21; Lixus cardui Oliv. — 22; Sitones lineatus Lin. u Sit. lineellus Bonsd. — 23; Liparus coronatus L. — 24; Psalidium maxillosum F. — 25; Какъ разобраться въ находимыхъ на плантаціяхъ видахъ долгоносиковъ, повреждающихъ бураки-25. Общій очеркъ—32; подробное описаніе: періодъ "лёта" —35; появленіе жуковъ весною—38; брачный періодъ—42; передвиженія по земль и лёть жуковь—44; исчезновеніе жуковь—50; личинки и куколки-51. поводон вічась здеї-падолода выноводи здей-уд Глава III. Враги свекольнаго долгоносика $61\!-\!74$ Общій обзоръ - 61; зеленая мюскардина - 62; красная мюскардина-71. Глава IV. Вредъ, приносимый свекольными долгоносиками и борьба съ ними.......... 75 - 87Вредъ, приносимый жуками- 75; вредъ, приносимый личинками -- 77; убытки отъ долгоносика вообще -- 79; районъ наибольшихъ поврежденій свеклы долгоносиками — 82; причины массоваго размноженія долгоносиковъ - 83; періодичность его-85; методы борьбы съ долгоносикомъ-87. Глава V. Механическіе методы борьбы со свекольнымъ долгоносикомъ..... Ловчія канавы-88; ручной сборъ жуковъ-91; стоимость его-96; недостатки метода-99.

Глава VI. Химическій методъ борьбы со свекольнымъ

Отпугивание жуковъ пахучими веществами-100; отравленіе жуковъ: швейнфуртская зелень—101; опредъленіе чистоты ея: амміакомъ-102; микроскопическимъ анализомъ-103; водой—104; химическимъ анализомъ-105; опредъление крупнозернистости — 106; пріобрътеніе швейнфуртской зелени—108; кръпость смъси и приготовление ея-109; стоимость опрыскиванія — 114; джипсинъ — 114; мышьяковистая м'тдь съ известью — 116; хлористый барій — 117. Опрыскиватели — 118; конные: выочный пульверизаторъ Вермореля — 120; рядовой пульверизаторъ Вермореля-120; пульверизаторъ К. Плятца-121; колорадо — 122; креслообразный пульверизаторъ — 124; ручные: Эклеръ № 1 Вермореля—125; Фигаро, Плятца, Austria—129. Наконечники: Вермореля—130; Сенека и Калля—134. Производство опрыскиванія—135; вліяніе опрыскиванія бураковъ швейнфуртской зеленью—138. Заключеніе—143.

Глава VII. Микологическій методъ борьбы со свеколь-

Исторія микологическаго метода въ Россіи—145; пользованіе натуральной мюскардиной—147; искуственное разведеніе мюскардины—148; зараженіе плантаціи мюскардиной— 151; практическое значеніе микологическаго метода борьбы со свекольнымъ долгоносикомъ-153.

Глава VIII. Раціональный методъ борьбы со свекольнымъ долгоносикомъ

Сущность раціональнаго метода -156; когда надо бороться съ долгоносикомъ-157; гдъ и какъ надо вести борьбу-157; пробныя раскопки-159; ловчія полосы-160; календарь работь по борьбъ съ долгоносикомъ-162; обязательность принятія мъръ противъ долгоносика—165; союзы плантаторовъ для борьбы съ долгоносикомъ-166; роль спеціалиста энтомолога въ союзъ-167.

Глава IV. Вредь, приносимый свекольными долгоносиками

Глава V. Механическіе методы больбы со свекольнымъ

Вредъ, приносимый жуками- 75: вредъ, приносимый ли-

и борьба съ ними

предисловіє.

Извъстіяхъ Министерства Земледълія № 30 за 1899 годъ.

Земледъщя. Затъмъ, въ началъ лъта 1899 и 1900 головъ,

Широкая извъстность, которою пользуется свекольный долгоносикъ въ качествъ классическаго врага сахарной свекловицы, и отсутстве въ русской литературъ сводки свъдіній, касающихся образа жизни этого вредителя и способовъ борьбы съ нимъ въ достаточной степени оправдываютъ появленіе въ свъть настоящаго изданія. Постоянные запросы со стороны владъльцевъ сахарныхъ заводовъ о высылкъ имъ соотвътствующаго руководства касательно долгоносика послужили причиной порученія мнѣ Департаментомъ Земледълія въ 1901 году составить возможно подробное описаніе обыкновеннаго свекольнаго долгоносика и другихъ видовъ этого-же семейства жуковъ, встръчающихся вмъсть съ нимъ на плантаціяхъ, ихъ образа жизни и современныхъ методовъ борьбы съ ними, на основаніи собственныхъ наблюденій и литературнаго матеріала. Представляя на судъ читателей составленную мною книжку, считаю необходимымъ сказать нъсколько словъ о томъ, какимъ личнымъ опытомъ и матеріаломъ я располагалъ, отда отви ахи азая и віношад

Работая въ 1895 и 1896 годахъ на свекловичныхъ плантаціяхъ Воронежской губерній надъ изученіемъ свекловичныхъ блохъ-Chaetocnema, мнъ пришлось попутно познакомиться и со свекловичными долгоносиками; тогда-же были произведены мною первые лабораторные и полевые опыты истребленія ихъ разными инсектисидами, изложенные въ зам'ътк'ъ "Свекольный долгоносикъ и другіе враги сахарной

свеклы", напечатанной въ журналъ "Сельск. Хоз. и Лъсов." и изданной впослъдствіи особой брошюрой Департаментомъ Земледълія. Затьмъ, въ началъ лъта 1899 и 1900 годовъ, мнѣ пришлось работать, по порученію Департамента Земледълія, въ Шебекинскомъ имѣніи гг. Ребиндеръ, Курской губерніи, надъ организаціей опытовъ истребленія долгоносика швейнфуртской зеленью; результаты работъ 1899 года изложены въ краткомъ предварительномъ отчетъ подъ заглавіемъ "Борьба со свекольнымъ долгоносикомъ (Cleonus punctiventris Germ.) при помощи парижской зелени", напечатанной въ Извъстіяхъ Министерства Земледълія № 30 за 1899 годъ.

Къ сожалънію, мнъ ни разу не пришлось посвятить изученію біологіи свекольнаго долгоносика хотя-бы одно лізто сплошь; всв мои наблюденія производились въ кратковременные, сравнительно, прівзды, связанные съ производствомъ на плантаціяхъ другихъ какихъ-нибудь работь и изслідованій, что, конечно, не могло не придать имъ характера отрывочности и незаконченности; многіе вопросы, которые слъдовало-бы разръшить, такъ и остались даже не затронутыми. Приступивъ къ выполненію предложенной мит задачи, я много надеждъ возлагалъ на изслъдованія И. Даныша и его ассистентовъ, спеціально работавшихъ въ 1900-1901 годахъ въ Кіевской губерній надъ изученіемъ образа жизни свекольнаго долгоносика, и даже отчасти сознательно задержалъ выходъ въ свъть настоящаго изданія, чтобы воспользоваться новъйшими данными по біологіи этого жука; но, къ сожальнію, надеждамь моимь не суждено было оправдаться.

Изслъдованія велись не энтомологами, безъ пониманія того, какіе именно вопросы должны быть поставлены для разръшенія и какъ ихъ надо было изучать.

Сочиненія и статьи, использованныя мною при составленіи настоящей работы, всюду цитированы въ подстрочныхъ примъчаніяхъ или въ текстъ, за слъдующимъ исключеніемъ: отчеты И. Даныша, числомъ три, для краткости прямо именуются въ текстъ по порядку ихъ выхода въ свътъ: первый, второй и третій, что соотвътствуеть слъдующимъ его статьямъ:

- И. Данышъ. Въстникъ Сахарной Промышленности.
 1900 г. № 14.
- 2) И. Даништ и д-рт К. Визе. О примъненіи мюскардины въ борьбъ противъ Cleonus punctiventris. Въст. Сах. Промышл. 1901 г. №№ 6, 7 и 8.
- 3) *И. Даныш*. Къ вопросу объ охранъ свекловичныхъ плантацій отъ жука долгоносика. Въстн. Сах. Промышл. 1901 г. №№ 46—49.

1





Рис. 1. се и в - экуки, с-яшки, с-молодия лигинки



Рнс.II. a-палувэрослая и в-взрослыя лигинки, с-кукагка снизу и d-сверху.



гис.III. Лигинка, покрытая спорами зеленой мюскардины.



Рис.IV. Личинка въ гежликъ изъмицана зеленой мюскардины



Рис.V. Лишнка, пораженная красной мюскардиной.




Рис.VI. Лигинка, окруженная сътью разросшигося мицелія.

дабы съумыть отличить его оты пругихы встрычающихся на бурачной плантаци жуковь того-же семенства, перылю бчень на исто похожихы.

ства Сисиюнае, куда причисияется свекольный долгоносикъ, характеризуется Сублующими признанами^м). Голова сильно наклоненная, отчего хосотокъ паправленъ почти

MOTO BH : CITOGO FOT BE BUILDED A TO THE XETOM

Описаніе вредящихъ свеклѣ долгоносиковъ.

Обыкновенный свекольный долгоносикт, изображенный на хромолитографированной таблицѣ въ натуральную величину, или, какъ его чаще называють въ разговорѣ, жучект, жукъ, свинка, козявка, есть жукъ, относящійся къ семейству слониковъ или долгоносиковъ (Curculionidae), характеризующемуся вытянутою въ хоботокъ головою и четырехчлениковыми лапками (концевымъ отдѣломъ ноги, состоящимъ изъ мелкихъ члениковъ, и оканчивающимся двумя коготками). На концѣ хоботка помѣщаются ротовые органы, главную существенную часть которыхъ составляють двѣ крѣпкія верхнія челюсти, при помощи которыхъ жукъ грызеть растительныя ткани. По бокамъ хоботка, на большемъ или меньшемъ разстояніи отъ его вершины, прикрѣпляются усики, а при основаніи его, по бокамъ головы—глаза.

Семейство долгоносиковъ относится къ одному изъ наиболье богатыхъ видами семействъ жуковъ, среди которыхъ имъется много представителей, вредящихъ въ полеводствъ, льсоводствъ, плодоводствъ и огородничествъ. Даже по отношеню къ свеклъ обыкновенный свекольный долгоносикъ (Cleonus punctiventris) является далеко не единственнымъ вреднымъ представителемъ этого семейства, такъ какъ, наряду съ нимъ, въ литературъ неоднократно упоминались и другіе виды долгоносиковъ, повреждавшихъ бурачные всходы. Поэтому недостаточно еще знать, что главный врагъ свеклы Сl. рипстічентіз относится къ семейству долгоносиковъ, а необходимо познакомиться подробно съ его описаніемъ,

А. СИЛАНТЬЕВЪ.

1

дабы съумъть отличить его отъ другихъ, встръчающихся на бурачной плантаціи жуковъ того-же семейства, неръдко очень на него похожихъ.

Родъ Cleonus, одинъ изъ многочисленныхъ родовъ семейства Curculionidae, куда причисляется свекольный долгоносикъ, характеризуется слъдующими признаками 1). Голова сильно наклоненная, отчего хоботокъ направленъ почти вертикально внизъ. Хоботокъ короче груднаго щита или thorax'a (т. е. части тъла, слъдующей за головой); на сторонъ, обращенной впередъ, онъ почти всегда плоскій и снабженный килемъ-продольной возвышенной линіей. Усики кольнчатые, съ очень длиннымъ основнымъ членикомъ-стебелькомъ и 7-ю болве короткими, расположенными къ стебельку подъ угломъ, и образующими своей совокупностью такъ называемый жиутика. Первые два основные членика жгутика, (т. е. прикръпляющійся къ стебельку и слъдующій за нимъ), длиннъе слъдующихъ, къ вершинъ укорачивающихся и расширяющихся и образующихъ вслъдствіе этого булаву усиковъ. По бокамъ хоботка имъется съ каждой стороны по глубокой продольной бороздкъ, сначала идущей отъ вершины его вдоль хоботка, а потомъ быстро загибающейся книзу. Въ эти бороздки жукъ вкладываетъ стебельки усиковъ, когда послъдніе находятся въ бездъйствіи. Если-же усики расправлены, то стебельки отставляются подъ прямымъ угломъ къ хоботку, а жгутики направляются впередъ. Стебелекъ, вложенный въ бороздку, не хватаетъ до глаза. Глаза удлиненные, не выпуклые. Грудной щить (смотря на жука сверху) къ головъ съуженъ, а длина его по большей части равна его ширинъ по заднему краю; послъдній имъеть двъ плоскія выемки, въ которыя входять закругленныя основанія надкрылій. *Щимокъ* (scutellum—треугольничекъ, примыкающій къ заднему краю грудного щита, въ самой его срединъ, между основаніями обоихъ надкрылій) очень малъ или совершенно не замътенъ. Надкрылья удлинненныя или удлинненно-яйцевидныя. Бедра (самая толстая часть ноги) безь зубцовь. Голени (часть ноги между бедромь и лапкой) переднихь ногь на вершинт съ большимь, горизонтально и внутрь направленнымь шипомь. Коготки (по два на концъ лапки) при основани сросшеся, неподвижные. Перепончатыя крылья, при помощи которыхь жукъ летаеть (сложенныя и запрятанныя обыкновенно подъ твердыми надкрыльями), имъются или отсутствують. Тъло жука покрыто чешуйками и волосками, маскирующими въ различной степени темный основный фонъ хитиноваго покрова его и придающими ему болъе свътлую окраску.

Сеопия punctiventris Germ. — Conicirostris Gyll. Обыкновенный свекольный долгоносикъ или, какъ мы будемъ его называть въ настоящей работъ, просто свекольный долгоносикъ, отвъчая всъмъ признакамъ рода Cleonus, отличается отъ другихъ видовъ того-же рода слъдующими особенностями:

Крупнийшіе признаки. Жукъ, въ общемъ, бѣловато-съроватаго цвѣта, съ одной наискось идущей черной, то болѣе, то менѣе рѣзко выраженной полосой посрединѣ каждаго надкрылья (обѣ полосы расположены одна къ другой подъ угломъ, направленнымъ вершиной назадъ); между этой черной полосой и концомъ надкрылья, примѣрно на половинѣ разстоянія, имѣется на каждомъ изъ нихъ по бугорку, спереди бѣлаго, а сзади чернаго цвѣта; брюшко испещрено по свѣтлому фону многими мелкими черными точечками, а посрединѣ его выдѣляются расположенныя въ одну продольную линію черныя площадки, по одной на каждомъ брюшномь кольцѣ. Господствующіе размѣры отъ лба, при согнутомъ внизъ хоботкѣ, до конца брюшка—13—14 млм., попадаются же экземпляры отъ 10 до 15 млм. длины.

Подробное описаніе. Основный цвѣтъ тѣла жука черный, свѣтлымъ же онъ представляется при наружномъ осмотрѣ вслѣдствіе того, что все тѣло болѣе или менѣе густо покрыто особыми бѣловатыми чешуйками, расположенными неравномѣрно, то гуще, то рѣже, а мѣстами и вовсе отсутствующими; это обстоятельство и служитъ причиною существованія различныхъ тоновъ окраски долгоносика и при-

⁽d) Для раземотрънія многихъ изъ этихъ признаковънеобходимо запастись хорошей лупой или препаровальнымъ микроскопомъ.

сутствія черныхъ точекъ, полосъ и т. п. на мѣстахъ тѣла, лишенныхъ чешуекъ. Чешуйки эти при основаніи, въ мѣстѣ прикрѣпленія къ тѣлу жука, закруглены, а на противоположной свободной сторонѣ глубоко вырѣзаны, далѣе половины своей длины, и оканчиваются 3—4 тонкими остріями 1) (рис. 1). Грудной щитъ и надкрылья покрыты болѣе мел-



Рис. 1. Чешуйки Cl. punctiventris Germ. (1774 8) 9Д 100

кими и короткими чешуйками, съ вершинными вырѣзками, заходящими едва только за половину ихъ длины; на нижней же сторонѣ тѣла, въ особенности на груди и ногахъ, чешуйки крупныя, удлиненныя и настолько глубоко вырѣзанныя, что получается иногда впечатлѣніе пучка изъ 3—4 волосковъ, выходящихъ изъ одной точки. Среди этихъ волосковидныхъ видоизмѣненныхъ чешуекъ попадаются изрѣдка сразу отличающіеся своей грубой конструкціей и большей величиной обыкновенные одиночные волоски. Общій бѣловато-сѣроватый цвѣтъ, придаваемый жуку этими чешуйками, принимаетъ на надкрыльяхъ и на груди, въ особенности около мѣста при-крѣпленія ногъ, свѣтло-буроватый оттѣнокъ.

Надо замѣтить, однако, что не всѣ жуки окрашены совершенно одинаково— у нѣкоторыхъ преобладаетъ бѣловатый, у другихъ сѣроватый, у третьихъ, наконецъ, слегка буроватый оттѣнокъ.

Чешуйки, покрывающія тѣло жука постепенно, отъ времени, стираются въ родѣ того, какъ стирается пыльца на

крыльяхъ бабочки отъ неосторожнаго прикосновенія къ нимъ пальцевъ, вслъдствіе чего долгоносики къ концу своей жизни становятся болъе темными и менъе красивыми, нежели въ началъ весны. Хоботокъ, къ вершинъ немного расширенный, на передней сторонъ съ ръзковыраженнымъ продольнымъ килемь, по объ стороны котораго идеть по бороздкъ, отдъ ляющей срединный киль отъ двухъ боковыхъ, играющихъ роль реберъ, отграничивающихъ переднюю поверхность хоботка отъ боковыхъ. Грудной щитъ имъетъ неровную и морщинистую поверхность, усвянную грубыми точками. По срединъ его задняго края находится замътное даже простымъ глазомъ вдавленіе, отъ котораго (или даже иногда вдоль котораго) тянется продольный киль, далеко не у всъхъ экземпляровъ одинаково ясно выраженный. Надкрылья съ хорошо развитыми плечевыми углами, на заднемъ концъ закругленныя, каждое въ отдъльности, но безъ вершиннаго острія. Ихъ длина почти равна двойной ширинъ обоихъ надкрылій, взятыхъ вмъстъ. На каждомъ надкрыльи по 10 правильныхъ продольныхъ рядовъ грубыхъ точекъ, постепенно уменьшающихся по величинъ въ каждомъ рядъ по направленію оть основанія къ вершинъ. Изъ этихъ десяти рядовъ точекъ 1-й и 9-й, считая отъ шва (отъ линіи соприкасанія обоихъ надкрылій другь съ другомъ), доходять до самаго конца надкрылья, гдв и соединяются между собою угломъ; 2-й рядъ точно также соединяется съ 8-мъ, а 3-й-съ 6-мъ и 7-мъ, при этомъ, всв эти ряды проходять мимо бугорка на надкрыльи, а именно: 1-й, 2-й и 3-й между нимъ и швомъ, а 6-й, 7-й, 8-й и 9-й по другую, наружную сторону бугорка, углы-же соединенія этихъ рядовъ точекъ приходятся позади бугорка, между нимъ и вершиной надкрылья. Ряды 4-й и 5-й идуть какъ разъкъ самому бугорку и на немъ оканчиваются, 10-й рядъ точекъ идетъ по самому наружному краю надкрылья, не доходя до его вершины, и ни съ какимъ другимъ рядомъ доватое, безногое тъло, согнутое полюжинидоо эн амарот

Самиы отличаются отъ самокт болъе стройнымъ складомъ всего тъла, нъсколько меньшей въ общемъ величиной, а главное, присутствент ясно выраженнаго вдавле-

¹⁾ Большинство авторовъ описываютъ, что тъло жука покрыто округленными чешуйками и нѣжными волосками, но это, какъ видно изъ настоящаго описанія, не вполнѣ вѣрно. Форма чешуєкъ, какъ оказалось, характерная для каждаго вида, можеть служить хорошимъ признакомъ для различія жуковъ въ томъ случаѣ, когда, какъ это бываетъ нерѣдко, они оказываются сильно потертыми, лишенными характернаго для нихъ рисунка. Сравнивать надо всегда чешуйки на одной и той-же части тъла, лучше всего на надкрыльяхъ. Всѣ рисунки чешуєкъ сдѣланы при одинаковомъ увеличеніи.

нія посрединь 1-го и 2-го колецт брюшка, отсутствующаго у самокт.

Кромѣ того, возвышенная продольная линія вдоль грудного щита, идущая отъ вдавленія задняго его края, о которой мы упоминали выше, у самцовъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ отсутствуетъ, или же слабо развита, въто время, какъ у самокъ она обыкновенно сразу бросается въ глаза.

-q На основаніи пром'вровъ жуковъ, собранныхъ въ 1899— 1900 годахъ въ Курской губерніи, можно составить слідующую табличку разм'вровъ самцовъ и самокъ, въ миллиметрахъ.

	мцы (д			амки (2	1-
minimum 0/111	Господствую- щіе размъры.	maximum.	minum niminum nbininum nbinin	Господствую- щіе разм'вры.	maximam
10,0	13,0	14,0 170 R	11.3	14,0	15,0
12,0 4,0	15,0 5,0	16,0 5,5	14,0 4,5		18,0 6,0
	10,0	10,0 13,0 12,0 15,0	10,0 13,0 14,0 12,0 15,0 16,0	10,0 13,0 14,0 11.3 12.0 15,0 16,0 14,0	10,0 13,0 14,0 11.3 14,0 12.0 15,0 16,0 14,0 16—17

Яйца свекольнаго долгоносика желтовато-бѣлаго цвѣта, съ прозрачной скорлупкой, болѣе или менѣе овальной формы, достигающія 1,1-1,5 млм. длины и 0,75-0,9 млм. толщины, причемъ наиболѣе вытянутое яйцо изъ числа измѣренныхъ имѣло діаметры $1,5\times0,75$ млм., а наиболѣе короткое и толстое— $1,3\times0,9$ млм.

Личинка свекольнаго долгоносика имѣеть мясистое, бѣловатое, безногое тѣло, согнутое полудугой и снабженное твердой желтовато-бурой головой безъ глазъ. На головъ, надъ ртомъ, при разсмотрѣніи въ лупу, легко замѣтить, благодаря болѣе темной окраскъ, сердцевидное пятно, обращен-

ное узкимъ концомъ къ затылку. Отъ затылка къ объимъ сторонамъ рта тянется по узкой болъе темной полоскъ. Темнъе всего окрашена пара массивныхъ верхнихъ челюстейвъ темнобурый, переходящій на вершин'в почти въ черный цвътъ. Тъло личинки изборождено многими поперечными морщинками, покрывающими всю верхнюю и нижнюю его стороны; на бокахъ-же выдъляется два параллельныхъ ряда мягкихъ вздутій въ видъ подушечекъ, по числу колецъ, образующихъ тъло личинки. Оба ряда подушечекъ раздъляются ясно обозначенной бороздой. Въ особенности ясно эти подушечки выдъляются, начиная съ четвертаго кольца (считая оть головы), въ то время какъ три первыхъ, грудныхъ кольца у взрослыхъ личинокъ нъсколько толще остальныхъ, брющныхъ, и образують на спинъ за головой нъчто въ родъ горба. На спинной сторонъ 1-го груднаго кольца расположена вытянутая въ поперечномъ направленіи, свътло-буроватая съ болъе темнымъ переднимъ краемъ, отсвъчивающая хитиновая бляшка. На бокахъ того-же кольца съ каждой стороны имъется по маленькой буроватой точечкъ, представляющей изъ себя дыхательное отверстве, дыхальце или стигмату. На 2-мъ и 3-мъ грудныхъ кольцахъ такихъ стигмать нъть, но за то онъ имъются на всъхъ 8 брюшныхъ кольцахъ тъла личинки, располагаясь по одной линіи непосредственно надъ подушечками верхняго ряда. На брюшной сторонъ каждаго изъ трехъ грудныхъ колецъ вмъсто ногъ сидитъ по парѣ небольшихъ бородавочекъ, снабженныхъ 4-6 довольно длинными рыжеватыми волосками, что видно только въ хорошую лупу. Длина взрослой, готовой къ окукленію личинки, промъренная отъ лба до задняго конца брюшка, при естественномъ, полусогнутомъ положеніи ея тъла, достигаеть обыкновенно 13-14 млм., при наибольшей ширинъ тъла въ 5,5-6 млм. полоно оп стандетам

Куколка, такъ-же, какъ и здоровая личинка, свътлаго, желтовато-бълаго цвъта, мягкая, съ ясно обозначенными и пригнутыми къ груди ножками и головой съ хоботкомъ. Двъ пары крыльевъ еще нъсколько укорочены, не достаютъ конца брюшка, и со спинной стороны завернуты на брюш-

ную. Грудной щить вполнѣ сформированъ, а брюшныя кольца, въ числѣ 7, очень рѣзко обозначены, причемъ на заднемъ концѣ спинной и боковой сторонъ каждаго изъ нихъ сидитъ рядъ шипиковъ, особенно развитыхъ на трехъ послѣднихъ кольцахъ. Кромѣ этихъ шипиковъ имѣется еще двѣ пары ихъ буроватаго цвѣта, а именно: одна пара очень маленькихъ сидитъ надъ самымъ анальнымъ отверстіемъ, на особой, прикрывающей его надпорошицевой крышечкѣ, слѣдовательно на спинной сторонѣ, а другая пара крупныхъ шиповъ, расположенныхъ на бугоркахъ, сидитъ подъ анальнымъ отверстіемъ, на концѣ брюшка съ его нижней, брюшной стороны. Длина куколки достигаетъ 11—14,5 млм. при наибольшей ширинѣ въ 5—6 млм.

Въ 1873 году французскій энтомологъ Шевроля описаль новый видъ долгоносика, котораго, по его мивнію, слъдуеть считать главнымъ виновникомъ поврежденій свекловичныхъ плантацій въ Россіи, а именно: Cleonus betavorus Chevr.,-долгоносика свеклояднаго, живущаго въ Крыму и на Кавказъ. Почти навърно можно сказать, однако, что видъ этотъ является синонимомъ или только варьететомъ Сl. punctiventris Germ. Дъйствительно, еще Θ . Кеппенъ 1) писалъ въ 1882 году слъдующее: "Этотъ видъ, по утвержденію самого Шевроля, чрезвычайно похожъ на Cl. punctiventris, отъ котораго главнъйше отличается тъмъ, что овальное углубление на предтуліи (prothorax) съ тремя килями. Г. Фаусть, спеціально разрабатывающій семейство Curculionidae, на мой запросъ отвътилъ мнъ, что онъ считаетъ Cl. betavorus Chevr. простою разновидностью Cl. punctiventris. Къ этому г. Фаустъ присовокупилъ, что углубленія на предтуліи у представителей рода Cleonus значительно изм'внчивы, почему они не могутъ служить хорошимъ видовымъ признакомъ". Разбирая свой матеріалъ по свекольнымъ долгоносикамъ, я призналъ ихъ всъхъ принадлежащими къ виду Сl. punctiventris, причемъ, желая провърить себя, отослалъ жуковъ на просмотръ знатоку русскихъ слониковъ А. И. Яковлеву въ Ярославлъ, Лвв пары крильевъ еще нъсколько укорочени, не достаютъ

который призналь ихъ за настоящихъ *Cl. punctiventris* и высказаль въ то-же время мысль о томъ, что *Cl. betavorus* Chevr. синонимъ или слабый варьетэтъ *Cl. punctiventris*. Во всякомъ случав, значить, въ губерніяхъ Курской, Харьковской и Воронежской вредитъ типичный обыкновенный свекольный долгоносикъ *Cl. punctiventris*.

Каждый сколько-нибудь наблюдательный хозяинъ навърно замъчалъ, что среди массы обыкновенныхъ свекольныхъ долгоносиковъ, ползающихъ по плантаціи, попадаются и другіе, похожіе на нихъ жуки, въ большей или меньшей степени принимающіе участіе въ поъданіи свекловичныхъ всходовъ. Хотя, въ огромномъ большинствъ случаевъ, главнымъ или почти даже единственнымъ врагомъ плантацій оказывается обыкновенный свекольный долгоносикъ, но это нисколько не исключаеть возможности того, что который нибудь изъ этихъ второстепенныхъ вредителей размножится въ большомъ количествъ и начнетъ приносить ощутительный вредъ. Таковые случаи въ дъйствительности происходять безъ сомнънія гораздо чаще того, что мы знаемъ объ нихъ, потому-что у насъ не обращается обыкновенно должнаго вниманія на видовой составъ вредителей; игнорировать-же его, какъ мы увидимъ ниже, вовсе не слъдуетъ.

Въ концъ 50-хъ годовъ графомъ А. Бобринскимъ, усердно содъйствовавшимъ развитію свеклосахарной промышленности въ Россіи, было поручено агроному Штосу изученіе въ Кіевской губерніи враговъ свеклы, въ результатъ котораго было появленіе на сельскохозяйственной выставкъ 1860 года, устроенной Императорскимъ Вольно-Экономическимъ Обществомъ, коллекціи изъ восьми видовъ долгоносиковъ и ихъ личинокъ, кромъ Cleonus punctiventris, вредящихъ свеклъ 1).

Данныя о вред'в, приносимомъ видами, собранными г. Штосомъ, подтверждаются частью западноевропейской практикой, частью-же нашими русскими наблюденіями.

Кеппевъ (С. Хоз. и Льсов. 1880. Декабра. стр. 415) усомивлея въ върности

⁻Шо Вредныя насъкомыя. Т. П. часть І, стр. 316.

^{1880.} Декабрь. стр. 401. По указанію Ө. П. Кеппена, коллекція эта хранится въ Университеть Св. Владиміра въ г. Кіевь.

т Теперь мы займемся описаніемъ этихъ второстепенныхъ вредителей.

Cherr, Chroman and Chachil Budgerers Cl. punctiventris. Bo

2. Cleonus (Stephanocleonus Motsch) foveicollis Gebl. == fatuus Gyll. == podolicus Chevr. Корневой свекольный долгоносикъ 1).

Отличается отъ Cl. punctiventris меньшими размърами, нъсколько болье буроватой окраской своего чешуйчатаго покрова, присутствіемъ на м'вств черныхъ косыхъ полосъ посреди надкрыльевъ такого-же цвъта большихъ пятенъ, большими размърами чернаго поля позади бугорка съ бълой точкой передъ вершиною надкрыльевъ, очень грубо-морщинистымъ и изрытымъ груднымъ щитомъ. Углубление посрединъ задняго края грудного щита значительно слабъе выражено, чъмъ у Сl. punctiventris, а грудной щить безъ продольнаго киля, или-же съ едва замътнымъ намекомъ на него. На хоботкъ спереди ръзко-выраженный продольный киль, на половинъ его длины замътно возвышающійся, вслъдствіе чего жукъ кажется, если смотръть на хоботокъ въ профиль, явно горбоносымъ. На буроватомъ брюшкъ, у нормально окрашенныхъ жуковъ, замъчается 5 продольныхъ рядовъ черныхъ, не покрытыхъ волосовидными чешуйками пятенъ (по одному пятну на каждомъ брюшномъ кольцъ въ одномъ продольномъ ряду), изъ коихъ одинъ тянется посрединъ брюшка, два по краямъ его у самыхъ надкрыльевъ, и два между среднимъ и крайними. Средній рядъ, ръзче всего выраженный, видень постоянно, промежуточные-же и крайніе ряды зачастую бывають болье или менье заy crpoeding it malepar openime the abit of the маскированы.

Чешуйки (рис. 2), покрывающія надкрылья этого долгоносика, отличаются оть таковыхъ-же обыкновеннаго свекольнаго долгоносика большей шириной вершинныхъ зубцовъ или допастей, которыхъ бываетъ всего по 2—3 на каждой чешуйкъ (ръже по 4), а не по 3—4, какъ у предыдущаго вида, главнымъ-же образомъ тъмъ, что выръзы на вершинъ чешуйки въ общемъ достигаютъ только до половины ея длины, не заходя такъ глубоко, какъ у обыкновеннаго свекольнаго Рис. 2. Чешуйки Сl. fоveicollis Gebl. долгоносика.

Размъры Cl. foveicollis Gebl. въ миллиметрахъ (экземпляры изъ Самарской, Курской, Воронежской и Харьковской губерніи):

ораоотанному извъстнымъ знач	Minimum.	щіе размъры.	Maximum.	
1) Длина жука отъ лба (при согну-	UIKOBE I.	уковъ-слон	K GMONO	
томъ хоботкъ) до задняго конца над-	EVES. ESE	rie aroro a	нто значе	
крылій.	9,1	10,5	12,0	
2) Длина жука съ вытянутымъ впе-		ADERIKAMENTAL-R		
редъ хоботкомъ, отъ вершины послъд-	dTIdO N	of Porcin	SEPONENCE	
няго до конца надкрылій	60.10,11yBe	11 12,500	998 14,25 LV	
3) Наибольшая ширина жука	TOT 4,0	4,25	MNI 5,00091	
4) Длива хоботка	3,25	3,5	4,25	

Этотъ видъ долгоносиковъ, судя по имъющимся у меня даннымъ, имъетъ, въроятно, наиважнъйшее хозяйственное значение послъ Сl. punctiventris. Дъйствительно, по даннымъ, сообщеннымъ мнъ главнымъ агрономомъ удъловъ И. Н. Клингенъ, относительно опустошеній, произведенныхъ въ Тимашевскомъ удъльномъ имъніи Самарской губерніи въ 1900 году, ясно было, что эти опустошенія, занявшія члощадь болъе 200 десятинъ свекловичныхъ посъвовъ, совершенно не давшихъ урожая (въ предшествующіе годы опустошенія среди бурачныхъ поствовъ тоже наблюдались, но въ меньшей степени) по своей интенсивности нисколько не уступаютъ таковымъ-же, производимымъ обыкновеннымъ свекольнымъ долгоносикомъ, которому они и были приписаны. Просматривая-же присланныхъ оттуда жуковъ, я убъдился, что изъ 73 штукъ-71 относились къ виду Cl. foveicollis а 2—Cl. fasciatus, въ то время, какъ Cl. punctiventris среди нихъ не было ни одного. Это служитъ неопровержимымъ доказательствомъ того, что Cl. foveicollis можетъ совершенно самостоятельно наносить свекла сильный вредь. Затамъ,

¹⁾ Этотъ видь также быль помъщенъ въ коллекцію г. Штоса, но Θ . П. Кеппенъ (С. Хоз. и Льсов. 1880. Декабрь. стр. 415) усомнился въ върности опредъленія этого жука на томъ основаніи, что въ каталогъ жуковъ Геммингера и Гарольда родиной его показана одна Сибирь. Ниже мы узнаемъ, что сомнѣнія г. Кеппена были несправедливы.

просматривая сборы мои на плантаціяхъ въ губерніяхъ Курской и Воронежской, я отыскиваль постоянно среди массы Cl. punctiventris извъстный проценть Cl. faveicollis, большій, нежели % другихъ видовъ долгоносиковъ. Что они вредятъ буракамъ въ Курской губерніи совм'єстно съ Cl. punctiventris, вытекаеть изъ того, что посл'в опрыскиванія бураковъ парижскою зеленью, среди погибшихъ отъ отравы жуковъ, неоднократно находились также Cl. foveicollis. Такъ какъ этотъ жукъ занимаетъ огромный районъ распространенія 1), о чемъ я могу судить по имъющемуся въ Зоологическомъ Музев Академіи Наукъ матеріалу, обработанному извъстнымъ знатокомъ жуковъ-слониковъ г. Фаустомъ, то надо полагать, что значеніе этого жука, какъ врага свекловичныхъ плантацій, по мъръ появленія послъднихъ въ восточной части Европейской Россіи и, быть можеть, въ Западной Сибири, будеть все болъе и болъе увеличиваться. Отсюда вытекаеть необходимость изучить біологію этого жука, такъ какъ, судя по нъкоторымъ намекамъ, онъ отличается своимъ образомъ жизни отъ обыкновеннаго свекольнаго долгоносика. Въроятнъе всего, что личинка его живетъ не просто въ землъ, около корней свеклы, а внутри ихъ, о чемъ я заключаю изъ словеснаго сообщенія И. Н. Клингенъ, передававшаго мнъ, что масса долгоносиковъ наблюдалась имъ въ Тимашевъ внутри корней сохраняемых на зиму бурачных высадковъ. Это обстоятельство и послужило мотивомъ назвать его корневымъ свекольнымъ долгоносикомъ. Кромъ того, онъ отличается біологически отъ обыкновеннаго долгоносика еще и тъмъ, что совершаетъ массовое нападеніе на свеклу нъсколько позже, во второй половинъ мая, хотя, быть можеть, это зависить отъ климатическихъ условій Тимашевскаго удвльнаго имвнія, гдв это наблюдалось.

саны, Просматривая-же присланныхъ оттуда жуковъ, я убъ

3. Cleonus (Chromoderus Motsch.) fasciatus Müll.—affinis Schrank.—
niveus Bonsdorff — albidus F. — berolinensis Gmel. Бъловатый свекольный долгоносикъ.

4. Cleonus piger Scop. - sulcirostris L. - scutellatus Bule lavy-

На первый взглядь, по величинь и, отчасти, по окраскь, въ особенности-же въ потертомъ видь, онъ похожъ на СІ. foveicollis Gebl., но легко отличается отъ него устройствомъ возвышенной линіи или киля на хоботкь, что хорошо видно, если смотръть на хоботокъ спереди, такъ сказать, въ лобъжуку; а именно, киль близъ конца хоботка, вилообразно раздваивается. Затъмъ, верхъ жука густо покрытъ чистобъльми чешуйками, причемъ, на свътломъ фонъ надкрылій, немного позади половины ихъ длины, ръзко выдъляется широкая, черная, поперечная полоса съ неровными краями, и по два черныхъ-же пятна на каждомъ надкрыльи—одио на плечахъ, передъ полосой, а другое позади нея, близъ вер шины надкрылья. Грудной щитъ жука морщинистый.

Чешуйки на надкрыльяхъ мелкія, короткія, толстыя, къ вершинъ быстро сходящія на нътъ, одноконечныя, не раздъленныя на зубцы (рис. 3).

Непокрытыя волосками морщины на грудномъ щитъ и голыя мъста на надкрыльяхъ интенсивно-черныя, блестящія, какъ-бы лакированныя.

A REQUIENTS

Puc. 3. Чешуйки Cl. fasciatus Müll.

Размъры какъ у предыдущаго вида.

Cleonus fasciatus Müll. въ небольшомъ количествъ встръчается въ предълахъ всего свекловичнаго района Европейской Россіи, мъстами-же можетъ приносить довольно значительный вредъ, какъ это и наблюдалось въ Кіевской губерніи, въ имъніи Корсунь (Вебель). Мнѣ этотъ видъ попадался въ небольшомъ количествъ на всѣхъ осмотрънныхъ плантаціяхъ Курской и Харьковской губерніи; жучекъ отравлялся вмъстъ съ Сl. punctiventris во время моихъ опытовъ опрыскиванія свекловичныхъ всходовъ швейнфуртской зеленью.

¹⁾ По имъющимся въ моемъ распоряжени даннымъ, Cl. foveicollis встръчается отъ губерній: Кіевской (коллекція Штоса), Курской, Воронежской, Харьковской, Екатеринославской (мои сборы), Московской (Матеріалъ Зоолог. Муз. Московск. Университ.) и Нижегородской (Матер. Зоолог. Музея Имп. Акад. Наукъ) черезъ всю Сибирь до Забайкалья, Съвернаго Китая и Туркестана (матер. Зоол, Муз. И. Ак. Наукъ).

4. Cleonus piger Scop. = sulcirostris L. = scutellatus Boh. Abyx-3. Cleonus (Chromoderus annionornois magarun III - affinis Schrank -

Немного крупнъе обыкновеннаго свекольнаго долгоносика, общимъ же видомъ и характеромъ окраски очень на него похожъ; потертые экземпляры среднихъ размъровъ могуть быть на первый взглядъ приняты за Cleonus punctiventris даже энтомологомъ. Между тъмъ, различать эти два вида между собою очень легко, обративъ вниманіе на переднюю сторону хоботка, гдв у описываемаго вида два ясно выраженныхъ продольныхъ киля съ бороздой между ними, въ то время какъ у обыкновеннаго свекольнаго долгоносика имъется только одинъ киль. Громадная разница замъчается также въ формъ чешуекъ на надкрыльяхъ, которыя у этого вида довольно крупны, удлиненной формы, немного изогнуты,

> постепенно утончаются къ вершинъ (рис. 4), но имъютъ притупленный конецъ.

Что касается окраски, то у свъжихъ жуковъ видны на надкрыльяхъ по двъ косыхъ матовочерныхъ полосы на каждомъ, и по черному Рис. 4. Чешуйка Cl. piger пятну позади предвершиннаго бугорка. Грудной Scop. щить матовый, довольно грубозернистый, у задняго края съ яснымъ вдавленіемъ посрединъ и съ замътнымъ, направляющимся отъ этой впадины впередъ продольнымъ килемъ. По бокамъ этого киля мелкія бороздки, усаженныя бълыми чешуйками, образующими узкую бъловатую линію; по бокамъ же груднаго щита имъется съ каждой стороны по болже широкой, неясно изогнутой бъловатой продольной полосъ. Окраска большею частью бъловатосърая, иногда съ буровато-сърымъ оттънкомъ. Брюшко въ многочисленныхъ, довольно крупныхъ голыхъ точкахъпятнышкахъ, иногда скорве даже черное, съ немногими свътлыми волосками. На надкрыльяхъ ряды слабо выра-JAJER BULCTE CE Cl. punctiventes no BROWN CASPOT CXLINESK

Длина жука до конца надкрылій: Наибольшая ширина Отъ лба, при согнутомъ Отъ конца вытянутаго хоботкъ. впередъ хоботка. 4,5-6,5 MJM. 12-17 млм. 13,5—19,5 млм.

- Cleonus piger также наносить вредъ свеклъ, появляясь нъсколько позже обыкновеннаго долгоносика; личинка его живеть въ корняхъ и въ нижней части стеблей чертополоха Carduus, татарника — Cirsium, репейника — Lappa, василька — Centaurea и лебеды—Atriplex. Въ Австріи приносить иногда существенный вредъ. Обитаеть онъ въ предълахъ всего свекловичного района; мн онъ попадался въ 1899-1900 гг. въ Курской и Харьковской губ. только изръдка; въ 1897 году, по свидътельству И. В. Васильева, попадался чаще другихъ видовъ (кромъ Cl. punctiventris) на свекольныхъ плантаціяхъ Воронежской губерніи; въ конців іюня личинки и куколки этого долгоносика встръчались ему массами въ корняхъ вышеуказанныхъ растеній по межамъ, вдоль дорогъ и на паровыхъ поляхъ. а ступик ото мянирив сахинтали

5. Cleonus (Cyphocleonus Motsch.) tigrinus Panz. = marmoratus F. Мраморный долгоносикъ.

Hurs Achillen millefolium in RopheBingaxb pomena Purchrum

6. Cleonus (Pseudocleonus Chevr.) cinereus Schrank = costatus F. -Отличается отъ предыдущихъ трехъ видовъ болъе вытянутой, вальковатой формой тыла и характерной мраморной окраской надкрыльевь, покрытыхь болъе или менъе четыреугольными, бѣлыми и черными пятнами, расположенными какъ бы въ шахматномъ порядкъ; эти бълыя пятна обра-

зуются крупными, длинными, изогнутыми игловидными чешуйками (рис. 5), не имъющими при основаніи явнаго вздутія, а постепенно къ вершинъ, безъ замътнаго съуженія, переходящими въ остріе (чъмъ онъ отличаются отъ че-



Рис. 5. Cl. tigrinus Panz.

шуекъ Cl. fasciatus, рис. 3). Мъстами, на надкрыльяхъ, а также вдоль шва, расположены замътно меньшей величины волосовидныя чешуйки буроватаго или съроватаго цвъта. Посрединъ груднаго щита проходить одна продольная, а по бокамъ- по двъ перекрещивающихся въ видъ неправильной буквы Х бълыя полосы, соединяющіяся между собою одной поперечной. На грудномъ щитъ и надкрыльяхъ изъ чешуекъ выставляются многочисленныя мелкія бородавочки или пуговки, интенсивно чернаго цвъта, блестящія, какъ-бы лакированныя. Хоботокъ довольно толстый и короткій, прямой ¹), на передней сторонъ имъющій одиночный, не доходящій до самаго конца его, не совсъмъ ровный, какъ бы морщинистый киль.

Длина жука до конца надкрылій: Наибольшая ширина
При согнутомъ хоботкъ При вытянутомъ хоботкъ жука.
отъ лба.

8-13 млм.

9—15 млм.

4—5 млм.

Этотъ долгоносикъ, сильно варьирующій по размѣрамъ, отмѣченъ Штосомъ въ 1860 году вредящимъ свеклѣ въ Кіевской губерніи; встрѣчается по всей Европъ, очень часто на цвѣтахъ пижмы — Tanacetum vulgare и другихъ сложноцвѣтныхъ; личинки его живутъ въ корняхъ тысячелистника—Achillea millefolium и корневищахъ ромена— Pyrethrum inodorum.

6. Cleonus (Pseudocleonus Chevr.) cinereus Schrank = costatus F. = -ктия отновішення Rossi. Съроватый долгоносикъ.

Что агиноопольнийын домодим сийжих в жуковъ

Надкрылья покрыты съроватыми чешуйками относительно равномърно, съ неправильными перерывами, не образуя яснаго рисунка въ видъ голыхъ полосъ или большихъ пятенъ; на хоботкъ одинъ, очень сильно развитой киль, посрединъ замътно приподнятый, отчего хоботокъ въ профиль кажется горбоносымъ. На грудномъ щитъ три продольныхъ киля, изъ коихъ средній ръзко выраженный и гладкій, а боковые, отдъляющіеся отъ него волосатыми бороздками— слабо приподнятые, морщинистые. По бокамъ этихъ двухъ килей и на границъ между спинной и боковой поверхностями груднаго щита, съ каждой стороны, располагаются двъ широкія бъловатыя продольныя полосы. Надкрылья удлиненно-овальныя, почти яйцевидныя, покрытыя чешуйками,

камъ-по двъ перекрещивающихся въ вилъ неправильной

сильно вздутыми при основаніи, быстро утончающимися въ остріе, переходящее въ длинную тонкую щетинку, равную по длинъ самой чешуйкъ (рис. 6). На брюшкъ многочисленныя, круглыя, черныя, безволосыя, довольно крупныя пятна.


Длина съ вытянутымъ хоботкомъ около 16 млм., при наибольшей ширинъ тъла въ 5,5 млм.

Cleonus cinereus также отмъченъ Штосомъ въ Рис. 6. Чешуй-качествъ вредителя свеклы для Кіевской губер- ка С1. сіпете из ніи. Обитаеть въ средней и южной Европъ; на плантаціяхъ Курской и Харьковской губ. мнъ совсъмъ не попадался.

7. Cleonus (Leucosomus Motsch.) ophthalmicus Rossi—pedestris Poda—
momus Scop. — 4-punctatus Schrank. — distinctus F. Глазчатый долгоносикъ.

Этоть долгоносикъ менѣе всѣхъ похожъ на типичнаго Cleonus, отличаясь своимъ широкимъ, сильно яйцевиднымъ тѣломъ. Киль на передней сторонѣ хоботка узкій, ясно выраженный, раздвояющійся на лбу (а не на концѣ хоботка, какъ у Cleonus fasciatus) на 2 отрога, съ очень узкой бороздкой между ними. Хоботокъ массивный, очень толстый. Грудной щитъ выпуклый, кзади сильно расширенный, съ неровной поверхностью, но безъ морщинъ и зернистости, усѣянный мелкими точками. У передняго и задняго края его имъется по вдавленію, а между ними слабо выраженный продольный киль. По бокамъ спинной стороны грудного щита проходитъ по свѣтлой змѣевидной продольной полоскѣ. Надкрылья яйцевидно овальной формы, выпуклыя, покрытыя рядомъ нѣжныхъ то-

покрытыя рядомъ нѣжныхъ точекъ. На сѣровато-буроватомъ фонѣ ихъ выдѣляются 4 свѣтлыя точки —глазка, по 2 на каждомъ надкрыльи, одна позади средины, а другая—на половинѣ разстоянія отъ первой точки до вершины над-



Puc. 7. Чешуйки Cl. ophthalmi cu Rossi (средняя сверху, а крайнія—въ профиль).

А. СИЛАНТЬЕВЪ.

ствитерьно является вредителемь свемым

¹⁾ У похожаго на него по окраскъ вида Cl. candidatus Pall. хоботокъ въ профиль изогнутый, съ вогнутымъ основаніемъ и приподнятой и вздутой вершиной.

крылья. Чешуйки на надкрыльяхъ довольно крупныя, сильно изогнутыя, при основаніи явно вздутыя, а съ половины длины ръзко съуженныя и оттянутыя въ длинное остріе, но безъ щетинки на концѣ (рис. 7), чѣмъ онъ отличаются какъ отъ чешуекъ Cl. tigrinus, у которыхъ съужение идеть до самаго конца постененно, такъ и отъ чешуекъ Cl. cinereus, оканчиваюпри наибольшей ширинь тьла вы 5,5 мллимании пешлодиви иди

-ами Длина жука до конца надкрылій: Отъ лба при согнутомъ. При вытянутомъ хоботкъ при тъда. отъ вершины его.

15—18 млм. 13,5—16 млм. -8 млм.

Cleonus ophthalmicus также быль замъчень Штосомъ на свекловицѣ въ Кіевской губерніи. Отечествомъ ему является средняя и южная Европа. Мнъ онъ попадался на планташотия всор, = 4-ринставия Schrank. = distinct.ондет вноро втакій

Затымь намъ остается разсмотрыть долгоносиковь, тоже повдающихъ свекловичные всходы, но относящихся къ другимъ родамъ, а именно 1): Один ампоно докаривло диново твломъ Киль на нередней сторовъ хоботка узки, ясно вы-

8. Tanymecus palliatus Fabr. Малый сърый долгоносикъ (рис. 8).

Хоботокъ короткій, четыреугольный, немного силюснутый, съ небольшой выемкой на концъ; безъ килей и бороз-

докъ на передней его сторонъ, а сплошь, подъ одинъ тонъ съ груднымъ щитомъ, покрытый чешуйками. По бокамъ хоботка имъется по короткой бороздъ для вкладыванія усиковъ. Усики длинные, тонкіе: основный членикъ ихъ, отогну-Рис. 8. Тапу- тый назадъ, хватаетъ значительно дальше глаза; жгутикъ усиковъ 7-ми-членистый, съ удлиненны-

mecus palliatus Fabr. (нат. вел.). ми двумя первыми члениками. Грудной щить замътно вытянутый по длинъ, посрединъ расширенный. Надкрылья зам'ятно шире грудного щита, съ тупо ср'язанными плечевыми углами, удлиненныя, до двухъ третей длины почти параллельныя и лишь къ вершинъ съуженныя. Основной цвътъ тъла черный, замаскированный волосовидными чешуйками, сверху буроватаго, а снизу съроватаго цвъта, покрывающими всю его поверхность болъе или менъе равномърно, безъ особыхъ рисунковъ, снизу гуще, а сверху ръже. Половыя различія какъ у Cl. punctiventris. Хитиновый покровъ у этого долгоносика значительно слабъе, проницаемъе для будавки, нежели у жуковъ рода Cleonus.

Длина жука съ вытянутымъ хоботкомъ 8,5—11 млм., при наибольшей ширинъ тъла въ 3,5-4 млм.

Tanymecus palliatus L. живеть на разныхъ сорныхъ травахъ-кранивъ, чертополохъ и другихъ; въ 1900 г. поъдалъ всходы сои въ Мелитопольскомъ увздв (Мокржецкій). Вредиль свекловицъ въ Кіевской губерніи (Вебель) и въ Волчанскомъ увздв Харьковской губ. (Ярошевскій), причемъ въ послъднемъ случав онъ превосходилъ по числу всъхъ прочихъ долгоносиковъ, повреждавшихъ плантаціи. Я его не разъ ловилъ на буракахъ въ Курской, Воронежской и Харьковской губерніяхъ, и находиль отравленнымъ вм'яст'я съ Cl. punctiventris на опытныхъ участкахъ. Встръчается онъ въ предълахъ всего свекловичнаго района.

9. Otiorhynchus ligustici L. Пузатый свекольный долгоносикъ. (рис. 9). requestit one sanualett.

Этотъ видъ является однимъ изъ многочисленныхъ представителей (по каталогу Reitter'а въ палеарктической фаун'в насчитывается болѣе 550 видовъ) рода Otiorhyn-

chus, характеризующагося слъдующими признаками. Хоботокъ короткій, толстый, съ тонкими и длинными усиками, стебелекъ которыхъ, будучи отогнутъ назадъ, заходитъ дальше глаза; первые два членика булавы усика удлинены, причемъ 2-й длиннъе перваго. Характернъе всего въ ихъ внъшнемъ ви-



Puc. 9. Otion Lynchus ligustici L. (нат. вел.),

¹⁾ Кромъ перечисленныхъ видовъ долгоносиковъ рода Cleonus въ литературь упоминается, въ качествъ вредителя свеклы, еще Cleonus ukrainensis Gavr. (Ф. А. Гавронскій, «Поврежденіе свекловичных влантацій долгоносиком воваго вида». Земледъліе. 1885 г. № 13). Судя по мъстообитанію жука въ стадія личинки въ головкахъ будяковъ, это ни въ коемъ случав не Cleonus, а какой-нибудь изъ видовъ рода Larinus, столь обыкновенныхъ въ головкахъ разныхъ сложнодвътныхъ. Пространныя, но мало содержательныя разсужденія автора не дають никакого повода предполагать, что этоть долгоносикъ дъйствительно является вредителемъ свеклы,

ль-это сильно выпуклый, часто почти шаровидный грудной щить и выпуклыя-же, нъсколько удлиненныя надкрылья, у плечъ закругленныя, а посрединъ достигающія наибольшей ширины. Вторая пара крыльевъ (для летанія) отсутствуєть и надкрылья сросшись по шву. Что касается въ частности даннаго вида О. ligustici, то онъ имъеть на передней сторонъ хоботка продольный киль, не голый, какъ у Cleonus'овъ, а покрытый вмъстъ съ прочей поверхностью хоботка чешуйками. Грудной щить и надкрылья силошь покрыты мелкими бугорочками, слегка выступающими между чешуйками. Тъло черное; чешуйки, его покрывающія, буроватыя, буровато-, или иногда зеленовато-сърыя: на надкрыльяхъ чешуйки двоякаго рода: однъ изъ нихъ имъють форму слегка изогнутыхъ, широкихъ, къ верху съуженныхъ пластинокъ съ довольно притупленной вершиной, въ то время какъ другія раза въ 11/2 болье длинныя, имъютъ видъ узкихъ полосокъ. Широкія и узкія пластинки располагаются на надкрыльяхъ продольными рядами, чтозамътно даже и на глазъ, соотвътственно замъчаемой продольной полосатости надкрыльевъ, причемъ темныя полосы заняты узкими и длинными, а свътлыя--широкими и короткими пластинками, дающими подъ микроскопомъ, на выпуклыхъ мъстахъ, нъкоторый бронзово-металлическій отблескъ. Длина жука съ вытянутымъ хоботкомъ достигаеть 12-13,5 млм. при наибольшей ширинъ тъла въ 5-6 млм.

Оtiorhynchus ligustici является однимъ изъ важныхъ вредителей свеклы; въ практическомъ отношеніи онъ занимаетъвъроятно слъдующее мъсто послъ Cleonus foveicollis и можетъ быть поставленъ на одну ступень съ Тапумесия palliatus. Жукъ этотъ широко распространенъ въ Европейской Россіи и отличается многоядностью; онъ поъдаетъ листья и почки плодовыхъ деревъ и винограда, вредитъ люцернъ, хмѣлю, клеверу, эспарцету, ъстъ крапиву, колючки (Хаптышт), спорышъ—Ројувопит aviculare, Ligustrum, Heracleum и проч. Въюгозападномъ районъ этотъ долгоносикъ вредитъ свеклъсистематически, судя по показаніямъ Штоса (1860 г.), Севастьянова и Ермолова (1878 г.), Линдемана (1869 г.), Баллі-

она и Мокржецкаго (попадался въ большомъ количествъ въ Бълой Церкви, въ 1899 году). Въ 1880 году видъ этотъ вредилъ въ Волчанскомъ у., Харьковской губ. (Ярошевскій), а въ 1897 году-въ Павловскомъ у., Воронежской губ. (И. Васильевъ). Миъ этотъ долгоносикъ попадался на всъхъ плантаціяхъ въ Курской, Харьковской и Воронежской губерніяхъ, но въ незначительномъ количествъ. Образъ жизни этого жука по описанію С. А. Мокржецкаго таковъ: самка откладываеть въ половинъ лъта свои продолговатыя округлыя яички у корневой шейки растеній, болбе 150 штукъ каждая. Изъ янчекъ выходять личинки, уходящія глубже въ землю и питающіяся корешками кустарниковъ и травъ, въ томъ числъ, въроятно, и свекловицы. Къ осени личинки достигають полнаго возраста. Тъло ихъ бълаго цвъта, съ рыжей головой и жесткими волосками. Съ наступленіемъ осеннихъ холодовъ личинки впадають въ окочентние и лежатъ безъ движенія до весны, а въ концъ апръля дълають себъ въ землъ мещерку, гдъ и превращаются въ куколку, изъ которой недъли черезъ двъ выходить взрослый жукъ, объъдающій по ночамъ и раннимъ утромъ ростки и листья свекловицы; днемъ-же жуки прячутся подъ камни, въ землю и подъ корневые листья сорныхъ травъ,

10. Liophlocus tessellatus Müll.—nubilus F.—aureopilis Tourn.—ineditus Tourn.—robusticornis Tourn.—modestus Tourn. Кранчатый свекольный долгоносикъ.

На первый взглядъ похожъ на предыдущаго, какъ размѣрами такъ и вообще внѣшнимъ своимъ видомъ, но, при внимательномъ разсмотрѣніи, отличается отъ него многими признаками. Форма тѣла болѣе удлиненная, нежели у Otiorhynchus ligustici и занимаетъ какъ-бы средину между этимъ послѣднимъ и Tanymecus palliatus, котораго онъ напоминаетъ своими угловатыми плечами надкрылій (а не закрупленными, какъ у Otiorhynchus). Тѣло черное, покрытое сѣровато-бѣлесоватыми чешуйками; надкрылья гладкія, съ продольными рядами точекъ; чешуйки, покрывающія ихъ однородныя, по формѣ напоминающія широкія чешуйки

Otiorhynchus ligustici, но раза въ два меньше ихъ. Чешуйки эти покрываютъ надкрылья не равномърно, а мъстами гуще, образуя свътлыя пятна, чередующіяся съ пятнами болъе темными, менъе обильно покрытыми чешуйками. Длина жука отъ вершины вытянутаго хоботка до конца надкрылій 10—13 млм., при наибольшей ширинъ тъла въ 5 млм.

Первое указаніе на то, что жуки изъ рода Liophloeus тоже вредять свекловицѣ въ Кіевской губерніи было дано Петцольдомъ въ 1855 году; узнать-же, какой именно видъ въ этомъ повиненъ, пришлось впервые С. А. Мокржецкому, которому прислали въ 1899 году изъ Бѣлой Церкви жуковъ Liophloeus tesselatus въ большомъ количествѣ. Безъ сомнѣнія онъ вредилъ тамъ и раньше, но его смѣшивали, вѣроятно, съ Otiorhynchus ligustici.

11. Lixus cardui Oliv.—pollinosus Germ. Фрачникъ свекольный.

Родъ Lixus, тоже довольно богатый видами, характеризуется лучше всего своимъ продолговатымъ тѣломъ и над-крыльями, на концѣ разъединенными, чаще всего оттянутыми даже въ два отдѣльныхъ острія на подобіе фалдъфрака.

Видъ L. cardui (рис. 10) отличается очень короткимъ стебелькомъ усиковъ, едва превышающимъ по длинъ первые три членика булавы. Оттянутыя вершины надкрыльевъ



Puc. 10. Lixus cardui Oliv. (нат. вел.).

слабо выражены, не острыя, а закругленныя. Черное тъло покрыто снизу гуще, а сверху ръже и неравномърнъе съроватыми чешуйками съжелтой пыльцей. Бока груднаго щита и двълиніи посрединъ его болъе густо волосисты. Хоботокъ и грудной щитъ густо пунктированы; послъдній передъ вершиной сильно перетянутъ. Надкрылья по длинъ немного болъе, чъмъ въдва раза превышаютъ ширину; покрыты рядами принетъ съ зернистыми междуральями. Ллина

(нат. вел.). два раза превышають ширину; покрыты рядами нѣжныхъ точекъ, съ зернистыми междурядьями. Длина жука около 13 млм.

Lixus cardui, по сообщеніямъ Петцольда (1855 г.) и Штоса (1860 г.), также вредить свекловиць въ Кіевской губерніи.

Жукъ встръчается въ южной Европъ и обитаетъ внутри стебля татарника Onopordon acanthium, гдъ жуки, вылупляющеся изъ куколокъ еще съ осени, перезимовываютъ.

12. Sitones Lineatus Lin. = viridifrons Motsch. Полосатый листовой долгоносикъ и

покрыть сверху сфраватыми, буроватыми мин веленовато-

13. Sitones Lincellus Bonsd.—occator Herbst. Линейчатый листовой долгоносикъ.

Родъ Sitones, богатый представителями, составляють мелкіе долгоносики, чаще всего не свыше 5 млм. длины (тахіmum 10 млм.); онъ характеризуется слъдующими признаками: хоботокъ короткій, наверху съ продольною срединною бороздкою; усики тонкіе, длинные, со стебелькомъ, достигающимъ глазъ; первый членикъ жгутика удлиненный и толще остальныхъ, второй нъсколько длиннъе третьяго, прочіе коротки. Глаза больше, болъе или менъе выступающее. Грудной щить одинаковой ширины и длины, или ширина его немного превышаеть длину, по бокамъ только слегка расширенный. Округленный щитокъ (scutellum) очень малъ. Надкрылья продолговатыя, съ притупленными плечевыми углами. Голени безъ роговыхъ шипиковъ; третій членикъ лапки широкій, двулонастной; конечный членикъ (4-й) большой, несущій два большихъ, простыхъ, подвижныхъ коготка. Жукъ можетъ летать, такъ какъ имъетъ перепончатыя SOME PASHKAR MOTELIEROBLIAN PACTORI I KAKE-TO! POPONE RALIDON

Таковы признаки рода Sitones, по которымъ, можетъ быть, удастся не спеціалисту отличить этихъ жучковъ отъ другихъ, похожихъ на нихъ долгоносиковъ; надо зам'втить, однако, что, не им'вя подъ руками точно опред'вленнаго матеріала по прочимъ родамъ этого семейства для сравненія, довольно трудно справиться съ подобной задачей даже при помощи опред'влителя, а не только по одному описанію родовыхъ признаковъ. Что-же касается двухъ видовъ Sitones, повдающихъ свеклу, S. lineatus L. и S. lineellus Bonsd., то для отличія ихъ отъ другихъ представителей того-же рода безусловно необходимо приб'вгнуть къ помощи опред'влителя,

а еще лучше спеціалиста, потому-что простое описаніе жуч ковъ дълу не поможетъ.

Sitones lineatus L., наиболъе широко распространенный, покрыть сверху съроватыми, буроватыми или зеленоватосърыми маленькими, кругловатыми, тъсно одна возлъдругой сидящими чешуйками; низъ свътлъе, бъловатый. Грудной щить немного большей ширины, нежели длины, всего шире позади средины, съ тремя продольными свътлыми полосами. Надкрылья съ продольными точечными бороздками, съ болъе свътлыми промежутками между ними. Длина съ вытянутымъ впередъ хоботкомъ 4—5 млм. при ширинъ тъла около 1,75 млм. Общей формой тъла жучекъ напоминаетъ Тапутесия раlliatus въ миніатюръ.

Sitones lineellus Bonsd. нѣсколько меньше предыдущаго, около 3 млм. длины; грудной щить у него съ менѣе закругленными, почти прямыми боками; тѣло черное, покрытое сѣрыми, бурыми или буровато-желтыми чешуйками; усики, голени и лапки или ноги цѣликомъ красновато-желтобурые; надкрылья въ болѣе глубокихъ продольныхъ точечныхъ бороздкахъ, промежутки между которыми болѣе свѣтло окрашены; третій, а иногда также пятый и седьмой промежутки между бороздками на надкрыльяхъ (считая отъ шва) съ темными пятнами.

Оба эти вида долгоносиковъ, равно какъ и другіе представители того-же рода, питаются всходами, главнымъ образомъ, разныхъ мотыльковыхъ растеній какъ-то: гороха, бобовъ, клевера, люпина, равно какъ и другихъ семействъ, въ томъ числѣ и свекловицы. Вредъ отъ нихъ свекловичнымъ плантаціямъ замѣчался въ 1899 году въ Бѣлой Церкви, Кіевской губерніи (С. Мокржецкій).

14. Liparus (Molytes) coronatus L. Морковный долгоносикъ.

Крупный черный долгоносикъ, сверху голый, за исключениемъ полоски при основани груднаго щита и двухъ пятнышекъ на каждомъ изъ его боковъ, покрытыхъ буроватыми длинными грубыми волосками; иногда такіе волоски

кое гдъ встръчаются и на надкрыльяхъ, а на нижней сторонъ тъла они всегда есть. Формой тъла нъсколько напоминаетъ пузатаго долгоносика, только грудной щить и надкрылья его не столь шарообразны. Бедра всъхъ ногъ снабжены явственными зубцами; основной членикъ усика не достаетъ до глаза. Голова и грудной щить въ многочисленныхъ точкахъ, а поверхности надкрылій напоминаютъ собою грубую шагреневую кожу съ плоскими выпуклостями и имъютъ слабо намъченные продольные ряды нъжныхъ точекъ. Надкрылья сросшіеся и жукъ не летаетъ. Съ вытянутымъ впередъ хоботкомъ достигаетъ 14—17 млм. Жукъ этотъ, свойственный моркови, поъдаетъ также и свекольныя листья (С. Мокржецкій).

15. Psalidium maxillosum F. Черный свекольный долгоносикъ.

Интенсивно чернаго цвѣта, сверху почти совершенно голый, снизу покрытый нѣжными сѣроватыми волосками. Хоботокъ короткій, толстый, грубопунктированный, съ ямкой посрединѣ; конецъ стебелька усиковъ достигаетъ далѣе задняго края глазъ; грудной щитъ, по бокамъ закругленный, покрытъ рѣдкими грубыми ямками, пространство между которыми сплошь занято очень нѣжными крестообразными точечками; надкрылья имѣютъ продольные ряды очень грубыхъ, простымъ глазомъ даже замѣтныхъ ямокъ, пространство-же между этими рядами усѣяно мелкими зернышками. Голени всѣхъ ногъ на вершинѣ расширены въ видѣ закругленной лопасти, усаженной по краямъ иглами. Жукъ не летаетъ. Длина съ вытянутымъ хоботкомъ 8—9 млм., при наибольшей ширинѣ около 3¹/2 млм. Повреждалъ свеклу въ Воронежской губерніи.

Здѣсь мы описали всѣ виды долгоносиковъ, относительно которыхъ имѣлись личныя наблюденія и данныя въ литературѣ о томъ, что они повреждали сахарную свеклу въ предълахъ Россіи. Не подлежить, однако, никакому сомнѣнію

что этимъ далеко не исчернывается весь контингентъ вредителей свеклы, который можеть дать столь богатое видами семейство жуковъ долгоносиковъ. Спеціальныхъ изслъдованій враговъ свекловичныхъ плантацій изъ міра насъкомыхъ было еще такъ мало, что многіе виды вредныхъ для свеклы долгоносиковъ навърно ускользали отъ нашего вниманія и неизвъстны намъ, какъ таковые; другіе-же, способные питаться бураками, не могли до сихъ поръ, въ силу какихълибо условій, оказывать вреда, но, при благопріятно сложившихся обстоятельствахъ, безъ сомнънія, проявять свою разрушительную д'вятельность; въ особенности важно считаться съ этимъ обстоятельствомъ при закладываніи плантацій въ новыхъ областяхъ, насчитывающихъ, быть можетъ, въ составъ своей фауны много насъкомыхъ, отсутствующихъ въ прежнемъ свекловичномъ районъ. Хорошій примъръ мы видимъ на Cleonus foveicollis Gebl. который, изъ побочнаго вредителя въ районъ средней и южной Россіи, за Волгой обратился въ главнаго врага культуры свеклы. Надо замътить при этомъ, что дъло тамъ только начинается, такъ что мъстные виды долгоносиковъ могли не успъть еще освоиться съ новой для нихъ культурой и пріобръсти паразитическихъ наклонностей; заволжскій-же районъ вообще, въ особенности въ его южной части, можно сказать почти навърное, дастъ цълый рядъ видовъ, опасныхъ для свекловичныхъ плантацій. На приложенный списокъ и описанія долгоносиковъ слъдуетъ, поэтому, смотръть только какъ на придержку при опредъленіи вредителей нашихъ плантацій, но не болье; много шансовъ за то, что долгоносики, поподающие бураки, (а не только найденные на плантаціи—это разница) окажутся принадлежащими къ одному изъ вышеописанныхъ видовъ, это върно; но не будеть ничего удивительнаго также и въ томъ, если мы встрътимъ и новаго врага, до сихъ поръ не извъстнаго. Такъ, напримъръ, извъстно, что какой-то видъ рода Нурега попадался на свеклъ въ Воронежской губерніи: этоть родь, равно какъ и роды Sitones, Cleonus, Otiorhynchus, Lixus и многіе другіе легко могуть дать новыхъ вредителей: Въ виду этого, не остается ничего болъе, какъ только

указать сочиненія, по которымъ можно опредълять жуковъ изъ семейства долгоносиковъ.

1) Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren 1). Ceмейство долгоносиковъ-Curculionidae, помъщается въ выпускахъ: IX, XIII, XXXIII, XXXV, XXXVII, XLIV и XLV, обнимающихъ группы: Otiorhynchini и Brachyderini, Coryssomerini и

1) Подъ этимъ общимъ заглавіемъ издается, извъстнымъ энтомологомъ Эдмундомъ Рейттеромъ въ Паскау (Моравія), серія монографически обработанныхъ опредълителей (составленныхъ какъ самимъ Рейттеромъ, такъ и другими извъстными энтомологами) жуковъ отдъльныхъ семействъ или даже части семейства. Опредълители эти безусловно необходимы для каждаго, желающаго точно опредълить любого жука, в тръчающагося въ предълахъ Европейской Россіи и Кавказа. Русскаго опредълителя для жуковъ, годнаго для научной обработки матеріала, не существуеть, а иностранные, визщающіе въ одномъдвухъ томахъ обзоры всъхъ семействъ жуковъ Западной Европы, не вполнъ для насъ пригодны, такъ какъ въ нихъ отсутствуютъ многіе русскіе виды. До сихъ поръ вышло 46 выпусковъ опредълителей жуковъ Рейттера, Выписывать ихъ можно не только черезъ книжные магазины, но и прямо отъ издателя по адресу: Edmund Reitter, Paskau, Mähren. Въ виду той пользы, которую могуть принести упоминаемые опредълители хозяевамъ, имъющимъ нъкоторую энтомологическую подготовку и желающимъ самостоятельно заниматься обработкой собранныхъ вредныхъ или полезныхъ жуковъ, мы приведемъ здъсь для свъдънія перечень опубликованныхъ уже семействъ. Heft (выпускъ) I. Семейства: Cucujidae, Telmatophilidae, Tritomidae, Мусе-

taeidae, Endomychidae, Lyctidae u Sphindidae Coccinellidae. Ling Crabin Harane propin

Scaphidiidae, Lathrididae n Dermestidae.

Cistelidae. Georyssidae u Thorictidae.

Paussidae, Clavigeridae, Pselaphidae u Scydmaeynasani, Euyyrini, nidae.

VI. Colydiidae, Rhyssodidae u Trogosidae.

VII u VIII. Cerambycidae.

IX. Curculionidae—группа Otiorhynchini.

attrait A.X ostonaut Дополнение къ выпуску V.

XI. Bruchidae (Ptinidae auct.).

Platypsyllidae, Leptinidae, Silphidae, Anisotomi-XII. dae u Clambidae.

XIII. Curculionidae—группа Brachyderidae.

BTO CAMB HO.VIX UB. APY Histeridae. Thousening again deal Sugarena Hame

Dytiscidae u Gyrinidae.

XVI. Brotylidae u Cryptophagidae.

Baridini, Cryptorhynchini, Cossonini и Calandrini, Hyperini, Tropiphorini и Alophini.

Часть интересующихъ насъ группъ, какъ-то: Otiorhynchini (родъ Otiorhynchus), Brachyderini (Sitones) и Нурегіпі (Нурега) уже вышли; главная-же самая группа—Сleonini съ родомъ Сleonus уже обработана извъстнымъ знатокомъ слониковъ Фаустомъ и выйдетъ вскоръ въ свътъ.

(TA)	XVII.	»	Phalacridae.
) n	XVIII.	»	Trychopterygidae.
)))	XIX.	» "	Hydrophilidae (Hydrophilini).
) I	SEE SX.	»	Hydrophilidae (Sphaeridini и Helophorini).
»	XXI.	W	Parnidae, none ure measured of the property of the particular of t
))	XXII.	»	Heteroceridae
)	XXIII.		Cicindelidae.
n lo	XXIV.) »	
)	XXV.	10 »	
I will	XXVI.) D	Bostrychidae.
	XXVII.) »	Nitidulidae (pogs Epuraea).
A DI	XXVIII.	m want	Cleridae. Tana anagar onator an onator aza
w Lo	XXIX.	D	Cantharidae (Drilini).
)) L	XXX.) n	Cantharidae (родъ Danacea).
m	XXXI.	HOLD MA	Scolytidae.
))	XXXII.	Z let II W) rec	
))	XXXIII.	way »	Curculionidae—группы Coryssomerini и Bari-
			Helt (manyerra) I. Counterno: Curufidue, .inibate
mbil	XXXIV.	A. Debi	Carabidae (Carabini-Carabus).
»	· XXXV.	»	Curculionidae-rpynna Cryptorrhynchini.
»			Meloidae (Zonitin.).
))	XXXVII.) n	Curculionidae-группы Cossonini и Calandrini.
n	XXXVIII.	I , whi	Melolonthidae (Dynastini, Euchyrini, Pachypo-
			dini, Cetonini, Valgini u Trichiini).
»	XXXIX.	n anih	Carabidae (Scaritini).
»	XL.	"	Hylophilidae.
*	XLI.	ne »	Carabidae (Harpalini u Licinini).
"	XLII.	/ may 1	Tenebrionidae (Tentyrini u Adelostomini'.
9)	XLIII.	"	Staphylinidae (Aleocharini-Aleochara).
»	XLIV.	en b	Curculionidae—группа Нурегіпі.
"	XLV.	»	Curculionidae—группы Tropiphorini и Alophini.
"	XLVI.	all mine	Monotomidae.
И	TOTODILO HOT OF		INVAPORA RIANTH PURA RECOLLING HAZORIONS INVENTO

Нъкоторые изъ этихъ выпусковъ вышли уже вторымъ изданіемъ, другихъже, какъ-то: №№ II, VII, VIII, IX, XI, XII и XIII нътъ уже больше въ продажъ; ихъ можно достать только случайно по значительно повышенной цънъ.

- 2) Seidltz. Fauna transsylvanica. Königsberg. 1891. Этимъ опредълителемъ, заключающимъ въ себъ всъ семейства жуковъ, приходится пользоваться при разработкъ тъхъ группъ слониковъ, для которыхъ еще нътъ опредълителей Рейттера. Въ этомъ сочиненіи описаны всю роды европейскихъ жуковъ, но часть южнорусскихъ видовъ въ немъ отсутствуеть.
- 3) Въ настоящее время, при участіи нъсколькихъ русскихъ энтомологовъ, изготовляется, подъ общей редакціей А. И. Яковлева (Ярославль) "Опредълитель жуковъ Европейской Россіи" и начнетъ выходить въ свъть въ 1903 году.

Въ заключение можно дать слъдующий практический совъть плантаторамъ, желающимъ серьезно относиться къ веленію борьбы съ долгоносиками и лично вести наблюденія надъ появляющимися у нихъ видами жучковъ, а именно: необходимо попробовать, прежде всего, самостоятельно разо браться по прилагаемымъ въ этомъ изданіи описаніямъ или по указаннымъ опредълителямъ, съ какими именно видами приходится имъть дъло и затъмъ непремънно, какъ бы върно ни казалось опредъленіе, слъдуеть его провирить, передавъ матеріаль на просмотрь спеціалисту энтомологу; полученные обратно жучки, лично опредъленные и послъ того провъренные компетентнымъ лицомъ, послужатъ надежнымъ матеріаломъ для сравненія при дальнъйшихъ самостоятельныхъ опредъленіяхъ. Продълавъ это нъсколько разъ и убъдившись, что собственныя опредъленія дълаются правильно, можно уже понемногу довърять себъ въ случаяхъ, не вызывающихъ никакого сомнънія; во всъхъ же остальныхъ всетаки слъдуеть прибъгать къ помощи спеціалиста. Кто не жалъетъ небольшой затраты, тому лучше всего выписать себъ отъ энтомолога Рейттера (адресъ смотри въ подстрочномъ примъчаній на стр. 27) по 1-2 экземпляра долгоносиковъ всъхъ вышеописанныхъ видовъ, встръчавшихся въ Россіи на свеклѣ 1), что значительно упростить работу опредъленія пой-

¹⁾ Коллекція изъ всѣхъ 15 описанныхъздѣсь видовъ слониковъ (по одному экземпляру) стоить у Рейттера, по его послѣднему прейскуранту 1901—1902 года, всего 1 р. 45 к.

манныхъ жучковъ, гарантируя даже новичка отъ очень грубыхъ ошибокъ, и поможетъ на самой плантаціи розыскать. вредные виды, давъ представление о томъ, какъ они выглядять. Не слъдуеть однако-же надъяться на опредъление по одному только сравненію внішняго вида жуковь, безь просмотра всъхъ указанныхъ мелкихъ признаковъ, потому что для начинающаго это быль бы самый върный способъ впасть въ ошибку и все до основанія перепутать: одному вн'вшнему виду можно довърять только тогда, когда глазъ уже достаточно напрактикуется въ улавливаніи систематическихъ признаковъ, да и то приходится постоянно, для контроля, браться за лупу или микроскопъ. Нечего и говорить, конечно, что въ случав появленія на плантаціяхъ новыхъ, еще не извъстныхъ вредителей свекловицы или же массоваго размноженія такихъ видовъ, которые до сихъ поръ играли второстепенную роль, слъдуеть сообщать объ этомъ письменно, съ приложеніемъ образцовъ самихъ насъкомыхъ по одному изъ нижеуказанныхъ адресовъ, или же публиковать въ какомънибудь сельскохозяйственномъ или энтомологическомъ періодическомъ изданіи.

Основныя правила серьезнаго отношенія къ дѣлу требують конечно, чтобы, въ случаѣ опубликованія подобныхъ фактовъ, у наблюдателя не было ни малѣйшаго сомнѣнія въ принадлежности долгоносиковъ, дѣятельность которыхъ имъ описывается, въ точности къ тому или другому виду; въ противномъ случаѣ подобныя сообщенія не имѣютъ никакого научнаго значенія, если видовое названіе вредителей неизвѣстно, или даже приносять вредъ, если насѣкомыя приводятся подъ невѣрными названіями, вслѣдствіе неточности опредѣленія.

Для повърки собственнаго опредъленія лучше всего посылать матеріаль въ Энтомологическое Бюро Министерства Земледълія и Государственныхъ Имуществъ (С.-Петербургъ, Министерство Земл. и Госуд. Имуществъ, Энтомологическое Бюро); можно направить его также въ Русское Энтомологическое Общество (С.-Петербургъ, Минист. Земл. и Госуд. Имущ., Русское Энтомологическое Общество); не откажутся

дакже въроятно просмотръть матеріалъ по вреднымъ долго носикамъ и въ Таврическомъ Естественноисторическомъ Музев (гор. Симферополь), Бессарабскомъ (г. Кишиневъ), въ редакціи Русскаго Энтомологическаго Обозр'внія (Ярославль губ., Никить Рафаиловичу Кокуеву), равно какъ и въ зоологическихъ кабинетахъ высшихъ сельскохозяйственныхъ и лъсныхъ учебныхъ заведеній, каковы: Московскій Сельскохозяйственный Институть, Спб. Лъсной Институть, Институть сельскаго хозяйства и лъсоводства въ Новой Александрін (Люблинской губ.) или Кіевскій Политехникумъ. Во всъхъ этихъ учрежденіяхъ, кромъ Энтомологическаго Бюро Министерства Земледълія, опредъленія насъкомыхъ необязательны и могуть быть сдъланы только изъ любезности. За плату жуковъ опредъляеть энтомологъ Рейттеръ, причемъ зимою, съ 1 октября по апръль, онъ береть за опредъление съ каждаго экземпляра по $4^{1}/_{2}$ коп., а въ лътнее полугодіе дешевле, всего по 3 коп. за экземпляръ. Съ весны 1902 года въ м. Смъла Кіевской губ. функціонируеть Энтомологическая опытная станція Всероссійскаго Общества сахарозаводчиковъ, въ кругъ задачи которой должно входить ознакомленіе со встми вредителями плантацій. Наконецъ, узнавъ по "Адресной книгъ русскихъ зоологовъ" (изд. 1901 г. ц. 50 к.) адресъ живущаго по близости энтомолога, спеціалиста по жукамъ, можно сдълать попытку завязать и съ нимъ сношеніе съ цізлью воспользоваться его помощью и указаніями. патняти ви потоводном

лодихъ практанентъ (См. таблица, рис. 1). Сначата на въвитацияхъ практанотся мемие жуки въ огромномъ большинствъ, случаевъ на сторонахъ, прилекающихъ къ бурачинамъ (т. ев прошлогодинмъ свекаовичнымъ плантаниямъ); затъмъ, сът наступленіемъ теплихъ безвътренныхъ дней и массонаго спариванія, появляются рои летучикъ жуковъ и всякая правильность въ распредъленіи ихъ по плантациямъ наручнается, Дружно напавъ на какой-инбуль участокъ посъвъ, жуки быетро его упитгожаютъ, оставляя поств себя один испетать, посль чего перебираются на другой и т. д. Плантаціи испет

дакже върожно просметрътъ матеріаль до вреднымъ долго в в носикамъ н въ Таврическомък Истественнои сторическомъ и въ зоологических кабинстахъ высинкъ сельскохозяйственныхы и лыгикув учебныхь занеденій, жаковы: Московы и crin Cemenoconflersenura discretyrise Ends. Abenon fluorus- es TYTE, HECTITYTE COLECCIO AS THE PROPERTY IN A SCOREGIC OR SENDOROLLES

Образъ жизни свекольнаго долгоносика. кумъ. Во вефхътатихъ учрежденияхъл кромъ битомологиче-

Общій очерку. Въ общемъ, не касаясь деталей и отдъльныхъ уклоненій отъ нормы, жизнь и дъятельность свекольнаго долгоносика въ Европейской Россіи, въ районъ разведенія сахарной свеклы, протекаеть следующимь образомь Проведя зиму подъ землею, въ куколочныхъ колыбелькахъ вполнъ уже сформировавшіеся и нормально окрашенные жуки появляются на поверхности земли весною, то раньше, то позже, въ зависимости отъ условій мъстности и климатическихъ особенностей даннаго года; время появленія ихъ колеблется между последней третью марта и половиной апръля, всегда до появленія всходовъ свеклы и неръдко еще до ея посъва. Первое время жуки бродять по землъ безъ особаго порядка, прокармливаясь на счеть дикой растительности, но, съ появленіемъ всходовъ свеклы, постепенно перебираются на плантаціи, гдъ и начинають свою опустошительную дъятельность - поъданіе съмядолей и почечекъ молодыхъ растеньицъ. (См. таблица, рис. 1). Сначала на плантаціяхъ появляются пъшіе жуки, въ огромномъ большинствъ случаевъ на сторонахъ, прилегающихъ къ бурачищамъ (т. е. прошлогоднимъ свекловичнымъ плантаціямъ); затъмъ, съ наступленіемъ теплыхъ безв'ятренныхъ дней и массоваго спариванія, появляются рои летучих жуковъ и всякая правильность въ распредъленіи ихъ по плантаціямъ нарушается. Дружно напавъ на какой-нибудь участокъ посъва, жуки быстро его уничтожають, оставляя послъ себя одни пенечки, послъ чего перебираются на другой и т. д. Плантаціи испе-

щряются проилъшинами, полосами и цълыми полями, сильно изръженными или сплошь поъденными жукомъ, которыя приходится подсъвать или сплошь пересъвать. Во время этихъ работъ, уничтожающихъ послъдніе слъды растительности на плантаціяхъ, жуки, тревожимые къ тому-же съялками и боронами, перекочевывають на другіе участки плантацін до новаго появленія всходовъ. При обилін жука, и притомъ въ годы особенно неблагопріятствующіе росту свеклы, такіе пересъвы могуть повторяться 2 и 3 раза.

По мъръ появленія настоящихъ листьевъ, развитія ихъ и укръпленія молодыхъ растеньиць, жуки становятся для нихъ уже не столь опасными-ихъ поврежденія уже не губять, а только задерживають въ рость свеклу.

Со второй половины апръля, весь май и до половины іюня продолжается брачный періодъ жизни долгоносикажуки спариваются и откладывають яйца. Самка дізаеть хоботкомъ ямку на поверхности земли, чаще всего близъ молодого растеньица, кладеть въ нее одно яйцо и засыпаеть его землей (таблица, рис. с). Одна самка откладываеть всего въ разныхъ мъстахъ до 40 — 50 штукъ яицъ. Черезъ нъкоторое время изъ яицъ выходять молоденькія личиночки 1) (таблица, рис. д).

Личинки питаются корнями свеклы и, по мъръ своего развитія и роста бурачнаго корня, уходять вивств съ нимъ все глубже и глубже въ землю. При наличности многихъ личинокъ у одного корня (15-20 и болѣе) растеніе настолько повреждается, что рано или поздно погибаеть-ботва его блъднъетъ, желтъетъ, вянетъ, и наконецъ засыхаетъ. При меньшемъ количествъ личинокъ буракъ хотя и выдерживаеть, но отстаеть въ своемъ развитіи; наконецъ, единичныя поврежденія, при сильномъ рость, совсьмъ не отражаются на внъщнемъ видъ растенія.

¹⁾ На хромолитографированной таблицъ, въ интересахъ экономіи мъста, пришлось помъстить молодыхъ личинокъ на одномъ рисункъ со всходами свеклы; такая картина можеть встретиться въ натуре только на пересевахъ; нормально-же появленію личинокъ соотвътствуеть уже наличность на свеклъ нъсколькихъ настоящихъ листочковъ: пройдя стадію вилки, растеніе тогда начинаетъ уже принимать форму кустика.

Стадія личинки продолжается около 2 мѣсяцевъ; съ іюля начинается окукленіе, въ массѣ совершающееся въ августѣ и захватывающее часть сентября. Куколки помѣщаются въ вертикально-овальной колыбелькѣ, съ гладкими блестящими стѣнками, головой вверхъ (таблица, рис. ІІ d); глубина залеганія ихъ зависить отъ того, гдѣ находилась личинка передъ окукленіемъ, а также, по всей въроятности, и отъ характера почвенныхъ условій, колеблясь между 30 и 80 стм.

Въ стадіи куколки насъкомое проводить не болъе 2 недъль, послъ чего изъ нея получается жукъ, сначала очень свътлый и мягкій, розоватый, потомъ буроватый, разныхъ оттънковъ: наконецъ, хитинъ грубъетъ, окрашивается въ нормальный черный цвътъ: тогда же на немъ яснъе выступаетъ рисунокъ изъ съроватыхъ чещуекъ. Жуки нормально остаются въ своихъ колыбелькахъ всю зиму до слъдующей весны нъкоторые-же изъ нихъ, вывороченные наружу при выконкъ свеклы при осенней пахотъ, а, можеть быть, и самостоятельно выползающіе изъ колыбелекъ, могуть появляться на поверхности земли уже осенью. Таковъ, въ общемъ, годовой никлъ жизни свекольнаго долгоносика, изъ коего вытекаютъ три основныхъ положенія, важныхъ для борьбы съ этимъ врагомъ: 1) молодое покольніе жуковь развивается, въ главной своей массъ, на свекловичных плантаціях, 2) жуки враги плантацій сл'ядующаго года-перезимовывають въ земли, на мыстах своего развитія и, какъ выводъ изъ первыхъ двухъ положеній, 3) *главным* очагом заразы снабжающимъ плантаціи даннаго года жуками, являются прошлогоднія бирачища. Это главное, что необходимо усвоить себъ каждому, желающему вести борьбу со свекольнымъ долгоносикомъ, такъ какъ на этихъ основныхъ положеніяхъ построена вся современная борьба съ этимъ врагомъ. Теперь, зная общую схему развитія нашего жука, мы можемъ приступить къ разсмотрѣнію деталей его образа жизни и случаевъ отклоненія оть нормы.

Подробное описаніе образа жизни свекольнаго долгоносика. Приступая къ подробному разсмотрѣнію образа жизни свекольнаго долгоносика, необходимо прежде всего припомнить

явленіе, наблюдаемое въ животномъ и растительномъ мір'в вообще, а именно, неодновременность наступленія того или другого біологическаго момента для всѣхъ индивидовъ, обитающихъ въ одной и той же мъстности; такъ различается обыкновенно начало явленія, (напримъръ появленіе самыхъ первыхъ жуковъ, начало откладки яицъ, вылупленіе первыхъ личинокъ, окукленіе и т. п.), наблюдаемое единично, постепенное развитие его, массовое явленіе-когда оно достигло высшей точки своего развитія, на которой и держится нѣкоторый срокъ; затъмъ наступаеть убывание и послъдніе единичные признаки минувшаго явленія, знаменующіе полный его конецъ. Отсюда вытекаетъ, что насъкомое въ одной и той же стадіи развитія наблюдается въ теченіи болье или менъе продолжительнаго періода времени, въ зависимости какъ отъ вида животнаго, такъ и отъ особенностей даннаго года, что имжетъ громадное практическое значеніе. Періодъ, въ теченій котораго мы встрівчаемь взрослых в насіжомых в или такъ называемый періодъ "лёта" (хотя-бы насъкомыя и не летали), періодъ откладки яицъ, нахожденія личинокъ и куколокъ нхъ, неръдко настолько растянуты, что запоздалые индивиды поколънія родителей встръчаются одновременно съ ранними экземплярами той же стадіи слъдующаго покольнія. Пояснимъ на примъръ. Жуки какого-нибудь вида встръчаются, допустимъ, въ теченіе 3 мъсяцевъ, изъ коихъ въ теченіи послъднихъ 21/2 мъсяцевъ откладывають яйца; на развитіе личинки, куколки и выдупленіе изъ нея взрослаго жука съ момента откладки яйца потребно, положимъ, 2 мъсяца; тогда легко можетъ получиться слъдующее: если первые жуки родительскаго поколънія появились 1 и начали отгладывать яйца 15 апръдя, то развившеся изъ этихъ ящъ жуки новаго поколънія начнуть появляться съ 15 іюня; но съ 15 іюня по 1 іюля продолжается лёть и откладка янцъ запоздальми жуками стараго, родительскаго покольнія. При поверхностном наблюденіи, безг научно-обставленных в спеціальных изслыдованій, очень легко при этомъ впасть въ такого рода ошибку: принять запоздалыхъ жуковъ перваго покольнія за ранних второго и приписать имъ откладку янці, въ то время, когда они, быть можеть, этого вовсе и не дълають до слъдующей весны, другими словами установить несуществующую вторую тенерацію этого жука ві то же льто ві. Не отрицая вовсе факта существованія двухъ и даже большаго числа генерацій одного и того же насъкомаго въ теченіе года, необходимо указать однако на то, что принятіе двухъ генерацій въ году для многихъ насъкомыхъ, по тщательно произведеннымъ изслъдованіямъ, оказалось опибочнымъ и покоилось на аналогичныхъ приведенному нами примъру основаніяхъ, имъвшихъ источникомъ большую растянутость періода лёта.

Не вдаваясь въ подробный обзоръ причинъ, вызвавшихъ первоначальное возникновеніе продолжительности періода лёта и прочихъ стадій видовой жизни насъкомыхъ, укажемъ здъсь только условія, вліяющія въ ту или другую сторону на эту продолжительность, а именно: тонографія м'встности, составъ, влажность и температура почвъ, характеръ почвеннаго покрова, растительности, мъстообитанія насъкомыхъ и, въ особенности, метеорологическія условія даннаго года. При однородности прочихъ условій, насъкомыя, зимующія на южномъ склонъ, появятся на поверхности земли раньше находящихся на съверномъ, а залегающія въ поверхностныхъ слояхъ почвы—раньше, чъмъ въ болъе глубокихъ. Разница въ появлении насъкомыхъ изъ поверхностныхъ слоевъ почвы южнаго склона и глубокихъ съвернаго будеть уже болъеили менъе замътна; высокое и низкое положеніе, а въ связи съ этимъ и различія въ степени влажности почвы также не остаются безъ вліянія на колебанія въ срокахъ появленія насъкомыхъ. Затъмъ громадное вліяніе въ этомъ отношенін имъеть ходъ атмосферическихъ явленій и притомъ въ двоякомъ направленіи, а именно: 1) измъняя абсолютные сроки появленія насъкомыхъ въ сторону ускоренія или запозданія ихъ и 2) сокращая или удлинняя общій срокт нахожденія

покольнія. При повержностномъ наолюдении,

той или другой стадіи даннаго вида насъкомаго. Дъйствительно, мы знаемъ что въ жизни природы годъ на годъ не приходится; съ одной стороны бывають годы съ очень раннимъ или, наоборотъ, сильно запоздалымъ противъ обычнаго наступленіемъ тѣхъ или другихъ природныхъ явленій; съ другой-же стороны, самое явленіе можетъ протекать быстро, сказываясь въ ръзкой формъ, или-же, наоборотъ, растягиваться на болье долгій срокъ. Такъ, допустимъ, нормальное (обычное) начало появленія первыхъ жучковъ будеть между 1 и 10 апръля: а концомъ исчезновенія—срокъ между 20 іюня и 1 іюля. Въ годы съ очень ранней весной первые жуки могуть, допустимъ, появиться на 2 недъли раньше — 15 марта, а съ запоздалой — настолько-же позже, только съ 15 апръля; тоже и относительно исчезновенія ихъ. Но очень раннее появление первыхъ жуковъ весною еще вовсе не предръщаеть вопроса о столь-же раннемъ ихъ исчезновеніи и наобороть; въ годы съ очень ранней, по недружной весной и холоднымъ лътомъ, мъщающими нормальному теченію брачнаго періода жизни жуковъ, могуть наблюдаться одновременно отклоненія въ сторону слишкомъ ранняго появленія и черезчуръ запоздалаго исчезновенія ихъ, т. е. отклоненія сроковъ въ противуположныя стороны, равно какъ и наоборотъ-при поздней, но дружной веснъ и такомъ же началъ лъта жуки могутъ появиться ненормально поздно, быстро всей массой отложить яйца и исчезнуть даже раньше обычнаго срока, дука дунател опистивон

Въ первомъ случав лёть будеть сильно растянуть (въ нашемъ гипотетическомъ случав отъ 15 марта по 15 іюля), во второмъ же, наоборотъ, протечеть дружно и быстро (отъ 15 апръля по 15 іюня). При ранней и дружной веснъ или поздней и холодной, начало и конецъ явленія будуть передвигаться въ одну и ту же сторону—въ первомъ случав лётъ начнется и окончится раньше, во второмъ же, наоборотъ.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что дъйствительные сроки начала массоваго проявленія и конца той или другой стадіи видовой жизни насѣкомаго являются результатомъ взаимодъйствія цълаго ряда факторовъ—почвенныхъ и топогра-

^{*)} Генераціей называется срокъ, протекающій между двумя тождественными моментами въ жизни индивидовъ двухъ смежныхъ покольній, напр. съ момента откладки янцъ (выхода изъ куколки и т. п.) родителями до откладки янцъ (выхода изъ куколокъ и т. п.) ихъ-же дътьми.

фическихъ, главнымъ же образомъ метеорологическихъ, подверженныхъ измъненію по отдъльнымъ годамъ, съ чъмъ неминуемо приходится считаться хозяину. Свекольный долгоносикъ врагъ мистный, осидлый и подробное изучение фенологическихъ явленій его жизни вполнъ во власти каждаго плантатора; это первое, съ чего следуетъ начать при желаніи вести раціональную борьбу съ этимъ врагомъ. Природныя условія въ разныхъ концахъ свекловичнаго района столь различны, что на все нижеизложенное въ этой главъ слъдуеть смотръть только какъ на общую придержку, какъ на немногіе конкретные примъры, взятые изъ дъйствительныхъ и немногочисленныхъ наблюденій въ нъсколькихъ губерніяхъ, въ разное время и разными лицами производившихся: только собственныя многольтнія наблюденія могутъ дать полную и точную картину жизни долгоносика именно въ тъхъ условіяхъ, при которыхъ приходится вести хозяйство въ данной мистности, тъмъ болъе, что въ жизни и дъятельности этого насъкомаго не послъднюю роль играеть и самъ человъкъ въ видъ той или другой системы избранной имъ культуры.

Появление жуковъ весною. Жуки появляются на поверхности земли въ началъ весны, какъ только сойдеть снъгъ и нъсколько обсохнеть верхній слой почвы; само собою разумъется, что въ разные годы, въ одной и той же мъстности, эти моменты приходятся на разныя числа, почему и появленіе первыхъ, самыхъ раннихъ жуковъ, можеть колебаться отъ второй половины марта до половины апръля. За первыми жуками появляются все новыя и новыя полчища ихъ, пока самые послъдніе экземпляры не покинуть своихъ подземныхъ зимнихъ убъжищъ. Періодъ, въ теченіи котораго протекаеть это явление во всемъ его объемъ, съ момента выхода изъ земли самыхъ первыхъ и самыхъ послъднихъ жуковъ, очень трудно поддается учету безъ спеціальныхъ, очень точно обставленныхъ наблюденій; приходится довольствоваться обыкновенно непосредственными наблюденіями на поверхности земли, причемъ необходимо отличать два момента—появленіе д'яйствительно самыхъ передовыхъ

единичныхъ жуковъ и нахожденіе ихъ на поверхности земли въ количествъ, бросающемся въ глаза всякому даже безъ спеціальныхъ поисковъ за ними; хозяевами отмъчается обыкновенно именно этотъ послъдній, или даже еще позднъйшій моменть—начало поврежденія бурачныхъ плантацій. "Жукъ появился" на языкъ хозяевъ обыкновенно означаетъ, что жука уже много или что онъ началъ уже вредить; поэтому дъйствительное начало появленія жуковъ изъ земли надо отнести къ болъе раннему періоду противъ имъющихся въ литературъ указаній сроковъ появленія жучка; насколько именно—зависить отъ характера весны даннаго года.

Обращаясь къ литературъ, мы узнаемъ у Кеппена, изучавшаго въ 1880 году вредящихъ свекловицъ насъкомыхъ въ разныхъ губерніяхъ Европейской Россіи 1), что "время появленія жука, смотря по м'встностямъ, колеблется между половиною апръля и половиною мая. По свъдъніямъ, собраннымъ мною на мъстъ, жукъ появляется въ южной части губернін Кіевской обыкновенно въ половинъ апръля; но бывають годы, когда это случается ранъе: по показанію г. Вебеля, въ 1875 году, жуки въ Смълъ появились массами уже въ послъднихъ числахъ марта мъсяца. Въ той же Смъль, Кіевской губерніи, въ 1900—1901 годахъ производились наблюденія надъ свекольнымъ долгоносикомъ И. Данышемъ и его ассистентами. Скржинскій, одинъ изъ ассистентовъ, сообщаеть слъдующее 2): "Выходъ изъ земли никогда не бываеть одновременнымъ. Изъ наблюденій нашихъ оказывается, что время выползанія находится въ зависимости отъ глубины горизонта, на которомъ зимуетъ жукъ.

Такъ какъ жуки распредъляются въ землъ очень неравномърно, то и выходъ ихъ наружу долженъ происходить неодновременно. Дъйствительно, выходъ ихъ изъ земли можно наблюдать даже въ конит мая. Этой неодновременностью вы-

тень, (27 апръля, произошель первий желущеевый лехи

 ¹) Ө. Кеппенъ. Насъкомыя, вредящія въ Россіи свекловицъ. Спб. 1881, стр. 22—24.

²) С. Скржинскій. О способахъ борьбы со свекловичнымъ долгоносикомъ и нъкоторыми иными вредителями сельскаго хозяйства. С. Хоз. и Лъсов. 1902. № 2, стр. 339.

хода объясняется фактъ неоднократнаго появленія массы жуковъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, именно: въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ". Данышъ идетъ еще далѣе, считая періодъ выхода жука изъ земли продолжающимся до конца іюня мѣсяца (хотя и не даетъ никакихъ тому доказательствъ и конкретныхъ примѣровъ) и приводитъ слѣдующую схему постепеннаго выхода долгоносиковъ изъ земли:

между 1 и 15 апрѣля выходить . . . $5-10^{\circ}/_{\circ}$ съ 15 апр. по 5 или 10 мая выходить . $75-85^{\circ}/_{\circ}$ послѣ 10 мая до 1 іюля выходять . . остальные (по Данышу—около $10^{\circ}/_{\circ}$, вѣрнѣе же отъ 5 до $20^{\circ}/_{\circ}$).

Сводя воедино показанія Даныша и Вебеля (о массовом появленіи долгоносиковъ въ Смѣлѣ въ 1875 году въ концѣ марта) приходится принять періодомъ выхода долгоносика изъ земли въ Кіевской губерніи съ половины марта по конецъ іюня.

Въ Бългородскомъ и Корочанскомъ уъздахъ Кирской губ. и Волчанскомъ-Харьковской (Шебекинскія имфнія гг. Ребиндеръ), по моимъ наблюденіямъ, въ 1899 году весна была ранняя, но весьма продолжительная, холодная и сухая. Годъ быль обильный жуками. Первые жуки встръчались на плантаціяхъ въ 20-хъ числахъ марта. Посъвъ свеклы въ экономіи, гдъ велись работы по истребленію долгоносика, производился съ 4 по 12 апръля; первые всходы появились 19 апръля, а 23 всъ посъвы уже взощли. Ходъ жуковъ, задержанный вътрами и холодами въ теченіи первыхъ трехъ недъль апръля, къ 20 числу сталъ замътнъе — появился пъшій жукъ, равно какъ и начали обнаруживаться первыя поврежденія всходовъ на плантаціяхъ. Въ первый жаркій день, 127 апръля, произошелъ первый-же массовый леть жука, послѣ чего до самыхъ послѣднихъ чиселъ мая его встръчали всюду по плантаціямъ въ громадномъ количествъ. Послъ 27 апръля жуки летали еще нъсколько разъ въ наиболъе жаркіе, безвътренные дни, но далеко не въ такой массъ. Съ послъднихъ чиселъ мая (съ 25 по 27) долгоносики почти исчезли, свекла окръпла и всъ работы по сбору и отравленію ихъ были прекращены.

Въ 1900 году весна наступила позже, жуковъ видѣли только въ началѣ апръля, но, такъ какъ весна была дружнѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году, то и первый небольшой лётъ наблюдался раньше—21 апрѣля—и продолжался до 12 мая; въ концѣ мая жука стало немного, но съ 7 по 11 іюня количество его снова нѣсколько возрасло. На основаніи двухлѣтнихъ опытовъ и показаній владѣльца и прикащиковъ Шебекинскаго имѣнія можно принять, для указаннаго района, наиболѣе острымъ періодомъ борьбы съ жукомъ время съ 20 апрѣля по 25 мая; въ нѣкоторые годы собирать жука приходится и возможно уже съ 5—10 апрѣля; иногда, наобороть, слѣдовало-бы продолжать борьбу еще въ началѣ іюня.

Въ Воронежской губерніи, по собраннымъ Кеппеномъ показаніямъ, въ уъздахъ Павловскомъ и Острогожскомъ появленіе жука замъчается не ранъе половины мая (ръчь
идеть здъсь, конечно, о массовомъ появленіи жуковъ). Мнъ
тоже пришлось констатировать фактъ запозданія весенняго
періода жизни долгоносика въ Воронежской губерніи въ
1895 и 1896 годахъ, по сравненію съ Курскимъ и Кіевскимъ
районами. Дъйствительно, посъвы въ Воронежской губерніи
запаздывають противъ Курскихъ на полмъсяца, вслъдствіе
чего поврежденія долгоносиками свеклы наблюдаются только
въ маъ.

Въ 1895 году въ имѣніи Плотицыныхъ, Острогожскаго уѣзда, съ 1 по 4 мая зеленѣли и начали подвергаться нападенію долгоносиковъ всходы только самыхъ раннихъ посъвовъ. Въ 1896 году, въ Рамони, Воронежскаго уѣзда, 4 мая жуки уже замѣчались на плантаціи, первые же всходы ожидались только 6 числа.

появленія свекольныхъ всходовъ, зависить отъ состоянія погоды: въ теплые дни они оживленно ползають по земль, чаще попадаясь на глаза по полямъ и дорогамъ, нежели въ

холодные, и особенно вътряные, когда они сидять больше подъ грудками (комьями) земли или на солнечной сторонъ ихъ, подъ защитою комьевъ и возвышенностей отъ вътра, не расползаясь на далекое разстояніе. Въ теплыя весны появленіе жуковъ наблюдается поэтому легче и съ большей правильностью—сначала замътны единично ползающіе экземпляры, затъмъ количество ихъ все болъе и болъе увеличивается; въ годы массоваго ихъ появленія всюду-на плантаціяхъ, дорогахъ, межахъ-видны сотни, тысячи пъшихъ жуковъ, ползающихъ въ поискахъ за пищей. О размърахъ предстоящаго нашествія пъшаго жука на плантаціи можно бываетъ составить нъкоторое представление еще до появления всходовъ. Въ раннюю же, но холодную весну, появляющеся изъ земли жуки остаются, какъ мы видъли, на мъстахъ, не расползаются: количество ихъ прибываеть, но они, сидя смирно въ ожиданіи теплой погоды, избъгають въ значительной степени нашего вниманія и могуть ввести въ заблужденіе неопытнаго хозяина своимъ кажущимся отсутствіемъ. Стоитъ только сразу установиться теплу, какъ засидъвшіеся жуки вдругь появляются повсюду, какъ по волшебству, и расползаются по всъмъ направленіямъ.

До появленія бурачныхъ всходовъ, вышедшіе изъ земли жуки прокармливаются насчеть дикой растительности, оказывая, однако, предпочтеніе растеніямъ изъ сем. Chenopodiaceae, какъ пишетъ Скржинскій *). Данышъ, указывая на всеядность долгоносика, говоритъ, что "за неимѣніемъ свекловичныхъ листьевъ Cleonus ы питаются всякими другими растеніями и даже злаками. Но если есть выборъ, то они предпочитають свеклу". Личныхъ наблюденій въ этомъ направленіи у меня нѣтъ, могу только констатировать, что во время опытовъ моихъ въ 1896 году жуки отлично ѣли листья мари (Chenopodium album) и лебеды (Atriplex laciniatum)—растеній, родственныхъ свеклъ.

Брачный періодъ. Подобно тому, какъ появленіе долгоносиковъ изъ ихъ зимнихъ убѣжищъ на поверхность земли преисходить не сразу, спариваніе ихъ также наблюдается въ теченіи длиннаго періода времени. Первыхъ спаривающихся жуковъ въ Шебекинскомъ имѣніи гг. Ребиндеръ Бѣлгородскаго уѣзда, Курской губерніи, видѣли въ 1899 году еще до 10 апрѣля, а 12 я самъ видѣлъ нѣсколько паръ ихъ іп сориlа; весна была, какъ упоминалось выше, ранняя, но холодная; первые жуки замѣчались въ концѣ марта. Спариваніе наблюдалось съ 12 апрѣля вплоть до моего отъѣзда изъ имѣнія 6 іюня; массовое спариваніе началось съ 27 апрѣля и тянулось весь май. Въ слѣдующемъ, 1900 году, тамъ же, еще 11 іюня замѣчалось значительное количество спаривающихся жуковъ.

Непонятными мнъ кажутся нъсколько данныя Кеппена и Даныша по вопросу о спариваніи долгоносика касательно одной и той же мъстности-Смълы, Кіевской губерніи. Такъ, Кеппенъ писалъ, что спариваніе начинается у нихъ въ началъ мая и продолжается до половины мая. Вторая половина мая и начало іюня проходять у нихь въ кладкъ яицъ. Ланышъ-же и его помощники нашли въ 1900—1901 годахъ, что "совокупленье и слъдующая вскоръ кладка яицъ начинается не ранбе 20 мая и продолжается около мъсяца". Безъ сомнънія оба показанія страдають съуженіемъ сроковъ спариванія и откладки яицъ. Вообще этотъ періодъ жизни долгоносиковъ представляетъ много интересныхъ, но совершенно еще темныхъ для насъ вопросовъ, къ сожальнію даже и не затронутыхъ послъдними спеціальными изслъдованіями Даныша и Ко въ Смълъ, а именно: сразу-ли по вылуплени жуки могуть спариваться, или же только послъ извъстнаго періода питанія, потребнаго для созрѣванія половыхъ продуктовъ; какъ происходить совокупленіе — однократно или повторно; черезъ какіе сроки и въ теченіи какого періода каждой самкой откладываются яйца: когда происходить лёть до или послъ спариванія и т. п.

Повадки жуковъ и самая откладка яицъ такъ хорошо описаны Кеппеномъ, что мы приведемъ это описаніе дословно. "Жуки крайне осторожны и при малъйшемъ шумъ перестаютъ ползать, приподымаются переднею частью

^{*)} Скржинскій, 1. е. стр. 340.

тъла нъсколько кверху и начинають водить усиками въ разныя стороны. Если шумъ усиливается, въ особенности при приближении человъка, они тотчасъ прижимаются къ земль, на которой они, благодаря своей сърой окраскъ, трудно различимы; или же они переворачиваются на спину и прикидываются мертвыми. Въ пасмурные дни они сидять спокойно подъ небольшими комьями земли. Съцълью совокупленія, парочки забираются въ мѣста защищенныя отъ вътра и другихъ неблагопріятныхъ вліяній, напр., подъ листья, подъ комья земли и пр. Оплодотворенная самка долго ищетъ мъста, гдъ поверхность почвы болъе рыхла; найдя такое мъсто, непремънно возлъ свекловичнаго растенія, она хоботкомъ продалбливаетъ въ землъ ямку и очищаетъ ее отъ частичекъ земли помощью переднихъ ногъ; глубина ямки равняется длинъ хоботка. Когда ямка готова, самка поворачивается къ ней брюшкомъ, становится надъ ней и опускаеть туда одно яичко; затъмъ, обернувшись снова хоботкомъ къ ямкъ, засыпаетъ ее землей помощью переднихъ ногъ и придавливаеть хоботкомъ". Самка кладеть по показаніямъ Мокржецкаго *)—20 штукъ; по Штосу **)—30, а по новъйшимъ изслъдованіямъ Даныша до 40-50 штукъ яицъ.

Передвижение по земли и лёть жуки вялы и малоподвижны; въ теплую, наобороть, они становятся весьма оживленными, всѣ движенія ихъ быстры, даже суетливы. Слѣдя за ползущимъ по плантаціи жукомъ въ жаркій день, приходится изумляться, какъ онъ легко и скоро преодолѣваеть встрѣчающіяся по пути препятствія, взбирается на комья, нерѣдко срывается оттуда, падаетъ на спинку, быстро начинаетъ перебирать въ воздухѣ ножками, зацѣпится за что-нибудь, вновь обернется и побѣжитъ дальше. Движенія происходять у нихъ, чередуясь съ остановками, преимущественно на болѣе возвышенныхъ точкахъ. Всходы свеклы жукъ объѣдаетъ или прямо съ земли, или же приподнимаясь даже на зад-

онисаны Кеппеноиз, что зия приведемь это описание

нихъ дапкахъ, какъ показано на таблицъ. Окончатедьной цълью передвиженій являются, конечно, бурачныя плантаціи, на которыя перебираются, въ концъконцовъ, почти всъ жуки, по Данышу до 90—95%, въ то время какъ остальные разсъиваются по межамъ, пару и канавамъ, поросшимъ лебедой, гдъ и размножаются.

Скржинскій объясняеть это явленіе перехода на плантапін стъдующимъ образомъ: "быстро перебъгая съ мъста на мъсто, они вскоръ разыскивають молодые всходы свеклы и тогда наступаеть массовое движение ихъ по направлению къ данной плантаціи, причемъ здёсь играетъ значительную роль чувство стадности, побуждающее жука следовать за своими товарищами". По моему дъло обстоитъ нъсколько иначе: въ стадіи іmago у жуковъ выработался инстинктъ странствованія, на почвъ разысканія пищи и мъсть откладки яицъ. Достаточно вспомнить, что странствованія пъшаго жука начинаются неръдко еще до появленія всходовъ свекловицы. Съ наступленіемъ тепла и проявленіемъ въ полной мъръ подвижности жуковъ, это стремленіе къ странствованію выражается съ особенной ръзкостью: жуки ползуть по родному бурачищу и за его предълы по разнымъ направленіямъ не взирая на преграды въ видъ валовъ, канавъ и т. п. Въ годы массоваго появленія п'ышаго жука и въ жаркіе дни приходится ставить у ловчихъ канавокъ рабочихъ, чтобы они сметали съ отвъсныхъ стънокъ всползающихъ на нихъ жуковъ, чтобы тъ не переползли преграды, причемъ не всегда однако удается съ ними справиться. Если плантація смежна съ бурачищемъ, то, натурально, многіе жуки сразуже попадають въ подходящія условія, лишь только выйдуть за предълы родного поля; другіе, избравшіе противуположное направленіе, осуждены на долгое безполезное блужданіе; часть ихъ тоже, конечно, рано или поздно попадетъ на плантацію, изм'внивъ почему-либо направленіе своего хода на болъе правильное. Казалось-бы, достигнувъ края плантаціи, жуки должны были бы успокоиться и остановиться, но нътьони стремятся все дальше и дальше. Вотъ жукъ только-что приползъ съ дороги къ крайнему рядку-проходитъ его,

^{*)} Мокржеихій. Вредители корнеплодовъ. Полная энцикл. сельск, хоз.

отат**) Кеплень, І. с. стр. 25. вуду орнан затвядон атовтоорой ам

пересъкаеть второй, третій, повернеть вдоль рядковъ, закусить, постоить, пойдеть дальше внутрь поля, обратно къ периферіи или вдоль рядковъ краевой полосы съ рядками, параллельными границъ плантаціи, какъ ему вздумается. Бываеть иногда и такъ, что жучекъ выходить за предълы плантаціи, или валится въ ловчую канаву, въ сторону смежнаго поля, не занятаго свеклой. На самой-же плантаціи въчное движеніе и стремленіе впередъ, усугубляемое еще прибытіемъ извнъ, со стороны границы, новыхъ полчищъ жуковъ.

Что-же происходить съ жуками, избравшими ложное направленіе и не попавшими на плантацію? Наскучивъ блуждавъ по неподходящему для нихъ пространству, выждавъ жаркаго дня, они поднимаются на воздухъ и летять въ поискахъ за плантаціями; появляются рои летучихъ жуковъ, гроза плантаторовъ, опускающіеся на бурачные посѣвы въ любомъ мѣстъ, безъ всякой системы, и могущіе въ одинъ— два дня обратить лучшіе, незатронутые участки въ оголенныя пространства, требующія немедленнаго пересѣва. Предвидѣть время и-мѣсто появленія летучаго жука очень трудно— онъ можетъ залетѣть не только со своихъ бурачищъ, но и отъ сосѣдей.

Обыкновенно принимають, что лёть жука находится въ зависимости отъ спариванія. Кеппенъ, а за нимъ и всѣ позднъйшіе авторы съ его словъ писали слъдующее: "Пускаются жуки перелетывать не тотчасъ по выходъ изъ земли, а нъсколько позднъе, а именно (въ кіевской губ.) въ началъ мая, когда начинается спариваніе, которое продолжается до половины мая и совершается преимущественно въ теплые дни". Данышъ пишетъ въ своемъ третьемъ отчетъ, что "отъ начала апръля до половины мая, т. е. во время массоваго выхода, жуки не подымаются на воздухъ. Полеть ихъ начинается лишь во время спариванія и тогда въ ясные, солнечные дни они могуть съ отдаленныхъ мъсть вторгнуться на молодые всходы свеклы". Скржинскій считаеть лёть жуковъ предшествующимъ брачному періоду: "По истеченій ніжотораго времени послів выхода жуковъ изъ земли, они пріобрътають способность летать... Для летающихъ жуковъ даже лъса и ръки не представляютъ препятствій. Они быстро разсъиваются по всъмъ плантаціямъ, разыскивая даже плантаціи, значительно отдаленныя отъ мъстъ первоначальнаго ихъ выхода. Къ счастію, къ этому времени свекла достаточно подросла, да и жуки не обращають на нее особеннаго вниманія (!?!), усивъъ уже утолить свой первый голодъ послъ зимней спячки и вступая въ періодъ своихъ любовныхъ отправленій" (курсивъ мой).

Попытаемся доказать, что лёть и брачная жизнь свекольнаго долгоносика явленія не всегда другь другу сопутствующія.

Во-первыхъ, въ 1899 году, я неоднократно наблюдалъ въ Шебекинъ, Курской губ. спариваніе долгоносиковъ съ 12 до 26 апръля въ такую погоду, когда ни о какомъ лёть и ръчи быть не могло: дулъ холодный произительный вътеръ, заставлявшій кутаться въ теплое пальто, а между тімь, пріютившись за какимъ нибудь прикрытіемъ, глыбкой земли, кучкой сора, съ подвътренной стороны, гдъ было тихо и солнце проявляло уже свою живительную дъятельность, парочки долгоносиковъ, сидя въ теплой ложбинкъ, уже наслаждались жизнью, заботясь, въ тоже время, о потомствъ Лёть долгоносиковъ несомнънно является однимъ изъ приспособленій въ интересахъ потомства, дающимъ возможность жукамъ разыскивать другъ друга и подходящія для кладки янцъ мъста. Приспособление это имъло особенный смыслъ въ некультурный, такъ сказать, періодъ жизни жука, до появленія культуры свеклы. Въ настоящее время всѣ жуки обладають способностью летать, но вопросъ въ томъ, вск-ли они пользуются этой способностью на дълъ. Значительное количество жуковъ, приползини на плантацію, имъютъ все для нихъ необходимое-пищу, рыхлую землю и изобиліе питательнаго матеріала для личинокъ. Куда и зачъмъ имъ летъть? Находясь цълыми днями на плантаціяхъ во время лёта, я видълъ массу жуковъ носившихся въ воздухъ и садившихся на землю, но мит не приходилось ни разу. замъчать поднимавшихся съ плантаціи. Иное дъло съ тъми жуками, которые, въ силу случайностей, не попали на плантацію, оставаясь блуждать по озимому или яровому полюихъ можеть заставить сняться оттуда голодъ или забота о
потомствѣ; если самъ жукъ дъйствительно всеяденъ, то личинка его всетаки можетъ придерживаться только опредъленнаго семейства растеній, напримъръ, исключительно однихъ
Сћепородіасеае, которыхъ можетъ и не быть на этихъ поляхъ
въ достаточномъ количествѣ. Въ такомъ случаѣ жуки, прокормившись сами, и весьма въроятно даже спарившись,
все таки не будутъ имѣть возможности отложить яйца и
полетять.

Лёть долгоносиковъ не есть явленіе, продолжающееся непрерывно въ теченіи изв'єстнаго періода времени съ наступленіємь благопріятныхъ для него условій—онъ идеть какъ-то порывами, отд'єльными днями, очевидно подъ давленіємь какихъ-то причинъ, и оканчивается гораздо ран'є прекращенія періода спариванія. Въ 1899 году въ Шебекинт быль только одинъ главный хорошій лётный день, 27 апр'єля, посліт чего летучаго жука вид'єли н'єсколько разъ въ теченіи мая, но въ значительно меньшемъ количествт; спариваніе продолжалось еще въ іюнт. Въ слітдующемъ году, тамъ-же первый лёть происходиль 21 апр'єля, а послітдній 12 мая; спаривающихся жуковъ въ значительномъ количествт находили еще въ половинть іюня.

Въ пользу того взгляда, что, при современныхъ условіяхъ паразитизма на культурной свеклѣ, летятъ только жуки, не попавшіе во время на плантацію, говоритъ то обстоятельство, что не каждый годъ лётъ бываетъ одинаково силенъ; въ одни годы, при массовомъ появленіи, приходится бороться почти исключительно съ пъшимъ жукомъ, лёта почти не происходить, въ то время какъ въ другіе, наоборотъ, главная масса жуковъ налетаетъ на плантаціи. Это легко объясняется распредѣленіемъ полей: если бурачище и плантація, при трехпольномъ сѣвооборотѣ, смежны, то преобладать должны пѣшіе жуки, а если они раздѣлены третьимъ полемъ, то натуральнѣе всего ожидать обильнаго лёта. Явленіе это яснѣе всего будетъ выражено, конечно, въ случаѣ изолированности свекловичнаго хозяйства; но, такъ какъ, въ дѣй-

ствительности, свекла культивируется обыкновенно во многихъ смежныхъ владъніяхъ, то на практикъ не всегда удается хозяину подмътить это на своихъ поляхъ-отношенія между полями путаются, плантаціи одного владъльца могуть повдаться пъшими жуками со смежнаго чужого бурачища, а лётный жукъ съ изолированнаго бурачища перваго владъльца можетъ попасть не на свою плантацію, а къ сосъду и т. п. Само собою разумъется, поэтому, что предположенія свои о въроятности появленія пъшаго или лётнаго жука въ предстоящую кампанію надо ділать, принимая въ расчеть распредъление полей вспат владъльцевъ даннаго района. Конечно, если свеклу культивирують на большей части площади увзда или даже губерніи, очень трудно предвидъть, куда устремятся рои летучаго жука, на свои или чужія владінія, и въ какомъ именно направленіи; въ этомъ отношеніи летучій жукъ можеть устроить самые неожиданные сюрпризы и опрокинуть всв разсчеты, появляясь внезапно тамъ, гдъ его вовсе и не ожидали; понятно почему его такъ боятся хозяева. Путаница усугубляется еще тъмъ обстоятельствомъ, что неръдко и на самихъ плантаціяхъ создаются условія, вынуждающія жуковъ къ перелётамъ: это-поъданіе ими всходовъ сразу на большой площади, и, въ особенности, слъдующіе за этимъ пересъвы. Ползая по лишенной растительности площади и убъждаясь въ томъ, что яйцеотложение на ней не имъетъ смысла, за отсутствіемъ кормящаго растенія, жуки быстро покидають участокъ, переселяясь на другой, имъющій еще всходы. Неоднократно, осматривая плантаціи въ нъсколько десятинъ послѣ пересѣва, мы на второй-же день съ большимъ трудомъ находили единичныхъ жучковъ--вся масса ихъ уже успъвала покинуть вспаханное поле. Въ Шебекинскомъ имъніи прекрасно знають это явленіе, повторяющееся въ обильные жуками годы по нъсколько разъ на одномъ и томъ-же полъ: появляются на участкъ А жуки, събдають его; за ними идуть съялки, жуки перелетають на участокъ В, гдъ повторяется та-же исторія, послъ чего совершается перелёть на уч. С и т. д. Той порой появились всходы на

А—и опять, какъ въ сказкъ про бълаго бычка, начинается вторичное путешествіе съялокъ, въ догонку за жуками, съ одного участка на другой; и такъ иногда до двухъ и болъе разъ. Дъйствительно, есть отъ чего придти въ отчаяніе. Фактъ перегона и появленіе лётныхъ жуковъ при пересъвахъ, по многолътнимъ наблюденіямъ А. А. Ребиндеръ, одного изъ владъльцевъ Шебекинскаго имънія, не подлежить сомнънію; то, что я видълъ въ 1899 году въ этомъ имъніи, вполнъ согласовалось съ этимъ показаніемъ.

Петящіе жуки держатся, по показанію Штосса, на высоть 2-хъ саженей оть земли и пролетають иногда до 7 версть. Кепиену же хозяева говорили, что жуки летають преимущественно въ случать опасности, и то лишь на незначительныя разстоянія. Мит приходилось наблюдать лёть въ мъстности, неблагопріятствовавшей выясненію вопроса о дальности перелётовь; что-же касается высоты полёта жуковъ надъ землей, то она бываеть различна, оть половины корпуса человъка до двойного его роста. Жукъ летить сравнительно быстро, такъ что не всегда удается поймать его фуражкой. Бросившись на землю, онъ вскорт оправляется, прячеть перепончатыя крылья и начинаеть торопливо бъгать, какъ и всякій другой пъшій жукъ. Массовый лёть происходить въ самую жаркую пору дня — часовъ съ 11 до 2 — 3-хъ пополудни; раньше и позже замѣтны только единичные экземпляры.

Въ мъстности холмистой, при нападеніи лётныхъ жуковъ, изъъденными оказываются прежде всего средніе горизонты склоновъ, въ то время какъ нижнія части ихъ и вершины холмовъ еще зеленъютъ.

Нечезновеніе жеуковъ. Самки и самцы свекольнаго долгоносика живуть, по нослѣднимъ изслѣдованіямъ Даныша въ Смѣлѣ, различный срокъ, а именно: самки отъ 3-хъ до 4-хъ недѣль, самцы отъ 5-ти до 6-ти; Скржинскій считаетъ для первыхъ около 30, а для вторыхъ около 40 дней жизни.

нечно, въ зависимости отъ окончанія брачнаго періода; спариваніе оканчивается въ Кіевской губ., по Кеппену, въ половинъ мая (слишкомъ рано), по Данышу же —около 20 іюня. Жуки,

A. CRIANTERES.

пойманные 20 мая, жили у меня въ банкахъ съ землей до 7 іюня, причемъ спаривались и откладывали яйца въ теченін 2-хъ неділь. Прибавивъ къ 20 іюня еще 3 неділи, мы выведемъ теоретически, по показаніямъ Даныша, что послъдніе жуки должны исчезнуть при этихъ условіяхъ около 10 іюля. Въ своемъ третьемъ отчетв Данышъ, однако, значительно раздвигаеть границы брачнаго періода жизни долгоносика; такъ, онъ пишеть: "Огромное большинство жуковъ, 90, а, можеть быть, даже 95%, живеть въ теченіи трехъ весеннихъ мъсяцевъ-апръля, мая и іюня-на поверхности земли и кладеть яйца. Остальные 5—10% свекловичныхъ жуковъ кладутъ яйца очень рано, въ началъ апръля, или, наобороть, поздно-въ конив іюля или въ августв мисяци" (курсивъ нашъ). Какъ жаль, что г. Данышъ по обыкновение не приводить конкретныхъ примъровъ, гдъ и при какихъ обстоятельствахъ онъ видълъ столь интересное явленіе, какъ откладку яицъ свекольнымъ долгоносикомъ въ августв мъсяцъ. Въ Воронежской губерніи я видълъ въ 1895 году единичныхъ, запоздалыхъ, сильно потертыхъ жуковъ перваго поколънія на плантаціяхъ Острогожскаго увзда 10 и 11 іюля, одновременно съ нахожденіемъ въ землѣ первыхъ куколокът ави компинитутна амелиприката котпо

Лишики и куколки. Черезъ сколько времени послѣ откладки яицъ вылупляются изъ нихъ личинки, въ точности неизвъстно; сопоставляя начало массоваго спариванія и появленіе первыхъ личинокъ, надо принять періодъ лежанія яйца въ землѣ около трехъ недѣль. По Кеппену въ Кіевской губ. "вторая половина мая и начало іюня проходять у свекольнаго долгоносика въ кладкѣ яицъ. Къ концу первой ноловины іюня вылупляются личинки. Время окукливанія начинается въ первой половинѣ іюля. Совершенныя насѣкомыя выходять изъ куколокъ, большею частью, еще въ туже осень, а нѣкоторая часть, можетъ быть, лишь слѣдующею весною". Это вполнѣ правдоподобно и согласуется съ тѣмъ, что мнѣ самому пришлось наблюдать въ Курской и Воронежской губерніяхъ, съ нѣкоторыми, конечно, варьяціями въ срокахъ. Между тѣмъ, въ отчетахъ Даныша мы находимъ совершенно невъроятныя и несообразныя свъдънія. Такъ, во второмъ отчетъ мы узнаемъ слъдующее: "Совокупленье и слъдующая вскоръ кладка яицъ начинается не ранъе 20 мая и продолжается около мъсяца. Въ концъ іюня встръчаются уже довольно большія личинки (фиг. 2) 1), приимпившіяся (!?!) къ корнямъ свекловицы; въ августъ коконы (не коконы, а куколки!), а въ сентябръ—вполнъ развившіяся насъкомыя". Ръчь идетъ очевидно о среднихъ срокахъ массоваго явленія, о 90—95°/о, не принимая въ расчетъ раннихъ и запоздавшихъ 5 — 10°/о. Въ третьемъ отчетъ Данышъ пишетъ: "Кладка яицъ происходитъ въ маъ и іюнъ мъсяцахъ. Превращеніе личинки въ куколку наступаетъ приблизительно послъ двухмъсячнаго личиночнаго періода, такъ-что въ концъ августа въ землъ можно найти "много куколокъ, а въ концъ сентября вполнъ развитыхъ молодыхъ жуковъ".

По этимъ даннымъ выходить, съ одной стороны, что съ 20 мая по конецъ іюня жукъ успѣваетъ отложить яйца, изъ которыхъ вылупляются личинки и достигають уже ³/₄ нормальнаго роста; съ другой стороны, личинковая стадія продолжается около двухъ мисяцевъ; въ третьихъ, разъ окукленіе происходить въ концѣ августа, то очевидно это относится къ личинкамъ, вылупившимся изъ яицъ въ концѣ іюня, а не достигшимъ уже въ эту пору столь солидныхъ размѣровъ, какъ ³/₄ нормальнаго роста. Очевидно, у Даныша приведены совершенно несравнимыя между собою данныя, начало массовой откладки яицъ показано слишкомъ поздно, равно какъ и начало окукленія.

Въ Курской губерніи, въ 1899 году, явно замѣтное уже спариваніе происходило въ 20-хъ числахъ апрѣля, а въ массѣ — послѣ перваго лёта, 27 числа. 24 мая раскопками было обнаружено присутствіе многочисленныхъ молодыхъ личиночекъ у корней свекловичныхъ кустиковъ, имѣвшихъ въ эту пору 4—5 листочковъ (плантація не пересѣвалась) и корешокъ 5—6 стм. длины при 3 млм. толщины у

шейки. Личиночки имъли отъ 1,5 до 3 млм. длины, при нормальномъ, полусогнутомъ положении тъла, и начали уже проявлять свою разрушительную дъятельность-въъдаться въ тонкіе корешки и перегрызать ихъ. Личинки находились на глубинъ около 7 млм. отъ шейки; даже самыя мелкія изъ нихъ, $1^1/_2$ млм. длины, очевидно еле вылупившіяся изъ яйца, вредили, перекусывая корешокъ 2 млм. въ діаметръ настолько, что верхушка его оставалась висъть только на ниточкъ, а листики завядали, что сразу позволяло узнавать присутствіе врага по внѣшнему виду молодого растеньица. Въ послъднихъ числахъ августа и первыхъ сентября, при выкопкъ свеклы, находили въ землъ, на тъхъ-же самыхъ плантаціяхъ, готовыхъ къ окукленію личинокъ (подъ кожею просвъчивались конечности будущей куколки), куколокъ, неокрашенныхъ и полуокрашенныхъ жуковъ молодого поколънія, только-что вылупившихся изъ куколокъ. Кромъ того, наблюдался извъстный % личинокъ, средневозрастныхъ и взрослыхъ, погибшихъ отъ мюскардины. Въ слъдующемъ году, тамъ-же, съ 27 августа по 20 сентября личинокъ и куколокъ почти совершенно невозможно было найти—вст онт были загублены мюскардиной; въ колыбелькахъ находились только, и то ръдко, жуки молодого поколънія, вполит нормально окрашенные, съ загрубъвшимъ хитиномъ, и болъе свътлые, буроватые. Такимъ образомъ, въ Курской губерніи, въ оба года—1899 и 1900—сроки окукленія и вылупленія изъ куколокъ жуковъ, по крайней мъръ въ концъ явленія, примърно соотвътствовали схемъ Даныша для Кіевской губерній; тэмъ страннъе кажутся мнъ результаты, полученные мною при изученіи долгоносика въ Воронежской губерніи въ 1895 году, гдв вобще періодическія явленія въ первую половину лъта шли съ запозданіемъ противъ Кіевской губерніи: окукленіе и выходъ жуковъ изъ куколокъ происходили значительно раньше противъ Курской губеніи, -- по моимъ наблюденіямъ и Кіевской -по схемъ Даныша, приближаясь къ срокамъ, приведеннымъ для Кіевской губерніи Кеппеномъ и противоръча указаніямъ этого наблюдателя касательно Воронежской губерніи. Кеп-

⁾ На фигуръ 2 изображена, довольно-таки безобразно, на ³/₄ взрослая личинка.

пень писаль, что въ Воронежской губерніи личинки вылупляются только къ концу іюня.

Дълая раскопки на плантаціяхъ, погибавшихъ отъ личинокъ долгоносика, въ имъніи Плотицыныхъ, Острогожскаго увзда, 10 и 11 іюля 1895 года, я находиль огромное большинство личинокъ вполив выросшихъ, готовыхъ уже къ окукленію, 13—14 млм. длины, гораздо меньше, но все-же неръдко, средневозрастныхъ, 9-10,5 млм. длины и, единично, мелкихъ, 6,5-8 млм. длины. Кромъ того, найдено было нъсколько готовыхъ уже куколокъ, а на поверхности земли пойманы были единично бродившіе запоздалые жуки перваго покольнія. Такимъ образомъ, начало окукленія можно было уже констатировать въ первой трети іюля, въ массъже это явленіе должно было произойти во второй половинъ йоля, а вылупление жуковъ-въ началъ августа. Такъ оно и произошло въ дъйствительности, о чемъ могу судить по раскопкамъ въ натуръ и опытамъ съ домашней культурой. Единичныя, запоздалыя личинки еще встръчались коегдъ на плантаціяхъ въ послъднихъ числахъ іюля и первыхъ августа; даже куколокъ было уже сравнительно мало, такъ какъ большинство ихъ уже обратилось въ молодыхъ, слабоокрашенныхъ жуковъ; вполнъ сформировавшіеся, твердые, нормальной окраски жуки были еще, однако, ръдки. При домашней культуръ, взрослыя личинки, посаженныя въ просторную банку съ землей, къ 6 августа прошли уже стадію куколки и имфли видъ мягкихъ, полуокрашенныхъ жучковъ. Изъ этого можно заключить, что максимальнымъ срокомъ пребыванія долгоносика въ стадіи куколки могуть быть три недъли, върнъе-же даже нъсколько менъе, такъ какъ, при домашней культуръ, жучки были уже довольно окрашены (одинъ даже близко къ нормальному), и личинки врядъ-ли сразу-же 12 іюля окуклились. . Полової дангоди

Приведенные примъры служатъ прекрасной иллюстраціей того, насколько измънчивъ бываетъ ходъ періодическихъ явленій въ жизни одного и того-же насъкомаго въ разные годы. Дъйствительно, въ Кіевской губерніи, по Данышу, окукленіе свекольнаго долгоносика происходитъ въ концъ авгу-

ста, а по Кеппену—съ начала іюля; въ Воронежской губерніи, по даннымъ Кеппена о времени массоваго появленія жука, а также и вылупленія личинокъ въ концѣ іюня, окукленіе не можеть произойти ранѣе конца августа, по моимъже изслѣдованіямъ въ той-же самой мѣстности оно протекло почти цѣликомъ въ іюлѣ. Изъ этого можно сдѣлать только одинъ практически-важный для хозяевъ выводъ—отнюдь не довольствоваться однолѣтними или вообще краткосрочными наблюденіями періодическихъ явленій въ жизни долгоносика (да и всѣхъ вредныхъ насѣкомыхъ), дабы дѣйствительность не опровергла-бы всѣхъ плановъ, построенныхъ на такихъ шаткихъ данныхъ.

Горизонть, котораго придерживаются личинки долгоносика, зависить оть возраста и, по всей въроятности, еще оть многихъ условій, какъ-то: характера почвы, влажности и температуры. Въ общемъ, съ возрастомъ и удлинненіемъ свекловичнаго корня, глубина залеганія личинокъ увеличивается. Совсѣмъ молоденькихъ я находиль 24 мая 1899 г. въ Курской губерніи почти у самой поверхности, на глубинѣ всего 7 млм.; въ іюлѣ-же въ Воронежской губ. онѣ находились между 4 и 8 вершками глубины, въ то время, какъ куколки попадались на 5 вершкахъ отъ поверхности земли. Многочисленными раскопками въ Курской губерніи, осенью 1900 года, констатировано присутствіе массы погибшихъ отъ мюскардины личинокъ, куколокъ и готовыхъ уже жуковъ въ колыбелькахъ, на глубинѣ 6—8 вершковъ. Кеппенъ находилъ личинокъ гораздо глубже, отъ 8 до 13 вершковъ.

Приготовляясь къ окукленію, личинка дѣлаетъ овальную, вертикально расположенную колыбельку, съ очень гладкими, уплотненными, какъ будто чѣмъ-то пропитанными, и потому отсвѣчивающими стѣнками; продольный и поперечный діаметры колыбельки достигають въ среднемъ 17,5 и 7 миллиметровъ, при крайнихъ отклоненіяхъ въ обѣ стороны въ 14 и 20 млм. для высоты, 6 и 8 млм. для поперечника.

Личинка, приготовившись окуклиться, сбрасываеть съ себя кожицу и обращается въ куколку, стоящую въ колыбелькъ всегда вертикально, головой вверхъ (таблица рис. II

с и d); слинявшая кожица остается лежать внизу въ видъ сморщеннаго комочка.

Новая ченерація жуков. Черезь 3, вірніве даже черезь 2 недъли послъ обращенія личинки въ куколку, послъдняя въ свою очередь линяеть и обращается въ жука, около котораго лежать уже теперь въ колыбелькъ 2 кожицы, послъдняя кожица личинки и покровъ куколки. Только-что вылупившійся изъ куколки жукъ совершенно мягокъ и неокрашенъ. Вскоръ-же хитиновый покровъ его начинаеть твердъть и принимать все болъе и болъе темную окраску-сначала слегка розоватую, потомъ розовато-буроватую, темно-бурую и, наконецъ, совершенно черную. Параллельно съ этимъ развиваются и яснъе выступають на темномъ фонъ покрывающія тіло нормально-окрашеннаго жука сіровато-біловатыя чешуйки, пока совершенно его не покроють сплошь; тогда только жукъ окончательно принимаеть свойственный ему видъ. Время, потребное для такой окончательной метаморфозы изъ мягкаго бълаго въ твердаго нормальнаго жука, въроятно, не очень велико; при вышеупомянутомъ моемъ опыть съ домашней культурой жуковъ, изъ личинокъ, посаженныхъ въ землю 12 іюля, 6 августа получилось нъсколько жуковъ, изъ коихъ одинъ почти уже достигъ нормальной окраски и твердости. А са пиванована иманиется в

Что дѣлають окончательно сформировавшіеся жуки — остаются-ли до весны въ своихъ колыбелькахъ или-же выходять еще осенью на поверхность земли? Простой жизненный опыть показываеть, что жука осенью не бываеть; еслибы онъ выходилъ изъ земли вскорѣ-же по вылупленіи изъкуколки, то, въ годы массоваго его отрожденія, онъ не могьбы избѣгнуть вниманія хозяевъ, въ виду того, что въ эту пору идетъ копка свеклы и на плантаціяхъ работають сотни человѣкъ.

Свидътельства всъхъ наблюдателей говорять то-же самое и сходятся между собою въ томъ, что главная масса жуковъ молодого поколънія проводить зиму въ своихъ колыбелькахъ. Оставаясь върнымъ вообще, это основное правиломожеть имъть, однако, и отступленія. Дъйствительно, я

лично видълъ, правда всего на всего только одинъ разъ, свъжаго живого жука въ половинъ сентября на шебекинской плантаціи въ Курской губерніи. Двое прикащиковъ тоже видъли въ томъ-же имъніи въ сентябръ по одному жуку, но только на паровомъ полъ; попался-ли имъ дъйстви тельно обыкновенный долгоносикъ Cleonus punctiventris или-же другой какой-нибудь видъ ручаться, конечно, невозможно. Затъмъ, сколько я ни распрашивалъ, никто больше жуковъ осенью не видълъ. Съ другой стороны, я неоднократно заставаль жуковъ, совершенно уже готовыхъ, вполнъ окрашенныхъ и отвердъвшихъ, въ ихъ колыбелькахъ, въ разные мъсяцы, отъ іюля до конца сентября. При этомъ, въ огромномъ большинствъ случаевъ, они были какіе-то полусонные, стояли вертикально, совершенно спокойно сложивъ ножки, и начинали перебирать ими только послъ того, какъ ихъ растревожать; сначала движенія производятся медленно, какъ бы нехотя, съ просонокъ, а потомъ все быстръе и быстръе. Иногда жуки находятся въ такихъ условіяхъ, что при всемъ желаніи вылізть на поверхность земли, они этого слълать не въ состояніи. Такъ, въ сентябръ 1900 года, послъ продолжительной засухи, въ Шебекинъ Курской губ. черноземъ настолько затвердълъ, что глыбы его съ трудомъ можно было разбить молотомъ; жуки были буквально зацементированы въ своихъ колыбелькахъ, хотя чувствовали себя, повидимому, отлично. Эктизо ариол привозния индрама дилуж

Въ связи съ вопросомъ о томъ, выходять-ли жуки ранняго вывода на поверхность земли или нѣтъ, находится вопросъ о существованіи *второй генераціи* свекольнаго долгоносика въ то-же лѣто. Дѣйствительно, если жуки, вылупившіеся въ срединѣ іюля, вылѣзутъ изъ своихъ колыбелекъ наружу и спарятся, то самки, отложивъ яйца, могутъ дать начало новому поколѣнію. Это выходитъ такъ на основаніи теоретическихъ разсужденій, на практикѣ-же никто подобнаго случая не встрѣчалъ, такъ какъ даже Данышъ, въ своихъ отчетахъ склоняющійся въ сторону существованія у долгоносика второй генераціи, не приводить никакихъ въ пользу того данныхъ, ограничиваясь одними отвлеченными

разсужденіями. Такъ, во второмъ своемъ отчетъ, Данышъ нишеть слъдующее: "Обыкновенно Cleonus'ы дають въ годъ только одно поколъніе. Однако, иногда случается, если осень бываеть продолжительная и теплая, что некоторое число насъкомыхъ выходить на поверхность земли въ сентябръ и, если самцы успъвають оплодотворить самокъ, то эти послъднія положать яйца; это будеть благопріятнымъ обстоятельствомъ для сельскаго хозяйства; выведшіяся личинки осенью не могуть противостоять холоду и лишенію пищи въ той степени, какъ вполнъ развившееся насъкомое, а потому большинство изъ этихъ позднихъ личинокъ неминуемо погибнетъ". Въ третъемъ отчетъ говорится еще категоричнъе: "Изъ яицъ, положенныхъ въ началъ апръля, могуть развиться окончательно жуки къ концу августа. Это молодое поколъніе жуковъ выползаеть изъ земли и, спарившись, можеть дать начало новому покольнію еще въ первомъ году". Къ сожальнію, однако, Данышъ не позаботился при такихъ детальныхъ и хорошо обставленныхъ (въ смыслъ удобства работы) изслъдованіяхъ доказать научно возможность осенняго спариванія и откладки яицъ путемъ изслівдованія половыхъ органовъ жуковъ, что было крайне необходимо исполнить для ръшенія такого важнаго вопроса, и ограничился только одними предположеніями. Тъмъ болье, это надо было выполнить, что, по изследованіямъ Мечникова, жуки, вылупившіеся въ концѣ сентября, оказались (по словамъ Кеппена), лишенными зрълыхъ половыхъ продуктовъ. А разъ у неперезимовавшихъ жуковъ, даже у самаго ранняго вывода, половые продукты дъйствительно всегда окажутся недозръльми, то какой-же можеть быть разговоръ объ осеннемъ спариваніи и откладкъ яицъ.

Итакъ, все пока говорить за то, что жуки молодого поколѣнія свекольнаго долгоносика зимують въ землѣ въ своихъ колыбелькахъ; на появляющихся-же осенью на поверхности земли я смотрю какъ на случайно вынесенныхъ наружу какой-нибудь механической причиной; такъ, при копкѣ свеклы или распашкѣ бурачища съ осени, есть много шансовъ разрушить колыбельку и вынести жука наружу, нослѣ чего, полежавъ нѣкоторое время безъ движенія, пригрѣтый солнцемъ жукъ въ концѣ концовъ побѣжить.

Разсмотръвъ, такимъ образомъ, образъ жизни нормально развивающихся жуковъ, составляющихъ главную массу и появляющихся отъ ранней кладки яицъ, намъ остается сказать нъсколько словъ объ индивидахъ, отклоняющихся отъ нормы въ другую сторону—въ сторону запозданія.

До самаго послъдняго времени, при осеннихъ раскопкахъ въ концъ августа и началъ сентября, находили жуковъ въ колыбелькахъ, куколокъ и взрослыхъ или полувзрослыхъ личинокъ, которыя имъли еще полную возможность окуклиться той-же осенью, такъ-что рѣчь могла идти только о томъ, всегда-ли зимують только жуки или на ряду съ ними также и куколки. Такъ было у Кеппена, который находилъ при раскопкахъ въ Смълъ, Кіевской губ., 4 сентября довольно много личинокъ, нъсколько куколокъ и жуковъ, причемъ онъ считалъ весьма въроятнымъ, что личинки успъють въ ту-же осень окуклиться и останутся до весны въ стадіи куколки. На этомъ основаніи Кеппенъ предположиль, что весною жуки появляются въ двухъ серіяхъ: перезимовавшіе въ стадіи ітадоранней весной, а въ видъ куколки—только въ іюнъ 1). Мечниковъ считаеть, что жукъ зимуетъ въ стадіи ітадо. Данныя, полученныя изъ моихъ раскопокъ, нисколько не противоръчать этому; я всегда находиль осенью, въ началъ сентября, жуковъ, куколокъ и очень мало личинокъ, настолько уже выросшихъ, что онъ, безъ сомнънія, должны были достичь окукленія въ ту-же осень. Только единственный разъ удалось найти въ послъднихъ числахъ августа, въ Шебекинъ, полуварослую личинку, относительно которой могло еще возникнуть слабое сомнъніе, успъеть-ли она окуклиться до зимы или нътъ. Данышъ и въ этомъ случат ръшаетъ вопросъ категорично и бездоказательно, а именно: "Запоздавшая генерація жуковъ, за недостаткомъ времени для превращенія,

¹⁾ Это толкованіе Кеппенъ приводить въ опроверженіе взгляда, высказаннаго двумя дъятелями въ Кіевской губ.—Зевигомъ и Вебелемъ—и утверждавшаго, что жуки развиваются будто-бы въ двухъ поколъніяхъ, причемъ лётъ перваго происходитъ ранией весной, а второго—въ іюнъ.

пебрина причиняемия саркоспоридіями оп флишерія бакте

ріальная болбаны Конечно, прежде всего эти больськи быни

замъчены на разводимихъ человъкомъ поленихъ насъцо-

MEXE, LEREDER weresnames befores (Bomby vinori), larbury

проводить зиму въ видѣ личинокъ или куколокъ, достигая окончательной формы лишь въ іюль или даже въ августь мъсяць (курсивъ мой) 1). Поэтому, само собою разумѣется, что мы можемъ найти въ землѣ личинки и куколки, равно какъ на поверхности земли вполнѣ развитаго жука во всякое время, начиная съ первыхъ чиселъ апрѣля до поздней осени".

ан амонув пиндохи элефатиза физики притоу навадиной чей warmeelkexekekkoroku if bepooning ahir nolybepolinkelinчинокът которыя имъян ещелосирю возможность окуплитьем польже осенью экакъчто обчь могла склин полько, отчтонь, BOOLEGED SHARTOTH TO THE SERVER HER HER SHARTON SHART TRIKE немуженки Пакъ было узычениена, который инходиль придриснонияхы вы Сивльи Кіевской тубе, феситябри повольно много личниотъ, сибеколько кумолокъ в жуковъ, пиричемъ бито ечиосень окучантыя простанутся по весны възстальткуколия. На этомъе основанія Кеппень предположінть, что весною жуки по-MYRORL, KYROZORE HO OBERE MEROZUNARNOKER HACTOLEKO YME выросцику, этологь безы сомный продмиы были достичь дось найти въ последнихъ числахъ августа, къ Шебекинъ, никнуть слабое сомнъніе, успъеть ли видонувлиться жозимы «Кинь станка онцарук», вы для истым и држен ваганда, высказавиаго двумя двителями въ Кіевской туб. - Зевигомъ и Вебелемъ-и утверждав;

уже полькосявились масло научать полаванно чаркантикую насъкомых и Гакъ Мюска пр Карг. Таковичнаго чарка порытилы на себя винимане при может годах в прошлаго столения

Враги свекольнаго долгоносика.

Многія вредныя насъкомыя, появившись въ массовомъ количествъ, вскоръ-же исчезають, вслъдствіе дъятельности паразитирующихъ на нихъ животныхъ, чаще всего насъкомыхъ-же изъ отрядовъ перепончатокрылых (напр. навздники) или двукрылых (мухи); это столь могущественный регуляторъ, безъ помощи котораго врядъ-ли намъ когда-либо удалось-бы справиться съ нашими врагами, въ случаяхъ массоваго ихъ размноженія. Къ сожальнію, для свекловичнаго долгоносика подобнаго регулятора изъ числа животныхъ паразитовъ до сихъ поръ еще никъмъ не найдено. За то долгоносики страдають въ сильной степени отъ грибныхъ болъзней, производящихъ среди нихъ сильныя опустошенія при естественныхъ условіяхъ, безъ всякаго вмѣшательства со стороны человъка. Описанію этихъ помощниковъ нашихъ изъ міра паразитныхъ грибовъ мы и посвятимъ настоящую главу. Стит он жизэтене опелентлаци заменирици амитони

Паразитные грибы, т. е. грибы, развивающіеся, въ противуположность сапрофитным, на живыхъ животныхъ и растеніяхъ, и вызывающіе своей дѣятельностью болѣзни и смерть организма, уже издавна обратили на себя вниманіе ученыхъ. Полтора столѣтія тому назадъ были замѣчены грибныя болѣзни насѣкомыхъ и, не взирая на то, что ими усердно занимался цѣлый рядъ ученыхъ, все-же много остается темнаго и необъясненнаго въ этой области. Изъ болѣзней насѣкомыхъ, производимыхъ растительными паразитами, наибольшее практическое значеніе вслѣдствіе своего эпидемическаго характера имѣють: мюскардинозъ—грибного

¹⁾ Это уже совершенно невъроятно.

происхожденія, поражающій всевозможныхъ насѣкомыхъ, пебрина причиняемая саркоспоридіями и фляшерія—бактеріальная болѣзнь. Конечно, прежде всего эти болѣзни были замѣчены на разводимыхъ человѣкомъ полезныхъ насѣкомыхъ, каковы шелковичныя бабочки (Вотвух тогі), затѣмъ уже только явилась мысль изучать болѣзни паразитныхъ насѣкомыхъ. Такъ мюскардинозъ шелковичнаго червя обратилъ на себя вниманіе въ 30-хъ годахъ прошлаго столѣтія, пебрина въ 50-хъ, а фляшерія—въ 60-хъ.

Свекольный долгоносикъ подверженъ: 1) мюскардинозу, явдяющемуся результатомъ зараженія его мюскардиной и 2) бактеріальной бользни фляшеріи. Мюскардина-понятіе сборное, обнимающее собою паразитныхъ грибковъ, поражающихъ только насъкомыхъ. Найдено нъсколько видовъ мюскардинъ, причемъ родство ихъ, равно какъ и положение въ системъ еще далеко не выяснены; вслъдствіе этого, вызываемыя ими болъзни и окончательные результаты пораженія насъкомыхъ бывають весьма разнообразны и отличны другь оть друга. Свекольный долгоносикъ страдаеть въ предълахъ Россіи, главнымъ образомъ отъ двухъ видовъ мюскардины: зеленой (Oospora destructor) и красной (Sorosporella uvella), которыя мы только и разсмотримъ подробнъе, такъ какъ прочіе виды мюскардиноза, вызываемые желтой мюскардиной (Echinospora) и нъсколькими видами билой (Isaria, Sporotrichum) встрѣчаются очень рѣдко и, кромѣ того, по многимъ причинамъ, практическаго значенія не имъютъ.

Зеленая мюскардина. Oospora destructor (Metschn.) Delacroix — Entomophthora anisopliae Metschn. — Isaria destructor Metschn. Зеленая мюскардина была открыта Мечниковымъ въ 1878 году на личинкахъ хлюбнаго жука или кузоки Anisoplia austriaca, и грибъ былъ названъ Entomophthora anisopliae, и передъланъ потомъ въ Isaria и Oospora destructor. Въ слъдующемъ-же году Мечниковъ нашелъ, что тотъ-же самый грибокъ поражаетъ взрослыхъ насъкомыхъ, личинокъ и куколокъ свекольнаго долгоносика 1). Зеленой мюскардиной этотъ

грибокъ названъ вслъдствіе того, что, достигнувъ полнаго своего развитія, онъ покрываеть поверхность тъла убитаго имъ насъкомаго порошкообразнымъ слоемъ темно-оливковозеленыхъ споръ, служащихъ источникомъ заразы. Зеленая мюскардина поражаеть, въ зависимости отъ состоянія погоды, отъ 10 до 100°/_о личинокъ, куколокъ и жуковъ молодого поколънія, слъдовательно можеть, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, играть роль дъятельнаго помощника человъка, безъ всякаго съ его стороны участія. Тъмъ естественнъе, конечно, желаніе со стороны человъка подчинить такого могучаго дъятеля своей волъ и обратить его въ орудіе борьбы съ долгоносикомъ, на чемъ и основанъ микологическій методъ борьбы, о которомъ рѣчь будеть ниже, въ главъ VII. Относительно заразительности зеленой мюскардины Скржинскій пишеть слідующее: "Зеленая мюскардина, какъ и другіе виды мюскардины, заражаеть насѣкомыхъ только посредствомъ споръ. Проникновение споръ мюскардины въ организмъ насъкомыхъ не ограничено какими-либо спеціальными условіями. Будуть-ли споры проглочены насъкомымъ съ пищею, проникнутъ-ли онъ въ организмъ черезъ дыхательные пути или отъ простого соприкосновенія—гибель насъкомаго неизбъжна. Наши лабораторные опыты убъдили насъ, что зараженіе долгоносиковъ зеленой мюскардиной абсолютно; что-же касается естественной вирулентности этого грибка въ отношеніи къ долгоносикамъ, то и она столь велика, что мюскардиноза среди нихъ не можетъ быть сравнимой въ патологическомъ отношении даже съ самыми гибельными эпидеміями среди высшихъ животныхъ".

Какъ-же происходить зараженіе насъкомыхъ? Зеленая спора гриба, попавъ на поверхность кожи, въ трахею или нищеварительные органы насъкомаго начинаетъ проростать, прободая кожу или стънку кишечника и давая ростокъ внутрь тъла. Подъ поверхностью кожи развивается особый инидіальный (по Мечникову) слой болъе крупныхъ, эллиптической или шаровидной формы, клътокъ грибныхъ нитей, иногда четкообразно сидящихъ на нити, въ непосредственномъ сосъдствъ другъ съ другомъ. Конидіи эти отдъляются отъ плодоносныхъ

¹⁾ Мечниковъ. О болъзняхъ свекловичнаго жука. «Земледълъч. Газета». 1879 г., стр. 508.

нитей, разсъиваются по всему организму и проростають самостоятельно, причемъ все тъло насъкомаго, кромъ полости кишечника, мало-по-малу пронизывается и туго заражается грибницей (съ ясными клъточными перегородками), вслъдствіе чего погибшія отъ зеленой мюскардины личинки или куколки оказываются совершенно твердыми, сохраняющими вижшнюю форму тъла, сплошь заполненными чисто-бълой массой плотно переплетеннаго мицелія, похожей въ изломѣ на мѣлъ или структуру спорыныи. Въ этой стадіи развитія гриба личинки или куколки напоминають собою какъ-бы муміи, заполненныя твердымъ бълымъ веществомъ и сохранивийя только внъшнюю форму тъла; такихъ мумифицированныхъ личинокъ можно найти въ землъ очень часто; онъ въ это время еще не заразительны, такъ какъ споръ еще нътъ. Споры, при благопріятныхъ условіяхъ развитія гриба, образуются вскорфже за мумифицированіемъ, или-же появленіе ихъ можеть быть задержано въ силу какихъ-нибудь неблагопріятныхъ условій, напр. паденіемъ температуры ниже 10°/0 на неопредъленный срокъ, вслъдствіе чего стадія муміи безъ споръ можеть продолжаться весьма различный періодъ времени. "При дальнъйшемъ развитіи гриба, пишеть В. А. Траншель 1), изъ подъ кожи личинки выростають наружу болъе тонкія грибныя нити, переплетающіяся въ войлокъ (войлочный слой Мечникова), окружающій личинку въ видъ чехла, первоначально бълаго цвъта. Въ нъкоторыхъ мъстахъ этого чехла начинается затъмъ развитіе спороношенія гриба. Начало спорообразованія зам'ятно по тому, что кое-гд'я въ б'ядой грибницъ появляются гнъзда оливковозеленаго цвъта. Эта окраска свойственна спорамъ гриба. Споры гриба удлиненно-эллипсоидальной формы, въ среднемъ 8 р. длины, 3 ч. ширины (указанія Мечникова, 4,8 ч. на 1,6 ч. слишпрободан кожу или ствику кишечника и дажи ростокъ в

комъ малы). Подъ микроскопомъ онъ кажутся почти безцвътными, лишь слегка зеленоватыми. Споры развиваются на концахъ древовидно - развътвленныхъ конидіеносцевъ, настолько между собою переплетенныхъ, что выдълить ихъ удается очень трудно. Вслъдъ за первой спорой на концъ въточки развивается вторая, третья и т. д., образуя такимъ образомъ четки. Число образующихся споръ, повидимому, не ограничено: мнъ приходилось видъть четки, заключавшія свыше 30 споръ. Начавшееся въ немногихъ мъстахъ развитіе споръ распространяется затъмъ на всю поверхность тъла личинки. Отъ прикосновенія темнозеленая масса споръ легко распадается". Разъ споры образовались, пораженное зеленой мюскардиной насъкомое уже представляеть изъ себя очагъ заразы для другихъ, здоровыхъ экземпляровъ.

Таковъ циклъ развитія этого гриба. Для хозяина, однако, недостаточно знать только одну исторію развитія его, но ему необходимо также умъть отличать по наружному виду личинокъ или куколокъ, пораженныхъ зеленой мюскардиной. Мы уже знаемъ изъ вышеизложеннаго двъ формы пораженныхъ личинокъ: 1) мумифицированную, безъ споръ, отличающуюся отъ здоровой и живой, по внъшнему виду, болъе темнымъ цвътомъ кожи, твердостью и мъловиднымъ изломомъ, и 2) личинку покрытую уже сфровато-оливковымъ спороноснымъ слоемъ (см. таблицу, рисунокъ III). Но это еще не все иногда грибница разростается въ землъ за предълами пораженнаго насъкомаго, то образуя радіально расходящіяся нитевидныя развътвленія (таблица, рис. VI), то обростая его сплошнымъ чехломъ (таблица, рис. IV). Опишу условія, при которыхъ мнъ пришлось наблюдать эти двъ послъднія формы проявленія дъятельности зеленой мюскардины.

Изслѣдуя въ 1895 году свекловичныхъ блохъ (Chaetocnema) въ Воронежской губерніи и напавъ на участокъ бурачной плантаціи, погибающей отъ личинокъ долгоносика, я выкопалъ нѣсколько десятковъ крупныхъ, готовыхъ къ окукленію, совершенно по внѣшнему виду здоровыхъ личинокъ и посадилъ ихъ 12 іюля въ большую стеклянную банку, наполненную черноземомъ, для полученія куколокъ и молодыхъ,

¹⁾ Ботаникъ Ботаническаго музея Императорской Академіи Наукъ В. А. Траншель помогъ мнъ, какъ не микологу, разобраться въ привезенномъ мною матеріалъ, опредъливъ виды грибныхъ болъзней, послужившихъ причиною смерти долгоносиковъ, и любезно составилъ цитируемыя здъсь и въ описаніи красной мюскардины части текста, за что я считаю пріятнымъ для себя долгомъ высказать ему свою живъйшую признательность.

неокрашенныхъ еще жуковъ. По изслъдовании содержимаго банки 6 августа, черезъ 31/4 недъли, оказалось, что только четыремъ личинкамъ удалось окуклиться и превратиться въ жуковъ, всъ-же остальныя поголовно погибли отъ зеленой мюскардины. Грибокъ мумифицировалъ все тъло личинокъ, заполнивъ его плотной бълой массой и сдълавъ его хрупкимъ; на поверхности тъла развилось большое количество споръ; кромъ того, мицелій столь буйно разросся внъ тъла личинокъ, что заполнилъ цълыми неправильными слоями, комками и сростками, всв пустоты между твломъ и облегавшими его комочками чернозема. Кромъ того, отъ мъста лежанія личинки, какъ изъ центра, расходидись обильныя развътвленія мицелія во всъ стороны, въ видъ бълыхъ корней и корешковъ, проникавшихъ между частицами земли и сцементировавшихъ ихъ (таблица, рис. VI). Условія для развитія гриба были подходящія, почва была рыхлая, отчего и возможно было мицелію разростись на далекое разстояніе оть личинки, свободно проникая между частицами почвы.

Иначе дъло обстояло въ другомъ случат, когда мит приходилось наблюдать эпидемію зеленой мюскардины, погубившей болъе 90°/_о всего молодого поколънія долгоносиковъ въ 1900 году, на плантаціяхъ Новаго хутора Шебекинскаго имънія гг. Ребиндеръ, Курской губерніи. Раскопки производились мною на плантаціяхъ свекловичныхъ высадокъ, 14-17 сентября, гдв въ мав и іюнъ наблюдалась масса долгоносиковъ. Лътомъ дожди были только въ іюнъ, послъ чего, до самаго прівзда моего на плантацію, 14 сентября, была полная засуха. Изръдка перепадали ничтожные по количеству осадковъ дожди, не пробивавшие кома, Земля просохла и страшно потрескалась; рыть ее лопатой не было никакой возможности. При распашкъ надо было впрягать въ плугъ по 4—6 паръ воловъ и тогда только плугъ едва бралъ громадныя глыбы, соскабливая съ нихъ небольшіе пласты; м'вста разръза на глыбъ были какъ-бы отполированы. Если удавалось пустять плугъ поглубже, до 10-12 вершковъ, ниже просохшаго и окаменъвшаго пласта, то отворачивались глыбы въ 1 или въ нъсколько пудовъ въсомъ. Нижняя поверхность глыбъ была чуть влажнѣе, края глыбъ сравнительно легко осыпались, но внутри онѣ были сухи и тверды, какъ камень, и разбивать ихъ удавалось только энергичными ударами молота. Личинковыя и куколочныя колыбельки находились на глубинѣ 6—8 вершковъ, т. е. какъ разъ внутри наиболѣе затвердѣвшей части пласта.

Разбивая окаменъвшія комья на мелкіе кусочки и добираясь до насъкомыхъ, я находиль слъдующее:

- то окращенных уже къ выходу, совершенно отвердения и окращенных жуковъ—въ маломъ количествъ, единично.
- 2) Жуковъ вполнѣ нормальныхъ на видъ или слабоокрашенныхъ, но уже мертвыхъ и проросшихъ въ разной степени мицеліемъ зеленой мюскардины. Нѣкоторые на видъ казались совершенно чистыми, но изъ заднепроходнаго отверстія, нѣсколько раскрытаго, виднѣлась бѣлая масса; у другихъ она выступала, кромѣ того изо рта, на ногахъ, снизу между кольцами груди, на брюшкѣ и, наконецъ, на бокахъ и спинѣ, обволакивая почти всю поверхность тѣла жука. На изломѣ было видно, что внутренность жука заполнена бѣлымъ мицеліемъ.
- 3) Сравнительно немного попадалось личинокъ разныхъ возрастовъ, окруженныхъ землею, безъ колыбельки, мумифицированныхъ, безъ зеленаго спороноснаго слоя, или покрытыхъ таковымъ (таблица, рис. III).
- 4) Огромное большинство личинокъ были поражены грибкомъ въ тотъ моменть, когда онъ приготовились уже къ окукленію и успъли приготовить въ землѣ куколочную колыбельку съ уплотненными и гладкими внутренними стѣнками, вслѣдствіе чего внѣшній видъ пораженія имѣлъ вполнѣ опредѣленную характерную форму, а именно: личинка или, гораздо рѣже, куколка лежитъ на днѣ вертикальной куколочной колыбельки, но не свободно, а въ бѣломъ чехлѣ, какъ-бы въ коконѣ изъ разросшагося внѣ тѣла личинки мицелія грибка, выстилающемъ собою всю внутреннюю поверхность стѣнокъ колыбельки. Такъ какъ, вслѣдствіе мумифицированія тѣла личинокъ грибкомъ, онѣ не заполняли

всей внутренности колыбельки, а разростание мицелія шло по стънкъ послъдней, то и внутри чехла надъ личинкой оставалось пустое пространство большей или меньшей величины. Нижняя часть чехла, соприкасающаяся съ мертвою личинкою, болъе толстостънна и грязновато-бълаго цвъта, верхняя-же часть его, окружающая пустое пространство, сибжнобълая и очень тонкостънна; самый верхъ кокона, неръдко, бываеть даже не вполнъ замкнутъ. Снаружи, коконъ, въ нижней своей части, очень часто бываеть окрашень въ сърно-желтый, красновато-желтый или даже ярко-оранжевый цвътъ (таблица, рис. IV), верхъ-же его, какъ и внутренность, снъжно-бълаго цвъта, вслъдствіе чего, при разбиваніи комьевъ земли, содержащихъ погибшихъ отъ зеленой мюскардины личинокъ Въ чехликахъ, эти послъдніе бросаются прежде всего въ глаза своей ослъпительной бълизной, напоминая собою овальные комочки ваты. Стънки колыбелекъ остаются совершенно черными или-же, слегка проростая мицеліемъ, бъльють, причемъ, однако, чехликъ можно бываеть вынуть изъ колыбельки целикомъ. Наружная поверхность личинки или куколки, вынутой изъ мицельнаго чехлика, равно какъ и внутренняя поверхность послъдняго въ нижней его части, покрыты большей или меньшей толщины спороноснымъ порошкообразнымъ слоемъ грязно-съро-одивковаго цвъта; особенно густо были покрыты куколки. Если счистить этотъ зеленоватый слой споръ, то поверхность тъла личинки представится грязно-желтовато-буроватой, иногда съ оранжевымъ оттънкомъ. Значительно ръже личинокъ внутри чехликовъ заключались погибшія отъ этого грибка куколки свекольнаго долгоносика. Так имывновтовым досудаворых ода

Появленіе чехликовъ изъ мицелія вокругъ личинокъ въ данномъ случав вполив понятно; грибъ, начавшій свою губительную дѣятельность послѣ іюньскихъ дождей, при теплой погодѣ, развивался при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ; поражая одну личинку за другой; къ той-же норѣ, когда наступиль періодъ роста мицелія внѣ пораженныхъ личинокъ и куколокъ, земля уже настолько затвердѣла, въ особенности около уплотненныхъ стѣнокъ колыбельки,

что грибница не могла проникнуть въ почву, а ползла только по стънкамъ, образуя чехликъ.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что поражаться могутъ зеленой мюскардиной и личинки, и куколки, и взрослые жуки, находящіеся въ земль, притомъ въ различной степени. Такъ, по свидътельству Даныша, при 90% умерщвленныхъ долгоносиковъ, приходится на долю личинокъ 70—75°/о, куколокъ $5-6^{\circ}/_{\circ}$ и жуковъ $9-10^{\circ}/_{\circ}$; при $10^{\circ}/_{\circ}$ зараженія погибають за только личинки. Съ другой стороны мы знаемъ, что, хотя плабораторными опытами и доказано, что жуки, ползающіе весною и въ началъ лъта на поверхности земли, погибаютъ при зараженіи ихъ спорами зеленой мюскардины, въ дъйствительности-же, на плантаціяхъ зараженія ихъ не происходить. Объясняется это по Данышу тъмъ, "что стадія личинки долгоносика совпадаеть съ такимъ періодомъ времени, когда атмосферныя условія наиболье благопріятствують развитію мюскардины. Жучки почти не заражаются въ природъ потому, что весной и осенью средняя температура бываеть недостаточно высока, а въ ионъ черезчуръ сухо. Кромъ того, мюскардиноза распространяется среди насъкомыхъ исключительно въ землъ, и то лишь въ течении четырехъ лътнихъ мъсяцевъ, именно въ іюнъ, іюлъ, августь и сентябръ. Поэтому заболъванію подвержены главнымъ образомъ личинки и куколки, находящіяся въ это именно время въ земль. Въ сентябръ уже можно встрътить извъстное количество молодыхъ, вполнъ развитыхъ жуковъ, погибшихъ отъ мюскардины", что мы и видъли въ описанномъ мною случаъ.

Въ третьемъ своемъ отчетв Данышъ приводитъ результатъ наблюденій на трехъ поляхъ надъ ходомъ отмиранія личинокъ, куколокъ и молодыхъ жуковъ, въ періодъ времени отъ апръля до конца октября, а именно:

плимъ развитно зеленой москардины; чъмъ больше въ землъ споръ и чъмъ скучениъе личники до поносика, тъмъ больше плансовъ имъ заразиться самимъ и размиожить за свой счетъ споры трибного паразита, что, въ свою очередь. Туси

THE CTEMENT SAPARITED HOCTH SANGATOR HOSELS CARRIED

	BESTON ASTRACTOR NO	ам авунянноци магаем <mark>А</mark> дарыку		видом голо вр вимам <mark>В</mark> увания		о вичосикат	
	овласть могулть эс- игля вэросный жугы;	Живыхъ.	Заражен-	Живыхъ.	Заражен-	Живыхъ.	Заражен-
Въ	началъ наблюденій	200 лич.	H IHMOTI GIAIGH V	200 лич.	698 Janes Levergroon	200 лич.	HAXOL
Въ	концъ іюня.	D 83. U	1 1 1 1	197 ,	3 лич.	Annual State of State	
	концъ августа кі. 19 ж. в.		The state of the		10.1		
Въ	сентябръ Т. С. С. С. С.	HIV OHH	фа <u>ст</u> ора	mry <u>ó</u> peka	िट <u>म</u> ास	25 кук.	140 "
	октябрѣ	EDNHOCT		100 жук.	100 лич. и кук.	5 жук	35 кук 140 лич 35 кук 20 жук

Сколько же времени потребно для полнаго развитія зеленой мюскардины съ момента зараженія насъкомаго до появленія споръ новаго покол'внія? Оказывается, что все зависить отъ внъшнихъ условій—влажности и температуры. Воть какія данныя по этому вопросу сообщаеть Данышъ. "Продолжительность трехъ фазъ: проростанія споръ, проникновенія ихъ во всѣ органы, образованія плодоносныхъ нитей и развитія споръ-бываеть различна: 4-6 сутокъ при 20-25 и умъренной влажности: нъсколько недъль при 12—15°; и нъсколько мъсяцевъ, если температура не поднимается выше 10°, или если насъкомое находится въ сухомъ и хорошо провътриваемомъ мъстъ. Смотря по надобности, можно или сдълать скорую разводку споръ мюскардины, или-же сохранить грибки въ видъ стромы, наполняющей мумісподобное нас'вкомое, и вызвать развитіе споръ только тогда, когда это будеть нужно". уквали думут ви йінегондын

Итакъ, значитъ, температура 20 — 25°, при умъренной влажности, является условіемъ, наиболъе благопріятствующимъ развитію зеленой мюскардины; чъмъ больше въ землъ споръ и чъмъ скученнъе личинки долгоносика, тъмъ больше шансовъ имъ заразиться самимъ и размножить за свой счетъ споры грибного паразита, что, въ свою очередь, усититъ степень заразительности даннаго поля.

Затъмъ, для того, чтобы понять всъ явленія, сопровождающія развитіе и исчезновеніе мюскардиноза на плантаціяхъ, что намъ потребуется при обзоръ микологическаго метода борьбы съ долгоносикомъ, необходимо ознакомиться съ тъмъ, какъ долго сохраняють споры зеленой мюскардины свою жизнеспособность. Оказывается, что срокъ этотъ не великъ-поле, сильно зараженное спорами, черезъ 2-3 года становится почти безопаснымъ для личинокъ. Дъло въ томъ, что, по объяснению Даныша, извъстные до сихъ поръ виды мюскардины не дають эндоспоръ, т. е. внутреннихъ споръ, снабженныхъ очень плотной внъшней оболоч кой, благодаря которой онъ могуть очень долго противостоять различнымъ дъйствіямъ окружающей атмосферы и даже обеззараживающимъ веществамъ. Эндоспоры сибирской язвы, напримъръ, сохраняють свою вирулентность свыше 10 лътъ. Споры мюскардины, наоборотъ, имъютъ очень тонкую наружную оболочку, а потому, подвергаясь вліянію воздуха, свъта, ръзкимъ перемънамъ температуры, не могуть противостоять имъ болъе одного года. При распашкъ до 7 вершковъ, въ промежуткъ времени между двумя посъвами свекловицы при 4-хъ-лътнемъ съвооборотъ, на одномъ и томъ-же полъ, весь верхній 7-ми вершковый слой ночти совершенно стерилизуется отъ споръ мюскардины, тогда какъ споры, лежащія глубже пахатнаго слоя, защищенныя оть атмосферныхъ вліяній, противостоять дольше. Находясь даже въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, споры мюскардины умирають гораздо быстръе, чъмъ эндоспоры. Несомнънно, что даже въ болъе глубокихъ слояхъ вемли, по истечении 4-хъ лътъ, изъ общаго количества мюскардины, находившейся на полъ во время послъдняго сбора свекловицы, сохранятся едва 1% споръ, способныхъ проростать. Быть можеть, туть даже совершенно не нашлось-бы этихъ споръ, если-бы какая-нибудь заблудившаяся самка Сleonus'a или другого какого-либо насъкомаго не положила тутъ Униць, изъ которыхъ вывелись затъмъ личинки, доставившія уцълъвшимъ спорамъ необходимую для ихъ развитія среду.

Красная мюскардина. Sorosporella uvella (Krass.) Giard = Таrichium uvella Krass. = Sorosporella Agrotidis Sorokin. (Таблица, рис. V). Этотъ видъ мюскардины встръчается ръже зеленой:

поданыму гибель отъ нея свекольнаго дол-Гоно гоносика не превышаетъ 30—40°/о. Миъ она попадалась вмѣстѣ съ зеленой мюскардиной дэг двъ Курской губерній въ 1900 г., но въ меньсторине становичество по прои водинения в от

нтэда, Погибшія 1 оты этой бользни личинки представляють изъ себя тонкій чехоль изъ вет в на кожицы ихъ, внутри котораго находятся зерна -одитоди отпожирнично-или ржаво-бураго цвъта. При ма-Рис. 11. Споры дъйшемъ неосторожномъ прикосновеніи ко-

красной мюскардины (увел. 90 разъ). жица разрывается и все тъло распадается на атронтног дона красный, зернистый, порошокъ ²). Подъ микро-

скономъ порощокъ этотъ оказывается состоящимъ изъ многоклъточныхъ тълъ, шаровидной или неправильной формы,

ржавобураго цвъта (рис. 11). Величина этихъ тълъ (споръ) весьма варіируеть; въ среднемъ. шарообразныя тъла имъють діаметръ въ 120 и (12 сотыхъ миллиметра). Клътки, слагающія эти падолишары, шаровидны или, вследствіе взаимнаго давленія, угловаты, около 8—10 р. въ поперечникъ. Въ зръломъ состояніи клътки споръ настолько между собою срощены, что при раздавливаніи онъ не разъединяются, а разрываются. При проращиваніи споръ въ питательныхъ жид-

Рис. 12. Піаровидныя кльтки костяхъ Красильщикъ 3) наблюдалъ развитіе ци-(увел. 90 разъ). линдрическихъ конидій съ округленными конца-

Описаніе привезенныхъ мною изъ Курской губ, личинокъ свекольнаго долгоносика, зараженныхъ красной мюскардиной, сдъданное В. А. Траншелемъ.

3) И. Красильшикъ. О грибныхъ бользияхъ у насъкомыхъ. Записки Новороссійскаго Обществ. Естеств. Т. ХІ. вып. І. Одесса 1886. стр. 96.

ми, около 9 р. длины и 3 р. ширины, причемъ послъ образованія споры на той-же "базидіи" не развивались дальнъйшія споры. Проращивание споръ мнъ не удалось. Кромъ споръ, въ нъкоторыхъ, по крайней мъръ, личинкахъ я наблюдалъ присутствіе грибницы изъ снабженныхъ перегородками нитей. Нъкоторыя клътки грибницы расширены и имъють эллипсоидальную или, чаще, шаровидную форму. Такія шаровидныя клътки или находятся среди цилиндрическихъ клътокъ грибныхъ нитей, или-же на концахъ ихъ, причемъ часто 2—3 клътки подъ рядъ принимаютъ шаровидную форму. На многихъ изъ такихъ шаровъ (повидимому, только на болъе тонкихъ нитяхъ) замъчается присутствіе какихъ-то сосочковъ на оболочкъ (рис. 12). Сосочки эти встръчаются далеко не на всъхъ шарахъ и, кромъ того, бывають развиты то сильнъе, то слабъе.

Повидимому, они принадлежать только оболочкъ и содержимое клътки въ нихъ не входить. Возможно, что эти шары представляють изъ себя стадіи развитія многокліточных споръ, хотя утверждать этого пока нельзя. Переходныхъ стадій между шаровидными клѣтками и зачатками споръ я не нашелъ. Самыя раннія стадіи развитія споръ я наблюдаль въ вид'в десяти почти еще безцвътныхъ клътокъ шаровидной формы, соединенныхъ въ гроздь, сидящую на концъ грибной нити (рис. 13). Какимъ образомъ про- развитія споръ исходить увеличение числа клътокъ-не выяс- дины (увел. 90 нено, но имъются указанія, что это происхо-



раннихъ стадій

дить черезъ почкованіе. Изъ сказаннаго видно, что исторія развитія этого интереснаго гриба еще почти неизвъстна" 1).

Скржинскій приписываетъ меньшую распространенность въ природъ красной мюскардины по сравненію съ зеленой той причинъ, что, "для зараженія среды (въ данномъ случав земли) требуется разрывъ ствнокъ мвшечка изъ кожицы

²⁾ Дъйствительно, кожица такъ нъжна, что мнъ стоило большихъ хлопотъ довезти въ Петербургъ пару почти цълыхъ личинокъ; обыкновенно, еще при разбиваніи кома колыбелька перекалывалась пополамъ, а съ нею вмъстъ переламывалась и личинка. Въ такомъ именно видь, на изломъ, и нарисована личинка на таблицъ (рис. V), чтобы показать видъ содержимаго кожнаго мъшка: сама-же кожица снаружи гораздо свътлъе, бълесоватъе. А. Силантьевъ,

¹⁾ Пользуюсь случаемъ просить всёхъ, кому придется встретиться съ больными личинками свекольнаго долгоносика, выслать матеріаль, какъ сухой, такъ и въ кръпкомъ спирту, въ Ботаническій музей Императорской Академіи Наукъ въ С.-Петербургь, В. Траншель.

насъкомаго какимъ-либо факторомъ извиъ, послъ чего можетъ произойти непосредственное соприкосновеніе споръ съ насъкомыми. Для зеленой мюскардины не требуется такого условія, ибо поверхностное размъщеніе споръ достаточно гарантируетъ легкую распространяемость заразы. Кромъ того, гифы этого грибка, распространяясь на нъкоторое разстояніе въ землъ, могуть самостоятельно убить находящееся вблизи насъкомое".

могуть самостоятельно убить находящееся вблизи насъкомое". соединетика в вы гранды, сплансую на финту Рис. 18 сена из Pendaganghuru (puctus). Hakuwik objasowik ripil-pasaria con исходить увеличение тисла клютого чте выне дины (увел. 90 Par 19 (grand I Puo zonochi orano pro ikinasan dukotokanakan kanen Jurta repeta normanie. Mar enasannari mirno, arti-neropia " pasarria procumirepectaro apaisa ente norra negasiscreat la

больныхи диуниками времольного долголючиства эксперальных ийко средо хой, чейкь испъ бранкому симруу, къ Ботаничений мурей Императору кой Ажадении Илукъ им С. Истербурган Н. Т., итата З. отначаност годъ, что они оправятся, совершение напрасно-нихы слъдуеты скорфе двестать ненастичнод богатую одождами и ераниительног прохладиую весту однастывачео девекладира

TOR HOUSE HOUSE HOUSE BEING CHIEF CONTRIBUTE THE STOCK HOS

Вредъ, приносимый свекольными долгоносиками и борьба съ ними.

Въ главъ II, при обзоръ образа жизни свекольнаго долгоносика, мы уже познакомились въ главныхъ чертахъ съ приносимымъ имъ вредомъ, здъсь-же мы займемся этимъ вопросомъ нъсколько подробнъе.

Вредять, какъ извъстно, жуки, объбдая листья, и личинки, нитаясь корнями свеклы. Объ эти категоріи поврежденій проявляются въ различной, болъе или менъе опасной для жизни свекловицы формъ. Жуки питаются свеклой въ разной стадіи ея развитія—начиная отъ только-что показывающагося изъ земли росточка съ не вполнъ еще расправленными съмядолями, до кустика порядочныхъ размъровъ, несущаго 5-6 и болъе развитыхъ листьевъ. Само собою разумъется, что, при одинаковомъ количествъ жуковъ на единицъ площади, эффектъ получается различный, смотря по тому, занята-ли плантація молодыми всходами или окръпшими уже растеньицами. Въ то время, какъ отъ первыхъ живо остаются одни только пенечки, кустящіеся экземпляры легко переносять выбданіе части мякоти съ края листа или въ толщъ листового черешка. Надо при этомъ имъть въ виду, что тъ крупные участки выгрызенной ткани, неръдко смущающе хозяевъ, которые мы видимъ на большихъ листьяхъ, являются результатомъ роста листа, вмъстъ съ которымъ пропорціонально разрастается и площадь поврежденія, имъвшая прежде маленькіе разм'тры; жукъ выгрызъ небольшой кусочекъ листа, а черезъ недълю-двъ, при хорошемъ ростъ, дырочка увеличится въ нъсколько разълженов визменнова

Судьба свекловичныхъ посъвовъ зависитъ не только отъ общаго количества долгоносиковъ, но, въ значительной степени, и отъ состоянія погоды. Конечно, если жуки объѣли уже почти наголо молодые всходы, ожидать при любой погодъ, что они оправятся, совершенно напрасно—ихъ слъдуетъ скоръе пересъять. Но въ ненастную, богатую дождями и сравнительно прохладную весну бываетъ, что свекла настолько быстро растетъ и кръпнетъ, что жуки ей мало сравнительно вредятъ; съ другой-же стороны, даже при маломъ количествъ жука, но въ сухую, вътренную и жаркую весну, когда ростъ свеклы надолго задерживается какъ-бы на одной точкъ и молодыя растеньица хиръютъ, поврежденія отражаются въ значительной степени на судьбъ плантаціи.

Предвидя весеннее нашествіе жуковъ, многіе хозяева высѣваютъ двойную порцію сѣмянъ, вмѣсто 1½—2 пудовъ з или 4 пуда на десятину, такъ, чтобы и жуку хватило, да и хозяину осталось-бы. Помимо двойной затраты на сѣмена, такой пріємъ невыгоденъ еще и въ другихъ отношеніяхъз въ мѣстахъ, не тронутыхъ жукомъ, всходы растутъ слишкомъ густо, тѣсня другъ друга и туго поэтому развиваются, тамъже, гдѣ они подверглись нападенію, могутъ все-таки образоваться сплошныя проплъшины, требующія подсѣва или вторичнаго пересѣва.

Если посъвъ основательно мъстами изръженъ, требуется нодсъвъ, а ежели онъ сплошь изъъденъ—вторичный или даже третичный пересъвъ; тутъ сомнъній быть не можеть; но нътъ хуже тъхъ случаевъ, когда приходится колебаться, пересъвать или нътъ, оправится-ли поъденная свекла или захирьеть и пропадеть, тутъ все зависить оты погоды, главнымъ-же образомъ отъ дождей. Въ общемъ, конечно, отъ нересъвовъ, особенно позднихъ, во второй половинъ мая или даже въ понъ произведенныхъ, урожай свеклы получается меньше, чъмъ отъ своевременнаго посъва, но, по сообщеню А. А. Ребиндеръ, неръдки случаи, когда пересъвъ даетъ дучше результаты по сравненю съ поврежденными и оставленными на поправку участками первоначальнаго съва.

Такъ какъ жуки встръчаются на плантаціяхъ въ иные

годы въ большомъ количествъ довольно долго, то козяева медлять приступать къ прорывкъ свеклы, не взирая на то, что растеньица уже приспъли къ этой операціи и тъснять другъ друга; это обстоятельство тоже, слъдовательно, вліяеть задерживающимъ образомъ на ростъ свеклы.

Итакъ, резюмируя все сказанное, мы узнаемъ, что ущербъ, приносимый хозяевамъ весенней дъятельностью долгоносиковъ, заключается въ слъдующемъ:

- 1) въ стоимости лишняго, противъ нормальнаго, количества съмянъ, по 3—6 рублей на десятину,
- 2) въ стоимости съмянъ и работы по второму-третьему подсъву или пересъву, по 8—10 рублей на десятину за каждый пересъвъ,
- 3) въ потерѣ урожая по массѣ или въ ⁰/₀ сахаристости на задержанныхъ въ ростѣ или поздно пересѣянныхъ плантаціяхъ,
- 4) въ затратахъ на активную борьбу съ долгоносикомъ— ручной сборъ его и проведеніе ловчихъ канавъ по 7—10 руб. на десятину.

Въ виду того, что развите свеклы зависить главнымъ образомъ отъ характера почвы и метеорологическихъ условій даннаго льта, то усугубляющихъ, то ослабляющихъ вредное вліяніе долгоносика, очень трудно учесть, какой именно образом урожая свеклы надо отнести на долю свекольнаго долгоносика.

Теперь обратимся къ личинкамъ. Во второй главъ мы видъли, что онъ начинаютъ подъъдать корни и губить молоденькіе кустики едва достигнувъ 1½—2 млм. длины. На Марьиномъ хуторъ Шебекинскаго имънія, 24 мая 1900 года, во время прорывки находили много завядшихъ бурачковъ съ переъденными корешками. Конечно, если-бы этимъ дъло и ограничивалось, то бъда была-бы не велика—все равно массу кустиковъ приходится выдергивать; но дъло въ томъ, что личинки, оставаясь послъ прорывки въ землъ, сконцентрировываются по нъсколько штукъ у одного корня и, совмъстными усиліями, могутъ губить даже сильныя полувърослыя растенія. Чаще-же всего, попадаясь у одного силь-

наго корня въ количествъ 2-3 штукъ, личинки не губять, а только ослабляють растеніе и задерживають его рость. Личинки, повреждающія корни, оставляють послъ себя ранки въ видъ оснинъ темнаго цвъта. Вотъ что нишетъ по этому поводу Скржинскій: "Если достаточно развитой корень свеклы подвергся нападенію большого количества личинокъ, то онъ представляется покрытымъ оспинами по всей своей длинъ. Въ виду того, что личинки появляются ко времени достаточнаго развитія корневой системы свеклы, онъ только въ исключительныхъ сдучаяхъ могутъ вызвать гибель цълой плантаціи. Такіе случаи намъ приходилось наблюдать, и тогда на одномъ корив мы насчитывали свыше 20 личинокъ. Обыкновенно личинки, не вызывая полной гибели свеклы, лишь повреждають ее въ большей или меньшей степени, понижая иногда въ значительной степени качественно и количественно общій сборъ свеклы, ибо при нападеніи личинокъ на плантацію часть болье слабыхъ растеній погибаеть, остальныя-же растенія задерживаются въ своемъ развитіи и выработкъ сахара, въ чемъ можно удостовъриться по одному внъшнему виду плантаціи, ибо на такой плантаціи листья свеклы принимають желтую окраску и свекла представляется какъ-бы преждевременно созръвшею. (Наоборотъ, къ осени поврежденная свекла значительно запаздываетъ въ созрѣваніи и тогда она выдѣляедся изъ общаго фона зелеными пятнами)".

По моимъ наблюденіямъ, корни, поврежденные личинками долгоносиковъ, бывають обыкновенно съ обгрызанными верхушками и боковыми корешками. Разъ, въ Воронежской губ., мнѣ пришлось видѣть гибель плантаціи въ 30 десятинъ (погибло отъ 50 до 90% растеній), вслѣдствіе дѣятельности личинокъ на такомъ мѣстѣ, гдѣ никто того не ожидалъ. Весною жуковъ на этомъ участкѣ было немного, и ихъ рѣшили не собирать, такъ какъ прорѣживаніе ими всходовъ было малозамѣтно. Вначалѣ все обошлось благополучно, бураковъ осталось еще достаточно, но въ іюлѣ ботва стала внезапно вянуть; первыя-же раскопки указали причину явленія; концы корней были объѣдены, и взрослыя личинки долгоносика находились туть-же въ землѣ, рядомъ съ буракомъ.

Само собою разумъется, что учеть убытковъ, приносимыхъ дъятельностью личинокъ, не убивающихъ всей плантаціи, а только ослабляющихъ ростъ свеклы, еще труднъе, нежели оцънка поврежденій, производимыхъ самими жуками. Данышъ приводить въ своемъ третьемъ отчетъ слъдующія величины:

"Стоимость охраны свекловичнаго поля отъ весенняго нашествія жуковъ колеблется отъ 4 до 20 рублей на десятину. Высота стоимости и цълесообразность охраны зависять не только отъ количества жуковъ, но также въ значительной степени и отъ принятаго метода борьбы".

"Убытокъ, получаемый отъ поврежденія свеклы личинками, часто исчисляется въ 20°/₀ полнаго урожая свеклы и равенъ приблизительно 25 руб. на одну десятину, превышая такимъ образомъ, иногда, въ значительной степени стоимость охраны посъвовъ отъ жуковъ".

Если въ одномъ владъніи трудно опредълить, безъ особаго, подробнаго, научно обоснованнаго учета, размъры потерь въ хозяйствъ вслъдствіе дъятельности жуковъ долгоносиковъ и ихъ личинокъ, то тъмъ болъе затруднительно выразить цифрой всю сумму убытковъ, приносимыхъ плантаторамъ этимъ врагомъ во всемъ свекловичномъ районъ Европейской Россіи. (С. А. Мокржецкимъ 1) сдълана нижеслъдующая сводка за 9 лътъ о размърахъ посъвовъ, пересъвовъ и погибшихъ плантацій сахарныхъ заводовъ, входящихъ въ составъ Всероссійскаго Общества сахарозаводчиковъ.

Годы.	Посъяно весною.	Пересъяно.	Уничтожено и не пересъяно.
$189^{1}/_{2}$	284.162 дес.	14.290	10.948
189 ² /3	281.798 "	59.056	26.388
$189^{3}/_{4}$	313.503 "	27.749	11.170

¹⁾ С. Мокржецкій. Размъры потерь свекловичныхъ плантацій отъ насъкомыхъ п необходимость систематической борьбы съ ними. Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Южн. Рос. 1901. № 2, стр. 48—52.

землъ, рядо	Посвяно Т/Т	находились	Уничтожено и
Годы.	весною.	Пересъяно.	не пересъяно.
1894/5	308.668 дес.	13.288	4.944 OMBO
1895/6	317.100 "	10,547	2.315
1896/7	327.061 ,	17.126	5.590 instruction
1897/s	372.501 "	21.961	Harro 8.578 Non 1949
1898/9	408.539 "	62.952	7.226
1899	467.543 "		26.083 Rimory
Въ среднем	The HOLL OF THE STATE OF THE ST		dzo 10.771 noro Bi

"Изъ этой таблицы видно, пишетъ авторъ этой сводки, что, въ среднемъ, ежегодно совершенно пропадаетъ 10.771 лес, свекловичныхъ плантацій, а пересъвается ежегодно, въ среднемъ, 28.371 дес. Главиъйшею-же причиною гибели плантацій свекловицы и ихъ пересъвовъ являются вредныя насъкомыя. Безъ преувеличенія можно сказать, что эти 10.771 дес., оставшихся уничтоженными и не пересъянными, ежегодно погибають отъ вредныхъ насъкомыхъ (главнымъ образомъ-свекловичнаго долгоносика). Если считать, что десятина свекловичной плантаціи, въ среднемъ, даетъ всего 900 пудовъ свекловицы, при средней цѣнѣ пуда 10 коп., то ежегодный убытокъ опредълится въ 969.390 р. или, круглымъ счетомъ, въ милліонъ рублей. Въ нѣкоторые-же годы убытки отъ насъкомыхъ могуть достигать гораздо большихъ размъровъ. Такъ, напримъръ, въ 1899 году пропало 26.083 дес. плантацій свекловицы (5,5% первоначальнаго поства) и общая потеря свекловицы въ этомъ году опредълится въ 25.785.654 пуда, что при цънъ въ 10-12 коп. за пудъ, составить потерю въ 21/2—3 милліона рублей. Къ этимъ потерямъ слъдуетъ прибавить еще потерю, обусловленную уменьшеніемъ урожая уцълъвшей свекловицы, въ среднемъ, не меньше 1%, и потери отъ пересъвовъ, которые повторялись по два и по три раза и, какъ мы видъли выше, достигали, въ среднемъ, 28.371 десятины. Такимъ образомъ, ежегодный убытокъ отъ пересъвовъ опредълится, приблизительно, въ 500.000 руб. Но, какъ было выше сказано, часто пересъвають плантацію во второй и даже въ третій разъ, что въ большой мъръ увеличиваетъ послъднюю сумму". 1.004 ласт вой ласто "Сказаннымъ, однако, не исчерпываются убытки, причиняемые насъкомыми свекловичнымъ плантаціямъ, такъ какъ ежегодно землевладъльцы теряютъ значительныя суммы на сборъ жучковъ руками. Расходъ по сбору жучка обходится, въ среднемъ, около 5 рублей на десятину, а такъ какъ сборъ производится ежегодно на большей части плантацій, то легко себъ представить тъ громадныя затраты, какія ежегодно несутъ землевладъльцы на собираніе жучковъ по всему юго-западному краю. Въ 1899 году, расходы по сбору жучка исчисляются въ 2.000.000 р. Въ общемъ-же убытки, причиняемые насъкомыми (главнымъ образомъ долгоносикомъ) свекловичнымъ плантаціямъ, ежегодно достигаютъ нъсколькихъ милліоновъ рублей".

Эти разсчеты, какъ извъстно, касаются только части заводовъ, преимущественно юго-западнаго края; общій подсчеть по всему свеклосахарному району дасть еще болѣе внушительныя суммы.

Убъдившись на приведенныхъ примърахъ, какихъ громадныхъ размъровъ достигаютъ убытки хозяевъ вслъдствіе дъятельности свекольнаго долгоносика, интересно узнать исторію этого вопроса, всегда-ли это насъкомое было такимъ вреднымъ и откуда оно появилось и обрушилось на головы нлантаторовъ. Прежде всего необходимо замътить, что обыкновенный свекольный долгоносикъ—Cleonus punctiventris Germ., какъ одинъ изъ членовъ черноземно-степной фауны, имфетъ очень широкое распространеніе. Отъ степей Венгріи, Моравіи и Австріи онъ встръчается по всей южной Россіи и Сибири на востокъ до Дауріи. Я находиль его неръдко среди обширныхъ, цълинныхъ, никогда даже не кошенныхъ степей Старобъльскаго увзда Харьковской губерніи. Следовательно, онъ является непремъннымъ членомъ фауны всего свекловичнаго района, и предположение о массовомъ вторжении этого врага откуда-нибудь извив, отпадаеть само собою; это врагь мъстный, размножающійся въ каждомъ новомъ районъ или изолированномъ свекловичномъ хозяйствъ вполнъ самостоятельно. Обыкновенно бываеть такъ, что въ первые годы о долгоносикъ не слышно, на него не жалуются, но потомъ, по истеченіи періода времени, потребнаго для его массоваго размноженія, въ силу изм'єнившихся условій хозяйства, онъ обращается въ систематическаго вредителя свекловичныхъ плантацій. Какъ скоро совершается это превращеніе изъ невиннаго степного жучка въ могучаго паразита нашего хозяйства,сказать трудно, за отсутствіемъ своевременно собранныхъ надежныхъ данныхъ; но а prori уже можно сказать, что въ этомъ отношеніи большое вліяніе оказывають, помимо принятой системы хозяйства, природныя мъстныя условія-ночвенныя и климатическія, благопріятствующія или, наобороть, препятствующія усиленному размноженію долгоносиковъ. Такъ, несомивино, что тяжелыя, влажныя почвы неблагопріятны для долгоносиковъ, потому-что содъйствують развитію среди нихъ грибныхъ болбзней; слъдовательно, даже при одинаковыхъ почвенныхъ условіяхъ, въ съверной, бояве обильной влагою степной полосв долгоносикъ имветь менъе шансовъ размножаться въ массъ, нежели въ болъе южной, сухой. Центромъ развитія свеклосахарной промышленности является юго-западный край вообще, главнымъже образомъ Кіевская губернія, за которой слідують Подольская и Черниговская. Изъ Кіевской губерніи и раздались первыя жалобы на жука въ 1851—1852 годахъ. Въ 1855 г. профессоръ Петцольдъ разсказываетъ уже о плачевномъ состояніи свекловичныхъ полей въ Кіевской губ. и уноминаеть о томъ, что графъ Бобринскій назначиль премію въ 10.000 рублей за изобрътеніе върнаго средства противъ долгоносика. По его же поручение агрономъ Штосъ занялся изученіемъ образа жизни этого жука. Съ 60-хъ годовъ по настоящее время жалобы на опустошенія, производимыя долгоносикомъ уже не прекращаются, а раздаются изъ болъе и болъе общирнаго района, стионову акининамедиен котока.

Уже въ 1880 году Кеппенъ сообщать, что вредъ отъ свекольнаго долгоносика быть у насъ наблюдаемъ, кромв Кіевской губерніи, также въ Черниговской, Подольской, Харьковской и Воронежской. Въ 90-хъ годахъ прошлаго стольтія К. Линдеманъ 1) сообщаль о поврежденіяхъ въ Борисоглъб-

екомъ увздъ Тамбовской губ. Мнъ лично извъстны поврежденія въ Воронежскомъ, Бобровскомъ, Навловскомъ и Острогожскомъ увздахъ Воронежской губ., въ Бългородскомъ и Корочанскомъ увздахъ Курской губ. и въ Волчанскомъ— Харьковской. Постивъ въ 1895 году Дерюгинское имъніе Е. И. В. Государя Императора, Дмитріевскаго у. Орловской губерніи, я узнать, что на жука тамъ не жалуются. Равнымъ образомъ, не страдаеть, повидимому, отъ долгоносика и съверозападный районъ разведенія свекловицы—губерніи привислянскія.

Сказанное выше въ I главъ о Cleonus foveicollis заставляеть отнестись съ ибкоторой осторожностью къ существующему въ литературъ указанію о вредъ отъ Cl. punctiventris въ Самарской губ. (Линдеманъ).

Приступая къ свекловичнымъ посъвамъ на цълинахъ или кръпкихъ залежахъ, въ первое время вреда отъ долгоносика не замъчается-онъ несомнънно тамъ существуеть, но въ неэначительномъ количествъ. Размножению его помогаетъ скопленіе въ одномъ мъсть громадныхъ запасовъ вкусной ници для жуковъ и личинокъ въ видъ носъвовъ свекловицы, въ связи съ созданіемъ удобныхъ для откладки яицъ и развитія личинокъ условій рыхлости почвы. Послъ свеклы на томъ-же мъсть свють хльба, а затьмъ земля оставляется подъ паръ и залежь. При такой системъ, въ особенности въ началъ, когда земли еще много, очень мало обращается вниманія на тщательность культуры—обработку земли и уничтожение сорной растительности, вствдствие чего не только на самой плантаціи, но и на всъхъ прочихъ поляхъ создаются условія, благопріятныя для жука-рыхлая земля и обиліе нищи, такъ какъ среди сорныхъ травъ, одними изъ первыхъ появляются родственныя свеклъ растенія—лебеда (Atriplex) разныхъ видовъ и марь (Chenopodium). Мы знаемъ, что растительность парового поля, мягкой и крѣпкой залежи различна; на пашнъ, оставляемой подъ залежь, въ началъ появляется буйная сорная однолътняя растительность, постепенно смъняемая многолътними злаками, вмъсть съ чъмъ замъчается и уплотнение почвы. Ясно, что чъмъ ръже мы

будемъ везвращаться на одно и то-же мъсто съ посъвами свеклы, тъмъ съ меньшимъ количествомъ жуковъ мы встрътимся, такъ какъ, съ теченіемъ времени, созданныя когда-то благопріятныя для ихъ развитія условія уже успъли за это время утратиться.

Въ дъйствительности-же, разъ приступаютъ къ посъвамъ свеклы, то, желая получить возможно больше барыша, устанавливають весьма низкіе ствообороты—трехпольные (свекла, озимь, паръ-черный или занятой) или даже двухпольные, причемъ ежегодно треть или половина всъхъ полей заняты свеклой. Само собою разумъется, что при такихъ условіяхъ имъются на лицо всъ данныя для усиленнаго размноженія жуковъ-обиліе пищи, непосредственное сосъдство мъсть вывода съ новыми посъвами и рыхлость почвы. Къ этому надо присоединить еще одно замъчательное свойство хозяевъ-обращать вниманіе на вредителей своихъ полей и начинать борьбу съ ними только тогда, когда тъ совершенно одольють ихъ; это коренная ошибка, отъ которой, кажется, ии одинъ хозяинъ до сихъ поръ не излъчивался. Напали насъкомыя въ массъ — хозяева готовы на какія угодно жертвы-пишуть корреспонденціи, приглашають спеціалистовъ, сгоряча принимають тъ или другія мъры, и никакіе расходы ихъ не останавливають. Но воть гроза миновала, на слъдующій годъ насъкомыхъ мало и-все забыто, никто пальцемъ не шевельнетъ и гроша не дасть на борьбу съ ними. Вотъ это-то и есть величайшее заблуждение, источникъ массовыхъ размноженій вредителей. Надо бороться съ насткомыми пока ихъ мало, и тогда не придется нести милліонных затрат на борьбу ст ними вт масси. Конечно, въ настоящее время, когда свекловичные посъвы занимають громадныя пространства, цёлые уёзды, отношенія между жуками и плантаціями такъ запутаны, что усилія одного хозяина ничъмъ не помогуть дълу, такъ какъ, неръдко, посъвы одного владъльца поъдаются жуками, выведенными на поляхъ другого, но сказаннаго правила необходимо строго придерживаться въ изолированныхъ хозяйствахъ, повреждаемыхъ жуками собственной разводки.

Итакъ, въ разныхъ пунктахъ свекловичнаго района вредъ оть долгоносиковъ проявляется въ различной степени, въ зависимости отъ природныхъ условій, давности веденія хозяйства и всего его строя. Но и въ одной и той-же мъстности количество появляющихся долгоносиковъ и размъры наносимаго ими вреда сильно варьирують по отдъльнымъ годамъ; различаются годы массоваго нашествія жуковъ въ перемежку съ удачными для хозяевъ періодами, когда жуковъ бываеть очень мало. Аналогичныя явленія, наблюдаемыя во встхъ случаяхъ массоваго размноженія вредителей, обусловливаются удачнымъ или неблагопріятнымъ для жуковъ сочетаніемъ природныхъ и хозяйственныхъ условій—случится рядъ лътъ сухихъ, при удобномъ распредъленіи полей и отсутствій на нихъ споръ мюскардины—жуки благоденствуютъ, размножаются до невъроятныхъ размъровъ, и цълыми несмътными полчищами обрушиваются на плантаціи; при обратных в условіяхъ, какъ ни многочисленно было развивающееся въ землъ поколъніе личинокъ-оно почти на-чисто можетъ быть погублено грибнымъ паразитомъ, и на слъдующій годъ, вмъсто ожидаемыхъ полчищъ, мы будемъ встръчать на плантаціяхъ только единичные экземпляры.

Зная образъ жизни и характерные признаки здоровыхъ и больныхъ жуковъ, личинокъ и куколокъ, предусмотрительный хозяинъ всегда будетъ уже осенью знать, какого количества жуковъ слъдуетъ ожидать въ предстоящую весну; для этого стоитъ только произвести пробныя раскопки въ 2—3 мъстахъ на каждомъ полъ (См. главу VIII) и сдълать соотвътствующій учетъ степени заселенности плантаціи долгоносиками. Полученные результаты дадутъ возможность судить о размърахъ предстоящей борьбы и своевременно подготовиться къ ней. При этомъ, всегда надо соображаться съ состояніемъ не только своихъ, но и сосъднихъ плантацій, имъя въ виду большую въроятность появленія пъшихъ или лётныхъ жуковъ отъ сосъдей.

Въ Кіевской губерній годами массоваго размноженія жуковъ были—конецъ 60-хъ и средина 70-хъ годовъ.

Для примъра періодичности появленія и убыванія жу-

ковъ приведу данныя по Роевскому хутору, Шебекинскаго имънія Курской губерніи. Этоть хуторь арендуется владъльцами Шебекинскаго имънія въ теченіи 23 лътъ, и съ самаго начала на немъ начали культивировать свеклу. Въ теченіи первыхъ 10 лътъ бураки съялись по всей землъ безъ системы и безъ удобренія. Затъмъ, съ 1886 г. стали удобрять, причемъ первые 3 года подъ свеклой была 1/4 часть площади, а въ 1889 и 1890 годахъ-1/2 площади. Именно съ 1890 года и начались большіе расходы на пересъвы и сборъ жуковъ. Чтобы избавиться отъ жука, въ теченіи 3-хъ льть—1891, 92 и 93-го посъвы производились главнымъ образомъ на крестьянской землъ, снятой въ обмънъ на арендованную. Но это не спасло плантацій отъ размножившихся въ массъ жуковъ, которые перелетали на новыя мъста. Въ 1891 году жуковъ было уже больше, чъмъ въ предъидущемъ, а въ 1892 — появился лётный жукъ въ страшномъ количествъ.

Съ 1894 года перешли къ трехполью, съ озимью и занятымъ паромъ, какового съвооборота придерживаются и до сихъ поръ. Надо замътить, что жуки появлялись на плантаціяхъ уже съ начала 80-хъ годовъ, но на нихъ мало обращалось вниманія.

Итакъ: въ 1889 году жуковъ было немного.

1800

OK OTHER MISTER WILLIAM OR HELD OF THE WILL WIT	9MIN XOSAHAB BEEL MALVINE
994 "71891 од "П. ав "стариз»	еще больше.
ижися 1892 мин прознания и	страшное количество,
NOTE (CM. CABRY VIII) H CIE	лётныхъ. дивтрам в
п пінь т 1893 пт в пинека в пине п	меньше, тоже лётныхъ.
онже 1894 ту жего на жтап изм	въ теченіи 3-хъдней до-
астояней бород и своевреме	вольно много, но пошли
он этомъ, всегда надо соображат	
1895	

MHOPO

- , 1896 , порядочно—пъщихъ.
- " 1897 " " очень много (но менъе, чъмъ въ 1892 году) иъшихъ.
- , 1898 , него польше пъщихъ.

въ 1899 году жуковъ было очень много (но менѣе, чѣмъ въ 1898 году) — лётныхъ.

- " 1900 " " " менъе чъмъ въ 1899.
- " 1901 " " почти не было—до 90°/_е и болѣе погибли отъ мюскардины въ 1900 г.

Если жуки, по той или другой причинъ, размножившись на мъстъ или налетъвъ отъ сосъда, появились на плантаціи, необходимо стараться ихъ уничтожить, не взирая на большее или меньшее ихъ количество; когда они, кромъ того, грозять гибелью плантаціи, хозяину приходится всъми силами отстаивать свое добро—вести съ ними ожесточенную борьбу.

всь истребительныя мѣры, принимаемыя противъ долгоносика, можно раздълить на:

- 1) Механическія, каковы ловля пъшихъ жучковъ ловчими канавами и сборъ ихъ руками.
- 2) Химическія, заключающіяся въ опрыскиваніи молодой свеклы ядовитыми жидкостями для отравленія пофдающихъ ее взрослыхъ жуковъ.
- 3) Микологическія—им'ьющія цізью воспользоваться дізятельностью паразитирующих на долгоносикахъ грибковъ съ цізью искусственнаго развитія среди нихъ грибной эпидеміи.

Такъ какъ ни одинъ изъ указанныхъ методовъ борьбы не безусловенъ, то наилучшіе результаты могутъ быть получены только при разумномъ комбинированіи встахъ имъющихся въ нашемъ распоряженіи истребительныхъ мѣръ, причемъ такой комбинированный методъ можно назвать 4) раціональнымъ методомъ.

Разсмотримъ-же теперь каждый изъ этихъ методовъ въ

чъмъ-нибуль полобнымъ. Погониял сажень вновь вырывает.

мой канавы, въ Шебекинь, обходикся, възависимости отвол

з 1-31-0081 да минидаж ГЛАВА V.

Механическіе методы борьбы со свекольнымъ долгоносикомъ.

Къ механическимъ методамъ борьбы со свекольнымъ долгоносикомъ относятся, какъ мы видъли въ предыдущей главъ, ограждение бурачныхъ плантацій ловчими канавами и сборъ жуковъ руками.

Ловчія канавы роются вокругъ плантацій для прегражденія на нихъ доступа ползущимъ жукамъ. Онъ дълаются въ Кіевской губерніи, по Кеппену, 6—7 вершковъ глубины при ширинъ въ одну лопату. Въ Шебекинскомъ имъніи Курской губерніи канавы имъютъ 6—8 вершковъ глубины при ширинъ въ 6—8 вершковъ.

Объ стънки канавы дълаются отвъсными, что не такъ выгодно, или-же обращенная къ плантаціи роется наклонно, такъ, чтобы дно было шире верхняго поперечника канавы (обратный наклонъ этой стънки, по Кеппену, доходить иногда до 45°), что сильно затрудняеть жукамъ всползаніе по ней въ сторону плантаціи, въ то время какъ вертикальную ствику жуки, въ жаркую погоду, одолъвають сравнительно легко. Недостатокъ наклонной стънки-легкое осыпаніе края пласта, висящаго въ видъ навъса надъ канавой. Въ зависимости отъ распредъленія полей и принятаго съвооборота, ежегодно роются новыя канавы, или-же подновляются старыя, какъ напримъръ, въ томъ случаъ, если плантація даннаго года непосредственно прилегаеть къ бурачищу предъидущаго, не раздъляясь широкой дорогой, логомъ (оврагомъ), или чъмъ-нибудь подобнымъ. Погонная сажень вновь вырываемой канавы въ Шебекинъ обходится, въ зависимости отъ ширины и глубины, въ 3/4—11/4 копъйки, что составить на

версту отъ 3 р. 75 коп., до 6 р. 25 коп. Для огражденія ловчей канавой площади въ 100 десятинъ, при наивыгоднѣйшемъ соотношеніи между сторонами, т. е. при формъ квадрата со сторонами по 489 саженъ, всего слъдовательно, 1960 погонныхъ саженъ, потребуется минимальный расходъ въ 15—25 рублей.

При рыть в новой канавы, или при подновленіи осыпавшейся въ теченіе года старой, землю кладуть валикомъ на сторону плантаціи. На рисунк 14 вдали черн вется линія ловчей канавы, а по рис. 27 можно получить в врное представленіе о разм'врахъ канавы, въ которой рабочіе стоятъ и сидять въ ожиданіи того, что ихъ аппараты наполнятся жидкостью.

Жучки, бъгая по полямъ въ поискахъ за пищей, валятся въ ловчія канавы, гдѣ и ползають, пока не будуть собраны. Для большаго удобства сбора иногда, въ стънкахъ ловчей канавы дълаются, на нъкоторомъ разстояніи другь отъ друга, небольшія углубленія, въ нъсколько квадратныхъ вершковъ, куда, въ концъ концовъ, и собираются свалившіеся въ канаву долгоносики. Попавъ въ канаву, жучки, въ холодную погоду или въ затъненной канавъ, (имъющей направление съ О на W), сидять довольно смирно, притаившись гдъ-нибудь въ трещинъ или подъ глыбкой земли; при обратныхъже условіяхь они быстро б'вгають и отчаянно лізуть на стънки съ цълью выбраться вонъ; многимъ изъ нихъ это и удается, такъ какъ практически невозможно сдълать канаву на протяженіи многихъ версть съ абсолютно гладкими стънками; всегда гдъ-нибудь окажется трещинка, осыпь, останется неровность, вслъдствіе прохожденія края лопаты, корней и норокъ насъкомыхъ и т. п.; по этимъ-то, малъйшимъ выступамъ, впадинамъ и шероховатостямъ, при отвъсныхъ стънкахъ, жучки отлично цъпляются, и многимъ изъ нихъ удается благополучно добраться до верха. Поэтому нельзя ограничиваться однимъ проложеніемъ ловчихъ канавъ вокругъ плантаціи, а необходимо еще, сверхъ того, держать по всей линіи особыхъ дежурныхъ рабочихъ, на обязанности которыхъ лежитъ ходить вдоль своего участка

канавы и собирать жучковъ со дна и со стънокъ. При слабомъ ходъ долгоносика, одного рабочаго достаточно на протяжении 100—200 или даже болъе саженъ, но, съ другой стороны, практика показываетъ, что при дружномъ натискъ иъщаго жука, въ хорошую погоду, въ годы массоваго его появленія, рабочіе, разставленные очень тъсно вдоль канавы и снабженные въниками для сметанія всползающихъ на стънки долгоносиковъ, не усивають съ ними справляться многимъ изъ нихъ все-таки удается выбраться изъ канавъ.

Дъйствіе ловчихъ канавъ, какъ предохранителей идантацій оть нашествія жука, продолжается только до начала лётаразъ жукъ полетълъ, онъ опускается, гдъ ему вздумается; но значить-ли это, что съ момента лёта ловчія канавы теряють всякое свое значеніе и ихъ можно безнаказанно забросить? Отнюдь нътъ. Ловчая канава на всякой благоустроенной плантаціи доджна быть на лицо съ ранней весны до осени, какъ универсальная преграда и ловушка для всъхъ ползающихъ насъкомыхъ; въ началъ-какъ хорошая (хотя и не абсолютная) преграда для долгоносиковъ, затъмъ, послъ лёта-какъ ловушка для нихъ-же, номогающая ручному сбору жуковъ; кромъ долгоносиковъ, есть еще вредители, каковы напр., гусеницы луговаго мотылька (Eurycreon sticticalis). совиноголовки гаммы (Plusia gamma), могущія массами вторгнуться на плантацію и навредить не меньше долгоносика, къ чему плантаторы должны быть всегда подготовлены; и въ этихъ случаяхъ ловчія канавы оказывають существенную помощь.

Повчими канавами, какъ мы видъли выше, окружаются плантаціи даннаго года; если послъднія смежны съ пропьлогодними бурачищами, то этого достаточно, но если бурачище отдълено отъ посъва свеклы какимъ-нибудь полемъ, то, помимо прорытія новыхъ ловчихъ канавъ вокругъ
плантаціи, весьма полезно было-бы подновлять прошлогоднія
канавы вокругъ бурачищъ и перенести центръ тяжести
борьбы съ пъщимъ жукомъ на старыя бурачища, что вполнъ
гармонируетъ и съ прочими мърами истребленія долгоносиковъ (см. главу VIII). Дъйствительно, прошлогоднее бура-

чище является центромъ, откуда жуки расползаются весною во всъ стороны; естественнъе всего тамъ-же ихъ и улавливать, при первой попыткъ съ ихъ стороны выйти за предълы бурачища, что, во многихъ случаяхъ, въроятно, повліяетъ даже на уменьшение количества летучаго жука. Такой пріемъ не можеть обойтись слишкомъ дорого, ограничиваясь ничтожнымъ расходомъ на подновление имъющихся уже на лицо канавъ, между тъмъ, какъ польза отъ него можеть быть весьма существенная. Въ случат дружнаго хода птиаго жука, больше шансовъ не допустить его до плантаціи при двухъ преградахъ, нежели при одной; что вылъзеть изъ первой канавы вокругъ бурачища, можетъ быть поймано во второй, у самой плантаціи. Въ виду этого я усердно рекомендую хозяевамъ испробовать это видоизмъненіе метода борьбы съ долгоносикомъ при помощи ловчихъ канавъ и на основаніи личнаго опыта убъдиться въ его пригодности.

Ручной сборь. Какъ только жукъ появился на поляхъ, въ болъе или менъе замътномъ количествъ, его начинають собирать по ловчимъ канавамъ и на плантаціяхъ при помощи рабочихъ поденныхъ, подъ надзоромъ старостъ или объвздчиковъ, или-же работающих задъльно, и получающихъ опредъленную заранъе сумму за извъстное количество добытыхъ жучковъ. При усиленномъ ходъ жука, въ особенности-же во время и тотчасъ послъ лата его, когда приходится экстренно спасать поствы отъ налеттвинихъ враговъ, количество сборщиковъ увеличивается, и на поляхъ тогда видны цѣлыя арміи сборщиковъ жуковъ (рис. 14). Удобнъе всего употреблять для этой цели подростковъ, такъ какъ у нихъ зреніе острѣе и движенія гибче и быстрѣе, нежели у взрослыхъ. Въ Шебекинскомъ имъніи гг. Ребиндеръ, Курской губерніи, сборомъ жуковъ занимаются преимущественно молодыя дъвушки, подъ началомъ одного или нъсколькихъ десятниковъ. Сборщицы растягиваются фронтомъ поперекъ рядковъ, у одного изъ краевъ плантаціи, на разстояніи друхъ рядковъ одна отъ другой, а надемотрщикъ идетъ позади ряда или передъ фронтомъ, пятясь задомъ, и наблюдаеть за тъмъ, чтобы работницы піли ровно, внимательно высматривали-бы жуковъ и не лѣнились-бы нагибаться за ними. Весь этотъ фронтъ движется вдоль по направленію рядковъ, отъ одного края плантаціи до другого, причемъ одна сосѣдка отъ другой идеть на разстояніи 2-хъ рядковъ и одного междурядья Выстрота передвиженія зависить отъ количества жука—чѣмъ послѣдняго больше, тѣмъ вся шеренга движется медленнѣе, такъ какъ ежеминутно приходится нагибаться. Каждая сбор-



-фак стипна да из Рис. 14. Сборъ жуковъ на плантации по пладата изведа за

заве остръе и движения гибче и бистубе, вежели у варослыхы

щица вооружена жестяной или глиняной кружкой, бутылкой, молочнымъ горикомъ съ отбитымъ краемъ и т. п. сосудами, куда кладутся собираемые жучки. Но всъ эти приборы не совсъмъ практичны, такъ какъ приходится все время слъдить за жуками, чтобы они не вылъзали; споткнется-ли сборщица или опрокинетъ кружечку — работа пропадаетъ непроизводительно, такъ какъ много жуковъ расползается. Въ Рамонскомъ имъніи Е. И. В. Принцессы Ольденбургской, Воронежской губерніи, пойманных жучковъ бросають въ кружки, предварительно оторвавъ имъ голову. Во избъжаніе разныхъ случайностей, при каждой партіи сборщицъ состоить по одному, два или болѣе мальчиковъ съ ведрами, въ зависимости отъ величины партіи и количества жуковъ; эти мальчики обходять періодически всю шеренгу, а сборщицы ссыпають въ ихъ ведерки собранныхъ жуковъ изъ своихъ ручныхъ сосудовъ, послѣ чего жучконосы бъгутъ къ опредъленному пункту, гдѣ морять жуковъ, высыпають ихъ тамъ и возвращаются къ своей партіи съ пустыми ведерками.

Самымъ лучшимъ приборомъ для собиранія жуковь, не требующимъ частаго опоражниванія, является небольшой м'ьшокъ изъ плотной ткани, непроницаемой для жуковъ, у открытаго своего конца туго перевязанный веревкой, вокругъ отбитаго бутылочнаго горлышка съ частью расширенія бутылки; изъ матеріи должна выставляться только верхушка горлышка, все-же оно, вмъстъ съ раструбомъ бутылки, должно входить внутрь мѣшка. Жуки, бросаемые черезъ гордо, проваливаются внутрь м'вшка, откуда они не въ состояніи выльзть, такъ какъ тому мъшаетъ входящая въ мъщокъ часть бутылки. Преимущество этого приспособленія передъ простой бутылкой заключается въ быстротъ опоражниванія мъшкастоить только распустить затянутое отверстіе, вынуть горлышко и вывернуть мъщокъ, чтобы сразу-же освободить его оть жуковъ, изъ бутылки-же требуется продолжительное вытряхиваніе, да и разбить ее очень легко.

При задъльной платъ собранные жучки принимаются обыкновенно отъ сборщиковъ по объему, и промъряются какой-нибудь условной мърочкой, заключающей нъкоторое среднее, изъ опыта опредъленное количество жуковъ, считаемое за единицу. Въ Воронежской губерніи, въ имъніи Плотицыныхъ, платили въ 1895 году за сотню по 3 копъйки. Оба описанные метода сбора, поденно и издъльно, имъютъ свои недостатки, но, въ общемъ, на сторонъ поденнаго сбора имъется много преимуществъ. Пріемка жука по объему гораздо проще, не требуетъ такого надзора за сборщиками;

при массовомъ появленіи долгоносика сборъ обойдется в'вроятно даже дешевле и можеть быть произведенъ быстръе, такъ какъ въ виду предстоящаго заработка на плантаціи высыпеть цълая армія сборщиковъ; но, съ другой стороны, лишь только жука становится меньше и собирать его труднъе, сборщики работаютъ неохотно, поднимаютъ плату, или даже совершенно не приходять. Собирають они жуковъ торопливо, стараясь напасть на "жучиное" мъсто, лишь-бы скорфе и побольше набрать, не гоняясь за отдъльными экземплярами; другими словами, работа идеть неряппливо, жуки не выбираются на-чисто. Хозяинъ лишенъ возможности регулировать сборь, направлять партно на плантаціи, бъдныя жуками, потому что тотчасъ-же начинаются разныя неудовольствія и даже отказъ отъ работы. При этомъ способъ, кромъ того, необходимо заботиться о томъ, чтобы принятые жуки опять не попали какимъ-нибудь окольнымъ путемъ въ руки сборщиковъ и не были предъявлены втогорльныка, все-же, оно, вивств съ раструбомъ аткіно аж оприс

Сборъ жуковъ поденными, при наличности хорошато надзора, даетъ лучшіе результаты: поденнымъ рабочимъ спъшить некуда, ихъ можно провести и самымъ тихимъ шагомъ, и быстрымъ ходомъ по плантаціи, въ зависимости отъ
количества жука: выборка производится болѣе тщательная;
рабочіе нисколько не заинтересованы въ томъ, есть-ли жуки
на той плантаціи, куда ихъ перевели, или нѣтъ, почему
можно регулировать сборъ вполнѣ по своему усмотрѣнію.
Но, конечно, для того, чтобы работа шла дѣйствительно, какъ
стѣдуетъ, нужны опытные надсмотрщики, въ противномъже случаѣ сборщицы будуть только непроизводительно ходить по плантаціямъ, изрѣдка нагибаясь за жукомъ. Если
нѣтъ надежнаго надзирателя, то всѣ выгоды сбора поденными утрачиваются и лучше тогда переходить къ задѣльной платѣ.

Собранныхъ жучковъ необходимо уничтожить, лучше всего заваривая ихъ горячей водой. Въ Шебекинскомъ имъніи г. Ребиндеръ, для этой цъли ставится на камняхъ, гдъ-пи-будь въ центральномъ пунктъ между плантаціями, большой

чугунный котель, до половины или болъе наливаемый водой, подъ которымъ 2 мальчика весь день поддерживають легкій огонь (рис. 15). Жучконосы, приносящіе періодически отъ своихъ партій собранныхъ жучковъ, вываливають ихъ изъ ведерокъ въ котелъ съ горячей водой, гдъ насъкомыя и оканчивають свое существованіе.

Для того, чтобы имъть представление о необходимомъ количествъ сборщиковъ и стоимости работы по собиранию, при-



Рис. 15. Пріемка собранныхъ долгочосиковъ и завариваніе ихъ въ котлъ.

веду для примъра данныя за 1899 и 1900 годы по этой операціи въ Роевской экономіи Шебекинскаго имѣнія г. г. Ребиндеръ. Оба эти года велся, по моей просьбъ, точный учетъ числа сборщиковъ и количества собранныхъ жуковъ, въ 1900 году болѣе грубый—въ ведрахъ и ихъ доляхъ, а въ 1899 году болѣе точно: передъ вываливаніемъ собранныхъ жуковъ изъ ведерка въ котелъ съ кипяткомъ, для умерщвленія, количество жуковъ промърялось жестяной кружечкой, средняя емкость которой, на основаніи нъсколькихъ перечетовъ, была опредълена въ 630 штукъ.

Въдомость о сборахъ свекольнаго долгоносика въ Роевской экономіи въ 1899 и 1900 годахъ, на плантаціи въ 235 десятинъ.

IS H	OBE, BK. 1899 F. Machine	-coop-	Число собран- ныхъ жуковъ.	пацоом 1900 г.п Устхно	исло сбор- пицъ. Число ведеръ куковъ.
Ивсяць число.	Гдъ собирали жуковъ.	Число щицъ.	Число ныхъ	Гдъ собирали жуковъ.	Число пинуъ. Число пжуковъ
Апр.	ors, nd coorpanio, n	Seq.	на ока	nets coopingmonts nutra	порып.
8	По развилинамъ яра	9	3,100	MINTER WATER OF THE REAL	The Control
9	n ne njadupajoren je	54	9,300	gaunt, innerers inc	Man and Man
10	По довчимъ канавкамъ	83	11,500	irik ospon manatini	ami,
22		24)	6-ske mastranova pi	
23		7	7,100		
24		95	20,000	По ловчимъ канавкамъ	140
25					78 1/4
26	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	245	33,395	, , , , , , , ,	95 1/4
27	no nanabiano w na managam	366			239 1
	" "	378			150 3/4
28	יי יי יי	100			
29	n n n	440			
30	" " "	537	140,120		
Май.		1			20 1/
1	, , ,	597	224,440	" " " · · ·	33 1/4
2	n n	279	98,470	n n n	135 1
3	egoa aa guu geneaudgans	427	73,160	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	41 1/4
4	in flore, or strong	435	88,660	По канавкамъ и на плантац.	184 1
5	H. A. A. Rindka, O. alo	463	173,600	коноле, половоо, ал	175 11/2
6	просыбы конний уче	455	321,880	DOS STATE BOO .	171 1/4
1107	пленотуж азыннар	330	290,570	сборинновъ и кол	TODO
8	ST ES STATEL STATE	130	280,070	H-IMO701 Saltoo VI	1900 P
10	Dence a coopean heix bases	424		TENEDER PRINTERS OF BUSINESS	211 1
11	Chilidalay Rest quality	249	1 - 17 27 3 3 10	CONTROL BRANCHSTON, LIAN	126 1/2
-6	прсколекихе перед	17071	a ocuon	Concentration and American Street Conference	средня

= 11	1899 r. droowne	coop-	собран- жуковъ.	м с ог эпагоо онт отр 1900 г.	-dogo	ведеръ
Мѣсяць число.	Гдъ собирали жуковъ.	Число щицъ.	Число ныхъ з	Гдь собирали жуковъ.	Число пинцъ.	Число жуковъ
Май.	one, a caunt ayer c	MONE	HOTEOR androa	зъ среднемъ по 485	d0(II.
12	По канавкамъ и на плантаціяхъ.	234	178,760	По канавкамъ и на плангаціяхъ.	243	2
13	d on aboragozaga	385	290,160	18 H S MAN, HA O HI	235	21/2
14	o" ara "vanarasa" an	356	218,420	THE MENTAL SECTION AS A SECTION OF THE SECTION OF T	115	1 2
15	THE DE BOTTO RET	258	173,400	TON S. D. SM K. S.	417	41/2
16	iai comania i pa	brie	NE STATE	n white	276	3
17	oro eronyocer coops	469	417,880	Managu nianosegaoM	329	4
18	na uproje e ar arq Na mara Quantana	210	313,000	в десятинь, въ юго-в	Bar I	
19	46 K 160 9 pr 98 un	7 7	and A	MOH OF THOME	425	4
20	", CERTIFICATION TO THE PARTY	551	173,600	MORTH OTE PELS.	431	$4^{1/}_{2}$
21	Thur, 410 Br. 1893 P.	70	13,500	npenkaymen rass	376	$3^{1/}_{2}$
22	Сборъ прекращенъ.	II ADY	OHI ATIA	e-orocha daoayas ago	102	1/4
23	n mainetarbn orași	oogle	anzod	HOHA DYOJEH.	146	1/2
24	and as orden man	hon	naPyr.	HOCIMORD, SRASTCATO	162	1/2
25	по собрано 8421/4 пу	ad vi	P. Roft	rpi osar as ov, no	150	1/2
26	oquanizacie aronofia	RIZ	08° or 0	h, sakhoyabunkh ok	121	7E1/4
27	дихван възводства оп	HOM	oqu oʻrr	чной сборь жуковь — То самаго послълы	92	1/8
-110	eganer sennoff g blich	Huer	,संशाम	травленія долгоносе	da)	OT
	BOE HTOOM Beero. Od at	8560 4	1,148,725	HOMY RI Beero, A. H.	5398	417/8
	HXP BOSMONHOCLP BE	HOLE	TORY CE	овь до предъловь,	CHE	H

На сборъ жуковъ, на плантаціи въ 235 десятинъ, въ Роевской экономіи, въ 1899 году было потрачено 8560 рабочихъ дней (однъхъ сборщицъ и мальчиковъ жучконосовъ), что обошлось въ общей сложности, считая плату поденнымъ, ихъ харчи, стоимость надзора и прочіе накладные расходы, въ 2.204 р. 87 к. Заработная плата колебалась отъ 5 до 40 коп въ день, на хозяйскихъ харчахъ. За это время было учтено около 4.200.000 собранныхъ жуковъ (въ дъйствительности

въроятно больше, до 5 милліоновъ). Выводя среднія величины, мы получимъ, что средняя стоимость 1 рабочаго дня по сбору жуковъ равнялась въ 1899 году 25,7 коп. (въ 1900 г.—24,9 коп.), причемъ въ одинъ рабочій день собиралось въ среднемъ по 485 долгоносиковъ, а одинъ жукъ обошелся на кругъ по 0,053 копъйки, что составитъ по 5,3 копъйки ва сотню. Въ наиболъе богатые жуками дни, каковы были 18 и 8 мая, на одного рабочаго приходилось по 1.538 и 2.154 штуки жуковъ въ день.

Операція сбора жуковъ обощлась на десятину, въ среднемъ, по 9 р. 38 к. въ 1899 году, и по 5 р. 70 к. въ 1900 году.

С. Мокржецкій принимаеть среднюю стоимость сбора жуковь на десятинь, въ юго-западномъ крав, въ 5 рублей. Калитаевъ 1) даеть для Звенигородскаго увзда Кіевской губерніи болье высокую норму, оть 7 р. 46 к. до 9 р. 98 к., възависимости оть года.

Въ предыдущей главъ мы уже видъли, что въ 1899 году на сборъ жуковъ въ юго-западномъ краѣ израсходовано было 2 милліона рублей.

Классическимъ примъромъ массоваго появленія и лова долгоносиковъ, является случай, имъвшій мъсто въ Смълъ, Кіевской губ., въ 1880 году, когда было собрано $842^{1}/_{2}$ пуда жуковъ, заключавшихъ около 80 милліоновъ экземпляровъ.

Ручной сборъ жуковъ—на плантаціяхъ и въ ловчихъ канавахъ—до самаго послѣдняго времени, до производства опытовъ отравленія долгоносиковъ, былъ единственной дѣйствительной мѣрой для уменьшенія производительности долгоносиковъ до предѣловъ, допускающихъ возможность веденія свекловичнаго хозяйства; безъ него приходилось-бы періодически прекращать посѣвы, пока не вымрутъ жуки въ данной мѣстности, и потомъ снова за нихъ приниматься до вторичнаго массоваго размноженія жуковъ и т. д.

Если эта мъра такъ дъйствительна, то почему-же нельзя ограничиться однимъ тщательнымъ сборомъ жуковъ въ свя-

зи съ примъненіемъ ловчихъ канавъ; для чего-же нужны еще другія средства? Оказывается, что первому рѣшенію вопроса мъщаетъ цълый рядъ обстоятельствъ. Во первыхъ, при сборъ жуковъ вылавливаются далеко не всъ наличные экземпляры, а многимъ изъ нихъ удается спастись, что вполнъ понятно; одни могутъ сидъть, не шевелясь, около комьевъ, подъ листьями и т. п., другіе прямо-таки избъгнуть вниманія сборщиць. Въ теплую погоду, на ярко освъщенномъ полъ, при обиліи жука, сборщицы настолько устають, что у нихъ скоро притупляется внимание и онъ пропускаютъ многихъ жуковъ. Во вторыхъ-же, многіе жуки попадають въ руки сборщиць и уничтожаются, уже успъвь отложить яйца (впрочемъ, это общій недостатовъ всёхъ мёръ). Въ-третьихъ, самый актъ сбора жуковъ толпой народа на плантаціи, представляеть собою отрицательное явленіе для роста свеклы. Земля для свеклы должна быть по возможности рыхла, въ особенности въ верхнемъ ея слоъ, что имъетъ громадное значеніе для сохраненія влаги, а влага въ степной черноземной полосъ Россіи, можно сказать, все.

Собирая жуковъ, партіи сборщицъ, проходя по нѣскольку разъ на одномъ и томъ-же мѣстѣ, содѣйствуютъ уплотненію ерхняго слоя почвы, въ особенности, когда она немного влажна. Это весьма важное обстоятельство и не допускаетъ примѣненія сбора жуковъ въ наиболѣе необходимые и опасные для жизни плантаціи моменты— въ хорошую солнечную погоду, сразу наступившую послѣ ненастья. Наголодавшіеся жуки съ жадностью набрасываются на бураки и съѣдаютъ ихъ, а собирать жуковъ еще невозможно, пока верхній слой земли не просохъ; если сразу-же пустить партію сборщицъ, онѣ утрамбуютъвсю плантацію, чѣмъ принесуть значительный вредъ.

На это могуть возразить, что и опрыскиваніе инсектисидами тоже необходимо возобновлять послів дождя; но дівло въ томъ, что поливальщики пройдуть или пробідуть съ машиной быстро и только одинъ разъ, а сборщицамъ приходится проходить по одному місту по нівскольку разъ, нагибаться за жуками, топтаться, такъ сказать, на одномъ містів, что несравненно вредніве для почвы.

³⁾ Земледьліе, 1893 г. № 6—22.

глава VI.

Химическій методъ борьбы со свекольнымъ долгоносикомъ.

Химическій методъ борьбы со свекольнымъ долгоносикомъ можетъ примъняться съ двоякою цълью: 1) отпугиванія жуковъ отъ посъвовъ непріятно пахнущими и даже ядовитыми веществами и 2) истребленія жуковъ отравливаніемъ пищи. Такъ какъ испытанія обоихъ этихъ пріемовъ химическаго метода борьбы съ свекольными долгоносиками въ Россіи впервые произведены были мною, то я и опишу предварительно результаты своихъ изслъдованій, а затъмъ перейду къ изложенію средствъ, предложенныхъ и испытанныхъ другими.

Отпугиваніе жуковъ пахучими веществами.

Чаще всего для этой цъли рекомендуется керосина; въ смъси же съ спроуглеродомъ, дъйствіе его считалось а prorі неотразимымъ. Въ виду этого я испробовалъ въ 1896 году то и другое средство какъ на свекольныхъ долгоносикахъ, такъ и на разныхъ жукахъ изъ мелкихъ листогрызовъ (Psylliodes, Chaetocnema, Phyllotreta) и пришелъ къ окончательному убъжденію въ абсолютной непригодности ихъ примъненія съ означенной ивлью на открытомъ воздухв. Не вдаваясь въ подробности моихъ опытовъ, скажу только, что на опытныхъ площадкахъ разбрасывался сплошь или сыпался вдоль рядковъ песокъ, смоченный однимъ керосиномъ или съ прибавленіемъ къ нему съроуглерода; при этомъ оказалось, что даже въ самыхъ сильныхъ пропорціяхъ, на 1 ведро песку 1/12 часть ведра керосину и 32 унціи съроуглерода (1/2 объема керосина), пахучая смъсь оставалась безъ всякаго вліянія на насъкомыхъ. Неоднократно случалось видъть, какъ жучки, бъгавине по голому чернозему, сворачивали, безбоязненно

что несравненно вреднее для почвы

приближались къ пахучему песку, перебъгали полоску его поперекъ или продолжали путь вдоль нея, останавливались, ъли бураки, спаривались, перебъгали на сосъднюю полоску и т. п., однимъ словомъ вели себя такъ, какъ будто запахъ керосина и съроуглерода совсъмъ ихъ не касался.

Мы упоминаемъ здъсь объ этомъ и ему подобныхъ способахъ борьбы съ насъкомыми при помощи пахучихъ средствъ съ исключительной цълью предостеречь хозяевъ отъ всякихъ попытокъ въ этомъ направленіи, въ виду полной ихъ непроизводительности.

отравление жуковъ.

Отравленіе жуковь производится путемъ пульверизаціи любимой ихъ пищи — всходовъ свеклы — ядовитыми жидкостями, при помощи спеціальныхъ приборовъ съ особыми, мелкораспыляющими наконечниками, отчего растенія покрываются тончайшимъ слоемъ мелкой ядовитой пыли; жуки, поъвъ отравленныхъ всходовъ и введя ядъ въ пищеварительные органы, травятся и погибаютъ... Для этой цъли употребляютъ разныя соединенія мышьяка и хлористый барій. Изъ мышьяковыхъ соединеній мы разсмотримъ три, примънявшихся у насъ въ Россіи и давшихъ положительные результаты, а именно: швейнфуртскую зелень, бълый мышьякъ и джипсинъ.

І. Швейнфуртская, парижская или французская зелень имѣетъ видъ зеленаго мелкозернистаго порошка и представляетъ изъ себя соединеніе уксусно-мѣдной соли съ мышья-ковисто-мѣдной солью $C_2H_3O_2 > Cu+3 AsO_2 > Cu$. Получается она при смѣшеніи горячихъ растворовъ мышьяковистой кислоты (бѣлаго мышьяка) и уксусномѣдной соли; вмѣсто послѣдней, ради удешевленія производства, берется мѣдный купоросъ и къ продукту соединенія его съ мышьяковистой кислотой прибавляють необходимое количество уксусной кислоты. Въ обоихъ случаяхъ получаются микроскопическіе кристаллы различной величины, прекраснаго изумрудно-зеленаго цвѣта и тѣмъ болѣе темнаго, чѣмъ они крупнѣе.

Швейнфуртская зелень, какъ краска, употребляется частью въ чистомъ видъ, но чаще въ смъси съ другими веществами, какъ-то: гипсомъ, тяжелымъ шпатомъ, сърно-свинцовой или хромово-свинцовой солью, придающимъ ей самые разнообразные оттънки. Въ общемъ, чъмъ интенсивнъе и ярче цвътъ, т. е. чъмъ крупнъе кристаллы зелени, тъмъ ея достоинство какъ краски оцънивается выше; ядовитыя свойства зелени, т. е. количество заключающейся въ ней мышьяковистой кислоты въ данномъ случав не играеть никакой роли, составляя даже отрицательное ея качество. Совствы иныя требованія, однако, предъявляются къ швейнфуртской зелени, какъ къ инсектисиду-она должна быть, по возможности, ядовитье и мелкозернистве, т. е., другими словами, чъмъ меньше въ ней примъсей постороннихъ веществъ и чъмъ мельче ея кристаллы, тъмъ она болъе соотвътствуеть цъли. Все это необходимо принимать въ разсчеть при покупкъ, дабы не пріобръсти какой-нибудь фальсифицированной краски, фигурирующей на рынкъ подъ названіемъ швейнфуртской зелени, въ которую послъдняя входить неръдко въ самомъ ничтожномъ количествъ, а во вторыхъ, чтобы выбрать среди разныхъ сортовъ настоящей швейнфуртской зелени наиболъе подходящую марку, т. е. содержащую наибольшее кодичество мышьяковистой кислоты (58,6°/₆) и возможно мелкозернистую. Поэтому можно рекомендовать выписывать швейнфуртскую зелень только оть солидныхъ фирмъ или же, передъ покупкой партіи, опредълять степень пригодности присланнаго образца, какъ инсектисида. - ономожу вінаницооз вдоо жен

Для испытанія швейнфуртской зелени существуєть нъсколько пріемовъ, въ зависимости отъ цѣли такового.


-оп отрани Опредъленіе чистоты швейнфуртской зелени.

а) Испытаніе амміакомъ. Швейнфуртская зелень, не растворимая въ водъ, вполнъ растворяется въ амміакъ. Самый простой, поэтому, способъ узнать, насколько чиста наша зелень, это взять нъкоторое ея количество въ стеклянный сосудъ (лучше всего въ пробирку) и налить туда нашатырнаго спирту-тогда кристаллы зелени растворятся, окрасивъ

жидкость въ прекрасный синій цвъть, а постороннія примъси дадуть нерастворимый осадокъ. Зная въсъ испытуемаго количества зелени и въсъ высушеннаго осадка, можно опредълить % примъси. При этомъ надо помнить, что часть зелени иногда, осъдая на дно, нъкоторое время не растворяется; тогда надо хорошенько взболтать жидкость въ пробиркъ или помъщать осадокъ стеклянной палочкой, что часто способствуеть успъщному раствореню. Если осадокъ все-таки упорно образуется, то надо испробовать достаточноли амміака, для чего, давъ слою жидкости устояться, сливають часть ея и прибавляють свъжей порціи амміака; если количество осадка сразу послъ этого замътно не уменьшится, то это, безъ сомнънія, не зелень, а посторонняя примъсь, неръдко подбавляемая недобросовъстными дрогистами.

b) Микроскопическій анализг.

Разсматривая чистую швейнфуртскую зелень въ каплъ воды подъ микроскопомъ, при увеличеніи въ 300-400, мы увидимъ, что она состоитъ въ главной массъ изъ прекрасныхъ ярко-зеленыхъ шариковъ, то одиночныхъ, то неръдко по 2, по 3 и болѣе вмѣстѣ. Эти шарики кристаллическаго строенія, причемъ кристаллики Рис. 16. Видъ швейнфуртской зелени расположены вплотную другъ



подъ микроскопомъ.

около друга, группируясь вокругъ центра шарика съ радіально расположенными длинными осями, отчего шарикъ, при хорошемъ освъщеніи, имъеть какъ-бы лучистую структуру (рис. 16). Размъры одиночныхъ шариковъ бывають весьма различны и колеблются оть 0,008 млм. до 0,033 млм. въ діаметръ. Кромъ шариковъ, въ очень незначительномъ количествъ, попадаются мелкіе, прозрачные, плиткообразные кристаллы правильной системы, не окрашенные въ зеленый цвътъ. Зная это, можно однимъ микроскопическимъ изслъдованіемъ ръшить, имъемъ-ли мы чистую

швейнфуртскую зелень или съ примѣсью постороннихъ веществъ, которыя будутъ имѣть совершенно иную форму и окраску ¹). Надо замѣтить, однако, что зелень представляется въ формѣ шариковъ только въ своемъ обычномъ видѣ, такая, какою получають ее съ фабрики; растертая-же сухая или пропущенная черезъ краскотерку, она распадается на отдѣльные кристаллы, да и тѣ нерѣдко оказываются при этомъ разрушенными. Въ такомъ случаѣ поневолѣ приходится прибъгать къ испытанію при помощи амміака.

с) Испытаніе водой. Иногда подъ видомъ швейнфуртской зелени продается краска, состоящая изъ крахмала, съ примъсью какихъ-то зеленыхъ крупинокъ, ничего общаго съ настоящей зеленью не им'вющихъ, но придающихъ всей массъ окраску, близко подходящую подъ цвътъ швейнфуртской зелени. Подъ микроскопомъ зерна крахмала оказываются бълыми, прозрачными и концентрически полосатыми. Если на такую краску, насыпанную толстымъ слоемъ въ пробирку, налить воды, то, по мъръ прониканія послъдней въ глубь краски, смоченные слои сразу ръзко измъняють свой цвъть и сильно темнъють, въ то время, какъ настоящая швейнфуртская зелень при подобномъ опытв только слегка темнъеть, не измъняя окраски; кромъ того, черезъ нъкоторое время, впитывая въ себя воду, крахмальныя зерна сильно набухають, и въ такомъ видъ эта смоченная фальсифицированная краска даже простымъ глазомъ отличается своей ненормальной грубозернистостью и разсыи-

Бывали случаи присылки нѣкоторыми фабриками, вмѣсто інвейнфуртской зелени, не только фальсифицированныхъ красокъ зеленаго цвѣта, но даже какихъ-то совершенно черныхъ и сѣроватыхъ продуктовъ (тертый асфальтъ, мѣлъ съ углемъ и т. п.), безъ всякаго слѣда зелени, вѣроятно въ разсчетѣ на то, что они сойдутъ за зелень съ примѣсью угольнаго порошка, что требуется по циркуляру министер-

плиткообразные пристаплы правильной системы, не окращен-

ства финансовъ 1898 г. за № 22.358 для безпошлиннаго пропуска зелени въ Россію изъ за-границы. Такую грубую фальсификацію легко обнаружить, конечно, прямо на глазъ, не говоря уже про испытаніе нашатырнымъ спиртомъ и изслъдованіе подъ микроскопомъ. Швейнфуртская зелень съ примъсью 5% сажи или угля замътно темнъе чистой, но всеже сохраняеть явственно зеленый цвъть; для испытаніе того, не превышаеть-ли подмъсь законныхъ 5%, лучше всего обратиться къ помощи нашатырнаго спирта и вычислить % нерастворившейся и высушенной примъси къ количеству испытуемой денатурализованной зелени. Еще проче, но нъсколько грубъе можно узнать то-же при помощи воды, разболтавъ въ ней взвъшенное передъ испытаніемъ количество смъси; зелень осядеть, а угольный порошокъ всилываеть наверхъ, послъ чего его надо собрать, высущить и взвъсить. Въ томъ и другомъ случав въсъ угольнаго порошка, умноженный на 100 и раздъленный на въсъ взятой пробы зелени, даеть % подмъси. И и ималиоден Леновов во облаг

d) Опредъление количества мышьяка и свободной мышьяковистой кислоты въ швейнфурской зелени. Содержаніемъ мышьяка въ мышьяковистыхъ соединеніяхъ мъди обусловливается быстрота дъйствія употребляемаго инсектисида, а потому и степень его пригодности въ борьбъ съ насъкомыми; къ сожалънію, опредъленіе количества мышьяка въ швейнфуртской зелени не можеть быть сдълано столь просто, какъ испытаніе примъсей къ ней, такъ какъ для этой цъли необходимо знаніе химіи. Приведемъ здівсь способъ, рекомендуемый Гайвудомъ 1), по реферату П. А. Кашинскаго 2). "При анализъ веществъ, содержащихъ мышьякъ, содержаніе воды находится высушиваніемъ ихъ при 100° въ теченіе 12—15 часовъ; общее содержаніе мышьяковистаго ангидрида опредъляется по методу Thorn Smith (кипячение съ разведеннымъ растворомъ ѣдкаго натра и титрованіе іодомъ); опредѣленіе мъди производится титрованіемъ іода, выдъленнаго мъдной

¹⁾ Микроскопическій методъ изслъдованія швейнфуртской зелени впервые быль у насъ рекомендованъ И. М. Красильщикомъ.

^{1.} K. Haywoad. Journ, Americ-Chem. Soc. 22. 568-82 u 705-6.

²⁾ Журналь опытной агрономін, 1901, кн. 1, стр. 100—101.

солью изъ іодистаго калія въ уксуснокисломъ растворъ. Для опредъленія содержанія растворимой въ водъ мышьяковистой кислоты примъняется выщелачиваніе анализируемаго матеріала водой при комнатной температуръ, причемъ въ растворъ переходить нѣкоторое количество мѣди; послѣднее должно опредълить, и отвъчающее ему количество мышьяковистой кислоты вычесть изъ найденнаго". Знать, имъетсяли въ зелени свободная мышьяковистая кислота и въ какомъ количествъ, весьма важно, такъ какъ она вредно отражается на здоровьи пульверизируемыхъ растеній, въ особенности болъе нъжныхъ и чувствительныхъ къ ней, каковы многія плодовыя деревья. Бураки, даже самые молодые всходы ихъ, составляють счастливое исключеніе; они безъ всякаго вреда для себя переносять большія количества хорошей швейнфуртской зелени, такъ-что при ихъ пульверизировании вовсе не приходится съ такой щенетильностью отвъшивать порціи яда, какъ напр. въ томъ случав, когда мы имвемъ дъло съ яблоней, персиками и т. п. модиком во вторка динек

е) Опредъление степени крупнозернистости швейнфуртской зелени. Чъмъ мельче частицы зелени, тъмъ она удобнъе для нашей цъли, потому-что тъмъ дольше она не осъдаеть на дно резервуара съ ядовитой смъсью и тъмъ равномърнъе распредъляется на поверхности листвы обрызгиваемыхъ растеній и плотиве на ней держится. Идеаломъ въ этомъ отношеніи будеть зелень, пропущенная черезъ краскотерку, у которой шарики уже разрушены, но этоть способъ измельченія, къ сожальнію, не всегда пригодень; чаще, поэтому, приходится пользоваться натуральной, не тертой зеленью, и выбирать, при равности прочихъ условій, т. е. одинаковой степени ядовитости и чистоты, ту марку, которая окажется состоящей изъ шариковъ меньшихъ діаметровъ. При наличности микроскопа или даже сильной лупы, этотъ вопросъ разръщается простымъ сравненіемъ размъровъ шариковъ; не имъя-же микроскопа, можно судить о размърахъ шариковъ по цвъту чистой зелени-чъмъ она блъднъе, тъмъ и шарики мельче. Имъя всего одинъ образецъ зелени и желая узнать, будеть-ли онъ относиться къ крупно или мелкозерни-

стымъ сортамъ, надо измърить діаметръ шариковъ преобладающихъ размфровъ подъ микроскономъ при помощи окулярнаго микрометра. Послъдній представляеть собою стеклянную круглую пластинку, вставляемую въ окуляръ микроскопа, съ нанесенными на ней мелкими дъленіями, напримъръ въ 0,5 млм.; къ микрометрическимъ окулярамъ прилагается таблица, показывающая, чему должно равняться одно дъленіе микрометра, при разныхъ комбинаціяхъ объективовъ и окуляровъ, опредъленной системы микроскопа. Если, напримъръ, въ таблицъ сказано, что измърительный коэффицієнть при окулярX и объективY равень 0,02, то это значить, что число дъленій микрометренной скалы, занимаемое однимъ шарикомъ, разсматриваемымъ въ микроскопъ при этомъ именно увеличении, надо умножить на 0,02, для того чтобы узнать дъйствительные его размъры. Такъ, если, напримъръ, шарикъ занимаетъ 11/2 дъленія окулярнаго микрометра, то истинный его діаметръ будеть равенъ 1,5 × \times 0,02 = 0,03 миллиметра.

Для измельченія швейнфуртской зелени, если она куплена слишкомъ крупнозернистою, приходится прибъгать къ помощи краскотерки, раздробляющей характерные шарики зелени въ мелкіе обломки кристалловъ; при этомъ приходится подбавлять понемногу воды, чтобы ядовитый порошекъ не пылилъ въ воздухъ. Результаты получаются хорошіе, такъ какъ измельченный тончайшій порошекъ зелени дольше остается во взмученномъ состояніи въ водъ, не столь быстро, какъ до этой операціи, опускаясь на дно. Но операція пропусканія зелени черезъ краскотерку хороша при условіи прим'яненія ея вскор'я-же и гдіз-нибудь поблизостивъ саду, паркъ и т. п., но только не на плантаціяхъ противъ долгоносика. Дъйствительно, заготовленную краску приходится вести въ ведрахъ или боченкахъ за нъсколько версть на плантаціи, часть ея плещется по стінкамъ, подсыхаеть и пропадаеть напрасно; при открываніи сосуда съ краской на вътру для отмъриванія порціи, въ него наносится пыль и соръ. На основаніи личнаго опыта я уб'вдился, что пропусканіе зелени черезъ краскотерку, вносить въ работу

много осложненій и хлопоть, почему слъдуєть при покупкъ предвидъть уже это обстоятельство и выбирать зелень возможно мелкозернистъе.

Швейнфуртскую зелень можно выписывать черезъ оптовые склады аптекарскихъ товаровъ, напримъръ, Штоль и Шмитг), Русское Общество Торговли Аптекарскими Товарами 2), или черезъ представителей и агентовъ разныхъ фабрикъ и экспедиторскія конторы, каковы: Густавъ Сиверсъ 3), Н. М. Луниъ 4) и проч., или-же прямо изъ за границы, напр. въ Германіи отъ Гадеманъ и Ко и другихъ фабрикантовъ въ Швейнфуртъ, отъ Девріентъ въ Цвиккау, и др.

Заказывать надо непременно химически чистую швейнфуртскую зелень, марка 707. Стоимость таковой зелени колеблется отъ 12 р. до 13 р. за пудъ съ провозомъ въ Петербургъ, безъ пошлины. Съ пуда беруть по 4 р. 50 к. пошлины. Если зелень выписывается какъ инсектисидъ, то ее можно получить изъ за границы безпошлинно двоякимъ способомъ;

- Денатурализаціей ея углемъ, согласно циркуляру по таможенному въдомству 1898 года, за № 22358.
- 2) При посредствъ правительственныхъ учрежденій (Департамента Земледълія), спеціалистовъ Министерства Земледълія и Государственныхъ Имуществъ, земствъ и сельско-хозяйственныхъ обществъ, имъющихъ право выписки швейнфуртской зелени для сельскохозяйственныхъ цълей, безпошлинно и безъ прибавленія угля, каждый разъ по особому разръшенію Департамента Таможенныхъ Сборовъ, на основаніи заявленій поименованныхъ учрежденій о назначеніи и количествъ каждой выписываемой партіи (по примъчанію къ ст. 133 тамож. тарифа).

Второй способъ пріобрътенія зелени несравненно практичнъе перваго, такъ какъ примъсь угольнаго порощка, даже очень мелкаго, заставляеть все-таки пропускать зелень черезъ краскотерку, вслъдствіе того, что частички угля

сильно засоряють наконечники пульверизаторовь и вызывають большую трату времени на остановки для чистки приборовь въ самый разгаръ работы.

Въ 1901 году были сдѣланы въ Петербургѣ запросы о цѣнахъ на химически чистую швейнфуртскую зелень, марка 707, у нѣсколькихъ фирмъ, и наименьшую цѣну показала фирма Штоль и Шмитъ, а именно 12 р. въ С.-Петербургѣ. Многолѣтнія работы мои съ зеленью, выписанной именно отъ этой фирмы, равно какъ и кабинетныя испытанія всѣми способами показали превосходныя качества ея какъ инсектисида—чистоту и ядовидость.

Крипость смиси. Прежде чъмъ приступать къ отравленію кормящихъ растеній, необходимо выработать норму кръпости смъси ядовитой жидкости, что зависить: 1) отъ степени выносливости растеній и 2) стойкости насъкомыхъ противъ отравы. Въ данномъ случав первое условіе отпадаеть, такъ какъ бураки совершенно не страдають отъ швейнфуртской зелени-ихъ можно покрыть густымъ слоемъ смъси и никакого вреда отъ этого для нихъ не произойдетъ. Долгоносики-же отравляются не очень легко, почему чъмъ кръпче смъсь, тъмъ лучше. Здъсь, при выработкъ нормы приходится, поэтому, придерживаться минимальной нормы смъси, успъшно отравляющей жуковъ. Таковой нормой я могу признать 8 золотниковъ швейнфуртской зелени на 1 ведро воды или 1 фунть ея на 12 ведеръ воды. Конечно, при домашнихъ опытахъ и даже въ натуръ, жуки будуть отравляться и при меньшей кръпости смъси, въ 4-5 золотниковъ на ведро воды, но не такъ скоро, а намъ необходимо губить ихъ возможно быстръе, чтобы они не могли продолжать своей вредоносной дъятельности и не успъли-бы отложить лейки, а другой переденачиваеть куски, Посль этого жинк

Кромѣ зелени, надо прибавить въ воду около 8—10 золотниковъ свѣжегашеной въ тонкій порошокъ или разведенной въ видѣ молока извести. Известь приходится прибавлять для того, чтобы крупинки зелени плотнѣе приставали къ поверхности всходовъ, и чтобы по бѣловатому налету виднѣе было, которые рядки опрысканы, а которые еще нѣтъ.

¹⁾ С.-Петербургъ: Улица Гоголя (Малая Морская).

т) - Казанская ул. 12 и Харьковъ, Петровскій пер., № 6.

Васильевскій Островъ, Средній Проспектъ, № 1.

уто од асъ чтио Садовая 27-9. ован асоцор мионов обивающи

Кромъ того, известь отчасти помогаетъ зелени оставаться дольше во взмученномъ состояніи.

Известь надо брать свъжегащеную, для чего куски негашеной извести, сложенные на деревянномъ помостъ или на чистомъ, хорошо утолоченномъ мъстъ, поливаются водой изъ лейки до тъхъ поръ, пока они не начнутъ разсы-



Рис. 17. Гашеніе и просъваніе извести.

паться въ порошокъ. Одинъ рабочій поливаеть известь изъ лейки, а другой перелопачиваеть куски. Послѣ этого необходимо известь просѣять, что съ удобствомъ можно дѣлать слѣдующимъ образомъ (см. рис. 17 по моей фотографіи въ Шебекинѣ, Курской губ., въ 1899 году). Рядомъ съ кучей извести ставится перерѣзъ, на края его кладется палка, играющая роль катка, а на этомъ каткѣ рабочій перекатываеть взадъ и впередъ деревянную раму, съ натяну-

тымъ на нее мелкимъ мъднымъ ситомъ; другой рабочій накладываетъ въ раму порошкообразной свъжегашеной извести, проходящей сквозь сито внутрь переръза въ видъ чистой тончайшей известковой муки безъ примъси песчинокъ. Но окончаніи просъванія слъдуеть только плотнъе закрыть переръзъ, чтобы оградить порошокъ отъ засоренія.

Отмпривание зелени надо производить дома, въ закрытомъ помъщении, гдъ-нибудь въ нежиломъ сараъ, но только не на воздухъ на мъстъ работъ. Дъйствительно, мягкая порошкообразная зелень очень легко пылить, при мальйшемъ токъ воздуха поднимается и попадаеть въ глаза, въ роть, въ носъ рабочимъ. Поэтому лучше всего поступають такъ: опредъливъ, въ какомъ сосудъ будетъ разводиться смъсь, напр. въ бочкъ въ 12,20 ведеръ или просто въ самихъ ведрахъ, заготовляють дома въ бумажныхъ фунтикахъ соотвътствующія количества зелени; напр. для 12 ведеръ воды беруть порцію въ 1 фунть зелени и запаковывають ее въ бумагу. Чтобы не возиться съ постояннымъ развъшиваніемъ, лучше всего заготовить соотвътствующей величины мърочки, вмѣщающія соотвѣтствующія сосуду порціи зелени, и потомъ уже прямо отмъривать ими зелень и завертывать отдъльныя порціи въ бумажные фунтики. Еще безопаснъе нъсколько смочить зелень передъ отмъриваніемъ, тогда она совстмъ не будетъ пылить.

На мѣстѣ производства работъ вливаютъ въ бочку извѣстной емкости воду, всыпаютъ въ нее изъ бумажнаго фунтика соотвѣтствующее числу ведеръ воды отмѣренное количество зелени и быстро перемѣшиваютъ воду деревяннымъ весломъ или палкой. Затѣмъ можно поступать двояко, или всыпать туда особой мѣркой отмѣриваемую порошкообразную известь, привозимую на мѣсто работъ, или-же предварительно разводить ее въ особомъ перерѣзѣ въ водѣ и вливать въ бочку съ зеленью въ видѣ известковаго молока, процѣживая его при этомъ черезъ холстину. Такъ какъ черезъ нѣкоторое время, когда вода въ бочкѣ со смѣсью успокоится, зелень опустится на дно, то каждый разъ, передъ наполненіемъ пульверизаторовъ ядовитой жид-

костью, необходимо всю воду въ бочкъ хорошенько разболтать весломъ и вновь взмутить всю зелень съ известью.

Въ Шебекинъ, Курской губерніи, въ 1899—1900 гг. мы поступали нъсколько иначе (см. рис. 18 по моей фотографіи). Зелень отмъривалась дома жестяными кружечками мелкими порціями въ 7—10 золотниковъ (только на 1 ведро), и заверты-



Рис. 18. Приготовление смъси швейнфуртской зелени съ известью и водой на воличество велени и быстлинатимъщивлоть воду дереван-

валась въ бумажные фунтики, которые цълой партіей, въ ящикахъ, везлись на плантацію; туда-же отправлялся и ящикъ съ известью и съ жестяной мърочкой, тоже на 1 ведро. Для возки воды имълись 2 бочки, 1 погонщикъ и пара воловъ на каждую партію бабъ, готовившихъ смъсь и наполнявшихъ ею аппараты. Привезя воду, погонщикъ отпрягалъ воловъ, впрягаль ихъ въ другую, пустую бочку и вхаль съ нею обратно на ръчку и т. д. Одна баба наливаетъ воду изъ бочки

въ ведро, другая переливаетъ ее въ другое ведро, процъживая черезъ тряпку, третья береть фунтикъ съ зеленью и обрываетъ у него хвостикъ надъ самой поверхностью воды, всыпая зелень въ воду, четвертая въ это время мѣшаетъ воду въ ведръ палкой, а пятая всыпаетъ туда-же мърочку извести изъ ящика. Заготовивъ ведеръ 6—10 смъси, въ зависимости оть числа поливальщиковъ въ партіи, бабы ждуть ихъ прихода, когда и наполняють ихъ аппараты, предварительно взболтавъ смъсь въ каждомъ ведръ палкою. Когда ведра опорожнены и поливальщики тронулись въ путь, бабы готовять новый запась смъси. Работа идеть быстро и непрерывно. Хотя при бочкъ, для приготовленія смъси, справилось-бы и меньшее число рабочихъ рукъ, но онъ нужны въ моментъ наполненія аппаратовъ жидкостью, чтобы не было задержки поливальщиковъ.

Какими приборами и какъ производится отравление растеній швейнфуртской зеленью, мы узнаемъ нъсколько ниже, теперь-же намъ слъдуетъ познакомиться съ нъкоторыми другими ядовитыми веществами, пригодными для отравленія долгоносиковъ. Скажемъ только два слова о вліяніи на нихъ швейнфуртской зелени, какъ отравы.

Моими опытами отравленія долгоносиковъ при домашней культуръ, въ 1896 году, а также во время работъ по истребленію долгоносиковъ швейнфуртской зеленью въ Шебекинъ въ 1899-1900 годахъ, я неоднократно имълъ возможность убъдиться въ томъ, что отрава, взятая въ надлежащемъ количествъ, не менъе 5-6 золотниковъ на 1 ведро воды, губить жуковъ очень быстро, уже черезъ нъсколько часовъ. На хорошо политой утромъ плантаціи, послі объда можно находить уже мертвыхъ и въ значительной степени ослабъвшихъ жуковъ. Первые признаки отравленія заключаются въ понижении подвижности жуковъ; шагъ у нихъ становится неувъренный, появляются подергиванія въ ногахъ, потомъ настоящія судороги; жукъ валится на бокъ или на спину, лежить нъкоторое время, не имъя возможности двигаться, и, наконецъ, издыхаетъ. На второй-же день послѣ поливки, если жуковъ много, ихъ трупы встрѣчаются на плантаціяхъ буквально на каждомъ шагу.

Стоимость швейнфуртской зелени для однократнаго опрыскиванія десятины, при нормѣ 60 ведеръ на десятину смѣси и 1 фунта зелени на 12 ведеръ воды, при цѣнѣ 12 р. 50 к. за пудъ зелени, достигаетъ 1 р. 57 к.

П. Джипсинъ или мышьяковокислый свинецъ представляетъ изъ себя инсектисидъ, открытый впервые въ Америкъ химикомъ Моультономъ. Вотъ что пишетъ химикъ Смитъ по поводу этого инсектисида: "употребляемая для опрыскиванія мышьяковокислая соль свинца, собственно, не есть соль, составъ которой можетъ быть выраженъ одною формулою, а есть смъсь дву-свинцовыхъ и трехъ-свинцовыхъ мышьяковокислыхъ солей, причемъ относительное количество каждой соли зависитъ, главнымъ образомъ, отъ того, какая именно была взята растворимая соль свинца. На практикъ мышьяковокислая соль свинца, которую принято изображатъ формулой Ръз (AsO₄)₂, пригодная для опрыскиванія, изготовляется путемъ смъшенія продажныхъ уксуснокислаго свинца Ръ (С₂Н₃О₂)₂ зН₂О или азотнокислаго свинца—Ръ (NO₃)₂ съ мышьяковокислой солью натра—Nа₂HAsO₄ п (H₂O)".

Для того чтобы удачно приготовить мышьяковокислую соль свинца, необходимо точно соблюсти отношеніе между количествами растворимыхъ свинцовыхъ и мышьяковыхъ солей, иначе это можетъ повредить листвъ обрызгиваемыхъ растеній. А такъ какъ въ продажъ встръчаются соли свинца и мышьяка съ весьма непостояннымъ содержаніемъ окиси свинца (РьО) и мышьяковаго ангидрида (As₂O₅), между которыми реакція должна происходить по формуль:

пиннето понавет 3 PbO+As₂O₅=Pb₃ (AsO₄)₂, атпрохив онжом

то очевидно, что для того, чтобы реакція при изготовленіи мышьяковокислаго свинца шла правильно, необходимо каждый разъ химическимъ анализомъ опредълять относительное количество идущихъ въ дъло продажныхъ солей. Какъ это дълать и какимъ разсчетомъ руководиться, желающіе могуть узнать въ брошюръ "По вопросу о такъ называемомъ джипсини» (Изд. Департамента Земледълія 1902 г.), здъсь-

же мы приведемъ только для примъра эмпирически выведенныя соотношенія между количествами солей, употреблявшіяся въ Америкъ при изготовленіи джипсина съ практической цълью.

По формулѣ Моультона, до 1897 года, пока не выяснилась необходимость большей точности, на 29,93°/₀ мышьяковокислой соли натра брали 70.07°/₀ уксуснокислой соли свинца.

По рецепту энтомолога Фернальда, для изготовленія джипсина растворяють въ *деревянном* ведрѣ или *глиняном* (но только не металлическомъ) 11 унцій уксуснокислой соли свинца въ 4 квартахъ ¹) воды и въ другомъ ведрѣ 4 унцій мышьяковокислаго натра (50°/₀) въ 2 квартахъ воды. Когда обѣ эти соли вполнѣ растворились, то обѣ смѣси сливають въ бочку, содержащую 150 галлоновъ (56 ведеръ) воды; при этомъ происходитъ химическая реакція, причемъ мышьяковокислая соль свинца осаждается изъ раствора въ видѣ мелкаго бѣлаго порошка. Раствореніе солей идетъ быстрѣе въ горячей водѣ. Къ указанному количеству воды обыкновенно прибавляютъ отъ 2 до 4 квартъ гликозы. Для растенія безопаснѣе, если при составленіи джипсина будетъ нѣкоторый избытокъ уксуснокислаго свинца, нежели наобороть.

Что касается свойствъ джипсина, какъ инсектисида, то, по словамъ Фернальда, онъ оказался весьма дъйствительнымъ средствомъ противъ многихъ насъкомыхъ, не исключая даже такого стойкаго, какъ гусеницы непарнаю шелкомряда—Оспетіа dispar, не поддававшагося вліянію швейнфуртской зелени и другихъ отравъ. Благодаря своему удъльному въсу, равняющемуся всего 1,00668, въ то время, какъ удъльный въсъ французской зелени равенъ 3,42225, джипсинъ остается въ водъ во взмученномъ состояніи, не осаждаясь, значительно дольше зелени; вслъдствіе этого, при опрыскиваніи удается распредълять его болье равномърно по поверхности листьевъ. Бълый цвътъ соли является также преимуществомъ, ибо сразу видно, обрызганы-ли растенія или нътъ; кромъ того, слъдуетъ замътить, что этотъ инсекти-

1) 1 литръ раввиется 0,08 ведра.

^{1) 1} кварта равняется 0,92 ведра.

сидъ держится на листвъ гораздо дольше другихъ такогоже рода веществъ, употребляемыхъ въ настоящее время сътою-же цълью.

Что касается количества джипсина, потребнаго на 1 ведро воды при примъненіи его противъ свекольнаго долгоносика, то въ этомъ отношеніи необходимы еще опыты. С. Мокржецкій рекомендуеть брать 1 фунтъ джипсина и 1 фунтъ сахарной патоки на 8 ведеръ, что, при 60 ведрахъ смъси на десятину, дастъ расходъ 7¹/₂ фунтовъ джипсина и столькоже патоки.

ПІ. Мышьяковистая мѣдь съ известью рекомендуется ассистентомъ Даныша—Скржинскимъ въ качествѣ очень сильнаго яда для отравленія долгоносиковъ, настолько сильнаго, что примѣненіе его онъ полагаеть ограничить только бурачищемъ, гдѣ на ловчихъ полосахъ не будеть происходить многочисленныхъ ручныхъ работъ, какъ на самой плантаціи.

Для приготовленія этой отравы, по рецепту Скржинскаго, слѣдуеть: 1) прокипятить 1 пудь билаго мышьяка (As_2O_3) и 1 пудь соды (Na_2CO_3) сь 13 ведрами воды до полнаго растворенія (кипяченіе продолжается около 1 часа). Полученный мышьяковистый натрій надо слить въ бочку (A).

- 2) Растворить 1 пудъ сърнокислой мъди (мъднаго купороса) въ 8 ведрахъ воды и слить въ другую бочку (В).
- 3) Облить 1 пудъ негашеной извести 2—3 ведрами воды, отфильтровать, добавить къ фильтрату 2 пуда черной патоки (меласса) и слить въ третью бочку (С).

Приготовленные растворы сохраняются въ отдѣльныхъ бочкахъ. Во время употребленія растворы эти смѣшиваются въ аппаратѣ, предназначенномъ для распыленія отравы. При этомъ слѣдуетъ строго придерживаться нижеуказаннаго рецепта:

- 1) 8 ведеръ чистой воды.
- 2) 6 литровъ ¹) мъднаго купороса (изъ бочки В).
- 3) 1 литръ мышьяковистаго натра (изъ бочки А).

HETEL RESIDENCE TOTAL CONTRACTOR CHARLES CHARLES CHOOSE TOTAL HERORIES

1) 1 иварта равняется 0,92 ведра.

4) 5 литровъ извести съ патокой (изъ бочки С).

Удобнъе всего, чтобы аппаратъ (колесный) былъ снабженъ бочкой, вмъстимостью въ 27 ведеръ; въ такомъ случаъ слъдуетъ сразу приготовитъ раствора В въ шестъ разъ большемъ количествъ и раствора С въ пять разъ больше, нежели раствора А. Тогда въ бочку аппарата вольется:

24 ведра воды для ите на эжу милоно на данег,

18 литровъ раствора В Всего 3 ведра смъси (1 ведро равно 12,3 литра).

Для отравленія одной десятины посъва израсходуется приблизительно около 25 ведеръ смъси, на что потребуется:

онь не засоряеть наконечник идоо сы другу в стороны, это-же

отмытвідно по 7°1/5 мѣднаго купороса Бэткого зомко-

-агмэ эжвг он $7^1/_2$ код жил извести эн ажы ажь ажн жил жил

-вин и кінэтэв 15 облатон черной патоки. стованию воод квін

IV. Хлористый барій быль впервые рекомендовань противъ свекловичнаго долгоносика Моравекомъ въ 1896 году въ Австріи, а въ Россіи его предлагалъ въ 1898 году Мокржецкій. Съ тъхъ поръ этотъ инсектисидъ сталь довольно популяренъ среди плантаторовъ вследствіе своей яко-бы дешевизны и легкости въ обращеніи; есть, однако, нъкоторыя данныя предполагать, что слава этого инсектисида немного преувеличена. Во-первыхъ, вначалъ предполагалось возможнымъ отравлять жуковъ $2^{1}/2^{0}/_{0}$ растворомъ хлористаго барія, на что, по даннымъ г. Станкевича, на десятину требовалось по 15 фунтовъ хлористаго барія (21/2 фунта на 31/3 ведра воды, а на десятину 20 ведеръ раствора, что, по моему, слишкомъ мало, такъ какъ во время моихъ двухлътнихъ работъ въ Шебекинъ получался, въ среднемъ, расходъ по 60 ведеръ смъси на десятину). По даннымъ агронома А. Бурмейстера 1), "20/0 растворъ хлористаго барія (BaCl₂) оказался слишкомъ слабымъ, и даже при 30/0 растворъ бывали случаи выздоравливанія приболівшихъ жуковъ, но 40/0 растворъ сильно дъйствуеть, и на другой день планвію удовлетворяють спинные пульверизаторы извъстнаго

^{1) 1} литръ равняется 0,08 ведра.

⁽Сельскій Хозянъ. 1900 г. № 48, стр. 799.

таціи буквально были осыпаны мертвыми жуками, которыхъ на одномъ квадратномъ аршинѣ можно было часто найти по 8—15 штукъ. Жуки, которые приняли много отравы, умирали чрезъ нѣсколько минутъ, другіе черезъ нѣсколько часовъ, а приболѣвшіе кончались на другой и даже третій день, но къ свеклѣ уже въ эти дни больные жуки не прикасались". Скржинскій тоже указываеть, что жуки гибнуть отъ 4—5% раствора хлористаго барія и даетъ для 1 десятины норму въ 1 пудъ хлористаго барія, т. е. 4—4 р. 50 к. за одинъ инсектисидъ.

Хлористый барій легко растворимъ въ водь, вслъдствіе чего съ нимъ удобно обращаться при пульверизированіи— онъ не засоряеть наконечника; но, съ другой стороны, это-же самое обстоятельство оказывается весьма неблагопріятнымъ для хозяина, такъ какъ не только легкій дождь, но даже сильная роса смывають инсектисидъ до чиста съ растенія и низводять всю работу къ нулю. Кромъ того, неизвъстно еще, не окажеть-ли систематическое введеніе въ землю раствора ВаСІ, вреднаго вліянія на жизнь культурныхъ растеній?

Итакъ, принявъ во вниманіе все сказанное, придется придти къ тому заключенію, что хлористый барій, какъ инсектисидъ, обходится нисколько не дешевле, а върнъе даже дороже швейнфуртской зелени.

Для закрѣпленія хлористаго барія на листьяхъ полезно прибавлять на каждое ведро около 1 фунта патоки или-же вливать туда по 1 лоту канифоли, растворенной въ рюмкѣ крѣпкаго 90° спирта.

Опрыскиватели.

Опрыскивателей существуеть очень много разныхъ системъ, но далеко не всѣ они пригодны для свекловичной плантаціи; самое главное условіе, которому они должны отвѣчать — это легкость, такъ какъ приходится работать все время на ходу, не задерживаясь на одномъ мѣстѣ, какъ напр. при опрыскиваніи плодовыхъ деревъ. Этому условію удовлетворяють спинные пульверизаторы извѣстнаго типа "Есlair № 1" фирмы Vermorel и другіе, устроенные

въ такомъ-же родъ. Съ ними легко можно идти любымъ шагомъ вдоль рядка, но ихъ работа малопродуктивна, самое большее двъ десятины въ день. Вслъдствіе этого, въ случаъ необходимости быстро опрыскать большія площади поствовъ, приходится имъть въ своемъ распоряжении сразу большое количество аппаратовъ и нанимать много рабочихъ. Эта малая продуктивность работы спинныхъ опрыскивателей заставила обратиться за помощью къ опрыскивателямъ конной тяги, которые могли-бы пульверизировать по нъсколько рядовъ разомъ. Но и здъсь явилось препятствіе для примъненія существовавшихъ уже и превосходныхъ для садовъ, перевозимыхъ на колесахъ, опрыскивателей, каковъ, напримъръ "Сентинель" а именно: глубокая вспашка и рыхлость почвы свекольной плантаціи, недопускающіе примъненія тяжелыхъ платформъ и приборовъ. Пришлось создавать особые типы легкихъ конныхъ опрыскивателей, поставленныхъ на колеса съ очень широкими ободами, каковъ напр. ранъе всъхъ изобрѣтенный конный пульверизаторъ Вермореля (рис. 19).

Конные опрыскиватели.

1) Выочный пульверизаторъ Вермореля. Идеаломъ коннаго пульверизатора, разсуждая теоретически, долженъ былъ-бы считаться выочный пульверизаторъ Вермореля, который одбвается лошади на спину въ видѣ выочныхъ сумъ, со штангой, имѣющей 6 наконечниковъ, и потому хватаетъ сразу на 6 рядовъ. Стоимость такого выочнаго пульверизатора, по каталогу фирмы Vermorel Villefranche (Rhône), равняется 420 франкамъ (160 рублей). Въ этомъ пульверизаторѣ нѣтъ никакой лишней тяжести—ни телѣжки, ни колесъ, только то что нужно, одинъ аппаратъ.

По отзыву правительственнаго агронома въ Томской губерніи, г. Окулича, работавшаго въ 1901 году съ пульверизаторами многихъ типовъ, этотъ вьючный пульверизаторъ работаетъ безусловно хорошо, но очень легко подвергается поломкъ и требуетъ очень спокойныхъ лошадей—иначе работа становится невозможной. При заказъ аппарата надо указать, на какомъ животномъ предполагается работать—на

дошади, мулѣ, ослѣ, быкѣ, какой высоты достигають опрыскиваемыя растенія (это важно для виноградниковъ) и на какомъ разстояніи отстоять рядки одинъ отъ другого.

2) Конный рядовой пульверизаторъ Вермореля (Pulverisateur à traction animale, modèle Eclair, pour betteraves) рис. 19. Этотъ пульверизаторъ состоить изъ цилиндрическаго резервуара, сдѣланнаго изъ красной мѣди, емкостью въ 300 литровъ (24 ведра), покоющагося на металлической двуколесной телѣжкѣ. Колеса съ широкими плоскими ободами, приспо-



ОСЫ жатаныя Рис. 19. Конный пульверизаторъ Вермореля. — Утовытва -ин атин идотявиденный пульверизаторъ Вермореля. — Утовытва -ин атин идотявиденный пульверизаторъ Вермореля. — Утовытва

собленными для взды по рыхлымъ, глубоко обработаннымъ почвамъ свекловичныхъ плантацій и картофельныхъ полей. Ширина хода измѣняется по желанію, въ зависимости отъ разстоянія между рядами посѣвовъ. При движеніи телѣжки впередъ, вращеніе колесъ передается ихъ оси, соединенной съ насосами, помѣщающимися внутри мѣднаго цилиндра съ жидкостью, и автоматически приводящей своимъ вращеніемъ весь аппарать въ дѣйствіе. Задній ходъ колесъ оси не передается, она остается неподвижною и насосы не

дъйствують. Затъмъ есть особый рычагъ, разобщающій движенія оси съ насосами. Позади аппарата, на вертикальномъ стержив, укрвиляется винтомъ, на любой высотв, складная горизонтальная штанга, поддерживаемая еще кромъ того двумя металлическими, симметрично расположенными прутьями. Къ горизонтальной штангъ прикръпляется слабо натянутая гуттаперчевая трубка съ шестью распыляющими наконечниками системы Vermorel (см. ниже), укръпляемыми на горизонтальной штангъ другь отъ друга на такомъ разстояніи, какъ того требуеть ширина междурядій на плантаціи. Эта гуттаперчевая трубка съ наконечниками получаетъ ядовитую жидкость изъ цилиндра, подъ извъстнымъ давленіемъ, при помощи спеціальной питающей трубки. На рисункъ 19 горизонтальная штанга представлена въ развернутомъ видъ, причемъ концы ея замътно выступають за бока всего аппарата; во избъжаніе полома, по прекращеніи дъйствія аппарата, оба свободные конца горизонтальной штанги могуть подниматься вверхъ, такъ какъ сама штанга не сплошная, а въ двухъ мъстахъ имъетъ шарниры. Стоимость такого аппарата равняется на мъстъ, на фабрикъ Вермореля, 620 франкамъ (225 рублей).

3) Конный пульверизаторъ К. Плятца (Fahrbare Pflanzenspritze mit automatischem Antrieb D. R. G. M. № 121,928 и 123,220). Нъмецкая фирма Carl Platz въ Ludwigshafen a. Rhein занялась изготовленіемъ пульверизаторовъ разныхъ типовъ, напоминающихъ внъшнимъ видомъ аналогичные приборы Вермореля, но нъсколько иной конструкціи. Конный опрыскиватель этой фабрики также по виду напоминаетъ только-что описанный приборъ Вермореля, отличаясь отъ него инымъ укръпленіемъ горизонтальной штанги, приведеніемъ насоса въ дъйствіе особымъ рычагомъ, а не вращеніемъ колесъ, присутствіемъ манометра и сидінья для кучера на резервуаръ съ жидкостью. Плятцъ изготовляетъ конные аппараты двухъ типовъ — на 12 и 17 наконечниковъ. По даннымъ, сообщеннымъ Оренбургскимъ губернаторомъ за 1901 годъ, производительность этого прибора достигаеть въ лътній рабочій 10-ти часовой день 12 десятинь, или 11/5 десятины

въ часъ. По отзыву правительственнаго агронома по Томской губерніи г. Окулича, конный опрыскиватель завода К. Плятцъ, лучшій изъ бывшихъ на работахъ конныхъ опрыскивателей, но только дорогъ. Стоимость этихъ приборовъ по каталогу следующая:

	Съ 12 наконечникам	и. Съ 17 наконечниками
Аппарать съ желвзны		потавлеруя пертоп
резервуаромъ, безъ ма	the Vermouse (cmon	
метра	350 марокъ.	420 марокъ.
За мъдный резерву:	аръ вицини атехо	
добавляется	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	70 9 70 9

За подвижную горизонтальную штангу добавляется отундення да на За автоматическое дъйствіе прибора вращеніемъ


колесной оси добавляется.

Стоимость прибора въ наиболъе совершенномъ видъ 500 м. (250 р.). 570 м. (285 р.).

4) Пульверизаторг "Колорадо" (рис. 20), американской фабрикаціи, стоимостью около 230 рублей, по описанію агронома А. Бурмейстера 1), испытавшаго его въ дъйствіи въ Россіи при опытахъ истребленія свекольнаго долгоносика хлористымъ баріемъ, представляетъ собою самодѣйствующій приборъ для рядового опрыскиванія, насосъ котораго приводится въ дъйствіе вращеніемъ одного изъ колесъ повозки, на который пом'ящается бочка съ ядовитой жидкостью. Струя бьеть съ давленіемъ отъ 3 до 4 атмосферъ; маленькій манометръ показываетъ силу давленія, регулирующагося спеціально пристроеннымъ винтикомъ: при лишнемъ давленіи жидкость проходить черезъ вентиль и особую трубку обратно въ бочку. Трубки съ наконечниками для пульверизированія могуть быть переставляемы на любое разстояніе-на 7, 8 и apours of the respect of the second of the s

9 вершковъ; аппараты дълаются для одновременнаго опрыскиванія отъ 6 до 10 рядовъ. Ходъ колесъ тоже переставляется по желанію.

Для большей пригодности аппарата пришлось нижнюю резиновую трубку, проводящую жидкость изъ насоса къ наконечникамъ, замънить мъдной, и, кромъ того, пульверизирующіе наконечники (какой системы?), часто засорявшіеся и отказывавшіеся д'вйствовать, зам'внены были краниками



пульверизатора "Альвейлера", которые, если аккуратно пригнаны, весьма хорошо дъйствують 1). Анада амотыдава

Судя по рисунку, намъ кажется, что четырехколесный пульверизаторъ "Колорадо" слишкомъ громоздокъ и тяжелъ

¹⁾ Сельскій хозяинъ 1900 г. № 48, стр. 799.

¹⁾ Намъ кажется нъсколько страннымъ, почему наконечники какой-бы то ни было системы могли засоряться и не дъйствовать при употребленіи раствора хлористаго барія, безъ примъси постороннихъ веществъ въ родъ извести, могущей дъйствительно засорять наконечники; въдь пульверизированіе 40/0 растворомъ хлористаго барія равносильно пропусканію чрезъ аппаратъ чистой воды, Если при этомъ наблюдается засореніе наконечниковъ, то причину надо искать только въ загрязненіи воды, употребляемой для пульверизаціи, неаккуратности и отсутствіи фильтраціи при наполненіи бочки, но отнюдь не въ устройствъ наконечника. А-тиот ам проз ак миромог ответника

для примъненія его на глубоко-обработанныхъ почвахъ свекловичныхъ плантацій, тъмъ болье, что колеса его имъють слишкомъ узкій ободъ.

5) Креслообразный конный опрыскиватель, рекомендуемый торговымъ домомъ Б. Микульскаго въ Варшавъ (Зельная, № 19) для свекловичныхъ и другихъ плантацій, состоить изъ металлическаго резервуара, прикръпленнаго къ задней части деревяннаго ящика со спинкой, приспособленнаго для сидънья. По бокамъ ящика торчать двъ ручки, по одной справа и слъва, сидящія по концамъ пропущенной сквозь него подъ сидъньемъ горизонтальной оси (такъ что можно, по желанію, качать правой или лівой рукой) и приводящія приборъ въ дъйствіе. Кресло это ставится на простой возокъ или легкую платформу, у задняго края повозки такъ, чтобы сидящій на немъ работникъ приходился спиной въ сторону движенія; на передней части возка пом'єщается бочка съ водой, соединяющаяся съ опрыскивателемъ при помощи резиноваго рукава съ краномъ. Посредствомъ этого рукава жидкость попадаеть изъ бочки въ аппарать, снабженный всасывающенагнетательнымъ насосомъ, помощью котораго въ резервуаръ получается безъ особаго усилія очень сильное, до 10 атмосферъ, давленіе. Отъ резервуара идетъ длинный рукавъ, снабженный на концъ металлической трубки съ краномъ особымъ наконечникомъ, разсвивающимъ вверообразную струю мельчайшихъ капелекъ въ 3 сажени ширины. До начала работы аппарать накачивается ручками-рычагами при закрытомъ кранъ, послъ чего, достигнувъ необходимаго давленія, посл'ядній открывають, и дальн'яйшее регулированіе силы струи производится болбе сильнымъ или слабымъ качаніемъ насоса. Такъ какъ рабочій сидить на возу и тянеть струю ядовитой жидкости за собою, то ему не предстоить опасности пострадать отъ ядовитой жидкости.

Не зная этого аппарата въ дъйствіи, трудно, конечно, сказать, насколько онъ пригоденъ на практикъ; но если его наконечникъ дъйствительно распыляетъ струю въ три сажени ширины, всъ части насоса работаютъ исправно и не требуютъ частаго ремонта, да если къ тому-же резиновые рукава

замънить пеньковыми, то много шансовъ за то, что приборъ этотъ окажется весьма хорошимъ и удобнымъ, въ особенности для сплошныхъ опрыскиваній на твердыхъ земляхъ противъ саранчи, кобылки и т. п. Для пашенъ и, въ особенности, для свекловичныхъ плантацій онъ будеть, пожалуй, слишкомъ тяжелъ, имъя въ виду примъненіе его на простой повозкъ а не на спеціально облегченной; кромъ того приходится опасаться того, не слишкомъ-ли великъ будетъ расходъ жидкости и инсектисида при такомъ наконечникъ, не снабженномъ, судя по рисунку, циклоннымъ распылителемъ. Стоитъ этотъ опрыскиватель у Микульскаго въ Варшавъ 85 рублей.

Ручные опрыскиватели.

6) Эклеръ № 1 Вермореля (рис. 21 и 22) имѣетъ видъ спинного ранца изъ красной мѣди; одѣвается онъ на двухъ



Рис. 21. Пульверизаторъ Вермореля «Эклеръ № 1», одътый на спину.

плечевыхъ ремняхъ, изъ коихъ одинъ прикрѣпленъ наглухо, въ то время какъ другой снизу зацѣпляется помощью крючка за нижній ободокъ резервуара. Сперва руку продѣваютъ сквозь ремень съ постояннымъ скрѣпленіемъ, а затѣмъ другой ремень перекидывають черезъ плечо и зацыпляють внизу крюкомъ. Съ правой стороны резервуара (когда онъ одъть на спину), торчить горизонтально впередъ рычагъ, приводящій аппарать въ дыйствіе, а съ львой—гуттаперчевая трубка съ металлической штангой и наконечникомъ Вермореля на концъ. Сверху аппарата имъется по срединъ большое эллиптическое отверстіе, со вставляемой внутрь съткой, закрываемое крышкой, служащее для вливанія сквозь него ядовитой жидкости; неподалеку отъ этого большого отверстія имъется еще второе, маленькое, прикрываемое маленькой металлической крышечкой, которое приходится открывать для пропуска воздуха при быстромъ наполненіи аппарата жидкостью.

Устройство аппарата лучше всего видно на разръзъ (рис. 22). Большую часть аппарата занимаетъ полый ре-




Рис. 22. Спинной пульверизаторъ Вермореля «Эклеръ № 1» въ разръзъ.

зервуаръ R, съ металлическимъ дномъ A; внутри его возвышается полый внутри цилиндръ съ закрытымъ верхомъ P— резервуаръ нагнетательнаго аппарата. Весь нагнетательный механизмъ помъщается подъ дномъ большого резервуара и состоитъ изъ горизонтальной оси B, проходящей въ плоскости

вертикальнаго разръза по срединъ аппарата и имъющей направо, въ C, отъемную ручку (на рисункъ видно только ея основаніе). Качаніемъ этой рукоятки вверхъ и внизъ ось вращается и то поднимаеть, то опускаеть колънчато-изогнутую свою часть, съ которой соединенъ вертикальный стержень, ходящій вверхъ и внизъ, соотвътственно ходу колънчатой части оси. Этоть вертикальный стержень въ верхней своей части проходить сквозь центръ круглой резиновой діафрагмы D, которую онъ сжимаеть при помощи двухъ металлическихъ кружечковъ D" и D" (для того, чтобы стержень не продраль широкаго отверстія въ центръ резиноваго круга D). Надъ резиновымъ кругомъ устроенъ металлическій кружекъ E, соединяющій пространство между D и E отверстіями съ полостью резервуара R и полаго цилиндра P. Когда вертикальный стержень, при извъстномъ положеніи ручки, опускается внизъ, то онъ тянетъ за собою внизъ и резиновую діафрагму D, растягивая ее при этомъ и увеличивая тъмъ самымъ пространство между резиновой діафрагмой и металлическимъ кругомъ Е; отъ этого жидкость изъ резервуара течеть по особымъ отверстіямъ въ эту расширенную полость. При подъемъ стержня и діафрагмы жидкость, не могущая попасть обратно въ резервуаръ R, всл * дствіе присутствія резиноваго кружечка, прилегающаго къ отверстіямъ снизу, подъ напоромъ поднимающейся вверхъ резиновой діафрагмы нагнетается черезъ особое сито изъ дырочекъ, замыкаемыхъ съ резиновымъ кружечкомъ, налегающимъ сверху, въ наполненный воздухомъ цилиндръ P. При новомъ опускании стержня, жидкость изъ P не попадеть обратно подъ Е, такъ какъ, вслъдствіе образовавшагося давленія воздуха въ P, резиновый кружечекъ въ Gсамъ собою закроетъ отверстія и т. д. Значить, съ каждымъ опусканіемъ и поднятіемъ резиновой діафрагмы D (или, что тоже, съ каждымъ качаніемъ вверхъ и внизъ рукоятки аппарата) количество жидкости, а вмъстъ съ тъмъ и давленіе воздуха внутри аппарата P будеть увеличиваться, вслъдствіе чего жидкость стремится изъ P по жельзной трубк * R, на которую навинченъ резиновый рукавъ съ

металлической штангой, съ кранчикомъ при основании и распыляющимъ наконечникомъ на концъ. Передъ началомъ работы надо, при закрытомъ кранчикъ на штангъ резиноваго рукава, сдълать нъсколько движеній вверхъ и внизъручкой аппарата, для того, чтобы создать извъстное давленіе внутри Р-иначе струя не будеть выходить изъ него съ достаточной силой и не получится должнаго распыленія; только послѣ этого можно открывать кранчикъ и начинать пульверизацію. Качать ручку надо плавно, безъ судорожной торопливости, небольшими размахами, то учащая, то задерживая качаніе, въ зависимости отъ того, на какое разстояніе нужно подавать распыленную жидкость. Такъ, при опрыскиваніи высокихъ деревъ, когда на резиновый рукавъ одъвается удлиненная штанга, необходимо большое давленіе въ цилиндръ Р, для опрыскиванія-же свекловицы оно можеть быть очень не велико и трата силы на качаніе ручки прямо ничтожна, причемъ наконечники съ рукавомъ приходится держать внизъ.

Уходъ за аппаратомъ ограничивается промывкой его и смазкой, по два раза въ день, посредствомъ пера или маслянки, тъхъ мъсть оси В, въ которыхъ она вращается, соприкасаясь съ металлическими частями аппарата, т. е. въ 2 точкахъ ея опоры и въ мъстъ соединенія ея съ вертикальнымъ стержнемъ, т. е. въ самомъ изгибъ колъна оси. Для промыванія, которое необходимо производить ежедневно по окончаніи работь, достаточно налить въ аппаратъ чистой воды и прокачать ее насосомъ.

Чтобы осмотръть внутренность нагнетающаго аппарата или перемънить испортившуюся резиновую діафрагму, надо, положивъ аппарать на бокъ, снять съ оси рукоятку, отвинтить всъ 10 винтовъ, придерживающихъ кружечки площадки съ діафрагмой, и, не разбирая ни оси, ни площадки, вынуть сразу и ось, и металлическій кружокъ, и каучуковый дискъ со стержнемъ, идущимъ отъ оси. Дальнъйшій разборъ частей для перемъны каучуковыхъ клапановъ или діафрагмы понятенъ будеть каждому, имъющему въ рукахъ аппаратъ.

Дъйствіе аппаратовъ "Эклеръ № 1" во всѣхъ отношеніяхъ превосходно, что доказывается тѣмъ, что они ежегодно расходятся по виноградникамъ и плодовымъ садамъ Западной Европы и Россіи тысячами.

Недостаткомъ ихъ можно считать то обстоятельство, что ручка для накачиванія придѣлана къ аппарату съ правой, а не съ лѣвой стороны, вслѣдствіе чего рабочему приходится держать штангу съ наконечникомъ и направлять струю лѣвой рукой, что тяжело и не такъ удобно. Во вторыхъ, каучуковая трубка слишкомъ недолговѣчна — она скоро трескается и рвется; кромѣ того, ею нельзя пользоваться для пульверизированія нефтяными препаратами, напримѣръ керосиновой эмульсіей.

При опрыскиваніи плантаціи въ Шебекинъ, Курской губерніи, спинными аппаратами Вермореля и Фигаро, въ среднемъ получилась производительность работы въ 0,85—1 десятина въ рабочій день; по даннымъ, сообщеннымъ Оренбургскимъ губернаторомъ, ранцемъ Вермореля съ большимъ трудомъ достигаютъ сплошнаго опрыскиванія 2-хъ десятинъ въ день.

7) Ранецт "Фигаро". По внъшнему виду онъ совершенно похожъ на Эклеръ № 1 Вермореля, но отличается отъ него дъйствіемъ рычага при накачиваніи. У него нъть оси B (рис. 22), а ручка, которою качають, имветь точку опоры на переднемъ краю металлическаго обода аппарата, другойже конецъ ея непосредственно соединенъ съ вертикальнымъ стержнемъ, дъйствующимъ на резиновую діафрагму. Вслъдствіе такого эксцентричнаго положенія точки опоры рычага по отношенію къ вертикальной плоскости свченія аппарата, проходящей черезъ центръ его тяжести, при качаніи ручкой, аппарать неминуемо ерзаеть на спинъ у рабочаго и натираеть ее. Кромъ того, сами аппараты такъ плохо запаяны, что начинають течь чуть не со второго дня работы и требують постояннаго ремонта. Упоминаемъ объ Фигаро только для того, чтобы предостеречь хозяевъ отъ покупки ранцевъ этой системы, такъ какъ наши южные склады сельскохозяйственныхъ машинъ обильно снабжены ими. 8) Ранецъ "Илятца" (Platz'sche Ptlanzenspritze № 1 и 2). Удачнъе всъхъ утилизировалъ идею Вермореля о спинномъ пульверизаторъ въ видъ ранца Карлъ Плятцъ 1), создавъ дъйствительно хорошій, прочный и удобный аппарать, который грозить въ скоромъ времени вытеснить оригинальный приборъ Вермореля. Кромъ аккуратности выполненія работы, онъ лишенъ недостатковъ Эклера, а именно, ручка у него помъщена съ лъвой стороны, а рукавъ дълается не гуттаперчевый, скоро ломающійся, а очень прочный, пеньковый. Аппарать № 1, емкостью въ 16 литровъ, стоить на фабрикѣ 26 марокъ (12 р. 50 к.), а № 2, въ 14 литровъ-24 марки (11 р. 50 к.). киктфонскивающим при выд поства

9) Ранецъ "Austria" (патентованный опрыскиватель "Austria" системы Земледъльческаго Общества въ Вънъ. Патенть Ф. Нехвиле), предлагаемый фирмою Б. Микульскаго въ Варшавъ, Зельная 19, механизмомъ своимъ мало отличается отъ Эклеръ № 1 Вермореля, только ручка у него слъва, трубка-же каучуковая. Цъна за аппаратъ 16 рублей. трудомъ достигають силопивто опрысниваны 2-жь десятинъ

Наконечники.

Ко всъмъ перечисленнымъ аппаратамъ могутъ быть придъланы наконечники любого типа; здъсь мы разсмотримъ подробно только наконечникъ Вермореля, какъ безусловно наилучшій изъ всёхъ существующихъ, и упомянемъ о нъкоторыхъ другихъ. Главное требованіе, которому долженъ отвъчать хорошій наконечникъ, это возможность добиться распыленія выходящей изъ аппарата струи жидкости въ мельчайшую пыль, которая какъ туманъ садиласьбы на листву. Необходимо, чтобы жидкость только покрыла опрыскиваемыя растенія мелкой пылью, но отнюдь не стекала-бы съ нихъ въ видъ капель-это пойдеть уже во вредъ дълу, такъ какъ много яда смоется съ листвы и онъ распредълится по ней неравномърно. Такому требованію вполнъ удовлетворяетъ наконечникъ Вермореля (рис. 23 и 24). Къ металлической штангъ, соединенной съ рукавомъ пульверизатора, привинчивается центральная часть наконечника (рис. 23 а или рис. 24, фиг. 3), съ которою соединяется особой гайкой (4 на рис. 24) другой подвижной резервуаръ наконечника — a' (рис. 23) или 2 (рис. 24); къ этому подвижному резервуару привинчивается сверху крышечка съ отверстіемъ по срединъ, черезъ которую и выбивается струя жидкости, получающая въ моментъ выхода циклоноподобное вращение и разбивающаяся отъ этого въ мельчайшую ныль. Такихъ крышекъ прилагается при аппаратъ три, съ выходными отверстіями разныхъ діаметровъ; чёмъ меньше отверстіе, тъмъ тоньше идеть распыленіе. Жидкость идеть по внутреннему каналу центральной части наконечника



собранный. разобранномъ видъ.

Рис. 23. Наконечникъ Вермореля В Рис. 24. Наконечникъ Вермореля въ

(фиг. 3 рис. 24), откуда направляется подъ прямымъ угломъ налъво, въ часть 2 (рис. 24 или рис. 23 а'), причемъ ей приходится проходить черезъ небольшое отверстіе, сообщающее между собою внутреннія полости резервуаровъ а и а' (рис. 23). Попавъ въ а', струя должна снова сдълать ръзкій повороть на 90°, чтобы попасть въ отверстіе в (рис. 23). Дно резервуара а не сплошное, а подвижное и замыкается оно шлянкой стержня (рис. 24 фиг. 5), вставляемаго въ резервуаръ а сверху, послъ того какъ отвинтять крышечку (рис. 24 фиг. 1). Такъ какъ плоская шляпка стержня (фиг. 5) шире самаго тъла стержня, то онъ и держится въ резервуаръ а' краями этой шляпки, будучи распираемъ пружиной с (рис. 23), упирающейся въ а' и въ особую шляпочку (рис. 24

¹⁾ Rheinpfälzische Maschinen-und Metallwaaren-Fabrik Carl Platz, Ludwigshafen a/ Rhein, эконно онагноо анишых ахиниентейвсоходо

фиг. 6), навинчиваемую на другой конецъ стержня (фиг. 5). Благодаря пружинк \dot{b} c, дно резервуара a' плотно замыкается плоской шляпкой стержня и жидкость оттуда не вытекаеть. Если-же, что неръдко случается, наконечникъ засорится, т. е. въ резервуаръ а набыются песчинки, кусочки извести, и т. п., то стоитъ только нажать пальцемъ снизу на шляпку стержня, пружинка сожмется, широкая головка вдавливается внутрь а', отчего струя жидкости устремится черезъ отверстіе, которое шире тъла стержня, и быстрый потокъ вынесеть соринки наружу. Быстро продълавъ эту операцію нъсколько разъ, т. е. сжавъ пальцемъ пружинку и отпустивъ ее, удается, обыкновенно, въ достаточной степени, избавиться отъ засоренія и получить возможность работать дальше. Но если соринка застряла въ отверстіи между а и а, то приходится закрыть кранъ, отвинтить шляпку (рис. 24 фиг. 4) и, вынувъ часть 2 изъ части 3 рис. 24), осмотръть и прочистить это отверстіе.


Если плохо просъвають известь, если употребляють швейнфуртскую зелень въ смъси съ углемъ, не пропустивъ ее черезъ краскотерку, если не процъживаютъ воду или недостаточно чисто работають при наполнении аппаратовъ жидкостью, подобные случаи засариванія происходять сплошь да рядомъ. Если работають со спинными аппаратами и однимъ наконечникомъ, то это еще не составляетъ слишкомъ большой задержки — рабочій отстанеть, прочистить наконечникъ и пойдеть по своей полосъ побыстръе догонять товарищей; но крайне непріятно и невыгодно, если подобная исторія повторяется часто съ аппаратомъ коннымъ, работающимъ сразу на 6-17 наконечниковъ. Дъйствительно, разъ одинъ засорился, надо либо останавливать машину и заняться его очисткой, либо оставить соотвътствующій рядъ неотравленнымъ, а какъ то, такъ и другое невыгодно. Но вотъ машину остановили, наконечникъ прочистили и пустили дальше; черезъ минуту засоряется другой наконечникъ-опять та-же исторія и т. д. Отсюда выходить, что, работая аппаратами со многими наконечниками, необходимо соблюдать самую педантическую чистоту и аккуратность

при составленіи смѣси, или-же брать болѣе широкія отверстія наконечниковъ и мириться съ большимъ расходомъ инсектисида. При моихъ работахъ въ Шебекинѣ, я нашелъ, что, при пульверизированіи швейнфуртской зеленью съ известью, при тѣхъ упрощенныхъ пріемахъ составленія смѣси и наполненія аппаратовъ, которыми мы пользовались, менѣе 1 миллиметра невозможно было брать отверстія, потомучто даже и при этомъ діаметрѣ наконечники часто засорялись, но распылъ былъ хорошій. Рабочіе старались всегда навинтить крышечки съ болѣе крупными отверстіями, такъ-что пришлось отобрать всѣ эти крышки. При пульверизированіи растворами, каковъ напр. хлористый барій, а не смъсями (швейнфуртская зелень съ известью), конечно можно пользоваться болѣе мелкими отверстіями.

Для большей продуктивности сплошного опрыскиванія, напр. кронъ большихъ деревъ или сплощной стъны виноградниковъ, и т. п., существують двойные и тройные наконечники, имъющіе одинъ неподвижной резервуаръ а и 2 или 3 подвижныхъ, устроенныхъ какъ a', съ пружинками c, (рис. 23) или безъ нихъ. Для свеклы подобное устройство непригодно, потому что циклонъ даже одного отверстія слишкомъ широкъ для узкаго рядка бурачныхъ всходовъ-приходится держать штангу возможно ниже, чтобы конусъ не успълъ сильно раздаться въ стороны и даромъ не поливалъ земли. Если держать наконечникъ повыше, и притомъ не надъ самымъ рядкомъ, а посрединъ междурядья, такъ, чтобы, наобороть, конусь распыленія струи образовался шире и захватываль-бы уже не одинь, а два смежныхъ рядка, то на первый взглядъ получается большая экономія во времени и въ количествъ инсектисида, ровно въ 50%, но при этомъ само пульверизированіе пойдеть несравненно хуже-много будеть ограховъ, неопрысканныхъ мъстъ; дъйствительно, трудно держать наконечникъ на ходу, все время на одной опредъленной высоть; чуть онъ опустился-конусъ съузился и не хватилъ на оба рядка; человъкъ на ходу всегда немного раскачивается, отчего и конусъ смачиваеть не прямолинейную полосу, а зигзагообразную, причемъ то правый, то лѣвый рядокъ окажутся за его предѣлами, т. е. неопрысканными. Наибольшее-же препятствіе такому экономическому утилизированію времени и инсектисида создаєть вѣтерь, рѣдко когда отсутствующій на плантаціяхь; во время вѣтра, опрыскивая одинъ рядокъ, т. е. при низкомъ держаніи наконечника, и то приходится брать нѣсколько въ сторону вѣтра, чтобы жидкость попадала прямо на рядокъ, а не сносилась на междурядье, при высокомъ-же положеніи наконечника надъ землей, когда образуется широкій конусъ распыленія съ ослабленнымъ, конечно, поступательнымъ движеніемъ струи, даже слабый вѣтеръ совершенно срываетъ широкую часть конуса въ сторону и дѣлаетъ пульверизированіе немыслимымъ.

Желаніе съэкономить если не инсектисидъ, то, по крайней мъръ, рабочую силу, привело къ изобрътенію особой горизонтальной металлической штанги, отходящей отъ обыкновенной продольной, въ видъ буквы Т, причемъ на горизонтальной части этой буквы располагаются 2, 3, 4 обыкновенныхъ наконечника Вермореля, для одновременнаго опрыскиванія соотв'ятствующаго числа рядовъ. Эта тяжелая штанга прикръпляется къ поясу рабочаго и поддерживается ремнемъ, обнимающимъ шею сзади; для большаго давленія накачиваніе идеть объими руками одновременно при помощи двухъ ручекъ. Такой аппаратъ съ 2 наконечниками стоитъ 40 франковъ (объемъ Эклеръ № 1) и 45 франковъ—на 20 литровъ. Оригинальными аппаратами Вермореля такого типа я не работалъ, но думаю, что штанга, не поддерживаемая рукою, на ходьбъ будеть раскачиваться справа налъво и жидкость неровно поливать рядки. Но у меня есть опыть другого рода. Я заказаль въ Шебекинъ, въ мастерской, сдълать только-что описанное приспособление съ нъсколькими наконечниками для носки въ рукахъ, а не на поясъ и далъ на пробу нъсколькимъ рабочимъ. Оказалось, что вслъдствіе поперемъннаго засоренія то одного, то другого наконечника, работа шла въ результатъ медленние, нежели съ обыкновенной ординарной штангой, и мы вынуждены были отказаться отъ этого приспособленія. Очевидно, что имъ возможно пользоваться, какъ и при употребленіи конныхъ многорядныхъ опрыскивателей, только при условіи строжайшей аккуратности во время приготовленія смѣси, чистоты воды, и пользованія болѣе крупными нумерами отверстій; еще болѣе пригодны для этой цѣли растворы, а не смѣси.

Кромѣ наконечника Вермореля, мы упомянемъ еще о наконечникѣ "Сенека" (рис. 25) и "Калля" (рис. 26). Первый изъ нихъ, по отзыву Кичунова ¹), даетъ большое разнообразіе въ выходѣ струи, которая, смотря по желанію, можетъ быть и достаточно крупною и чрезвычайно мелкою, и при-






Рис. 25. Наконечникъ «Сенека».

Рис. 26. Наконечникъ «Калля».

томъ онъ отличается большою производительностью въ работъ. Наконечникъ "Calla" (рис. 26) имъетъ два отверстія подъ угломъ, изъ которыхъ выходятъ сразу двъ струи и разбиваются на мелкія брызги, вслъдствіе взаимнаго столкновенія.

Производство опрыскиванія.

Въ заключеніе опишу порядокъ производства работы, котораго мы держались, истребляя долгоносика швейнфуртской зеленью въ 1899—1900 годахъ, въ Шебекинскомъ имѣніи г.г. Ребиндеръ, Курской губерніи.

Выше было изложено, какимъ образомъ подавалась вода на плантаціи и готовилась смѣсь швейнфуртской зелени съ известью. На рисункъ 27 представленъ моментъ, когда аппараты наполняются ядовитой жидкостью: рабочіе садятся рядомъ на земляной валикъ, край плантаціи, опуская ноги въ

¹⁾ Н. И. Кичуновъ. Борьба съ вредителями въ садоводствъ посредствомъ опрыскиванія. Изд. 2, 1901 г.; тамъ-же описаны многія другія системы на-конечниковъ.

ловчую канавку; работницы открывають крышку аппарата, взбалтывають палкой смѣсь въ ведрѣ и выливають ее въ аппарать, снова закрывая послѣ этого крышку. Для того, чтобы ранець не такъ натиралъ спину (у насъ были преимущественно аппараты "Фигаро") и чтобы при наполненіи его жидкость не попадала на тѣло и одежду рабочаго, на спину подъ аппара-



Рис. 27. Наполненіе спинныхъ опрыскивателей Вермореля ядовитой жидкостью.

томъ подкладывались старые мѣшки, рогожные кули и т. п. дешевая, мягкая подкладка. Когда аппараты наполнены и рабочіе успѣли покурить, ихъ ставятъ рядомъ другъ съ другомъ, такъ, чтобы между двумя смежными рабочими былъ всегда одинъ рядокъ. Каждый рабочій поливаетъ правый отъ него рядокъ, такъ какъ наконечникъ у "Фигаро" держится правой рукой. Когда рабочіе займутъ свои мѣста, прежде чѣмъ пускаться въ путь вдоль рядовъ, они должны хорошенько взболтать жидкость въ пульверизаторѣ и за-

тъмъ уже, по командъ надемотрщика "впередъ", рабочіе, справа по одному, трогаются съ мъста, качаютъ ручку, открываютъ кранъ и начинаютъ поливку; сперва выступаетъ самый правый; когда онъ пройдетъ шаговъ пять, трогается съ мъста 2-й съ права; онъ уйдетъ впередъ на пять шаговъ—идетъ 3-й и т. д., пока вся шеренга не тронется въ




Рис. 28. Опрыскиваніе бурачныхъ плантацій швейнфуртской зеленью спинными пульверизаторами Вермореля.

путь, вытянувшись въ одну косую линію по направленію рядковъ (рис. 28). Пустить всѣхъ рабочихъ одной шеренгой невозможно—по узости междурядій они мѣшалибы другъ другу; да все равно равненіе быстро разстроилосьбы при первой-же остановкѣ одного изъ рабочихъ. При каждой партіи поливальщиковъ состояло по 1, 2 или 3 воспитанника Маріинской низшей сельскохозяйственной школы въ Шебекинѣ, въ качествѣ надсмотрщиковъ. На обязанности ихъ было наблюдать за правильнымъ держаніемъ наконеч-

ника пульверизатора, за тъмъ, чтобы жидкость не лилась мимо рядка, чтобы рабочіе періодически встряхивали ранцы для взбалтыванія осъдающей на дно зелени, чтобы не лънились останавливаться для прочистки наконечниковъ; приэтомъ у отстающихъ обыкновенно оставался для надзора одинъ изъ надсмотрщиковъ. При наполненіи аппаратовъ надо было смотръть, чтобы рабочіе не тратили понапрасну времени, не упирались-бы наконечникомъ въ землю и т. п.

Чтобы не грязнить аппаратовъ, во время объда ихъ ставили рядомъ такъ, чтобы наконечники торчали вверхъ, не касаясь земли. По окончаніи работъ воспитанники-же вели учеть числа рабочихъ, опрысканной площади плантаціи, расхода зелени и извести, отмъривали зелень по фунтикамъ для слъдующаго дня и т. п.

Вліяніе опрыскиванія.

Теперь на очередь выступаеть вопросъ, гдъ-же и когда лучше всего производить опрыскиваніе всходовъ свеклы для отравленія долгоносиковъ; но этотъ вопросъ будеть выяснень въ главъ VIII, здъсь-же я приведу только конкретный примъръ распредъленія работь по времени и ихъ результатовъ въ томъ-же Шебекинскомъ имъніи въ 1899 году.

 апрѣля, въ первые теплые дни, когда жуки пошли и могли начать свою дѣятельность, на участкѣ A всходовъ еще совсѣмъ не было, на B, F и B начали показываться, а на \mathcal{A} и E были уже довольно ровные. Поливка на участкахъ B и F, которые, за недостаткомъ инструментовъ (по случаю несвоевременнаго прибытія части ихъ), и можно было, только сперва отстаивать отъ жуковъ, началась съ 24 апрѣля. Только по минованіи надобности въ поливкѣ указанныхъ участковъ переходили на другіе— \mathcal{A} и E, и частью A, поливая въ концѣ мая, кромѣ того, мѣстами, и всходы подсѣвовъ въ расколъ и сплошныхъ пересѣвовъ.

Условія производства работ в 1899 г. Весна была ранняя, сухая и холодная. Первыхъ жуковъ видъли довольно рано, въ концъ марта, но до двадцатыхъ чиселъ апръля, вслъдствіе вътряной и холодной погоды, ходъ ихъбыль незначителенъ — они больше прятались подъ грудками, мало показываясь на поверхности земли. Съ двадцатаго апръля стали перепадать теплые дни, 27 же числа былъ первый, чисто лѣтній, жаркій день, послѣ чего тепло и засуха стояли цёлый мёсяцъ, что крайне неблагопріятно отражалось на развитіи бурачныхъ всходовъ, почти прекратившихъ ростъ и вызывавшихъ самыя тревожныя опасенія за свою судьбу. За означенный періодъ прошель 16 мая надъ Роевской экономіей ливень съ градомъ, побившимъ въ общей сложности до 30 десятинъ уцълъвшихъ отъ жука всходовъ и повымывавшій пересъвы на участкъ Б. Этотъ ливень все-таки придалъ силы буракамъ и они немного тронулись въ ростъ. Послъ ливня 16 мая прошель лишь небольшой дождикъ 19 числа и до самыхъ послъднихъ чиселъ этого мъсяца снова настали жары и засухи, сопровождавшіяся земляными бурями, побивавшими бураки перваго съва и всходы пересъвовъ.

На ряду съ такими крайне неблагопріятными условіями роста свеклы, жука, какъ это и ожидалось, было громадное количество. Ходъ его, нѣсколько задержанный вѣтрами и холодами первыхъ трехъ недѣль апрѣля, сталъ замѣтнѣе къ двадцатымъ числамъ, когда, на появлявшихся всходахъ на участкахъ *В* и *Г*, начали обнаруживаться производимыя

жуками поврежденія. Лишь 27 апръля, въ первый жаркій день, произошелъ первый же массовый лёть жука, послъ чего, до самыхъ послъднихъ чиселъ мая, его встръчали всюду по плантаціямъ, и въ громадномъ количествъ. Послъ того жуки летали еще нъсколько разъ въ наиболье жаркіе безвътряные дни, но далеко не въ такой массъ. О количествъ бывшаго на плантаціяхъ Роевской экономіи долгоносика можно судить изъ того, что за сборъ жуковъ съ 8 апръля по 25 мая на 235 десятинахъ плантаціи было заплачено 2,204 р. 87 к., причемъ было собрано болъе 4,200,000 штукъ, не считая погибшихъ отъ отравы.

Въ довершение всего, направление съва отъ E къ I' и оть B къ A, вызванное условіями рельефа мъстности (поля Γ и A ниже и влажнъе, нежели E и B, почему надо было начинать съвъ съ послъднихъ) тоже должно быть отнесено къ числу факторовъ, вліявшихъ въ дурную сторону на ходъ поврежденія плантацій жучкомъ. Дъйствительно, къ началу поврежденія, поля Е, Д и В, наиболье удаленныя отъ прошлогоднихъ бурачищъ, откуда ожидался жукъ, имъли наиболъе сильные и выравнявшеся всходы, въ то время, какъ на А, В и Г, куда жукъ прежде всего неизбъжно долженъ быль направиться, всходы только что начали появляться (на E и Γ) или же ихъ совсѣмъ даже еще не было (на A). На подобныхъ плантаціяхъ первые всходы побдаются первыми партіями жуковъ, которые при этомъ собираются; новые неокръпшіе всходы изъ лежавшихъ въ землъ съмянъ повдаются новыми партіями жуковъ и т. д.; кромв того, вслъдствіе недостатка корма на ближайшихъ поляхъ и обилія всходовъ на дальнихъ, жуки разбредаются и разлетаются въ поискахъ за нимъ по всей плантаціи. Условія будуть совершенно иными, если съвъ начинается отъ прошлогоднихъ бурачищъ, такъ сказать "отъ жука".

Резюмируя все сказанное относительно внѣшнихъ условій веденія борьбы съ жукомъ въ Роевской экономіи весною 1899 г., нельзя не признать ихъ безусловно неблагопріятными, а именно: полный почти застой въ ростѣ бураковъ вслѣдствіе засухъ въ самый важный съ точки зрѣнія опас-

ности отъ жука періодъ ихъ жизни; громадное количество жука и неблагопріятное распредѣленіе полей въ смыслѣ порядка появленія на нихъ всходовъ—все это, вмѣстѣ взятое, давало очень мало надеждъ на успѣхъ и невольно заставляло опасаться, что жукъ выйдетъ побѣдителемъ.

Результаты примъненія парижской зелени противъ свекольнаго долгоносика. Первый вопросъ, интересовавшій владъльца имънія и всю администрацію его-будутъ ли жуки дохнуть отъ парижской зелени или нътъ, разръшенъ безусловно въ положительном смыслъ. На второй же день послъ первой пробной поливки, ученики низшей школы, участвовавшіе въ работахъ по борьбъ съ долгоносикомъ, нашли нъсколько труповъ ихъ на политомъ участкъ. Съ тъхъ поръ, во все время работъ, проъзжавше мимо наиболъе удачнаго поля Б, прозваннаго даже воспитанниками "жучинымъ кладбищемъ", могли лично убъждаться въ дъйствительности испытываемаго вещества. Въ нъкоторыхъ случаяхъ на квадратной сажени насчитывалось до 16 труповъ жучковъ. Смерть наступала уже на второй день по отравленіи бураковъ. Конечно, далеко не всегда вліяніе опрыскиванія плантаціи на жуковъ было столь очевидно; иногда труповъ не находили на политомъ участкъ или встръчали очень мало, что объясняется разными причинами (но потомъ они иногда объявлялись, вымытые ливнемъ изъ-подъ грудокъ). от на вичот внотвании А зглодомни сущинов фила

Для того, чтобы издохнуть, жуки должны поъсть отравленныхъ листьевъ. Отсюда естественно возникаетъ вопросъ, чего можно ожидать отъ поливки бураковъ—придется ли, истребляя жуковъ отравленными всходами, обречь послъдніе на гибель и пересъвать обычнымъ порядкомъ, илиже можно будетъ удержать ихъ отъ пересъва, т. е., другими словами, будетъ ли эта мъра только истребительною или также и предохранительною? И этотъ второй вопросъ разръшенъ въ благопріятномъ смыслъ, а именно: своевременно и надлежащимъ образомъ политые участки удалосъ отстоять от пересъва, не взирая на обиліе жука и ихъ казавшуюся безнадежность.

а) Участокъ E быль сплошь полить 7, 8 и 10 мая и жуки стали дохнуть массами, такъ что съ 8 по 11 мая сбора ихъ въ его предълахъ совсъмъ не производили. Затъмъ, до 15 мая на этомъ полъ жука было меньше чъмъ на другихъ, съ 15 же снова набралось громадное количество, 18 мая вторично стали поливать участокъ Eи къ 20 числу жуки снова почти исчезли. Бураки на участкъ В, на площади, пощаженной градомъ и земляной бурей, устояли противъ жука и, къ концу мая, вышли, такъ сказать, изъ подъ его власти, не взирая на то, что съ A и B, послъ сплошнаго пересъва ихъ, жуки должны были переселиться на B. Участокъ B совсѣмъ не быль полить, на A-же, не взирая на то, что всходы получились ровные, жукъ напаль такъ дружно, что поъль ихъ въ два дня; когда бросились поливать-было уже поздно; поработавъ немного и отравивъ часть плантаціи, работу прекратили за явной ея непроизводительностью, эшей отвызывающие итронацетиято

в) Еще рельефиве оказалось вліяніе опрыскиванія, какъ предохранительной м'вры, на участк * Γ . Когда его начали впервые поливать 26 апрыля, отъ границы съ участкомъ Д, то онъ быль уже порядочно поврежденъ, такъ что казалось немыслимымъ ему устоятъ противъ дальнъйшихъ натисковъ жука. На плантаціяхъ Д и Е, еще почти свободныхъ отъ жука, напротивъ того, рядки выдълялись на фонъ плантаціи въ видъ зеленыхъ шнурковъ. Аппаратовъ тогда было еще мало, почему, когда дошла очередь до полосы участка Γ , смежной съ прошлогоднимъ бурачищемъ, то жукъ успълъ уже почти все на ней поъсть и 1 мая, на поливаемомъ пространствъ, одновременно же производился подсъвъ. Очевидно, что поливка 1 мая и 30 апръля, а въроятно и 29, была запоздалою. Съ 4 по 6 мая стали вторично поливать участокъ Γ отъ границы съ I, но полили всего 21 десятину изъ 35, оставивъ 14 смежныхъ съ бурачищемъ десятинъ, поливкой которыхъ опоздали въ первый разъ, не политыми; часть этихъ 14 десятинъ была пересъяна сплощь, часть же въ расколъ. Третій разъ участокъ Γ быль политъ уже сплощь, такъ какъ на 14 десятинахъ появились всходы, опледенной

На одномъ изъ угловъ плантаціи Γ , на смежной съ \mathcal{A} сторонѣ, остался порядочный треугольникъ не политымъ, вслѣдствіе того, что рядки идутъ не параллельно границѣ поля. Замѣчательно то, что треугольникъ этотъ былъ въ концѣ-концовъ сплошь поѣденъ жуками и его пришлось пересѣять.

Мало того, бураки на плантаціи \mathcal{A} къ половинѣ мая не только сравнялись съ растущими на Γ , почти обреченными, казалось, на гибель, но даже во многихъ пунктахъ оказались значительно хуже ихъ и были подсѣяны; на участкѣ E, самомъ старшемъ и лучшаго роста, обнаружены были даже сплошь поѣденныя мѣста, такъ что, по освобожденіи аппаратовъ съ участковъ E и Γ , произведена была однократная поливка на \mathcal{A} и E, съ 13 по 15 и съ 21 по 24 мая. Своевременно политая часть плантаціи Γ къ половинѣ мая настолько оправилась, что не была даже подсѣяна.

ваздъльны непведуга рапіональной борьбы. Поэтому недо-Итакъ, въ этой главъ мы познакомились съ разными инсектисидами, опрыскивателями, наконечниками, вообще съ техникой борьбы со свекольнымъ долгоносикомъ при помощи инсектисидовъ. Къ какому-же можемъ мы придти заключенію по вопросу о степени цізнесообразности химическаго метода борьбы? Это заключение весьма кратко и не-• оспоримо: химическій методъ борьбы -это основа всей борьбы, центрг тяжести всъхг нашихг мъропріятій противг долгоносика. Дъйствительно, за это говорить все: примънимость его въ самый разгаръ производимыхъ жукомъ опустошеній, когда хозяева болъе всего склонны проявлять энергію въ дълъ борьбы съ врагами, и когда необходимость защиты посввовъ очевидна даже каждому неграмотному плантатору; превосходство его передъ ручнымъ сборомъ въ томъ отношеніи, что, какъ показывають многольтніе опыты примъненія ручного сбора жуковъ, онъ не ограждаль вовсе плантацій отъ необходимости производить пересъвы по два и по три раза, между тъмъ своевременно и надлежащимъ образомъ отравленные посъвы спасаются отъ пересъвовъ; при надлежащемъ распредъленіи борьбы съ жуками въ пространствъ, какъ мы это увидимъ въ главъ VIII, можно

сдѣлать главной ареной борьбы не самую плантацію, а прошлогоднее бурачище, стараться не допускать даже жуковъ до новыхъ посѣвовъ; что касается микологическаго метода борьбы, то, въ смыслѣ осуществимости примѣненія его на практикѣ, онъ не можетъ выдержать даже отдаленнаго сравненія съ химическимъ методомъ, что мы увидимъ въ слѣдующей главѣ.

Но, съ другой стороны, на швейнфуртскую зелень, хлористый барій и прочіе инсектисиды отнюдь не слъдуеть смотръть, какъ на какое-то всемогущее вещество, "магическій порошокъ", которымъ достаточно опрыскать плантацію, чтобы жуки, не тронувъ бураковъ, безвозвратно исчезли. Даже въ самыхъ удачныхъ случаяхъ, когда жуки отравляются массами, новыя партіи ихъ наползають или налетають съ сосъднихъ участковъ и продолжають уничтожать бураки, если смежные владъльцы не ведутъ раціональной борьбы. Поэтому недостаточно купить себъ нъсколько инструментовъ и задаться цълью производить опрыскиванія только въ тъхъ случаяхъ, когда гдъ-нибудь обнаружатся сильныя поврежденія. Можно съ увъренностью сказать, что въ большинствъ случаевъ работа будеть при такихъ условіяхъ слишкомъ запоздалою и малопроизводительною. Существенной пользы отъ отравленія плантацій, какъ міры борьбы съ долгоносикомъ, мы въ правъ ожидать только тогда, если мъра эта будетъ примъняться своевременно и систематически нъсколько лъть подрядъ, по заранъе опредъленному плану и съ разсчетомъ на все пространство плантаціи, если не всъми, то большинствомъ смежныхъ владъльцевъ. прибательная по попробраната

Рекомендуя усердно хозяевамъ обратить возможно большее вниманіе на химическій методъ борьбы, мы, хотя и признаемъ его главнымъ, основнымъ, но вовсе не отрицаемъ желательности или даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ необходимости прибъгать и къ другимъ мѣрамъ, предупредительнымъ или истребительнымъ, смотря по обстоятельствамъ. Вся суть въ томъ, какъ складываются обстоятельства въ данный моментъ, а это уже дѣло хозяевъ—примѣнять по мѣрѣ надобности разные методы борьбы въ той или другой комбинаціи.

т. е. 1000—1500 фунтов И ВАПТ ри заводском способы производства, (если-бы завод быль построень на 1000 пул.

мюскардина растиралась съ сухимъ поскомъ; на 1 въсовую

г десятину нужно отъ 10 до 15 фунговъ чистой мюскардины,

Микологическій методъ борьбы со свекольными долгоносиками.

Микологическій методъ борьбы заключается въ разведеніи въ массовомъ количествѣ, тѣмъ или другимъ способомъ, паразитирующихъ на свекольномъ долгоносикѣ грибковъ, съ цѣлью зараженія живущихъ на плантаціи насѣкомыхъ путемъ введенія въ почву заразнаго начала, т. е. искусственно культивированныхъ споръ мюскардины.

Исторія вопроса о прим'вненіи микологическаго метода борьбы со свекольнымъ долгоносикомъ такова. Профессоръ Мечниковъ, открывшій въ 1878 году зеленую мюскардину, предложилъ истреблять долгоносика этимъ грибкомъ и произвель въ 1879-1880 годахъ первые лабораторные опыты въ этомъ направленіи. Примъненіе новаго метода борьбы на практикъ проф. Мечниковъ поручилъ И. М. Красильщику, который и прибыль въ 1883 году въ Смълу-имъніе графовъ Бобринскихъ, Кіевской губерніи, для изысканія средства улучшенія производства мюскардины и производства опытовъ съ нею. Дъло наладилось только въ 1884 году, когда Мечниковъ нашелъ среду для мюскардины — пивное сусло, значительно разбавленное водою, а гр. Бобринскій согласился отдать одно изъ зданій подъ мюскардинный заводъ. Началось производство мюскардины фабричнымъ путемъ, съ разными механическими приспособленіями, чтобы по возможности устранить вліяніе рабочаго. Посъвъ производился въ металлическихъ плоскихъ и широкихъ чанахъ, совершенно закрытыхъ. Отъ посъва до сбора урожая мюскардины проходило 12—15 дней, впослѣдствіи это время было доведено до 5—8 дней. За одинъ сборъ 1 кв. арш. поверхности питательной жидкости давалъ въ среднемъ ¹/₄ фунта совершенно сухой, чистой мюскардины. Для употребленія мюскардина растиралась съ сухимъ пескомъ; на 1 вѣсовую часть мюскардины бралось 99 вѣсовыхъ частей песку. На 1 десятину нужно отъ 10 до 15 фунтовъ чистой мюскардины, т. е. 1000—1500 фунтовъ смѣси. При заводскомъ способѣ производства, (если-бы заводъ былъ построенъ на 1000 пуд. мюскардины), количество ея, потребное для зараженія 1 десятины, обошлось-бы въ 4 рубля. Заводу большихъ размѣровъ производство мюскардины обошлось-бы дешевле.

Быди произведены опыты, хотя подъ открытымъ небомъ, но въ деревянныхъ ящикахъ, покрытыхъ стекломъ, которые дали блестящіе результаты. Но такъ какъ для опыта въ большихъ размърахъ на поляхъ въ 70 — 100 десятинъ требовалось 1000 ф. мюскардины, то онъ былъ отложенъ. Въ 1885 году общество сахарозаводчиковъ ассигновало 10,000 рублей на производство большаго опыта; заводъ былъ усовершенствованъ. Но вдругъ наступилъ сахарный кризисъ, и все дъло разстроилось.

Затъмъ вторично вопросъ о борьбъ съ долгоносиками при помощи грибныхъ паразитовъ былъ поднять въ 1900 г.; директоръ лабораторіи въ Пастеровскомъ Институтъ въ Парижъ, И. Данышъ, съ ассистентомъ докторомъ Визе и нъсколькими другими помощниками организоваль на хуторъ Николаевкъ, близъ Смълы, по порученію и на средства Всероссійскаго Общества Сахарозаводчиковъ, изученіе грибныхъ паразитовъ свекольнаго долгоносика и опыты истребленія его микологическимъ методомъ. За 1900—1901 годы имъются три отчета И. Даныша, о которыхъ упоминается въ предисловіи. Здъсь мы познакомимся съ техникой истребленія долгоносиковъ при помощи зеленой мюскардины рекомендуемымъ Данышемъ способомъ, и затъмъ уже коснемся пригодности этого метода борьбы на практикъ.

Прежде всего надо зам'втить, что прим'внять мюскардину для борьбы съ долгоносиками можно двоякимъ образомъ, а

именно: пользоваться натуральной мюскардиной, естественно размножающейся на плантаціяхъ, или-же вводить въ плантаціи споры искусственно культивированныхъ грибковъ.

1) Пользование натуральной мюскардиной. При нѣкоторыхъ условіяхъ мюскардина размножается на плантаціяхъ въ такой сильной степени, что поражаетъ до 90—100% личинокъ, куколокъ и даже молодыхъ жуковъ. По даннымъ И. Даныша количество споръ, имѣющихся на свекольной плантаціи, находится въ прямой зависимости отъ продолжительности культуры свеклы и краткости сѣвооборота; другими словами, чѣмъ дольше ведется свекловичное хозяйство и чѣмъ чаще возвращаются съ посѣвомъ на одно и то-же поле, тѣмъ больше будетъ заключаться споръ въ землѣ и тѣмъ большій % индивидовъ молодого поколѣнія будетъ погибать отъ мюскардины.

Идеаломъ, съ этой точки зрвнія, было-бы воздвлываніе бураковъ постоянно или, по крайней мѣрѣ, до возможно полнаго истребленія жуковъ на одномъ и томъ-же полѣ, что, конечно, противорѣчить общимъ требованіямъ культуры. Если это и недостижимо на практикѣ въ виду общаго правила, то, во всякомъ случаѣ, не мѣшаетъ испробовать производство повторнаго посѣва бураковъ на плантаціяхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда раскопками констатирована очень большая смертность личинокъ и куколокъ отъ мюскардины въ предшествовавшемъ году.

Не оспаривая приведеннаго выше положенія Даныша, вѣрнаго теоретически, нельзя, однако, не указать на существованіе еще цѣлаго ряда факторовь, вѣрнѣе всего метеорологическихь, въ связи съ почвенными условіями, имѣющихъ большее практическое значеніе и создающихъ періодичность мюскардинной эпидеміи. Дѣйствительно, мы знаемъ, что въ одномъ и томъ-же хозяйствѣ, при одномъ и томъ-же сѣвооборотѣ, въ одни годы мюскардина почти отсутствуеть, въ то время какъ въ другіе эпидемія свирѣпствуетъ въ полной силѣ. А затѣмъ, развѣ бурачныя поля заселены однѣми личинками долгоносиковъ и развѣ одни свекольные долгоносики поражаются мюскардиной? Личинки пластинчато-

усыхъ, главнымъ-же образомъ разныхъ видовъ хлъбнаго жука или кузьки, а также другихъ насъкомыхъ являются заурядными обитателями полей свеклосахарнаго района, а потому и бурачныхъ плантацій; появляясь неръдко въ массовомъ количествъ и поражаясь мюскардиной, всъ эти насъкомыя, помимо свекольнаго долгоносика, служать безъ сомнънія источникомъ обогащенія почвы спорами этихъ грибковъ. Поэтому, не довольствуясь вышеприведенными теоретическими соображеніями г. Даныша, необходимо всегда убъждаться раскопками въ натуръ, какъ обстоить дъло въ дъйствительности; въ годы, благопріятные для развитія мюскардины, въ сравнительно молодомъ свекловичномъ хозяйствъ почва можетъ быть заражена въ большей степени, нежели на поляхъ, давно засъваемыхъ бураками—при обратныхъ условіяхъ.

2) Искусственная культура мюскардины. Разводить мюскардину можно двоякимъ способомъ: въ различныхъ искусственныхъ питательныхъ средахъ и на живыхъ насъкомыхъ. Первый способъ, чисто лабораторный, недоступенъ хозяевамъ практикамъ вслъдствіе своей дороговизны и сложности, второй-же, хозяйственный, несравненно болье пригоденъ для практическихъ цълей, вслъдствіе чего мы и ограничимся описаніемъ именно этого послъдняго способа.

"Для искусственнаго разведенія мюскардины, пишетъ Скржинскій ¹), прежде всего необходимо достать вполнѣ чистую разводку этого грибка. Такую разводку грибка можно выписать изъ какой-либо спеціальной лабораторіи. По нашимъ изслѣдованіямъ, потребуется около 10 трубокъ разводокъ на картофелѣ для зараженія 1 килограмма cleonus'овъ, на которыхъ разовьются споры въ достаточномъ количествѣ для зараженія 100 килограммовъ иныхъ здоровыхъ насѣкомыхъ.

- Первую чистую разводку мюскардины всякій сельскій хозяинъ можеть получить самостоятельно, не выписывая ея изъ спеціальной лабораторіи. Для этого слѣдуетъ собрать зараженныя зеленой мюскардиной особи cleonus'а, находимыя во время осенняго изслѣдованія бурачищъ, или же во время осенней вспашки поля. Собранные такимъ образомъ экземпляры мюскардины могутъ быть употреблены для полученія чистой разводки грибка, ибо сами они представляются далеко не чистыми, въ виду наличности въ землѣ извѣстнаго рода микроорганизмовъ, живущихъ на счетъ мюскардины.

Чистую разводку мюскардины можно получить сейчасъ же (во время осенняго сбора экземпляровъ мюскардины), если имъемъ хотя немного живыхъ жуковъ (найденныхъ во время раскопокъ бурачищъ). Для этого найденные зараженные экземпляры сущать при комнатной температурь, растирають въ деревянной ступкъ (или инымъ путемъ) въ порошокъ и, помъстивъ живыхъ жуковъ въ закрытый ящикъ, обсыпаютъ ихъ упомянутымъ порошкомъ (посредствомъ раздувательнаго мъха или инымъ путемъ). Если мюскардина была вполнъ эрълой и вирулентной, то всъ жуки погибаютъ по истеченіи ніскольких дней. Умирающих насікомых переносять изъ общаго ящика въ тарелки (или иную посуду), наполненныя стерилизованнымъ (въ жарко натопленной печи) пескомъ, слегка влажнымъ; тарелки эти прикрываютъ стекломъ и ставять въ тъни при to 16-25°. По истечени 3-5 дней всв зараженныя насъкомыя (въ тарелкахъ) покрываются мицеліемъ и еще черезъ 2—3 дня на мицеліи образуются зеленыя споры. Послъ образованія зеленыхъ споръ мюскардина является вполнъ созрълой и вирулентной. Полученную такимъ путемъ вполнъ чистую разводку мюскардины слъдуеть сохранить, для зараженія весною большаго количества насъкомыхъ, слъдующимъ образомъ: мюскардинированные экземпляры раскладываются тонкимъ слоемъ на листахъ пропускной бумаги и помъщаются въ сухое, защищенное отъ свъта мъсто при t^o около 25^o С. Когда мюскардина обсохнеть, ее слъдуеть покрыть тонкимъ слоемъ мелкаго песка или земли, предварительно прокаленныхъ и затъмъ охлажденныхъ (т. е. стерильныхъ). Послъ этого листы съ мюскардиной можно сложить другъ на друга въ деревян-

¹) С. Скржинскій. О способахъ борьбы со свекловичнымъ долгоносикомъ и нѣкоторыми иными вредителями сельскаго хозяйства. С. Хоз. и Лѣсов. 1902. № 2., стр. 364.

ный или металлическій ящикъ. Ящикъ долженъ плотно закрываться для полной защиты мюскардины отъ всякаго поврежденія. Во всѣхъ стѣнкахъ ящика необходимо продѣлать буравчикомъ отверстія, слегка заткнутыя ватой для свободнаго доступа воздуха. На зиму ящики съ мюскардиной должны быть помѣщены въ прохладное и сухое помѣщеніе, температура котораго должна быть, по возможности, постоянная и близкая къ 0° (подвалъ, погребъ). Такимъ-же способомъ сохраняются на зиму и найденные на плантаціяхъ мюскардинированные экземпляры сleonus'а, если не было возможности тогда же приготовить чистую разводку мюскардины".

Весною, сохраненная такимъ образомъ мюскардина идетъ на зараженіе произвольнаго количества живыхъ жуковъ, собираемыхъ при первомъ ихъ появленіи.

Данышъ предлагаетъ во второмъ отчетѣ слѣдующій болье упрощенный способъ сохраненія зараженныхъ мюскардиною насѣкомыхъ, предназначаемыхъ для распространенія эпидеміи на большія пространства. Надо просто ежедневно собирать мертвыхъ насѣкомыхъ изъ заразныхъ помѣщеній и закапывать въ землю на 60—80 сантиметровъ глубины, чередуя слой земли съ слоемъ мертвыхъ насѣкомыхъ. При соблюденіи этихъ условій — мюскардина развивается прекрасно. Заражая такимъ образомъ сотни килограммовъ насѣкомыхъ, получаются сотни килограммовъ споръ.

Для массоваго культивированія зеленой мюскардины нѣтъ никакой надобности пользоваться именно самими свекольными долгоносиками или ихъ личинками — для этой цѣли, за отсутствіемъ въ данный моменть долгоносиковъ, могутъ служить и другіе виды жуковъ, напримѣръ, майскіе или хлѣбные, появляющіеся въ массѣ. Но такъ какъ и долгоносики собираются въ массѣ, то проще всего, конечно, слѣдуетъ заражать именно ихъ.

- "Всякаго рода личинки могутъ быть заражены подобно тому, какъ и вполнъ развившееся насъкомое. Притомъ-же онъ представляютъ болъе благопріятную среду, чъмъ жучки, и даютъ болъе споръ. Зараженныя личинки должны быть

высыпаны на землю и это пространство земли должно быть обнесено досками, вбитыми на глубину 40—60 сантиметровъ; вмъсто этого можно положить зараженныя личинки въ большіе ящики, наполненные землей. Личинки проникнуть вглубь ея, гдѣ и умруть и дадуть тамъ большія разводки грибковъ, отъ которыхъ сами погибли. Каждый кубическій метръ земли заключаеть въ себѣ тысячи зараженныхъ насѣкомыхъ или ихъ личинокъ, въ которыхъ скоро образуются густыя сѣти изъ нитей мицелія. Въ этой землѣ будетъ находиться такая масса споръ, что ихъ можно будетъ разсыпать по полямъ во время вспашки.

Разводки мюскардины на зарытыхъ насъкомыхъ могуть сохраняться въ теченіе года и служить для зараженія спорами поверхностнаго слоя земли, который всегда почти лишенъ мюскардины. Эти споры заразять молодыхъ личинокъ вскоръ послъ ихъ выхода изъ яичекъ и, такимъ образомъ, предохранятъ корни свеклы, а въ то-же время въ значительной степени увеличать число зараженныхъ и окончательно истребленныхъ насъкомыхъ.

Итакъ, каждый хозяинъ, слъдуя этимъ указаніямъ, можетъ съ очень малыми затратами приготовить необходимое количество мюскардины, сообразно протяженію своихъ полей.

Среднимъ числомъ требуется 10 трубочекъ разводокъ на картофелѣ для того, чтобы заразить 1 килограммъ сleonus'овъ, а это количество зараженныхъ насѣкомыхъ будетъ достаточно, въ свою очередь, чтобы заразить, по крайней мѣрѣ, 100 килограммовъ другихъ здоровыхъ насѣкомыхъ. Слѣдовательно, на фермѣ, гдѣ собирается ежегодно среднимъ числомъ около 5,000 килограммовъ cleonus'овъ, достаточно имѣть въ своемъ распоряженіи сотню трубочекъ чистой разводки къ тому времени, когда сleonus'ы начинаютъ выходить на поверхность земли. Этой разводки вполнѣ хватитъ, чтобы заразить всѣхъ насѣкомыхъ, которыя будутъ собраны отъ 15 апрѣля по 15 іюня".

3) Способъ введенія мюскардины въ землю. Такъ какъ мюскардина должна истреблять личинокъ, развивающихся изъящъ въ іюнъ и живущихъ первоначально недалеко отъ по-

OTD MICEKAPARIEM.

верхности земли, на глубинѣ 3—5 сантиметровь, то лучше всего вносить мюскардину въ маѣ мѣсяцѣ при помощи снарядовь, которые размѣстили-бы ее между рядами свеклы на глубинѣ 3—4 сантиметровъ. Данышъ полагаеть, однако, что одинаковые-же результаты могуть получиться и безъ лишней затраты времени и капитала внесеніемъ мюскардины на поле одновременно съ сѣменами свеклы при помощи обыкновенныхъ рядовыхъ сѣялокъ или-же при помощи скомбинированныхъ сѣялокъ, употребляемыхъ для суперфосфата.

Болѣе грубый пріемъ будеть заключаться въ разсѣиваніи мюскардины на плантаціи во время весенней или даже осенней вспашки.

4) Количество вводимой въ землю мюскардины. Сколько надо ввести въ землю мюскардины для того, чтобы заразить возможно большее количество личинокъ, приходится опредълять въ каждомъ отдъльномъ случав особо; для этого необходимо сообразоваться со степенью зараженности поля, предназначаемаго подъ посъвъ бураковъ, естественно развившеюся мюскардиною, что опредъляется спеціальными изслъдованіями. Путемъ пробныхъ раскопокъ можно также опредълить, какъ часто попадаются на будущей бурачной плантаціи насъкомыя въ разной стадіи развитія, пораженныя мюскардиною помимо долгоносиковъ. Въ общемъ, Данышъ рекомендуеть придерживаться следующихь нормь: оть 4 до 10 фунтовъ мюскардины на десятину (средняя норма) приходится вводить на поляхъ со старой культурой свеклы при 6-лътнемъ съвооборотъ; минимальная доза въ 2 фунта мюскардины на десятину возможна на поляхъ съ очень старой культурой (свыше 30 лътъ) при 3-лътнемъ съвооборотъ и, наконецъ, максимальная норма около 20 фунтовъ потребна для цълинныхъ полей (новинъ), на поляхъ, находившихся подъ свеклой всего 1-2 раза или же въ тъхъ мъстахъ, гдъ долгоносики появились только недавно, въ послъднее время, и, если, добавимъ отъ себя, на тъхъ же поляхъ не замъчалось массоваго размноженія другихъ вредныхъ насъкомыхъ, развивающихся подъземлею, и мора ихъ отъ мюскардины.

Итакъ мы познакомились теперь съ техническими пріемами микологическаго метода борьбы со свекольнымъ долгоносикомъ. Для того-же, чтобы оцѣнить практическое значеніе этого метода, мы припомнимъ нѣкоторыя основныя положенія, опубликованныя самимъ И. Данышемъ и главнѣйшіе моменты въ жизни долгоносиковъ.

- 1) Жуки встръчаются на поверхности земли съ первыхъ чиселъ апръля по конецъ іюля, причемъ въ апрълъ и маъ они наносятъ самый ощутительный вредъ свекловицъ.
- 2) Во все это время мюскардина противъ жуковъ совершенно безсильна — они, на волъ, не заражаются; ее приходится примънять только противъ личинокъ.
- 3) Въ хорошо устроенныхъ сельскихъ хозяйствахъ (третій отчетъ Даныша, стр. 889) ежегодно собираютъ и уничтожаютъ посредствомъ канавокъ около 90% выползающихъ изъ земли жуковъ за время отъ начала апръля до половины мая, остальные 10% жуковъ ускользаютъ отъ улова.
- 4) Какъ бы удачно ни дъйствовала мюскардина противъ личинокъ и куколокъ лътомъ, все-же это не исключаетъ необходимости охраненія посъвовъ свеклы и примъненія истребительныхъ мъръ противъ самихъ жуковъ весною. Ни одинъ здравомыслящій хозяинъ не согласится быть безучастнымъ зрителемъ уничтоженія жуками своихъ бураковъ въ чаяніи того, что мюскардина погубить ихъ личинокъ; слъдовательно, примъненіе сбора или отравленія жуковъ весною неизбъжно.
- 5) "Основываясь на личныхъ наблюденіяхъ и опытахъ, пишеть Данышъ (3-й отчетъ, стр. 930), мы пришли къ категорическому заключенію, что соотвѣтственное использованіе отравъ поведетъ къ болѣе дешевому и болѣе полному истребленію жуковъ въ сравненіи съ вылавливаніемъ ихъ руками. Примѣненіе отравъ не представляетъ никакихъ осложненій въ практическомъ отношеніи".

Что-же тогда остается на долю искусственнаго зараженія мюскардиной: покольніе неотравленныхъ жуковъ, изъкоихъ, въ зависимости отъгода, погибнеть отъмюскардины, безъвсякаго вмышательства человыка, отъ 10 до 100% личинокъ и куколокъ?

Положимъ, что, работая изъ года въ годъ, мы могли-бы настолько уменьшить общее количество жуковъ, что не моглобы быть и ръчи объ уничтожении посъвовъ свеклы даже безъ весенней ловли жуковъ рабочими, а дальше что? Пройдеть годь-другой, жуки снова размножатся и-опять на сцену выступять въ первую-же очередь механическій и химическій методы борьбы. При різшеній подобныхъ практическихъ вопросовъ необходимо считаться съ психологіей сельскихъ хозяевъ; съ этой точки зрвнія отравленіе долгоносиковъ стоитъ неизмъримо выше микологическаго метода истребленія, такъ какъ примъняется въ ту пору, когда жукъ особенно вреденъ и необходимость истребленія его очевидна для каждаго хозяина; а убъдите-ка большинство плантаторовъ изъ года въ годъ культивировать мюскардину и разсыпать по плантаціямъ, когда жуковъ почти не видно! А между тъмъ только при такомъ систематическомъ проведеніи въ жизнь рекомендуемыхъ Данышемъ пріемовъ и возможно удержать жуковъ отъ размноженія. Итакъ, мы не можемъ не признать въ концъ концовъ, что микологическій методъ борьбы съ свекольнымъ долгоносикомъ теоретически хотя и въренъ, но практически несостоятеленъ; самое больщое, что за нимъ можно признать, это роль второстепеннаго подсобнаго метода борьбы. Къ этому выводу неизбъжно придеть всякій даже на основаніи отчетовъ Даныша, такъ какъ врядъ-ли даже самому убъжденному противнику микологическаго метода борьбы удалось-бы такъ сильно дискредитировать его, какъ это сдълаль самъ его авторъ. Дъйствительно, Данышъ былъ приглашенъ Всероссійскимъ Обществомъ Сахарозаводчиковъ для изученія и проведенія въ жизнь метода борьбы съ долгоносикомъ при помощи грибныхъ паразитовъ. Въ первом его отчетъ только и говорится, что о мюскардинъ, причемъ, въ числъ задачъ, подлежащихъ разръщенію, упоминается изучение біологіи свекольнаго долгоносика и другихъ его враговъ, кромъ мюскардины. Во второмъ своемъ отчеть, въ прибавленіи, Данышъ помъстиль данныя Моравека объ отравленіи долгоносиковъ хлористымъ баріемъ, почему-то игнорируя русскія работы, причемъ, однако, въря

еще во всемогущество микологическаго метода, въ заключеніе писалъ слѣдующее: "во всякомъ случаѣ теперь-же можно сдѣлать тоть-же упрекъ методу съ поливкой, какъ и сбору: оба жертвуютъ будущимъ для настоящаго '). И дѣйствительно, предохраняя сборъ только даннаго года, эти методы могутъ только укоренять зло тѣмъ, что способствуютъ постоянному развитію cleonus'овъ, избѣгнувшихъ или сбора или яда, и создаютъ неблагопріятныя условія для развитія естественныхъ враговъ cleonus'овъ, между прочимъ, мюскардины ²). Однимъ словомъ, мы не считаемъ достаточно доказаннымъ, что поливки выгоднъе сбора; кромѣ того, при сборахъ возможна утилизація cleonus'овъ. Слъдовательно, къ поливкамъ можно обращаться только тогда, если будетъ доказано, что уничтоженіе cleonus'овъ посредствомъ мюскардины—невозможно" (курсивъ нашъ).

Въ третьемъ-же отчетъ, наконецъ, мы встръчаемъ совершенно иную картину: мюскардинъ отведено довольно скромное мъсто; Данышъ категорически высказывается въ пользу отравъ (см. выше, стр. 153 пунктъ 5); уклонившись отъ своей прямой задачи, онъ начинаетъ трактовать о совершенно постороннемъ для него предметъ—разныхъ пріемахъ химическаго метода борьбы, и притомъ какъ о чемъ-то новомъ, ему лично принадлежащемъ, ни словомъ даже не обмолвившись о томъ, что все это было уже предложено и примънялось въ Россіи до него...

Развъ это не полное торжество химическаго и пораженіе микологическаго методовъ борьбы, тъмъ болье чувствительное для послъдняго, что исходить оно отъ руки присяжнаго миколога, призваннаго доказать пригодность его на практикъ?

¹⁾ Курсивъ нашъ; по Данышу слъдуетъ жертвовать настоящимъ, т. е. посъвами для будущаго—удачнаго развитія мюскардины?

²⁾ Другими словами, жуковъ весною истреблять потому не слъдуетъ, что получится мало личинокъ; чъмъ больше въ землъ личинокъ, тъмъ успъшнъе развивается эпидемія мюскардины...

ende ho beendryngeerne minemoranieckare merena, pre 3akurienie ingant cutyrongee no beengare cuyvat renept-se worde college workske voucer merons ch normaren, kaku

и соору; ова эсермочных одоры только данняно пода, ети мествительно, предохраняя сборы только данняно пода, ети метолы могуть только укоренять злогитьик, что способствують

нан ада, и создають не создають не сторов в создають проделжить праговы сторов в сотественных враговы сторовых в сотественных в проделжить праговы сторовых в сотественных в сотетвенных в сотественных в сотетвенных в сотественных в

Раціональный методъ борьбы со свекольнымъ долгоноси-

Въ предшествующихъ главахъ мы ознакомились въ деталяхъ съ біологіей свекольнаго долгоносика, съ его врагами и практикующимися мърами борьбы съ нимъ, пріуроченными къ опредъленному моменту жизни этого насъкомаго. Мы узнали, что врагъ это чисто мъстный, размножающійся на плантаціяхъ того-же владівльца, которому онъ вредить, или же появляющійся съ ближайшихъ сосъднихъ. Это послъднее обстоятельство даетъ хозяину возможность держать долгоносика, такъ сказать, на учетв, быть освъдомленнымъ о томъ, въ какомъ направленіи и гдъ идеть развитіе жука, въ какихъ разм'врахъ и откуда сл'вдуеть ожидать его вторженія въ следующемъ году. Веденіе такого учета, въ связи съ разумнымъ комбинированіемъ разныхъ методовъ борьбы, въ зависимости отъ наличности тъхъ или другихъ условій, въ которыхъ наблюдается въ данный моменть свекольный долгоносикь, мы и назовемъ раціональнымъ методомъ борьбы съ этимъ вредителемъ. Преимущества раціональнаго метода борьбы заключаются въ томъ, что хозяину дается въ руки способъ заблаговременно и точно опредълить арену и размъры предстоящей борьбы, возможность своевременно и въ надлежащемъ количествъ запасти всъ необходимыя для нея приспособленія и произвести подготовительныя работы, въ то время, какъ обыкновенно, принимаясь за истребленіе жука только въ моменть нападенія его на плантаціи, хозяинъ находится часто въ полномъ невъдъніи относительно того, въ какихъ размърахъ и даже гдъ именно придется ему вести эту борьбу.

Приступая къ борьбъ съ долгоносикомъ, приходится ръшить слъдующіе вопросы: когда, гдъ и какія мъры предстоитъ принимать. Мы и разсмотримъ всъ эти вопросы по порядку.

Когда надо бороться съ долгоносикомъ.

Ръшеніе этого вопроса всецьло зависить отъ сроковъ наступленія тіхъ или другихъ моментовъ въ жизни долгоносика въ данной мъстности. Во второй главъ мы видъли, насколько варьирують сроки появленія жуковъ, личинокъ и куколокъ не только въ разныхъ губерніяхъ, но и въ одной и той-же мъстности, въ разные годы. Поэтому, принимая приводимые нами сроки только для общихъ соображеній, каждый хозяинъ долженъ на мъстъ вести ежегодныя записи о появленіи самыхъ раннихъ жуковъ, о массовомъ выходъ ихъ на поверхность земли, о передвиженіяхъ пѣшаго жука, о началѣ лёта, массовомъ лётъ и концъ его, объ уменьшении количества и окончательномъ исчезновеніи жуковъ; то же самое о спариваніи, откладкъ яицъ, о личинкахъ, куколкахъ и молодыхъ жукахъ, отмъчая по возможности начало, массовое теченіе и конецъ явленія. Завести тетрадку и тратить ежедневно или въ нъсколько дней разъ минутъ пять-десять на записи о томъ, что приходилось наблюдать за день на плантаціяхъ относительно жуковъ, вовсе не такъ трудно, а между тъмъ, ведя подобныя записи изъ года въ годъ, можно получить самую точную картину періодических вяленій въ жизни долгоносика именно въ данной мъстности, съ отклоненіями по отдільнымъ годамъ въ зависимости отъ метеорологическихъ особенностей каждаго года.

Гдѣ и какъ надо бороться съ долгоносиками.

Долгоносики развиваются на поляхъ, занятыхъ свеклой, откуда они весною перебираются на новыя плантаціи. До сихъ поръ борьба съ долгоносиками велась почти исключительно на новыхъ плантаціяхъ, гдѣ молодые всходы отстаивались отъ поврежденія ихъ жуками. Несравненно раціо-

нальнъе, однако, перенести арену борьбы на прошлогоднія бурачища, не допускать жуковъ переходить на новые посъвы. Для этой цъли слъдуеть:

- на *повчих* полосах вокругъ прошлогоднихъ бурачищъ, а также внутри ихъ, вдоль и поперекъ, для полученія возможно раннихъ всходовъ.
- 2) Подновить ранней весной ловчія канавки вокругъ прошлогоднихъ бурачищъ и поставить на нихъ, съ первымъ появленіемъ пѣшаго жука, сборщицъ.
- 3) Опрыскать всходы свеклы на ловчихъ полосахъ при первомъ появленіи жука какими-нибудь сильно дѣйствующими ядами: парижской зеленью, мышьякомъ, джипсиномъ, хлористымъ баріемъ въ сильныхъ дозахъ, и повторять эти опрыскиванія по мѣрѣ появленія новыхъ всходовъ и подрастанія старыхъ, а также послѣ дождей. Роль этихъ ловчихъ полосъ—отравить возможно большее количество выходящихъ изъ земли жуковъ еще на самомъ бурачищѣ. Ловчія полосы, въ связи со сборомъ жуковъ въ канавкахъ вокругъ бурачища, въ значительной степени уменьшатъ количество жуковъ, вторгающихся на плантацію.
- 4) На самой плантаціи противъ вторженія жуковъ, выведшихся внѣ бурачища, или прорвавшихся сквозь отравленныя ловчія полосы, надо засѣять ранней весной одновременно съ общимъ посѣвомъ свеклы—охранныя полосы вокругъ всей плантаціи, съ направленіемъ рядовъ параллельно границѣ поля, и отравлять ихъ какимъ-нибудь ядомъ, лучше всего хлористымъ баріемъ, какъ менѣе опаснымъ для человѣка. Равнымъ образомъ, слѣдуетъ вести сборъ жуковъ по канавкамъ вокругъ плантацій.
- 5) Если пѣшій жукъ, не взирая на тройную преграду— отравленныя ловчія и охранныя полосы и ловчія канавки— все-таки прорвется внутрь плантаціи, то надо производить опрыскиваніе посѣвовъ сплошь, по направленію движенія жука, т. е. отъ охранныхъ полосъ внутрь плантаціи. Равнымъ образомъ, если на плантацію вторгнется лётный жукъ, то надо немедленно-же отравить всю плантацію, на-

чиная съ того участка, на который жуки опустились въ большомъ количествъ.

Итакъ планъ борьбы съ жукомъ весьма простъ—сначала пытаются преградить ему доступт на плантацію, а затьмъ, если это не вполнъ удалось, отравляють его на самихъ поствахъ. Но, такъ какъ жуки откладывають свои яйца и выводять новое покольніе не на всьхъ участкахъ плантаціи въ одинаковомъ количествь, то хозяииу весьма важно знать, откуда и въ какихъ примърно размърахъ ожидать ему нашествія жуковъ слъдующею весною, т. е., другими словами, опредълить очаги заразы, такъ какъ [въ связи съ этимъ находится вопросъ о томъ, гдъ и въ какой мъръ надо осуществить подготовительныя работы по закладкъ ловчихъ и охранныхъ полосъ.

Для этой цъли надо замъчать, на какихъ именно поляхъ и отдъльныхъ ихъ участкахъ больше всегда наблюдается жуковъ, а также гдъ появляются въ большемъ количествъ подъжденные личинками долгоносика бураки. Это будетъ для насъ указаніемъ на то, гдъ надо ожидать наибольшаго количества молодыхъ жуковъ. Но этого еще мало-жуки могуть отложить яйца въ большомъ количествъ, изъ которыхъ выйдутъ личинки, но еще неизвъстно, разовьются-ли онъ въ жуковъ; извъстный проценть ихъ можеть погибнуть отъ грибныхъ болъзней. Для полученія болье точныхъ свъдъній о томъ, какое количество жуковъ надо ожидать предстоящей весной съ каждаго поля, следуетъ производить съ осени пробныя раскопки въ разныхъ мъстахъ, при различныхъ условіяхъ рельефа и пересчитывать количества личинокъ, куколокъ и молодыхъ жуковъ, здоровыхъ и погибшихъ отъ разныхъ причинъ, на единицъ площади. Пробныя площадки берутся въ 1 — 2 квадратныхъ аршина, въ разныхъ мъстахъ поля, для полученія болье правильныхъ среднихъ выводовъ; земля снимается слоями и просъвается сквозь металлическое сито съ такими отверстіями, чтобы личинки и куколки сквозь нихъ не провалились; комья надо разбивать и разминать, чтобы не пропустить куколки или жука въ колыбелькъ. Въ глубину копають до ³/₄ аршина. Затъмъ,

изъ полученныхъ величинъ со всѣхъ пробныхъ площадокъ одного поля, или части его, если данныя не слишкомъ разнятся другъ отъ друга, выводится ариометическое среднее на единицу площади, напр. на 1 квадратный аршинъ или сажень и т. п., а потомъ оно переводится на десятину. Лѣтнія наблюденія надъ количествомъ жуковъ, попадающихся на разныхъ участкахъ, помогутъ намъ болѣе правильно расположить въ пространствѣ пробныя площади, намѣтивъ уже заранѣе границы районовъ одинаковой плотности заселенія долгоносиками. По перечетамъ Даныша выходило, что, при 2,5 жукахъ на 1 квадр. аршинѣ, съ десятины надо ожидать выхода около ½ пуда жуковъ (1 пудъ заключаетъ около 120.000 штукъ живыхъ жуковъ). Затѣмъ Данышъ даетъ слѣдующее соотношеніе между количествомъ жуковъ на бурачищѣ и шириною ловчихъ полосъ, а именно:

При $^{1}/_{2}$ пуда жуковъ на десят., ловчій поясь = 2 саж. шир.

"На бурачищахъ площадью болѣе 60 десятинъ, кромѣ общаго ловчаго пояса, слѣдовало бы провести еще одинъ или два пояса вдоль или поперекъ поля. Если-же на данномъ полѣ оказалось болѣе 50 жуковъ на 2 кв. арш., т. е. болѣе 5 пудовъ на десятину, то, вѣроятно, кромѣ отравленія, придется прибѣгнуть еще къ собиранію жука въ канавкахъ". (Данымъ—3-ій отчеть, стр. 931).

Къ сожалѣнію, однако, изъ описанія не видно, являетсяли приведенная табличка плодомъ апріорныхъ соображеній, или-же выведена на основаніи опыта. Во всякомъ случаѣ, эта табличка теоретически не вѣрна, такъ какъ % площади бурачища, находящейся подъ ловчими полосами, сильно измѣняется въ зависимости отъ величины всего поля; поэтому несравненно правильнѣе было бы установить извѣстный % площади бурачища, который необходимо отравить при томъ или другомъ количествѣ жуковъ. Дѣйствительно, при квадратной формѣ поля процентъ площади, занимае-

мой ловчими полосами будеть измѣняться слѣдующимъ образомъ: вземох атаданом инжим должими должими полосами будеть измѣняться слѣдующимъ

Количество жука на 1 де-	Ширина лов-	Процентъ площади бурачища, занятой ловчими полосами, при:		
сятинъбура-	по Данышу.	10 десят. поля.	30 десят. поля.	50 десят.
1/2 пуда	2 caж.	11H9 50/0	30/0 BIND	2,90/0
вотодиува	o, cano cogono p	T,917,708 RI	он 04,58 нт	DONIS,5 BQB8
3 "	фицан in Hoo	10,3 801	пінэюотью о	MHM4,7,0TP
5 7,00 rour	TO THOM THE THE	12,9	омно7,5000н	5,8.017

Ловчія полосы на бурачищѣ легко осуществимы въ любомъ размѣрѣ въ томъ случаѣ, когда за свеклой въ сѣвооборотѣ слѣдуеть паръ; если-же бурачища заняты посѣвами, то приходится поневолѣ стремиться къ возможному сокращенію ширины ловчихъ полосъ, отказаться, быть можетъ даже отъ проведенія внутри бурачища перекрестныхъ добавочныхъ полосъ и т. д. Затѣмъ, необходимо также обращать вниманіе на родъ смежныхъ съ бурачищемъ площадей; если оно непосредственно прилегаетъ къ плантаціи, то ширина ловчей полосы, смежной съ послѣдней, должна дѣлаться въ 2, 3, 4 раза шире, нежели на прочихъ границахъ.

Если почему-либо пришлось бы совершенно отказаться оть заложенія ловчихь полось на бурачищахь, то необходимо закладывать таковыя на самихъ плантаціяхъ, кольцомъ вокругъ каждаго поля, причемъ со стороны ожидаемаго нашествія пѣшаго жука тѣмъ большей ширины, чѣмъ сильнѣе заселены имъ ближайшія бурачища.

Какъ лучше провести ловчія и охранныя полосы—каждый хозяинъ самъ легко сообразить на мѣстѣ, разъ у него имѣются тщательно собранныя данныя о количествѣ жука, зимующаго на бурачищахъ. Лучше всего для этой цѣли отмѣчать на планѣ мѣста взятія пробныхъ площадей и, условными знаками, результаты перечетовъ, напримѣръ, заштриховать однимъ цвѣтомъ или способомъ участки, заключающіе по ½ пуда жуковъ на десятинѣ, другимъ—по 1 пуду, и такъ далѣе. Тогда одного взгляда на планъ достаточно для того чтобы намѣтить распредѣленіе ловчихъ и охран-

ныхъ полосъ на бурачищахъ и плантаціяхъ; знаніе-же мѣстныхъ условій, которыми должны обладать хозяева, помогутъ еще болѣе справиться съ предстоящей задачей, принаровиться къ особенностямъ даннаго случая. Такъ, напримѣръ, если внутри, или у одного изъ краевъ большого бурачища имѣется площадь, густо заселенная жуками, при слабой зараженности всего поля вообще, то, само собою разумѣется, что, помимо заложенія ловчей полосы по периферіи всего бурачища, необходимо провести изоляціонную полосу по границѣ изобилующей жуками площади.

Планы съ нанесенными на нихъ результатами осеннихъ раскопокъ и перечетовъ и проектированными ловчими и охранными полосами слъдуетъ сохранять; подобно тому, какъ записи о періодическихъ явленіяхъ въ жизни долгоносиковъ, изъ года въ годъ веденныя, дадутъ хозяину возможность вполнъ освоиться со сроками наступленія въ данной мъстности разныхъ біологическихъ моментовъ, эти планы доставять цінный матеріаль для выясненія вопроса о періодичности появленія жука, о томъ, какія поля наиболъе благопріятны для его развитія и на какихъ, напротивъ, онъ болъе страдаетъ отъ мюскардины и другихъ болъзней; освътять, такъ сказать, хозяину скрытыя отъ глазъ явленія и законы подземной жизни жука, его размноженія, распространенія и вымиранія, съ точки зрвнія пространства и времени. Однимъ словомъ, собираемый подобнымъ образомъ матеріалъ дасть возможность хозяину досконально изучить свои поля и пріобр'всти въ борьб'в съ жукомъ господствующее положеніе и, въ концѣ концовъ, справиться съ нимъ.

Покончивъ съ этимъ, мы приведемъ для удобства хозяевъ циклъ годовыхъ работъ по принятію мъръ противъ свекольнаго долгоносика, расположенныхъ въ календарномъ порядкъ, начиная съ осени.

Календарь работъ по борьбѣ со свекольнымъ долгоносикомъ.

Августъ и Сентябръ.

Взятіе, во время копки свеклы или раньше, пробныхъ площадей на свекольныхъ плантаціяхъ для выясненія степени

заселенности поля жуками и ⁰/₀ смертности ихъ отъ мюскардины.

Обработка собранныхъ пробными раскопками данныхъ, нанесеніе ихъ на планъ; выработка плана кампаніи слѣдующею весною, т. е. опредѣленіе мѣста закладки и ширины ловчихъ поясовъ и полосъ и высѣвъ свеклы на нихъ.

Заготовка мюскардины на зиму.

Октябрь и Ноябрь.

Составленіе смъты на закупку потребнаго количества пульверизаторовъ и инсектисидовъ; выписка тъхъ и другихъ.

Февраль и начало Марта.

Осмотръ и ремонтирование старыхъ пульверизаторовъ.

Заготовка бочекъ, переръзовъ и ведеръ для отравъ.

Распредъленіе ядовъ и всъхъ принадлежностей для опрыскиванія по хуторамъ.

Обученіе рабочихъ и надсмотрщиковъ обращенію съ опрыскивателями.

Передача управляющимъ, прикащикамъ и десятникамъ инструкціи по поводу предстоящихъ работъ по борьбѣ съ долгоносиками и производству наблюденій надъ ихъ появленіемъ, образомъ жизни и проч.

Половина Марта—Априль.

При первой-же возможности высъвъ свеклы на ловчихъ полосахъ (а за отсутствіемъ таковыхъ—на охранныхъ полосахъ), если онъ не были засъяны съ осени.

Наблюденія надъ появленіемъ первыхъ жуковъ.

Исправленіе старыхъ ловчихъ канавъ вокругъ бурачищъ. Посъвъ свеклы на плантаціяхъ, а вмъстъ съ тъмъ—введеніе въ почву мюскардины.

Отравленіе ловчихъ поясовъ по появленіи на нихъ первыхъ всходовъ.

Приготовленіе ловчихъ канавъ вокругъ плантацій.

Сборъ жуковъ по ловчимъ канавамъ вокругъ бурачищъ.

Отравленіе охранныхъ полосъ на плантаціяхъ.

Зараженіе собранныхъ жуковъ мюскардиной.

Въ случаъ прорыва пъшаго жука черезъ охранныя полосы или появленія на плантаціяхъ лётнаго—немедленное

опрыскиваніе всей плантаціи или только соотв'єтствующей ея части.

Сборъ жуковъ по ловчимъ канавкамъ вокругъ плантацій, а въ случав массоваго его нашествія—и внутри ихъ.

Второе или даже третье опрыскивание ловчихъ полосъ.

Наблюденія за ходомъ и лётомъ жуковъ; опредѣленіе участковъ полей, наиболѣе изобилующихъ жуками, какъ будущихъ очаговъ размноженія молодого поколѣнія.

Май и Іюнь. Почно умимавы вызывания потребования по

Повторныя опрыскиванія ловчихъ и охранныхъ полосъ или плантацій.

Сборъ жуковъ и приготовление мюскардины.

Наблюденія надъ жуками и личинками ихъ.

-но фиспродублением довъ и вовим принидлежностей д. м.м. Пове

Опредъленіе районовъ поврежденія свеклы личинками. Наблюденія надъ исчезновеніемъ послъднихъ жуковъ, окукленіемъ личинокъ и вылупленіемъ изъ куколокъ первыхъ жуковъ молодого покольнія.

Очистка и уборка пульверизаторовъ на зиму.

При составленіи см'яты на выписку инструментовъ и инсектисидовъ на предстоящую весну, надо опредълить всю площадь ловчихъ полосъ и раздълить на производительность пульверизатора избранной системы въ одинъ рабочій день, выраженную въ десятинахъ; тогда мы узнаемъ, сколько намъ нужно пульверизаторовъ для опрыскиванія всъхъ ловчихъ полосъ въ одинъ день. Это число можно уменьшить въ 2 раза, растянувъ операцію на 2—3 дня. Это тіпітит, дальше котораго справиться будеть трудно, такъ какъ надо имъть въ виду, что часть приборовъ всегда будетъ въ ремонтъ. По нашему мнѣнію, однако, чтобы быть наготовъ отразить массовое нашествіе жуковъ на плантаціи-этимъ минимальнымъ числомъ приборовъ ограничиваться никоимъ образомъ не слъдуеть; надо пріобръсти ихъ по крайней мъръ въ такомъ количествъ, чтобы ихъ хватило на опрыскивание всей плантаціи въ теченіи 5-6 дней.

Инсектисиды надо запасать съ такимъ разсчетомъ, чтобы можно было опульверизировать всю площадь ловчихъ полосъ 5 разъ въ максимальныхъ дозахъ, а всю площадь плантаціи 3 раза; тогда только можно быть увѣреннымъ, что не придется остаться безъ матеріаловъ въ самый разгаръ борьбы.

Затъмъ необходимо принять за правило заказывать приборы и инсектисиды обязательно ст осени, такъ какъ многолътними опытами дознано, что при самыхъ спъшныхъ весеннихъ выпискахъ, даже по телеграфу, всегда происходятъ разныя задержки и проволочки—то у фирмы нътъ достаточнаго количества приборовъ, то вышла задержка съ доставкой матеріаловъ и т. п.; въ результатъ, получается запоздалое принятіе мъръ или даже потеря цълаго года.

Такимъ образомъ приходится организовать борьбу съ долгоносиками въ каждомъ хозяйствъ. Къ сожалѣнію, однако, всѣ усилія одного владѣльца побороть жука не въ состояніи будуть привести къ желательнымъ результатамъ при бездѣйствіи его сосѣдей. Дѣйствительно, при широкомъ развитіи культуры свекловицы на протяженіи цѣлыхъ уѣздовъ и даже губерній, что будутъ значить усилія отдѣльныхъ лицъ, если большинство владѣльцевъ будетъ относиться къ борьбѣ съ жукомъ кое-какъ или даже совершенно его игнорировать? Одни будутъ хронически затрачивать цѣлыя состоянія на правильную постановку дѣла истребленія, а другіе будутъ наводнять плантаціи своихъ сосѣдей полчищами жуковъ.

Разведеніе свекловицы—дѣло настолько выгодное, свекольный долгоносикъ является настолько типичнымъ продуктомъ свекловичной культуры, что нѣтъ никакихъ серьезныхъ доводовъ противъ того, чтобы сдѣлать принятіе мѣръ противъ свекольнаго долгоносика всѣми плантаторами обязательнымъ. Бурачища являются несомнѣнными очагами заразы для свекольныхъ плантацій, безразлично, своихъ-ли собственныхъ или сосѣдскихъ; разъ для всѣхъ обязательно соблюденіе санитарныхъ правилъ, правилъ предосторожности противъ огня, распространенія заразныхъ болѣзней и вообще всего, угрожающаго здоровью или имуществу сосѣдей, то

нътъ никакой логической причины оставаться каждому плантатору въ невъдъніи относительно количества зимующаго на бурачищахъ его сосъдей долгоносика. Другими словами, первымъ шагомъ на этомъ пути должно быть установление обязательности осенних изслыдованій бурачищь каждымь владъльцем съ правомъ присутствія при этомъ хозяевъ вспхъ смежных плантацій, или их уполномоченных, и сообщенія сосподямь результатовь своихь изслюдованій. Знаніе степени грозящей опасности дасть по крайней мъръ возможность каждому подготовиться къ ея устраненію. Затъмъ уже на очередь выступаеть введение обязательности принятія встми плантаторами признанных необходимыми предупредительных или истребительных мърг борьбы со свекольным долгоносиком. Признаніе м'вропріятій противъ долгоносиковъ обязательной повинностью въ интересахъ общей пользы только и можеть поставить все дъло на надлежащую точку, прида въ болъе энергичнымъ и просвъщеннымъ хозяевамъ, даже при настоящихъ неблагопріятныхъ условіяхъ ведущихъ борьбу съ жуками, увъренность, что ихъ труды и затраты не пропадуть даромъ. Въ противномъ случав, пройдуть еще десятильтія, энергія единичныхъ лицъ изсякнеть въ безплодной борьбъ, а жуки будуть попрежнему періодически наводнять наши плантаціи и наносить ежегодно милліонные убытки.

До введенія обязательной борьбы не м'єшало бы смежнымъ влад'єльцамъ одного района объединиться въ "союзт для борьбы ст долгоносикомт", причемъ всё они должны сообщать другъ другу результаты осеннихъ изслёдованій своихъ бурачищъ, осуществлять на д'єлё выработанный совм'єстно планъ борьбы съ жукомъ, а зат'ємъ, по окончаніи всёхъ работъ, вся стоимость ихъ разверстывалась-бы между всёми членами союза пропорціонально площади свекловичныхъ пос'євовъ въ данномъ году.

Разъ идея подобнаго союза гдѣ-нибудь осуществится на практикѣ, естественнѣе всего будетъ передать наблюденія за мѣстною жизнью долгоносика, производство осеннихъ изслѣдованій бурачищъ и обработку полученныхъ при

этомъ данныхъ, составление проекта осеннихъ и весеннихъ работь по борьбъ съ долгоносикомъ, смъть на пріобрътеніе приборовъ и ядовъ, наконецъ, техническое руководство по всвмъ вопросамъ, касающимся борьбы съ долгоносикомъ, спеціалисту-энтомологу, приглашаемому на средства всёхъ членовъ союза, который имълъ-бы мъсто жительства въ одномъ изъ хозяйствъ, входящихъ въ составъ союза, гдъ образовалась-бы, такимъ образомъ, небольшая энтомологическая станція, пресл'вдующая интересы исключительно м'встнаго свекловичнаго района. При 10-15 членахъ союза содержаніе спеціалиста явилось-бы ничтожнымъ добавочнымъ расходомъ для каждаго хозяйства, а между тъмъ они могли-бы пользоваться услугами спеціалиста, который в'вдаль-бы все дъло, причемъ были-бы гарантированы: правильность и однородность собиранія и обработки матеріаловъ и выполненія нам'вченнаго плана борьбы съ долгоносикомъ, безпристрастіе при оцънкъ степени зараженности бурачищъ и болъе научная постановка біологическихъ наблюденій, а потому и большая пригодность ихъ для практическихъ цълей.

опечатки.

AZMEN	DIXP II Becel	Напечатано.	Должно быть.
Cmp.	Строка.	Личинка	Личинка (Табл. рис. II b)
6 K	5 снизу	Куколка	Куколка (Табл. рис. II с и d)
7	near on a	Cl. faveicollis	Cl. foveicollis
12	3 сверху		Cl. cinereus
17	10 "	Cl. cinere us	Cl. ophthalmicus
-110-11	3 снизу	Cl. ophthalmi cu	lineatus
-1023	4 сверху	Lineatus de Ministro	lineellus
RETTO	PHOLOMOTHS	Lineellus	
29	1 name	Seidltz	Seidlitz
46	12 "	давъ	дать
47	3 снизу	не приходилось	ръдко приходилось
		ни разу	
65	114 MI,0 amil	T VBCe, M B ARTOURS	BCe; BLAKET REAL EMOTEUR
79	12 n n 1 k	(С. А. Мокржец-	С. А. Мокржецкимъ 1)
		кимъ 1)	TETO, TORISONE BERTH-C
89	9 сверху	14	15
99	at 2 distribution	первому	такому
105	2 снизу	J. K. Haywoad	J. K. Haywood
124	0 1917 1111 11 117	сильное правина	обольшое по напантанта
126	7 сверху	эдлиптическое	эллиптическое или
100	de Par	THE PARTY OF THE P	круглое
127	1 снизу	R	K
136	10 ,	Вермореля	Фигаро
137		Вермореля	Фигаро
		приэтомъ	при этомъ
138	4 сверху	приотоже	SALES AND

1948/1