

I 1949 K

Huzy

# ОРОГРАФИЧЕСКІЙ ХАРАКТЕРЪ

#### кольскаго полуострова

(ПЕРЕШЕЙКА)

въ связи съ **ледниковыми явленіями** и явленіями **поднятія**, размыванія и намыванія.

Николая Кудрявцева.

# СОДЕРЖАНІЕ.

#### ГЛАВА І.

#### Орографическій очеркъ.

Характеръ страны. Распредъленіе горъ, водъ, —озеръ и рѣкъ. Горы. Массивы и отдъльные купола. Характеръ горъ. Высоты ихъ. Тундры и вараки.

Долины. Характеръ долинъ. Четыре типа. Долины размыванія. Долины складчатости породъ. Ледниковыя долины или горные лога. Горныя котловины.

Воды. Конфигурація озеръ. Правильные ряды ихъ. Наволоки, острова, полуострова, заливы и проч.

Разности уровней озеръ и морей. Уклоны ръкъ.

Стверный пейзажъ у гор. Колы, съ вершины Горълой Тундры.

## ГЛАВА ІІ.

#### Ледниковыя явленія.

Телескопическое борождение.

Связь его съ конфигураціей и рядовымъ распредъленіемъ озеръ.

Dômes arrondis, Roches moutonnées, бараньи лбы, желоба, шрамы, полировка и царапины.

Цирки и морены. Ледниковый наносъ.


Берожденіе на вершинахъ и въ глубокихъ долинахъ.

Направленіе движенія въ различныхъ мастностяхъ.

Выпахиваніе или невыпахиваніе?

Опять ледниковый пейзажъ у Колы.

Нарвао-филента с



#### ГЛАВА ІІІ.

#### Явленія поднятія.

Берега западнаго Бъломорья, отъ Сумскаго Посада до Кандалакши.

«Рамбаки» -- линіи уровней и стертыя царапины.

«Пуръ-Наволокъ» - колоніи баланидъ.

«Сухая Губа» -- береговые валы.

Сохранность ледниковой полировки и царапинъ въ Кузакоцкой губъ на Средней Лудъ.

Кандалакша-отмытый тонкій песокъ съ раздробленными ракушками и съ Buccinum undatum, Ogranovenous OTAHOHILOS

Ръка Нива-вымываніе русла въ прежде отложенныхъ наносахъ, ускореніе теченія, поднятіе.

Береговыя террасы на Имандръ, по Пелесмозеру и пр.

Іокостровъ — перемытый матеріалъ ледниковаго наноса; слоистые пески; тонкій песокъ на верху.

Разнаволокъ-горизонтальные слоистые пески.

Соловарака-двъ террасы.

Въ Кольской губъ и по ръкъ Колъ-песчаные слоистые наносы; террасы; торосы.

Тулома — аллювіальная долина; террасы; углубленіе русла; разрушеніе песчаных острововъ; глиняно-известковыя террасы въ 10 вер. отъ Колы; горизонт. слоистые наносы у Соловараки.

Характеръ береговъ по Пулозеру и Мурдозеру; особенно на Пелесмозеръ, -- валунныя набережныя.

Жельзный наволокъ.

Прежнее русло реки Колы, около гор. того-же имени, и подножія Соловараки.

#### ГЛАВА IV.

#### Явленія размыванія и намыванія.

Соловарака. Два уровня. Воображаемое понижение мъстности на 47 метр. Выполнение Туломой долины. Чередование слоевъ гравія и тонкаго песку въ

Размывание первоначальное и современное.

Размываніе русла въ ръкъ Нивъ; по Пелесмозеру; по Имандръ; отсутствіе цесковъ на Имандръ; размываніе морены у Хибиныхъ Тундръ.

Пески у Разнаволока; богатство Туломы песками; береговыя террасы; переметы; размывание острововъ.

Рѣва Тулома; ен жизнь.

#### Приложенія:

- 1. Списокъ высотъ, опредъленныхъ барометрически.
- 2. Разръзъ Кольскаго полуострова, проведенный чрезъ Кандалакшу, Имандру и Колу.
  - 3. Объяснительная табличка къ разръзу.
  - 4. «Озеро Имандра»; нъсколько данныхъ для описанія озера.
- 5. Списовъ русскихъ и лопарскихъ названій къ тому же озеру, въ порядкъ ихъ естественнаго расположенія.

Предлагаемый очеркъ составляетъ окончательный результатъ моихъ изследованій на Кольскомъ полуостров'в (перешейк'в).

LOUIS IL HOURT VARBATTEPE CORREMENTO ROUSTREBURY CHERRAL BR-

A. Romain Homorpoons, 1881 at 1881 at

Въ предварительномъ отчетъ, читанномъ въ общемъ Собраніи Общества Естествоиспытателей, въ мав 1881 года, я вкратцъ указалъ на главнъйшіе результаты монхъ изслъдованій и главнымъ образомъ обратилъ внимание на физико-географическія отношенія.

Въ настоящемъ очеркъ, какъ указываетъ самое заглавіе, я разработалъ чрезвычайно интересныя соотношенія орографіи мъстности, ея рельефа съ дъятельностью ледниковъ минувшаго періода. Главнымъ образомъ я останавливаюсь на спорномъ до сихъ поръ вопросв о ледниковомъ выпахивании и на телескопическомъ борожденіи. Затъмъ излагаю факты поднятія, размыванія и намыванія, въ особенности по отношенію ихъ къ изм'вненію рельефа и конфигураціи современныхъ очертаній мъстности.

Главная идея, — тъсная зависимость современнаго рельефа отъ ледниковаго выпахиванія, - проведена чрезъ все сочиненіе и составляеть связующее звено четырехъ главъ, на которыя, совершенно естественно, разбитъ мой очеркъ. Такимъ образомъ составилось четыре главы — "Орографическій характерь", "Ледниковыя явленія", "Явленія поднятія" и "Явленія размыванія и намыванія".

Здъсь я совершенно не затрогиваю вопроса о распространеніи л'єсной растительности, хотя этотъ вопросъ чрезвычайно

интересенъ; желающихъ познакомиться съ добытыми мною данными по ботаникъ отсылаю къ моему предварительному отчету ("Кольскій Полуостровъ" 1881 г.).

Точно также здёсь не найдуть систематическаго описанія мёстности. Эта работа мной исполнена въ теченіи прошлаго года и носить характерь совершенно нопулярнаго очерка, замётокъ туриста; она, вёроятно, въ ближайшемъ будущемъ появится въ одномъ изъ нашихъ періодическихъ журналовъ.

nonce non chomological the boundary or conk (medemological)

жана чан полица, потронаваться на проделение в принеский принеский

з свей и вовершения из тратропиров вопрост в распрост

кольскій полуостровъ

# I' JI A B A I.

## Орографическій очеркъ.

Высокое плоскогоріе отд'вляется отъ громаднаго горнаго кряжа Скандинавскаго полуострова, по направленію на востокъ и юго-востокъ, и въ видъ удлиневнаго горнаго массива проходить чрезъ перешеекъ Кольскаго полуострова и выполняетъ последній. При первомъ знакомстве уже, подъезжая къ Кандалакшъ, вы поражаетесь громадными горами, которыя вплотную примыкають къ Кандалашской губъ. Чёмъ дале вы проникаете вглубь полуострова, темъ более убеждаетесь, что представленія о низменных болотистых тундрах лишены всякаго основанія. Главный, господствующій характеръ м'ястному ландшафту придають высокія обнаженныя скалы, м'встами только сближенныя, мъстами-непрерывно тянущіяся, въ видъ плато, на протяжени 2-21/2 тысячъ квадр. верстъ. Средняя высота плоскогорія можеть быть принята, по моему изм'вренію, за 300-350 метровъ (около 1000'); но есть отдёльныя горныя массы, которыя поднимаются надъ этимъ плато еще на громадную высоту. Такъ напр. Хибины Тундры - горы, возвышающіяся на берегу озера Имандры, достигають абсолютной высоты въ 920 метровъ ( =3020'=1300 аршинъ), при площади въ 2400 квадр. верстъ.

При моихъ неоднократныхъ поднятіяхъ на высокія вершины, я успѣлъ вполнѣ убѣдиться въ томъ, что всѣ отдѣльныя цѣпи горъ, поднимающіяся надъ плато, тянутся длинвыми рядами, параллельными между собой и — другимъ смежнымъ

ценямъ. Тавъ напр. Чауны Тундры, лежащія на западномъ берегу озера Имандры, представляють эту правильность. Они, вмѣстѣ со своими ближайшими сосѣдями—Хибиными тундрами, составляють главнъйшіе возвышенные пункты перешейка. Къ нимъ следуетъ присоединить, лежащія северне, Масельскія тундры. Остальныя извъстныя мнъ горы значительно ниже,будемъ ли мы подвигаться на югъ или на съверъ. Но, во всякомъ случав, мъстность, сильно гористая у Кандалакши, гдв лежать тундры: Волостная, Крестовая, Жельзная (900' = 274 метра), постепенно поднимается на съверъ, гдъ послъдовательно идутъ Плёсова тундра, Сырая тундра, на южномъ берегу озера Имандры, и наконецъ у средины его достигаетъ максимума, гдв лежать Хибины и Чауны, затвмъ идуть Вороньи тундры, Лоудусъ тундры, Средняя тундра, Чуны, Монча тундра, Нюда тундра, Масельскія-у Колозера, Чурма-Уавинчъ на Пулозеръ. Тамъ же, противъ нея поднимаются Кустменъ Варанчь значительно ниже предъидущей; Пучокъ или Чокъ-Варанчь, которая высится у самаго начала Пуолозера и изящно выдъляется своей двойной вершиной. Куадда-Уавинчь — двъ горы около средины того же озера. Пульчекъ-варанчь-къ съверу, Гангесъ-гора, еще дальше Вересковая гора — Кыскесъ-Пайкъ.

По Мурдозеру, при началѣ высокая тундра—Руыптъ-Ветъ, Новая цѣпь горъ — Куадда-Уавинчь, затѣмъ Шарый-Ветъ — двѣ горы одинаковаго наименованія.

За станціей Кицы, къ сѣверу, идутъ Овечья Варака, Шонга-Варака, Саловарака на Колъ; Караульная, Соколиная по Туломѣ и Горѣлая тундра въ Кольской губѣ, которая господствуетъ надъ всѣми окрестностями.

И такъ, мы видимъ, что чрезъ весь Кольскій перешеекъ, отъ Кандалакской губы до Кольской включительно, тянутся высокія горы съ обнаженными (тундры) или облиственными вершинами (вараки).

Конечно, всѣ эти горы изрѣзаны массами глубокихъ долинъ съ болѣе или менѣе крутыми склонами. Это, по мѣстному названію—лога. Глубокія котловины, заключенныя среди описанныхъ горъ, и лога ихъ, служатъ, большею частью, вмѣстилищами массы озеръ, ихъ выполняющими. Понятно само собой, что эти горныя озера, образовавшись въ случайныхъ котловинахъ, всъ лежатъ на различныхъ высотахъ, на неясно выраженныхъ террасахъ; они сообщаются между собой случайными протоками, которые, падая каскадами или порогами съ уступа на уступъ, несутъ свои воды къ морю. Такъ, здѣсь Пелесмозеро и Колозеро занимаютъ высшій пунктъ, и лежатъ притомъ на равныхъ высотахъ, всего въ полутора верстахъ одно отъ другаго. Но сообщенія между ними теперь нѣтъ. Здѣсь находится водораздѣлъ. Пелесмозеро, принимая въ себя Сыро-іокки, несетъ свои воды, въ видѣ бурнаго потока, въ озеро Имандру, которое, въ свою очередь, принявъ нѣсколько притоковъ, высылаетъ рѣку Ниву въ Кандалакшскій заливъ.

Колозеро отдаетъ свои воды при помощи водоската въ Пулозеро, оттуда въ Мурдозеро и, наконецъ, ръка Кола сначала, на протяженіи 18 верстъ, бъшено несется къ океану; но потомъ, успокоившись, быстро, но не бурно, течетъ дальше и опять только послъднія 4 версты ея теченія представляютъ водоскатъ

Если бросить общій б'яглый взглядъ на карту Кольскаго полуострова, и обратить при этомъ нѣкоторое вниманіе на озера и рѣки, то они невольно остановять на себѣ ваше вниманіе правильностью своего расположенія. Озеро Имандра напр. тянется на протяжении 90 верстъ съ съвера на югъ; прямымъ продолжениемъ его служатъ озера Пелесмозеро и Колозеро. Параллельно ему идуть - на восток в Умбозеро и Кутозеркина западъ, насквозь проръзающія Чауны-тундры. Другое направленіе, тоже чрезвычайне ясно выраженное, мы находимъ въ рядъ озеръ-2 Челмозера и 2 Пиренгозера, тянущіяся съ запада на востокъ на протяжении 70 верстъ; юживе, параллельно имъ, идутъ Калонгозеро и Кандасъ и продолженіемъ ихъ служитъ Бабинская Имандра. Еще юживе-Вадозеро тянется въ томъ же направленіи. Съвернъе-Ольчезеро, Кусколь, Ламбино, Кашкозеро, Сухоламбино, Манчезеро, Кувдоярви и Рагозеро, имъютъ стокъ въ Мончу губу, тянущуюся въ томъ же направленіи, простираются съ запада на востокъ. На востокъ, изъ Умбозера воды идутъ чрезъ 2 Чуднезера, 2 Сымбозера, Печу рѣку и Печозеро въ Имандру къ Разнаволоку. И, наконецъ, чуть ли не самое поразительное, по правильности своей формы, Нявкозеро, представляющее крестъ, вѣтви котораго идутъ—одна съ З. на В., другая съ ССЗ на ЮЮВ.

Наконецъ, переходя далѣе на сѣверъ, мы находимъ тамъ господствующимъ третье направленіе. Пулозеро, Мурдозеро, Кола-рѣка́, Тулома, Нотозеро и рѣка́ Конна (на 60 вер.) тянутся всѣ параллельно съ ЮЗ на сѣверо-востокъ.

Ръка Кола еще тъмъ интереснъе, что сбивается съ одного направленія на другое, но снова упорно возвращается къ первому. Такъ, вытекая изъ Мурдозера, Кола продолжаетъ его линію и идеть на с'вверо-востокъ; затімь, встрітивь у Кицъ горный кряжъ Овечьей тундры, сворачиваетъ на ССЗ; потомъ принимаетъ опять свверовосточное направленіе, встрвчая затъмъ препятствие въ Шонга-варакъ, сворачиваетъ опять параллельно прежнему на ССЗ, потомъ опять принимаетъ СВ направленіе и, наконецъ, снова сворачиваетъ на ССЗ и впадаеть въ Кольскую губу. Такая троекратная борьба не доказываетъ ли намъ совершенно очевидно существование правильности въ распредъленіи горныхъ кряжей? И дъйствительно. мы видимъ, что Чауны тундры идутъ параллеличо озеру Имандръ и Хибинскимъ тундрамъ, въ южной части озера, между Зашейкомъ и Гокостровомъ, хотя продолжение Чаунъ идеть вдалект отъ берега на разстояни 7-8 верстъ, но они тянутся также совершенно параллельно озеру. Въ Хибиныхъ тундрахъ, хотя и представляющихъ одно сплошное плоскогорье, мы, все-таки, находимъ лога, которые тянутся въ этомъ направленіи; — таковъ Долгій логь, параллельный озеру Имандръ.

Однимъ словомъ, правильность распредѣленія озеръ, всегда занимающихъ горныя котловины и зависящихъ отъ распредѣленія горныхъ кряжей, ясно указываетъ на правильность таковыхъ и сама подтверждается этими послѣдними и объясняется ими.

Такимъ образомъ мы приходимъ къ слѣдующему выводу. Озера располагаются по котловинамъ параллельными рядами потому, что таково расположение горныхъ кряжей.

И это неоспоримо для Имандры, Умбозера и многихъ другихъ.

Но почему ряды соединяющихся котловинъ, на западѣ отъ Имандры, тѣ, которые идутъ на широтѣ средины озера, идутъ съ запада на востокъ, совершенно правильно или волнисто—извиваясь, а южнѣе,—тянутся болѣе къ югу и принимаютъ юговосточное направленіе; сѣвернѣе же тянутся на сѣверовостокъ?

Если это случайно, то почему сохраняется въ извъстномъ районъ параллелизмъ озеръ?

Почему долины ръкъ тянутся въ томъ же направленіи на протяженіи 60—70 верстъ прямо, какъ стръла?

Почему, слъдовательно, горные кражи принимають это лучистое расположение?

Оставляя покам'єсть эти вопросы открытыми, я обращаюсь снова къ удивительно правильной конфигураціи береговъ, наволоковъ и острововъ.

Берега каждаго озера параллельны между собой. Такъ, въ Имандръ берега параллельны; въ Колозеръ, Пулозеръ, Мурдозеръ, Умбозеръ, Гремяхъ, Нотозеръ, Толвантъ и многихъ другихъ уже приведенныхъ раньше.

Мысы и наволоки, образованные этими берегами, тянутся всъ параллельно другъ другу, и бываютъ вытянуты въ одномъ направлечіи на 3—4 версты.

Такъ, особенно замъчательно въ этомъ отношении Пелесмозеро, которое изобилуетъ массой наволоковъ, очень узкихъ, вытянутыхъ на ССВ, составляя при этомъ весьма незначительный уголъ съ самымъ озеромъ; такъ что между берегомъ и наволокомъ образуется очень узкая и длинная, глубокая губа. Все эти наволоки сложены изъ крупныхъ валуновъ.

Всв острова на Имандръ, разбросанные въ огромномъ количествъ, сильно вытянуты въ длину, при томъ строго параллельно между собой. Два раза поднимался я на высокія береговыя тундры этого озера, на Сырую тундру и Хибины тундры и оба раза, видя у своихъ ногъ озеро, смотря на него съ громадной высоты въ 400 и 920 метровъ, былъ пораженъ тъмъ тождественнымъ параллелизмомъ береговыхъ очертаній острововъ, наволоковъ и береговъ, которое невольно ставитъ вопросъ — почему?

rosepa u Henecuciena. Safici romosia reput sanesa panerunariran

Обращаясь къ долинамъ и вообще углубленіямъ земной поверхности въ различныхъ видоизмѣненіяхъ, мы находимъ здѣсь развитыми главнымъ образомъ три типа:

1) Очень широкія и обширныя луговыя долины, или громадныя котловины, къ которымъ надо отнести напримъръ обширное низменное пространство, заключающееся между ръкой Колой на западъ, Овечьей варакой на югъ и Шонга-варакой на съверъ. Оно не имъетъ опредъленныхъ очертаній. Это очень низкая равнина, сильно болотистая, съ сохранившимися, мѣстами, небольшими озерками и пробивающимися изъ нихъ, сильно извивающимися среди болота ручейками. Жалкая растительность, состоящая изъ кривыхъ сосенокъ и корявыхъ березокъ, непревышающихъ двухъ аршинъ въ высоту; преобладаніе ерника, багульника и гажьей ягоды указываеть на тощую почву. Дъйствительно, насколько можно было разобраться среди ржаво-красной, застоявшейся среди кочекъ, воды, я убъдился, что собственно растительный слой здёсь отсутствуеть, а подпочва состоитъ изъ перемытаго, сортированнаго ледниковаго наноса. Мъстами выглядываютъ крупные валуны. Изръдка надъ однообразной равниной поднимаются купола отдельныхъ скалъ, сильно обточенныхъ и нигдъ не превышающихъ 10 метровъ. Мъстами приходится пробираться по обрывистымъ карнизамъ тавихъ отдёльных скалъ, и подъ ногами у васъ разстилается тогда болье или менье широкій проливь, отдыляющій два подобные острова. Весь онъ теперь сильно заросъ осокой, тростниками и, отъ края до края, въ ширину до 70 метровъ, выполненъ низко стоящей водой, которая только въ срединъ проложила себъ свободный путь и, нестъсняемая никакими зарослями, въ видъ неширокаго протока, тихо журча и крутясь, катитъ свои воды въ боле низкую котловину. Общій характеръ мъстности, берега котловины, нивеллировка дна, сортировка матеріала, сильная обкатанность г екъ и теперешнее состояніе, —чисто переходное, ясно говорять намъ, что это только-что уничтожившееся озеро, излившее свои воды, въроятно, въ Колу-ръку.

Такого же характера котловину встръчаемъ мы около Колозера и Пелесмозера. Здъсь высокія горы далеко разступаются въ стороны, и низменныя, болотистыя береговыя пространства, и громадныя массы крупныхъ валуновъ, съ вымытымъ матеряломъ, куда-то снесеннымъ водой, ясно указываютъ, на обоихъ озерахъ одинаково, что ихъ болотистыя береговыя пространства составляли дно одного громаднаго озера.

И такъ, первая форма котловинъ, всегда обширныхъ, не имъетъ правильныхъ очертаній и, какъ указываютъ детальныя изслѣдованія, принадлежатъ къ вмъстилищамъ пересохшихъ теперь озеръ.

2) Ръчныя и озерныя долины, а также глубокія горныя долины и лога, согласно расположенныя съ ближайшими цъпями горъ, и, главное, съ общимъ параллелизмомъ направленій горъ и озеръ въ данной мъстности; оно согласно напластованію горныхъ породъ и параллельно линіи простиранія.

Такія долины, большею частью, длинны и узки. Он'в тянутся прямо, на протяженіи н'вскольких десятков версть и ограничены высокими крутыми берегами. Это настоящія горныя долины.

Таковы долины Чаунъ Тундръ, Долгій логъ въ Хибиныхъ Тундрахъ, долина озера Имандры въ его средней части; долина Умбозера—по аналогіи.

Простираніе породъ, здѣсь развитыхъ, идетъ съ С на Ю, едва увлоняясь въ ЮЮВ, слѣдовательно параллельно озеру Имандрѣ и Чаунамъ-Тундрамъ.

Такъ какъ положение пластовъ здёсь сильно нарушено, они являются сильно складчатыми, мёстами поставленными на голову, то я полагаю, что именно складчатостью горныхъ породъ надо объяснить образование такихъ долинъ.

3) Наконецъ, идущая совершенно въ разръзъ съ предыдущей формой долинъ—по своему образованію и по своему направленію, —форма логовъ, тянущихся въ крестъ простиранія, по направленію, параллельному линіи паденія пластовъ.

Такъ напримър , въ тъхъ же Хибиныхъ Тундрахъ, мы видимъ цълый рядъ крутыхъ и глубокихъ логовъ, совершенно параллельныхъ между собой. Они имъютъ очень высокія округленныя стънки—выпуклыя во внутрь лога, очень узкіе внизу, заграможденные на днъ обточенными — угловатыми, и круглыми,

обкатанными валунами; они проръзываютъ насквозь цълую систему на голову поставленныхъ пластовъ, плоскости которыхъ перпендикулярны направленіямъ логовъ.

Ясно, что способы образованія этихъ трехъ системъ долинъ неодинаковы.

Первыя, собственно котловины, такія широкія впадины, которыя существовали первоначально тамъ, гдѣ широко разступаются горы. Затѣмъ, онѣ увеличивались въ размѣрахъ, вслѣдствіе размывающаго дѣйствія текучихъ и атмосферныхъ водъ. Наоборотъ, неровности дна ихъ, вслѣдствіе намыванія сюда продуктовъ разрушительной дѣятельности воды, постепенно выравнивались.

Вторыя, собственно горныя долины, тянутся параллельно главнымъ горнымъ кряжамъ и линіямъ простиранія породъ. Онѣ объясняются складчатостью горныхъ породъ, происшедшей, можетъ быть, вслѣдствіе боковаго давленія отъ осѣдающей Скандинавской горной страны, протяженіе которой параллельно, приблизительно, направленіямъ наиглавнѣйшихъ горныхъ долинъ.

Третьи, горные лога, идущіе перпендикулярно, или, по крайней мірів, подъ значительнымъ угломъ къ главнымъ горнымъ кряжамъ, вслівдствіе своего строгаго паралеллизма не могуть быть объяснены первымъ случаемъ, вслівдствіе своего направленія вторымъ. Къ разсмотрівнію этого вопроса мы вернемся еще.

Кому незнакомъ «ледниковый ландшафтъ» по книгамъ? Читая описанія Агассиза, Ляйелля, Гельмгольца, Тиндаля и др., невольно удивляєшься сходству приводимыхъ ими признаковъ для различныхъ ледниковыхъ областей. На эту общность типа—характера мъстности особенно указываетъ Крапоткинъ- Но, когда, вполнъ знакомый съ этимъ ландшафтомъ по Финляндіи, по рисункамъ и описаніямъ, я самъ впервые увидалъ его на громадномъ протяженіи, ясно развитымъ въ съверныхъ окрестностяхъ города Колы; когда съ вершины Горълой Тундры открылся предо мной громадный кругозоръ, я былъ пораженъ однообразіемъ, плавностью линій, правильностью, но и мер-

твенностью этого жалкаго пейзажа. Поэтому позволю себѣ, въ качествѣ личнаго наблюдателя таковаго, развитаго притомъ въ наиболѣе типичной ледниковой мѣстности, привести описаніе самой Горѣлой Тундры и открывающагося съ нея вида. Въ 4 верстахъ къ сѣверу отъ города Колы, на правомъ берегу губы, поднимается высокая и довольно крутая гора, носящая названіе Горѣлой Тундры. Съ южной стороны, на высотѣ, приблизительно около 100 метровъ, ее окаймляетъ возвышевное болото, поросшее мелкимъ лѣскомъ и усѣянное громадными, многосаженными, остроугольными валунами. Съ западной стороны, т. е. отъ рѣки Колы, гора сильно округлена, обточена и представляетъ громадный бараній лобъ. Съ востока она круто и неправильно обрывается. Высота Горѣлой Тундры 257 метровъ.

Вершина представляетъ совершенно голые выходы основной горной породы, гнейсовидной, съ частыми включеніями гранита. Она непокрыта никакой растительностью, кром'в лишаевъ и мховъ, а въ расщелинахъ, при самой ничтожной толщинъ хумуса, уже ютится жалкій ерникъ, не бол'ве вершка высотой, зат'ємъ гажья ягода и вороника. Пласты, поставленные зд'єсь совершенно на голову, носятъ волнистый характеръ. Простираніе ихъ на NW отъ 297—305. Паденіе, по крутизн'є едва опред'єлимое, идетъ на югъ. Настоящая древесная растительность начинается на высот'є 170 метровъ.

По направленію на востокъ, какъ я сказаль уже, эта скала оканчивается обрывомъ около 2 саж. высоты и внизу, въ выточенномъ углубленіи, въ бассейнъ скопилась въ значительномъ количествъ дождевая вода.

На Западъ и на Сѣв.-Западъ скала спускается легкимъ, отлогимъ склономъ, какъ разъ по направленію простиранія пластовъ, поставленныхъ на голову. Кругомъ все покрыто отчасти гранитными валунами, отчасти розсыпями этой самой породы, которая, повидимому, легко вывѣтривается.

На сѣверъ, у ногъ вашихъ, свѣтлой полосой вьется рѣка Кола, съ красивыми, причудливой формы, мысами и переметами. Съ правой стороны, на берегу, виденъ крутоспускающійся въ воду, густо покрытый лѣсомъ, наволокъ, видимо—

бараній лобъ, поросшій со временемъ сосновымъ лісомъ. Это часть вараки. Далъе, по лъвому берегу, видны высокія береговыя скалы, по здёшнему пахты. Онё оканчиваются или бараньими лбами, или лудами, здёсь носящими название щелье. Приблизительная высота ихъ отъ 10-15 саж. Далее Кола теряется за однимъ изъ наволоковъ, и только волнистыя высокія сърыя тундры, да мохнатыя вараки, смѣняются однѣ другими на разныхъ планахъ и, постепенно окрашиваясь сизой дымкой, теряются за горизонтомъ. Съ лъвой руки, т. е. по лъвому берегу Колы, поднимаются высокія тундры, которыя поэтому, уже съ ближайшихъ плановъ, закрываютъ намъ дальнъйшій видъ на NW. А на Стверъ и Ств.-Востокъ тундры значительно ниже, и потому въ глубокую даль видны-точно приплюснутые купола, одинъ за другимъ, цълыми неправильными рядами, заслоняя другъ друга, какъ плавно очерченные валы зыбью волнующагося моря. Всв они совершенно сглажены, обточены, округлены и, что особенно характерно, всподнимаются почти на одну и ту же высоту. Ширина ихъ втрое или вчетверо превосходить высоту; контуры рѣзко очерчиваются при яркомъ солнечномъ освъщении, и ясно видно, что края ихъ не плавно сливаются, а ръзко, подъ острыми углами перекрещиваются внизу.

На ONO, О и SO видны утесистыя скалы, съ обрывами и крутыми склонами. Это вараки, густо — до верху поросшія лівсомъ. За ними, дальше вглубь, опять тів же вараки и тундры; слівдов. опять повтореніе того же самаго.

Но красивъе всего видъ на югъ, вверхъ по ръкъ Туломъ, которая впадаетъ въ Кольскую губу. Тамъ, при самомъ ея впаденіи, на низенькомъ мысочкъ, стоитъ гор. Кола. Яркой голубой лентой вьется Кола и Тулома. Ръзко обозначаются на водъ наволоки. Вотъ, прямо за г. Колой виденъ по ръкъ вытянувшійся съ праваго берега, большой мысъ, а за нимъ черньетъ большой Нъмецкій островъ, за которымъ, скоро, два наволока противуположныхъ береговъ такъ сходятся, что берегъ, надвигаясь на берегъ, скрадываетъ даль и ръка Тулома теряется изъ виду. Но дальше, за массой надвинувшихся другъ на друга тундръ и варакъ, еле-еле видны на горизонтъ блъд-

ныя очертанія небесно-голубыхъ горъ съ острыми вершинами. Хибинскія ли это горы или Масельскія тундры? — трудно сказать.

Сама Кола-ръка вовсе не видна съ Горълой тундры — она скрывается за крутымъ наволокомъ около самой Солова-раки.

На западъ, на другомъ, лъвомъ, берегу ръки Колы, бросается въ глаза, сильно блестящее на солнцъ, озеро, версты 2 въ окружности. Оно называется Дровянымъ озеромъ; изъ него беретъ начало Дровяной ручей, впадающій въ Кольскую губу.

Надъ самой Колой видна, высоко-поднимающаяся надъ городомъ съ юга,—Соловарака, круто падающая къ ръкъ Колъ и на съверъ, но отлого спускающаяся къ Туломъ, т. е. на западъ.

Выше и дальше, прямо за Соловаракой, тянутся опять цвлые ряды варакъ и тундръ, сначала рвзко очерченныхъ, почти
черныхъ—лвсистыхъ, или сврыхъ—съ голыми вершинами. Потомъ, постепенно точно дымкой заволакиваются ихъ контуры,
все болве и болве теряясь въ сизоватой дали и только на самомъ горизонтв высоко поднимаются правильнымъ рядомъ цвпи
видимыхъ волнующихся вершинъ, перемежающихся мвстами съ сверкающими снъжными пятнами.

Горы. Высоты горъ, на сколько онъ мнъ извъстны, могутъ быть для Кольскаго полуострова распредълены на двъ группы: 1) Вараки — небольшія горы съ поросшей лъсомъ вершиной. 2) Тундры, съ голой вершиной, —значительно большей высоты.

1) Вараки. Существенный признавъ вараки заключается въ томъ, что она всегда, до самой вершины, включительно, покрыта мощнымъ ледниковымъ наносомъ. Это признавъ общій и очень важный. Мое мнѣніе таково, что до извѣстнато предъла,—въ Колѣ до 200 м., характеръ вершины горы, т. е. облиственность ея или голость, зависитъ прямо отъ того—смытъ ли ледниковый наносъ или же сохранился. Такъ напр. на Со-

колиной горф — по рфкф Туломф, поднимающейся выше 400 метровъ, мы видимъ растущими крупныя сосны, просто потому, что форма скаль, хотя и обрывистыхъ, такова, что наверху образуется достаточно большая горизонтальная площадка, на которой сохранился слой разрушенной горной породы. Въ противномъ случав, при довольно крутыхъ и постепенныхъ склонахъ, начинающихся отъ самой вершины, весь наносъ легко смывается и на голой отполированной поверхности скаль не можеть гивадиться никакая растительность. Такъ, на бараньемъ лбу, противъ Караульной вараки, нътъ растительности, хотя высота только 5 саженъ. Поэтому, даже въ томъ случав, когда варака сильно заросла лъсомъ, и ледниковый наносъ покрыть мощнымъ моховымъ покровомъ, и тогда мы можемъ признать его присутствіе, а следовательно и характеръ горы, по крупнымъ, иногда громаднымъ валунамъ, ръзко выдающимся изъ моховаго покрова. На подножіи вараки мы находимъ резко-угловатые валуны; на подножіи тундры -- обкатанные, круглые.

Такъ напримъръ, Соловарака, поднимающаяся надъ Колой, состоитъ изъ основной массивной горной породы, гнейса—выходы котораго мы находимъ въ берегахъ Туломы. Но наверху мы не находимъ никакихъ признаковъ матерой породы; т кова толща ледниковаго наноса; между двумя куполами Соловараки, съвернымъ и южнымъ, проходитъ глубокая котловина, но и въ ней не видно никакихъ признаковъ гнейса. Крупные валуны разсъяны по поверхности горы и мъстами на ней видны поросли молодаго лъса. Въ двухъ глубокихъ воронкообразныхъ котловинахъ ничтожные остатки озеръ. Мъстами громадные угловатые валуны, забравшіеся на самыя высокія точки вершины, довершаютъ картину. Высота Соловараки 81 метръ.

Овечья Варака, лежащая у самой станціи Кицы, въ какихъ нибудь полутора верстахъ отъ нея, интересна, какъ типъ вараки. Она покрыта мощнымъ слоемъ ледниковаго наноса, самаго типичнаго, не отсортированнаго. Здѣсь, мы наравнъ находимъ и громадные остроребристые валуны, съ глубокими бороздами, и средніе валуны, сильно обточенные, и щебень и песокъ и самую тонкую пыль. Сохранность наноса объясняется здъсь формою горы. Она тянется на протяжении 5-6 верстъ, и площадь ея на столько велика, что ледниковый наносъ сохранился. Этимъ, въ свою очередь, объясняется присутствіе лъса и его крупные размъры. Средніе обхваты деревьевъ таковы: — для сосенъ 126,2 Ст., — для березъ 74,1. Прекрасный рослый люсь производить здюсь отрадное впечатлюніе. Крупныя колонны стволовъ сосенъ высоко поднимаются кверху, не давая сучьевъ; совершенно прямые, точно выточенные, ровные, какъ въ тщательно содержимомъ паркъ любого англомана, они, разставленные на довольно значительныхъ разстояніяхъ, не тъснять васъ, а дають просторъ глазу вдоволь налюбоваться богатствомъ и красотой съверной природы. Только на самомъ верху, начиная съ 4 - 5 саженъ, широко раскидывается два-три мощныхъ, причудливой формы, сучка, образующихъ, распадаясь на цълую кущу вътвей, широкій тынистый шатеръ, который, сплетаясь съ ближайшимъ сосъднимъ, и дальше все также..., -образують твнистый покровь надъ стройной колоннадой лъса. Изръдка, черныя ели-правильными пирамидами, да сфровато-сиреневыя березы — своими стволами, кривыми или ровными, разнообразять и правильность и колориты мѣстнаго лѣса. Высота горы 185 метровъ. Другая, подобная же гора, Шонга-варака, находится верстахъ въ 16 отъ Овечьей вараки. Онъ очень схожи по своему характеру. Только Шонга - гора обрывается крутыми утесами къ рект Коль. Высота ея 54 метра. На противуположномъ, южномъ концъ перешейка, мнъ пришлось проходить чрезъ высокую Заборную вараку, которая составляеть главный переваль отъ Кандалакши къ озеру Имандръ. Высота ея 150 метровъ.

2) Второй типъ горъ — тундры. Главное отличіе ихъ отъ варакъ и ихъ общій характеръ были мною выяснены уже раньше. Здѣсь я замѣчу еще слѣдующее существенное отличіе въ общемъ характеръ тундръ. Тундры вообще характеризуются голой вершиной. Но различіе можетъ состоять въ томъ, что, при этомъ условіи, вся гора — или тоже голая, или же покрыта лѣсомъ. Тогда мы будемъ имѣть — 1) типичныя тундры—совершенно голыя скалистыя горы, которыя, только при

основаніи, на ничтожную высоту, покрыты л'єсомъ. 2) Тундры л'єсистыя, которыя только на самой маковк'є несуть пл'єшь, а самая гора на всемъ протяженіи покрыта л'єсомъ.

Тундры типичныя. Къ первому разряду относятся самыя высокія горы полуострова: Хибины тундры, Чауны, Масельскія, Плесова, Жельзная, Волосная, Крестовая, Кыскесъ Пайкъ около Пулозера, Рыптъ-Ветъ около Мурдозера.

Хибины тундры, состоящія изъ одной массивной породы— роговообманковаго сіенита, съ мѣстными включеніями лучистаго камня, чрезвычайно подвержены размыванію. Вся сплошная масса скалъ распадается по плоскостямъ спайности, и разрушеніе идетъ такъ далеко вглубь, что нѣтъ возможности добыть хорошій штуфъ. Повидимому, мы имѣемъ всѣ условія для обоснованія здѣсь растительности. Но, въ дѣйствительности, мы видимъ противное. Внизу, у подножія, дѣйствительно, мы видимъ роскошную растительность. Затѣмъ, продолженіе ея находимъ на первыхъ уступахъ до высоты, приблизительно, въ 230 абсол. метровъ. Все остальное громадное пространство, до высоты самой вершины, въ 920 метровъ (1300 арш.) (—3020')— совершенно голо.

Все, что сказано объ общемъ характерѣ Хибиныхъ тундръ, можетъ быть примънено ко всъмъ вышеприведеннымъ.

Тундры лисистыя. Къ таковымъ должны быть отнесены: Сырая тундра, Горфлая тундра и Чурма-Уавинчъ на Пулозерф.

Главное отличіе всёхъ сюда относящихся тундръ отъ предыдущихъ, заключается въ томъ, что лісистыя тундры имфютъ болье куполообразную форму, это dômes arrondis, напоминаютъ мохнатыя шапки съ суконнымъ верхомъ. Такъ и горы мохнаты отъ льсу, а вершина ихъ голая. Типичныяже тундры всь имфютъ скорье форму плато или цъпей.

Входить въ подробное описаніе такихъ лѣсистыхъ тундръ нѣтъ никакой надобности, потому что онѣ представляютъ явственно переходную форму отъ варакъ къ типичнымъ тундрамъ.

Къ варакамъ онъ подходятъ, кромъ растущаго на нихъ лъса, еще и тъмъ, что онъ покрыты толстымъ слоемъ ледниковаго наноса; но выше извъстной черты этотъ наносъ смытъ и тамъ уже нътъ лъсной растительности. Къ тундрамъ тѣмъ, что на вершинѣ ихъ, какъ напр. на Сырой Тундрѣ, мы видимъ обнаженные выходы горной породы, непокрытые ледниковымъ наносомъ. Такъ и на Сырой Тундрѣ, и на Горѣлой можно, поэтому, свободно наблюдать простираніе и паденіе пластовъ породы, ихъ образующей и ледниковые шрамы и борозды.

Изъ приведенныхъ тундръ Сырая поднимается на высоту 380 метровъ, Горълая—257 м., и Чурма-Вавинчъ около 400 метровъ.

Разности уровней озерт и уклоны ръкт. Бросивъ бъглый взглядъ на карту Кольскаго перешейка, мы видимъ ясно-выраженный рядъ озеръ, которыя вытянулись естественнымъ образомъ такъ, что послъдовательно служатъ главными водоёмами водоёмами такъ, что послъдовательно служатъ главными такъ, что послъдовательно служатъ послъдовательно служатъ главными водоёмами такъ, что послъдовательно служатъ главными такъ, что послъдовательно служатъ служат

Мы уже раньше видёли, что водораздёль лежить посреди перешейка, между озерами Колозеро и Пелесмозеро. Воды пелесмозера стекають въ видё горнаго потока въ Имандру, а нек вытекаетъ рѣка Нива, впадающая въ Кандалакскій вадше.

Озеро Имандра, при протяженіи въ 90 версть, лежить на высоть 110 метровъ. На следующемъ уступе, надъ нимъ лежить. Пелесмоверо на высоте 135 м.; Колозеро на той же

Такимъ образомъ, наибольшая разность уровней, которую мы получаемъ для озеръ—Пелесма и Кольскаго, и Ледовитаго осе на, равняется 135 метрамъ. Высота, конечно, весьма зачительная, но если отнести ее ко всему протяженію Кольскаго перешейка, длиною въ 270 верстъ, то получимъ весьма малое отношеніе 1: 2134 или—43,4 къ 100000. Но таково олько абсолютное отношеніе; относительное же и дъйствитльное значительно разнится отъ вычисленнаго. Это происхольть оттого, что озера здъсь имъютъ весьма значительныя путяженія, (а уровни ихъ горизонтальны). Такъ Имандра тянечя на 90 верстъ, Пелесмозеро на 14 верстъ, Колозеро 15 веръ, Мурдозеро около 13 вер., Пулозеро—8, два плеса на

ръкъ Нивъ сложностью въ 9 верстъ; и того получаемъ горизонтальный уровень длиной въ 149 верстъ, или положимъ для ровнаго счета 150 верстъ. Теперь дѣло уже сильно измѣняется. Изъ общаго протяженія перешейка въ 270 верстъ надо вычесть 150, которые не имѣютъ уклона и тогда вся высота въ 135 метровъ, должна быть отнесена къ остальнымъ 120 верстамъ. Получается отношеніе 1:948 или 105,4:100000. Это составляетъ средній уклонъ рѣкъ. Но, въ дѣйствительности, мы видимъ, что уклоны мѣстныхъ рѣкъ весьма неравномѣрны. А именно, особенно рѣзко выдѣляется въ этомъ отношеніи рѣка Кола. Первыя 18 верстъ своего теченія, она представлаетъ собой бурный горный потокъ, бѣшено скачущій по каменистому ложу. Затѣмъ слѣдующія 18 верстъ она довольно спокойно течетъ къ морю и, наконецъ, послѣднія 4 версты опять образуетъ водоскаты.

Совершенно такое же чередованіе быстроты потока съ спокойными плесами находимъ мы на ръкъ Нивъ. Вытекая изъ озера Имандры на высотъ 110 м., она на протяжении семи верстъ круго падаеть по своему ложу, затъмъ 5 версть спокойно течетъ въ плесъ, потомъ опять 4 версты бурно несется по камнямъ и 4 версты проходитъ чрезъ озеро. Затъмъ, остальныя 12-13 версть, до самаго моря, опять съ ревомъ и пъной несется внизъ. Итакъ, изъ всъхъ 33 верстъ, только 9 можно принять за горизонтали. Остальныя 24 представляютъ уклонъ въ 110 метровъ. Отношение получается равнымъ 1:233 или 43: 10000. Для ръки Колы, отъ Шонгавараки до послъдняго водоската, т. е. на протяжении 18 верстъ-падение въ 11 метровъ, или отношение 1:1746 или 5,7:10000. Отъ статціи Кицы до Шонгавараки тоже 18 версть, наденіе 72,6 м. Отношеніе равняется 1:264,5 метра или 37,8:10000. Такимъ образомъ мы получаемъ следующія цифры для быстротекучих into vocamennoe, brandmedier, ornoenreasnoe ace u il trado

Рѣка Кола 1:264,5 или 37,8:10000 » Нива 1:233 » 43:10000

Для спокойно текущихъ (напр. Кола) 1:1746 или 5,7:10/00. Для того, чтобы сдёлать совершенно нагляднымъ такое опоставленіе, я возьму еще одинъ реальный примъръ. Возьмемъ съмъ изв'єстную р'єку Неву. При длин'є въ 67 верстъ и средней ширин'є до 300 саж. она им'єсть паденіе только въ 50'. Получаемъ отношеніе высоты паденія къ ея длин'є — равнымъ 50': 234.500 ф. Или 2,132' къ 10000'.

Получивъ отношенія въ равныхъ числахъ, сравнимъ ихъ:

Hива . . 43:10000. Нева . . 2,132:10000.

Получаемъ отношенія уклоновъ двухъ различныхъ рѣкъ, равнымъ приблизительно 1:21.

То есть рѣка Нива имѣетъ въ 21 разъ болѣе крутое паденіе, нежели Нева, и, конечно, соотвѣтственную скорость.

Понятно, что въ зависимости отъ такого значительнаго уклона находится и скорость, и размывающая, и переносная сила воды.

Тѣ громадныя запруды естественнаго образованія, которыя мы находимъ по ръкъ Нивъ, послужили причиною образованія глубовихъ озеръ, которыя, служа преградою, задерживая со страшной быстротой несущуюся рѣку, заставляють ее осаждать весь взвешенный матерьяль, и крупныя гальки, и валуны, катимыя по дну, въ этихъ же «плёсахъ». Поэтому, естественно, озгра, чрезъ которыя протекаютъ горныя ръки, мельютъ чрезвычайно быстро, а у устья ръкъ, такъ напр. у Нивы, въ Кандалакшъ, мы не находимъ той громадной массы матерьяла, который вправъ были бы ожидать а priori. Такъ, ръка Нива, выходя изъ Имандры, несется на протяжении семи верстъ, и весь намытый матерьяль отлагаеть въ Пинозеръ. Затъмъ, выходя профильтрованной изъ озера, она снова, на протяжении 5 верстъ, круго падаетъ внизъ и опять насыщается взвъшеннымъ матеріаломъ, который опять оставляетъ въ первомъ «плёсь», длиною въ 4 версты. И только продукты послъдняго размыванія, на протяженіи 12 верстъ, она выносить въ море.

Этотъ матеріалъ отложился тамъ, при устью, въ видю нюсколькихъ подводныхъ коргъ, т. е. каменистыхъ валунныхъ грядъ, по которымъ бешено проносится струя воды, оставляя ясный следъ далеко въ море. Масса мелкаго песку осаждается еще раньше, верстахъ въ 3 отъ моря, где существуетъ небольшое расширеніе рѣки. Цѣлыя гряды его, отложившіяся особенно по лѣвому берегу, указывають на то, что здѣсь особенно рѣзокъ переходъ отъ быстраго потока къ спокойной рѣкѣ. Остальныя массы песку, конечно, выносятся далеко въ море. Но море у Кандалавши не заносится сильно пескомъ, по крайней мѣрѣ, еще по послѣднимъ измѣреніямъ оказывается тамъ глубина въ 50 метровъ.

Тоже самое, почти, наблюдается и по Коль-рькь. Въ верхней части своего теченія она особенно бурлива и быстра; весь громадный, взвышенный въ ней матеріалъ, набранный ею на протяженіи 18 версть, она отлагаетъ на послыдующихъ восемнадцати верстахъ спокойнаго теченія. И такъ какъ до моря остается затымъ уже только 3—4 версты бурнаго теченія, то и количество выносимаго ею матеріала не особенно значительно.

Совершенно другое явленіе представляеть ріка Тулома. Теченіе ея довольно равном'трно. Если и встр'таются пороги, то, при большомъ паденіи, они имфютъ незначительное протяженіе, а такого рода пороги не могуть особенно сильно увеличить скорость теченія, а следовательно и силу размыванія Гораздо важнъе, въ этомъ отношеніи, общее увеличеніе крутизны наклона русла. Можно сказать даже, скорбе, наоборотъ, что существование многихъ, незначительныхъ по величинъ, каскадовъ, указываетъ болве на слабый уклонъ рвки, такъ какъ на пространствахъ отъ одного водопада до следующаго, поверхность ръки можетъ быть принята почти за горизонтальную, а большое число задерживающихъ кряжей указываетъ-или 1) на случайное направленіе ръки поперекъ параллельныхъ валовъ ледниковаго наноса, или 2) на то, что пласты горныхъ породъ падають въ сторону верховья реки. По Туломе мы имеемъ какъ разъ этотъ последній случай. А именно, простираніе сильно-слюдянаго гнейса идеть на NW, подъ угломъ 290°, падають же пласты на SW подъ угломъ въ 37°.

#### ГЛАВА II.

#### Ледниковыя явленія.

Скорость движенія ледника вовсе но зависить отъ уклона ложа его, а прямо пропорціональна давленію налегающаго фирна.

Агассицъ.

Въроятно нътъ другой мъстности, которая бы такъ полно и такъ грандіозно представляла намъ слъды ледниковаго періода, какъ Лапландія.

Но за то, съ другой стороны, въ немногихъ мъстностяхъ такъ дружно соединяются условія, которыя уничтожаютъ главнъйшіе изъ этихъ слъдовъ.

Здѣсь сильнѣйшіе ливни смываютъ наносы; колебанія температуры, достигающія 65°, разрушаютъ скалы наравнѣ съ атмосферными дѣятелями; къ нимъ присоединяются лишаи и мхи, которые, сильно разъѣдая поверхность скалъ, приготовляютъ почву для болѣе крупной растительности.

Уже Бетлинкъ, въ 1839 году изследовавшій ближайшія окрестности Нотозера, Туломы ръки и гор. Колы, указывалъ на главивишіе признаки ледниковаго періода. Борозды, шрамы и царапины, - съ одной стороны, штосзейте бараньихъ лбовъ съ другой, вотъ краеугольный камень, на которомъ онъ строитъ всѣ свои положенія. Но, мѣстами, ледниковыхъ шрамовъ при всемъ желаніи не отыскать; бараньи лбы, --мъстами, развиты сильно, - м'встами, вовсе отсутствуютъ. Краноткинъ, въ своемъ капитальномъ трудъ о ледниковыхъ явленіяхъ, указываетъ на необходимость принимать во внимание непремънно комплексъ признаковъ. И дъйствительно, когда на съверъ вы находитесь въ подобной мъстности, гдъ весьма сильно была выражена ледниковая эпоха, тамъ что-то ясно говоритъ вамъ, что здёсь работали глетчеры. Это ито-то — это все. Каждый наволокъ. сельга, островъ, мысъ, заливъ, форма горы, пахты съ царапинами, формы логовъ, бараньи лбы, шрамы и борозды, морены и отдёльные громадные валуны, однимъ словомъ все, а главное - общій характеръ м'встности, ландшафтъ и паралеллизмъ очертаній, воть что всего скорве уб'єждаеть въ при24

сутствін здісь когда-то, на той же почві, которая подъ вашими ногами, - сплошнаго ледниковаго покрова.

Обращаясь теперь къ этимъ многоразличнымъ признакамъ существованія въ Лапландіи ледниковой эпохи, я разсмотрю ихъ въ той последовательности, которая получается по степени ихъ повсемъстнаго развитія.

Телескопическое борождение, это-то параллельное повсюду выпахиваніе почвы, которое совершается на различныхъ высотахъ, про которое такъ много говоритъ Крапоткинъ о его распространенности и такъ мало о его причинности и о сравнительной степени его развитія.

Явленіе телескопическаго борожденія на съверъ ръзко бросается въ глаза, какъ на Бъломорьи, такъ и въ Лапландіи. Я уже въ первомъ своемъ отчеть (январь 1881) указывалъ на сильное развитіе таковаго на западномъ берегу Бѣломорья около Керети, въ Кузакоцкой губъ. Тамъ, въ параллель съ общимъ орографическимъ характеромъ мъстности, направленіемъ шрамовъ, бараньихъ лбовъ, наволоковъ и пр., я указывалъ на два параллельные высокіе хребта, выточенные льдомъ въ плотной породъ Средняго острова. (Хлоритовый сланецъ). такинетай втибения заправна инфивисте и поменания

Наиболъе сильное развитие телескопическаго борождения я наблюдаль по Повенецко-Телекинской почтовой дороге, къ северу отъ Пов'вида. Тамъ мы видимъ невысокія и узкія каменныя гряды, совершенно параллельно между собой вытянутыя на нъсколько верстъ. Но то телескопическое борождение, которое наблюдается на Кольскомъ полуостровъ, должно быть названо гигантскимъ. Всматриваясь въ ближайшіе окружающіе васъ предметы въ природъ, вы видите наволокъ, ясно вытянувшимся въ какомъ либо направленіи; вы видите небольшія корытца въ плотной пород'в, царапины и пр. Но, всматриваясь въ эти детали, вы не замъчаете главнаго. И здъсь, какъ всегда, чтобы лучше скакнуть, надо отступить, какъ говорить французская пословица (Il faut reculer pour mieux sauter). Здёсь внизу, всматриваясь въ мелочи, какъ бы изучаешь въ лупу расположение мъла на доскъ, тогда какъ, бро-

сивъ лупу, и отступя подальше, съ удивленіемъ замівчаешь нарисованный кругъ. Стоитъ только подняться на любую значительную высоту, приблизительно отъ 300 до 400 метровъ (1500'), и внимательно всмотръться въ группирование острововъ на Имандръ, ея косъ, мысовъ, наволоковъ, лудъ, заливовъ, береговъ, окрестныхъ горъ и особенно этихъ последнихъ, съ ихъ долинами, чтобы ясно видъть всюду гигантскіе отпечатки какой-то громадной ступни, которая оставила здесь свои следы. Вы, смотря какъ я, съ высоты более 3000 футъ на окрестность, невольно были бы поражены страшнымъ могуществомъ, поразительной мощностью бороздящей силы. Это тотъ несокрушимый памятникъ ледниковой эпохи, то ледниковое борожденіе, которое время въ силахъ будетъ стереть только по истечении целаго ряда геологических эпохъ. Для человъчества это зовется въчностью.

Для озера Имандры, всёхъ его острововъ и для сосёднихъ горъ Чаунъ-Тундръ, телескопическое борождение имъетъ направленіе съ юга на стверъ.

Телескопическое борождение есть продуктъ истирающаго дъйствія движущагося ледянаго покрова; это-его выпахиваніе. На этомъ основаніи надо признать, что въ различныхъ мъстностяхъ направление его можетъ измъняться, но всегда прямо зависить отъ направленія движущихся ледниковъ. Для одной мъстности два различныхъ направленія можетъ быть въ томъ случав, если, почему либо, было два періода движенія ледниковаго покрова. И, наконецъ, можетъ быть еще частное выпахиваніе, происходящее въ томъ случав, когда общій покровъ прервался по пунктамъ, и на возвышенностяхъ залегли главнъйшія ледниковыя массы, которыя, выпирая окрайные ряды, высылаютъ глетчеры въ существующія долины и, разъ принявъ одно направленіе, производять выпахиваніе на дальнъйшемъ протяжении.

Поэтому-то видимъ мы такое странное, правильное измънение въ очертаніи рельефа Кольскаго полуострова. Прошу временно перенестись опять къ орографическому характеру страны, къ той конфигураціи горъ и озерь, на которыя я обращаль вни-Manie. When the product is to the rest whether a rest out the state of the state of

Мы видъли соотношение двухъ направлений всюду: съ Съвера на Югъ и съ Запада на Востокъ.

Я привель выше цёлую массу примёровь такого паралеллизма направленій, которое существуеть для рядовь озерь, тянущихся съ запада на востокъ; къ этому присоединю теперь еще — большой логъ въ Чауно-Тундрахъ и всв параллельные лога въ Хибиныхъ тундрахъ; я ни мало не сомнъваюсь, что эти послъдніе чисто-ледниковаго образованія. Лога вполнъ совпадають своимъ направленіемъ съ направленіемъ ледниковаго движенія, вполн'є подчиняясь, притомъ, всёмъ его уклоненіямъ. Кром' этого и главныхъ доводовъ - 1) невозможпости воднаго образованія ихъ, всл'єдствіе вышележащихъ поперечныхъ трещинъ и 2) выточенности ихъ въ вертикально — «на голову» поставленныхъ пластахъ, вкрестъ простиранія,можно привести еще: во первыхъ, общее направленіе и строгій паралеллизмъ ихъ очертаній; 2) правильная, общая для всѣхъ, форма и прямизна ихъ; 3) выпуклость склоновъ внутрь лога; 4) общая, одинаковая обточенность и округленность грядъ; 5) бараньи лбы съ западной стороны; 6) присутствіе гигантскихъ котловъ; 7) присутствіе крупныхъ валуновъ посторонняго происхожденія на грядахъ. Все это вм'єсть, весь комплексъ признаковъ, убъждаетъ насъ въ томъ, что дъйствительно ледниковый покровъ, принужденный взбираться на такую громадную высоту, какъ 3000', долженъ былъ, несомнънно, производить сильнъйшее истирающее дъйствіе - и произвель эти лога.

Несомивнно, следовательно, какъ это доказаль уже Бётлинкъ, что ледниковый покровъ двигался также и съ запада изъ Скандинавіи, перпендикулярно къ направленію озера Имандры. Строеніе Бабинской Имандры, ея острова и проч., и ледниковыя царапины и шрамы на вершинъ Сырой тундры согласуются совершенно съ этимъ направленіемъ. Затъмъ еще на Сырой тундръ мы имъемъ върный признакъ: восточный склонъ, падающій къ озеру, неправиленъ и обрывисть; даже самая вершина обрывается въ эту сторону вертикальной скалой въ 3 саж. высоты, а западный склонъ правильно закругленъ и обточенъ, однимъ словомъ представляетъ типичный бараній лобъ. Все это вмѣстѣ приводитъ насъ къ тому заключенію, что дѣй-

ствительно существовало движение на востокъ. Но далве, Бётлинкъ и я наблюдали около Колы ледниковые шрамы и проч. по направленію на Сѣв. Востокъ. Слѣдовательно произошло отклоненіе движенія къ сѣверу. Это явленіе имѣетъ себѣ причиной тотъ фактъ, что скалы плоскогорія круто обрываются къ Ледовитому океану, и большая Кольская губа заставила здёсь мощный потокъ уклониться къ сёверу.

Точно такое же объяснение надо примънить къ уклонению общей вытянутости озеръ, къ югу отъ Имандры или на югозападъ ея, - по направленію NW-SO. Очевидно здъсь повліяла чрезвычайно глубокая Кандалакшская губа.

Телескопическое борождение развито чрезвычайно сильно по всему полуострову. Мъстами оно выразилось въ видъ неглубоваго выпахиванія скаль, образовавъ корыта и желоба; мъстами, - въ видъ длинныхъ каменныхъ грядъ, сплошныхъ, изъ коренной породы; кое-гдф онф покрыты толстымъ слоемъ ледниковаго наноса. Такъ, на Пелесмозеръ ясно развиты эти послѣднія формы; даже само озеро можетъ быть смѣло принято за продуктъ такого выпахиванія, потому что направленіе его совпадаеть съ таковымь. Около Кандалакши и на южномъ берегу Имандры, на Зашейкъ, телескопическое борожденіе развито въ видъ сельгъ, преимущественно. Онъ принадлежатъ къ третьему, наиболее распространенному типу: внутри - длинный обточенный каменистый кряжъ изъ матерой горной породы (длинный бараній лобъ); сверху, снаружи, онъ покрытъ толстымъ слоемъ ледниковаго наноса, неотсортированнаго; въ немъ въ изобиліи содержатся крупные угловатые валуны.

Длинные острова и наволоки особенно характеризуютъ Имандру. Цёлая система высокихъ параллельныхъ грядъ валуновъ, узкихъ и длинныхъ, характерна для Пелесмозера.

Такое разнообразіе повторяется всюду, хотя, въ сущности, надо принять, что вездъ одинаково дъйствовала бороздящая сила ледниковаго потока, и только отдёльныя модификаціи такого борожденія выразились въ различныхъ містностяхъ особенно сильно, особенно типично, въ зависимости отъ особенныхъ мъстныхъ условій, орографіи страны, характера подлегающей породы; степени сопротивленія движенію, въ зависимости отъ сомкнутости устья долины или крутизны подъема и т. д.

Заканчивая главу о телескопическомъ борожденіи, я повторяю, что при той степени развитія, которую оно им'ветъ на Кольскомъ полуостровѣ, я считаю его за важнѣйшій признакъ ледниковаго характера страны, за главное указаніе направленія движенія различныхъ глетчеровъ двухъ послѣдовательныхъ эпохъ, за наиболѣе сохранившійся, вслѣдствіе своихъ грандіозныхъ размѣровъ, памятникъ ледниковой эпохи.

Другія явленія ледниковой эпохи, какъ образованіе бараньихъ лбовъ, шрамовъ и царапинъ на гладко обточенныхъ, полированныхъ скалахъ, также сильно развиты на Кольскомъ полуостровъ. Но степень выразительности каждаго такого образованія по различнымъ мъстностямъ различна. Здъсь всезависить отъ следующихъ главнейшихъ факторовъ: 1) отъ степени сопротивленія движенію, поэтому отъ болве или менъе сильнаго надавливанія, 2) отъ характера подлегающей породы, по ея плотности и способности принимать полировку, 3) отъ большей или меньшей подверженности породы къ разрушенію; отсюда сохранность или утрачиваніе полировки и борожденія, 4) отъ высоты и склона, въ зависимости отъ размывающаго действія воды, 5) отъ минеральнаго характера, по способности поддерживать почти на голыхъ скалахъ растительность, которая сохраняетъ намъ эти признаки, 6) отъ степени защищенности скалъ ледниковымъ покровомъ.

Собственно бараны лбы были мной замѣчены особенно хорошо развитыми уже раньше Лапландіи. Такъ на Рамба-кахъ, островахъ Бѣлаго моря, лежащихъ между Сороками и Кемью, великолѣпно развиты громадные бараныи лбы, съ сохранившейся полировкой и шрамами, которые притомъ находятся на отвѣсной скалѣ, на высотѣ 10—11 метровъ. Затѣмъ особенно хорошо развиты бараныи лбы, въ глубинѣ Керетской губы, въ селѣ и около водопада. Около Кандалакши, восточный берегъ губы, со стороны лѣваго берега рѣки Нивы, представляетъ рядъ бараныхъ лбовъ гигантскихъ размѣровъ.

Для насъ особенно интересенъ цёлый рядъ бараньихъ

лбовъ, которыми заканчиваются Хибины тундры на берегу озера Имандры. Представьте себъ почти прямую линію, по ко торой расположились въ рядъ бараньи лбы; отъ каждаго вверхъ круто поднимается соотвътствующая ему каменная гряда, которая доходить до самой вершины и тамъ опять заканчивается бараньимъ лбомъ. Мъстами каменная гряда прорывается, образуя очень глубокія ущелья, горные лога съ отв'єсно падающими ствиками. Здёсь, какъ и на всякой поглетчерной сторонь, бараній лобь заканчивается отвъснымь обрывомь съ неправильными, необточенными стънками. Затъмъ, по той же линіи гряды, начинается новый бараній лобъ, основаніе котораго, впрочемъ, неправильно, такъ какъ оно съ ударной стороны было защищено обрывомъ противолежащей стѣнки. Мѣстами, между такими последовательными бараньими лбами, лежащими на разныхъ высотахъ одной и той же гряды, нътъ слишкомъ глубокихъ логовъ, а существують только довольно широкіе и плоскіе желоба, которые посл'ядовательно повторяются во всей систем в грядъ. Тогда одинъ, нижній бараній лобъ, переходя въ последующій, заканчивается также сильно обточеннымъ сглаженнымъ, но болъе пологимъ скатомъ на поглетчерной сторонъ. Все это вмѣстѣ, при общемѣ взглядѣ на склонъ, производитъ впечатление каменныхъ прямолинейныхъ грядъ, совершенно параллельныхъ, состоящихъ изъ последовательных цёпей бараньих лбовь, изъ которых каждый смотрить другь другу въ затылокъ. Кромъ этой полной системы лбовъ, мы находимъ еще на южномъ берегу Имандры, отдъльный большой бараній лобъ-Сырую Тундру, которая ударной стороной также обращена на западъ. Здъсь особенно хорошо выразилась равном врно-истирающая способность ледника. На поверхности бараньяго лба, съ западной стороны и вруго падая на западъ, (18°) выходить толстый пласть бълаго кварца. Въ несколькихъ местахъ, на поверхности основной породы, замічаются жилы того же вещества, идущія по самымъ разнообразнымъ направленіямъ. Все это вм'єсть, и основной гнейсъ, изобилующій включеніями граната, и пластъ, и жилы -выровнены и сглажены въ одну общую кривую поверхность, по которой мъстами тянутся парадлельныя глубокія борозды

30

съ запада на востокъ, или немного уклоняются, именно съ WSW на ONO подъ угломъ въ 80°. Съ восточной стороны бараній лобъ обрывается отв'єсной скалой въ 3 саж. высоты.

На съверномъ концъ озера Имандры мы находимъ еще одинъ большой бараній лобъ, развитый въ видъ отдъльной куполообразной горы, это Куреньга варака. Она состоитъ изъ бълаго сіенита съ блестящей каліевой слюдой, развитой толстыми, крупными табличками.

Затемъ мы находимъ целый рядъ небольшихъ бараньихъ лбовъ, развитыхъ въ видъ отдъльныхъ горушекъ, на переходъ между Овечьей и Шонга-варакой.

Наконецъ, великолъпно выраженный бараній лобъ мы имъемъ въ Горфлой тундрф, въ 4 верстахъ въ сфверу отъ города Колы. Она описана у меня уже раньше. И туть же, на съверъ и съверо-съверо-востокъ отъ нея, развита цълая система бараньихъ лбовъ, зыбью волнующееся каменное море, -- настоящія roches moutonnées. Онъ уже описаны мною раньше въ орографическомъ очеркъ.

Одного изъ главнъйшихъ признаковъ ледниковаго борожденія, почти всегда недостаєть на Кольскомъ полуостровь. Я говорю о ледниковой полировкъ. Почти вездъ она уничтожена, благодаря сильному вывътриванію скалъ. Сръзанность выступающихъ острыхъ угловъ, равненіе подъ одноповерхности, обточенность и сглаженность ея - вотъ все, что осталось на поверхности болъе или менъе значительныхъ высотъ. При такомъ сильномъ вывътривании породы, когда целыя скалы, какъ въ Хибиныхъ горахъ, разбиты громадными трещинами на массивныя колонны - нечего искать шрамовъ; колонны, въ свою очередь, на глубину двухътрехъ аршинъ, состоятъ уже, видимо, изъ одного щебня (продуктъ разслаиванія по плоскостямъ спайности); Богъ знаетъ, какъ онъ еще держится вмъсть, но, очевидно, что подъ вашими ногами и надъ вашей головой, - скалы въ сотни тысячъ пудовъ грозять ежеминутно разрушиться, разсыпаться въ прахъ, увлекая въ своемъ паденіи новыя, стирая следы прежней гармоніи, прежней жизни, и въ самомъ разрушеніи своемъ, давая

источникъ новымъ образованіямъ. Ніжоторыя скалы не устояли и еще плотныя, отдёлившись продольной трещиной, рухнули внизъ и, връзавшись въ массу щебня своихъ сородичей, стоять теперь вертикально, рядомъ съ отвъсными ствнами горы, какъ памятники страшной и теперь действующей силы.

Понятно, что на такихъ скалахъ, обращающихся съ поверхности въ розсыпи, не могла сохраниться не только полировка, но и шрамы, и борозды. И только крупныя, глубокія, корытообразныя углубленія, желоба можно еще просл'єдить въ расположеніи щебня издали, съ высоты.

Полировку мнъ удалось видъть только въ немногихъ мъстахъ. Еще раньше Кольскаго полуострова, въ Кузакоцкой губъ Бълаго моря, - на Среднемъ островъ, на незначительной высотъ въ 4-5 сажень надъ уровнемъ моря. На озеръ Имандръ, - на Ловушкинскихъ островахъ, въ 10 верстахъ отъ Іокостровской станціи. Зат'ямъ, на Высокомъ остров'я, противъ Хибиныхъ тундръ, недалеко отъ станціонной избы, на восточномъ берегу острова; на высотъ только отъ 1 до 2 аршинъ. Отдельные валуны съ полировкой попадались изредка. Такъ, около самой Іокостровской станціи найденъ быль большой валунъ, пудовъ 10 въсомъ, котораго одна поверхность представляла плоскость, совершенно выглаженную и великолепно отполированную. По ней, въ одномъ только направленіи, проходять борозды, шрамы и царапины, совершенно параллельные. Этотъ великолъпный экземпляръ изъ хлоритово-тальковаго сланца, совершенно мыльный на ощупь, поставленъ мной вертикально у избы.

При разборѣ бороздъ и шрамовъ приходилось руководствоваться двумя признаками. Параллелизмомъ ихъ между собой и съ другими очертаніями мѣстности, — и несоотвѣтствіемъ ихъ съ пластованіемъ породы, ен жилами, трещинами и спайностью.

Царапины сохранились только тамъ, гдф есть полировка и шлифовка. Шрамы различимы еще на гнейсахъ и гранитахъ мелкозернистыхъ; борозды же сохранились почти всюду. Такъ, на Сырой и Горфлой тундрахъ ихъ можно ясно различить. Лучше всего они сохранились въ низинахъ, тамъ, гдв недавно смыть ледниковый нанось, гдв вода еще не успъла

ихъ уничтожить. Поэтому на лудахъ Имандры они отлично видны.

Относительно уклоненія борожденія отъ главнаго направленія, при подъемахъ на бараній лобъ, мнѣ не удалось сдѣлать наблюденій, потому, во-первыхъ, что у главныхъ горъ, Хибиныхъ, гдѣ я останавливался, бараньи лбы развиты въ такихъ гигантскихъ размѣрахъ, что на тѣхъ именно, особенно крутыхъ, высокихъ боковыхъ склонахъ лба, гдѣ бываютъ уклоненія, мнѣ не удалось быть, не могъ пробраться; снизу, у подножія лба ничего не видно, такъ какъ подножіе отвѣсно поднимается саженъ на 10; а въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ случилось быть, такіе боковые шрамы не были развиты, или, вѣрнѣе, были стерты. Такъ, на Горѣлой тундрѣ около Колы, и на бараньемъ лбу въ селѣ Керети.

Морены развиты, мъстами, очень сильно. Такъ, напримъръ, вся гора Соловарака, состоящая изъ двухъ параллельныхъ массъ, представляетъ громадную поддонную морену въ 81 м. высоты, три версты длины и саженъ триста ширины. Вся эта громадная масса матеріала сложена здісь неправильной грудой, неразсортированной. Туть мы находимъ рядомъ ледниковую пыль, мелкій песокъ, гравій, щебень, гальки, валуны всёхъ разм'вровъ, до громадныхъ глыбъ скалъ остроугольной формы, которыя вѣнчаютъ южную вершину Соловараки. Съ сѣвера эта морена размыта, и мы ясно видимъ на разръзъ громадные торчащіе обкатанные валуны, потоки песку и гравія, ниспадающіе до-низу, и внизу цълыя гряды валуновъ и щебня. Съ запада, со стороны Туломы, гора сохранилась въ целости и поросла кустарникомъ. А съ востока она сильно подмыта рѣкой Колой, которая унесла весь песокъ и гальки, и остался дикій хаосъ громадныхъ круглыхъ и угловатыхъ валуновъ и глыбъ скалъ, точно послъ гигантскаго побоища какихъ то ти-TAHOBS. WELLETS THE ALTER AND SPEAKER AMERICAN DESIGNATION OF

Продольныя, боковыя морены мы находимъ отлично развитыми по озеру Имандръ. Вдоль всего кряжа Хибиныхъ тундръ, съ съвера на югъ, тянется громадный валъ въ 70—80 саж. высоты, версты полторы ширины и 40 верстъ длины. Эта морена поросла гигантскимъ сосновымъ лъсомъ. Только на са-

момъ берегу обнажаются выходы основной роговообманковой породы, тождественной съ породой Хибиныхъ горъ. Очень возможно, что внутри этой гряды, матерая порода поднимается выше, но несомнъненъ тотъ фактъ, что, при троекратныхъ моихъ переходахъ по этой грядъ, я видълъ всюду только одни громадные обкатанные валуны.

Кром'в этой продольной морены, мы находимъ тутъ же, при начал'в логовъ, еще другія морены, которыя отд'вляются отъ описанной—глубокой лощиной, по которой протекаетъ горный ручей. Эти морены, какъ напр. въ Медв'яжьемъ логу, поднимаются на значительную высоту, до 30 саж. надъ уровнемъ лога, и состоятъ сплошь изъ сильно — обкатанныхъ, совершенно округленныхъ валуновъ, крупныхъ разм'вровъ; песокъ и галька зд'ясь вымыты.

Съ другой стороны озера, на западномъ берегу, мы находимъ только остатки подобной же, только совершенно размытой, морены. Именно, недалеко отъ Іокострова, на югѣ отъ него, около Желѣзной губы, есть Желѣзный наволокъ. Онъ рѣзко отличается отъ другихъ тѣмъ, что состоитъ не изъ сплошнаго каменнаго кряжа, а изъ груды крупныхъ, совершенно обкатанныхъ валуновъ, которые крутымъ, мѣстами совершенно отвѣснымъ валомъ, поднимаются на высоту нѣсколькихъ саженъ надъ водой. Сверху, на валунахъ, залегаетъ тонкій растительный слой, и на немъ ютится нѣсколько корявыхъ березъ.

Тѣхъ моренъ, которыя должны бы были перерѣзать поперекъ озеро Имандру, мы не находимъ и слѣда въ самомъ озерѣ. Конечно, это происходитъ, главнымъ образомъ, вслѣдствіе размыванія. Только по берегамъ, въ очертаніи ихъ, мы находимъ указанія на тѣ мѣста, гдѣ начинались такія гряды. Такъ, Іокостровскій полуостровъ и противулежащій ему наволокъ лежатъ на одной прямой, идущей съ З на В. Затѣмъ два самыхъ большихъ полуостровка—Рикатайбола и Корабельный тянутся съ запада на востокъ.

Но въ другомъ направлении, на той же Имандръ, мы имъемъ богатыя указанія на существованіе нѣсколькихъ параллельныхъ моренъ. Такъ напр. около Хибиныхъ тундръ мы видимъ цѣлые длинные ряды острововъ, вытянутыхъ въ нѣсколько параллельныхъ прямыхъ. Наприм. Высокій островъ (Чахкисуолъ), и Сявъ островъ, параллельно имъ 3 Пфтушьи острова Кингъ-суолъ, Пышки-суолъ, Рихкъ-суолъ и проч. Изъ нихъ только Высокій островъ-Чахки-суолъ-представляеть крутой куполь, поднимающійся на высоту около 100 метровъ; но кругомъ этого купола, на всемъ протяжении, около 3 верстъ въ окружности, островъ сложенъ изъ неправильно нагроможденныхъ грудъ валуновъ. Всв остальные острова имвютъ - очень незначительно поднимающійся надъ водой, матерой кряжъ, который обнаруживается въ лудахъ, но главная масса островка состоитъ изъ груды валуновъ. Для примъра возьмемъ лежащій нѣсколько съвернъе Большой Палёный островъ. Онъ имъетъ около одной версты длины и 3 въ окружности, также низокъ, какъ и Сявъ-островъ, и весь поросъ силошнымъ ельникомъ, который вообще зд'ясь очень типиченъ, потому что ель принимаетъ особый характеръ. Она вытягивается въ высоту, тощая, чахлая, съ редкими и короткими сучьями, и потому скоръе напоминаетъ плохо-очищенную въху, нежели растущее дерево. Сосенъ здъсь нътъ, а примъшивается еще низкорослый и корявый березнякъ. Весь Паленый островъ состоитъ изъ однихъ валуновъ, прикрытыхъ бъднымъ моховымъ покровомъ, который у воды смыть, и береговая линія, вся сплошь занята равном валунами, величиной въ челов вческую голову. Не только общая форма острова, низкая, вытянутая въ длину и едва въ серединъ поднимающаяся надъ концами, убъждаетъ насъ въ томъ, что весь островъ сложенъ изъ валуновъ, но особенно эти равномърно поднимающіяся набережныя, почти отвъсно висящія надъ водой, сложенныя изъ однихъ только валуновъ, на высоту отъ одного аршина до сажени, убъждають въ последнемъ.

Приведенное описаніе постоянно повторяется, почти въ одинаковыхъ выраженіяхъ, для всѣхъ острововъ Имандры, а потому Палёный островъ, можетъ служить типомъ другихъ. Вездѣ мы видимъ эти характерныя обрывистыя набережныя изъ валуновъ. Пойдемъ мы вверхъ—находимъ тѣ же валуны—и такъ до самаго конца.

Цирки, которые, по своей особенно типичной формѣ, служать однимъ изъ признаковъ и памятниковъ ледниковой эпохи, развиты очень рѣдко и слабо въ Хибиныхъ горахъ. Это про-исходитъ, конечно, потому, что центръ движенія ледниковъ лежалъ не здѣсь, а въ Скандинавіи. Но затѣмъ, когда общій ледниковый покровъ стаялъ и распался на нѣсколько центровъ, тогда и Хибины тундры должны были служить центромъ движенія. Поэтому мы находимъ въ нихъ одинъ циркъ, ясно развитый въ формѣ круглой котловины, съ очень крутыми стѣнками. (Представляю рисунокъ).

Затъмъ, за современную намъ форму цирка надо принять всъ верховья логовъ, въ которыхъ до половины іюля не вытаиваетъ снътъ. Верховья эти расширены, имъютъ отвъсныя, гладко обточенныя стънки, которыя книзу переходятъ въ вогнутую кривую поверхность. Масса перетертаго матеріяла лежитъ здъсь у основанія.

Борождение на вершинах и въ глубоких долинах. Когда я говорилъ о ледниковой полировкъ и борожденіи вообще, мнъ приходилось уже указывать на то, что на вершинахъ мы, обыкновенно, находимъ гораздо чаще слъды изборожденія, нежели въ низинахъ. Но, съ другой стороны, если намъ случается встретить, где нибудь невысоко надъ водой, следы шрамовъ и бороздъ, то обыкновенно, въ такихъ случаяхъ, не только самые борозды и шрамы лучше сохранились, но мы здёсь находимъ ясно сохранившимися и ледниковую полировку и шлифовку, а вследствие этого ясно видны и царапины. Кром'в этого соотношенія, мы ясно видимъ еще слъдущее. На осмотрвнныхъ мной вершинахъ на Сырой тундрв, Хибиныхъ горахъ, Горблой тундръ, мы находимъ такое направление бороздъ и шрамовъ, что равнодъйствующая ихъ можетъ быть принята идущей съ запада на востокъ. Весь крупный рельефъ мысовъ и лудъ, въ низинахъ, согласуется съ этимъ. Но, въ низинахъ и глубовихъ долинахъ, линіи врупнаго рельефа распадаются на массу мелкихъ (губы, бухты, косы, мысы, острова), линіи которыхъ вытянуты прямо въ поперечномъ первому направленіи. Напр. Рикатайбола.

Поэтому и направленіе бороздъ, шрамовъ и проч., какъ

напр. на Высокомъ островъ, идетъ съ съвера на югъ. Снявъ небольшую толщу моховаго покрова, на одной изъ лудъ Высокаго острова, я нашелъ отлично сохранившуюся полировку и на ней двъ системы параллельныхъ шрамовъ и царапинъ. Они пересъкались подъ угломъ въ 10°. Первая система идетъ съ N-S, другая NNW-SSO. Это последнее внолне совнадаетъ съ направленіемъ главной средней полосы озера Имандры.

Соображаясь, поэтому, съ двумя направленіями шрамовъ и бороздъ, - на вершинахъ горъ и въ долинахъ, и съ ударными сторонами варакъ и тундръ, представляющихъ бараньи лбы, мы приходимъ къ тому заключенію, что существовало два движенія ледниковаго покрова. Первое, которое по времени предшествовало, направлялось съ запада на востокъ и особенно ясно выражается теперь на высотахъ горъ, и въ крупномъ рельеф'в м'встности. Ему обязаны своей формой Хибины тундры съ главнъйшими надъозерными логами, Сырая тундра съ своимъ бараньимъ лбомъ, Бабинская Имандра съ островами, Рикатайбола и прочее. Второе, позднъйшее по времени, движеніе совершалось съ юга на съверъ и ему обязаны своей формой всв линіи мелкаго рельефа въ долинахъ, гдв онъ, какъ позднъйшій, мъстный, болье подчинался, въ направленіи своего движенія, крупному рельефу м'єстности. Это движеніе выравняло основанія бараньихъ лбовъ Хибиныхъ горъ, оставило боковую морену; съ южной стороны, образовало большой баранній лобъ въ Чауно-тундрахъ, около Жельзнаго наволока; на Высокомъ островъ, съ южной стороны, -слъды борожденія на бараньемъ лбу; оно изрѣзало большіе полуострова, напр. Рикатайболу, тянущуюся съ запада на востокъ, на цёлую систему мелкихъ косъ и бухтъ, совершенно параллельныхъ и вытянутыхъ съ С на Ю. Ему обязаны своимъ направленіемъ всп острова Имандры.

Эти два главнъйшія направленія движенія, мъстами дають уклоненія, какъ наприм'єръ, около Колы, западное движеніе переходить въ югозападное, въ зависимости отъ главнаго долосклона на съверъ, облегчавшаго поэтому ниспадание ледника въ море съ обрывистыхъ утесовъ. Такое уклонение отъ первоначальнаго направленія замізчаемь мы, вообще, всюду тамь, гдъ глетчеру представляется возможность свернуть на болъе просторную широкую равнину, съ которой, въ свою очередь, легко могутъ быть удалены массы льда въ обширный глубокій бессейнъ. Панкан ватронатыва к напакатыю удова загов

Поэтому, по берегамъ Ледовитаго океана, въ большинствъ мъстъ, общій покровъ и направленіе бороздъ сворачиваеть къ берегу; по берегамъ Кандалашской губы-тоже явленіе, но въ меньшей степени. Попотом жиздениямиле уписы инданизателя

#### Выпахиваніе или невыпахиваніе?

(21/1100) OH, AU, ADOU ATSONATESTS

жения от лиот ахиминия Андикъ Аары, при уклонъ всего въ 3°, а мъстани и въ 0° 18′ и при толщинъ въ 80 метр., имъетъ скорость въ 210 мм., тогда какъ ледникъ Грюнберга, не смотря на уклонъ въ 300, но за то при толщинъ въ 25 м., имъетъ скорость всего въ 56 мм.

L. Agassiz Système glaciaire. торому ледникъ не сталъ бы двигаться всявдствіе своей пластичности».

и одан вондот этропирим дела доминоо жи вачим Голкинсь, пр

Увлекшись этимъ новымъ геологическимъ дъятелемъ, стали приписывать глетчерамъ даже образование широкихъ альпійскихъ долинъ и глубокихъ озеръ. Цалая литература возникла по этому предмету въ новъйшее время; но я считаю излишнимъ не только говорить подробно, но даже упоминать о такихъ эфемерныхъ сочиненіяхъ, которыя утверждаютъ, наприм'бръ, что глетчеры вымыли долины и фіорды, и что озера, какимъ то особеннымъ способомъ, выкопаны глетчерами или были вытёснены давленіемъ ледяныхъ массъ». Такъ говоритъ объ этомъ вопросъ Бернгардъ ф. Котта, въ своей «Геологіи настоящаго времени». Далъе онъ высказывается еще яснъе: «Мнъ кажется, что состояніе долинъ скоръе сохранялось, чъмъ измънялось глетчерами, то есть, еслибы ледъ не защищалъ дна и ствиъ ихъ, то вывътривание и дъйствия воды произвели бы въ нихъ несравненно большее разрушение; какъ вывътривание такъ и размывы водою сопровождались бы во всякомъ случав болве значительными результатами, чвмъ

то выглаживание горныхъ породъ, какое могло быть произведено въ одинаковое время глетчерами».

Это одно изъ крайнихъ мавній, отстаивающихъ ничтожность разрушительной двятельности ледниковъ.

Прежде, чёмъ разсматривать этотъ вопросъ по существу, замѣчу здѣсь, что всякій геологъ согласится со мной вь томъ, что еслибы допустить глетчеръ самой незначительной толщины въ долину размыванія, въ которой мы, сплошь и 18домъ, встръчаемъ вертикально стоящіе обелиски изъ щебна наноса, полуразрушенныхъ утесовъ, то онъ, безъ усилія, снесъ бы все это внизъ, такъ что не осталось бы и следа отъ такихъ препятствій. Такъ точно я думаю, что еслибы теперь глетчеръ проникъ въ трещины Хибиныхъ горъ, то милліоны кубическихъ футъ роговообманковаго щебня сразу низверглись бы внизъ. Снъжныя лавины сразу сносять цълыя деревни и лъса, тъмъ болъе глетчеръ, медленно, но неуклонно, разрушаетъ выдающіяся преграды. Д'вятельность воды, въ подобныхъ же случаяхъ, должна продолжаться еще десятки и сотни лътъ, чтобы достигнуть тахъ же результатовъ. Въ Хибиныхъ тундрахъ, не смотря на общую разрушенность горной породы, не смотря на истекшія тысячельтія, не смотря на то, что жьстами уже пласты раздвинулись между собой, все еще сохранилась общая закругленость очертаній, которую, стремясь производить вогнутыя формы, вода должна бы была уничтожить раньше всего. экту он доновидов аткнойет обльст он а мания.

Альфонсъ Фавръ доказалъ, что «ниже Женевы древніе продукты глетчера лежатъ очевидно на болѣе древнихъ еще толстыхъ грудахъ валуновъ, которые никогда не были сдвигаемы съ мѣста глетчеромъ и чрезъ которые, напротивъ, онъ переступалъ постоянно».

о Очевидно, г. Фавръ не признаетъ дъйствія законовъ тяжести.

Ляйелль, какъ извъстно, признаетъ нѣкоторую истирающую силу глетчеровъ, но болъе склоненъ увлекаться разрушительнымъ дъйствіемъ айсберговъ.

«У основанія всякаго водопада мы можемъ видѣть глубокое, кругловатое озеро, которое размыла падающая вода. Полагаютъ, что такимъ же образомъ ледъ, спускаясь съ обрыва или крутаго склона, съ котораго онъ сноситъ песокъ и камни, давитъ всей массой на подножіе крутизны и вытираетъ здёсь углубленіе. Однако, обсуждая этотъ процессъ, мы должны въ то же время принять, что, разъ образовавъ углубленіе, ледъ теряетъ силу, нужную для его увеличенія, и окончательно не въ состояніи вырыть проходъ въ преградѣ на низовомъ концѣ ложбины, гдѣ прежде выгружался ледъ и гдѣ теперь вытекаетъ источникъ».

Агассицъ говоритъ: «Бока ледника, также какъ и нижняя поверхность, усѣяны валунами, камнями, гальками, пескомъ и грубымъ и мелкимъ гравіемъ, такъ что, въ самомъ дѣлѣ, онъ играетъ роль какой-то гигантской терки, бока которой достигаютъ нѣсколькихъ сотъ футовъ глубины, а поверхность — нѣсколькихъ тысячъ футовъ ширины и нѣсколькихъ миль длины. Терка эта истираетъ дно и стѣнки, по которымъ она двигается, полируя, бороздя и царапая ихъ, по мѣрѣ своего поступательнаго движенія.... Вещества, болѣе или менѣе плотно вмерзшія въ ледъ, образуютъ ту истирающую поверхность, которая при своемъ движеніи по долинѣ оставляетъ повсюду несомнѣнный слѣдъ своего пути».

Аusset доказалъ своими изследованіями, что, хотя свыше снежной линіи (2000 метровъ) глетчеры незначительно истирають скалы, но, ниже ея, треніе льда и гравія, имъ увлекаемаго, такъ сильно, что оно уничтожаетъ всё выдающіяся остроконечія и округляетъ всё выпуклости. Глетчеръ можно сравнить съ гигантской стругальной машиной, которая скоблить дно, срезаетъ неровности, растираетъ ихъ въ мелкій песокъ, превращаетъ, наконецъ въ гразь, и затёмъ пользуется этимъ же порошкомъ, чтобы шлифовать и полировать скалы своего ложа; вотъ отчего происходитъ тотъ бугристый видъ, который мы заменаемъ въ руслахъ бывшихъ глетчеровъ, по которымъ прежде, въ теченіи цёлыхъ стольтій, скользили гигантскія ледяныя массы».

Габріэль де Мортилле, въ 1859 году, пришелъ къ убъжденію, что «всъ большія озера были сперва совершенно выполнены аллювіальными веществами и послъ вновь вырыты дъй-

ствіемъ льда, который, въ періодъ сильнѣй паго холода, своею тяжестью и необыкновенною силою движенія очистилъ ихъ отъ выполняющихъ ихъ рыхлыхъ слоевъ аллювія, даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ аллювій достигалъ толщины 2000 футъ. Кромѣ этого выпахиванія, ледъ двигалъ по наклонной плоскости всю массу камней и грязи, начиная отъ центральныхъ углубленій до нижнихъ стоковъ озеръ и даже значительно дальше».

Профессоръ Рэмсей доказываетъ, что «нѣкоторые небольшіе пруды и скалистые неглубокіе бассейны, встрѣчаемые въ гористыхъ мѣстностяхъ, обязаны своимъ происхожденіемъ истирающему дѣйствію ледниковъ, разрушающихъ мягкія скалы. Въ 1859 году, тотъ же Рэмсей высказалъ предположеніе, что озерные бассейны не принадлежали къ до ледниковой эпохѣ, но что они были вырыты льдомъ во время ледниковаго періода».

Кромѣ того, о постепенномъ расширеніи и углубленіи глетчерами долинъ, по которымъ они движутся, свидѣтельствуетъ также путешественникъ въ полярныя страны Хайесъ (Hayes - «The open Polar sea» London 1867 р. 403).

Ляйелль въ своемъ сочинени о «Древности человъка» говоритъ: «такъ какъ сила давленія и движенія впередъ громадна, то песокъ, служа полирующей массой, сглаживаетъ поверхность, камешки чертятъ и исполосовывають ее, а большіе камни производятъ глубокія борозды. Наконецъ, выдающіяся части скалъ называемыя roches moutonnées, округляются и сглаживаются въ форму сплющенныхъ куполовъ проходящимъ по нимъ ледникомъ».

Гельмгольцъ говоритъ въ своей стать о ледникахъ: «громадныя ледяныя массы глетчеровъ двигаются внизъ медленно и тихо, не замътно даже для проходящаго туриста — наблюдателя.... но они двигаются съ непреоборимой силой, передъ которой преграды, которыя могли бы ей поставить люди, сломались какъ соломенки, и которой слъды ясно сохраняютъ, какъ мы видимъ, даже гранитныя стъны долинъ. Когда, за рядомъ влажныхъ годовъ, при обильномъ снътъ на высотъ, нижняя часть глетчера подвигается впередъ, то онъ не только раздавливаетъ человъческія жилища и ломаетъ могучіе стволы деревьевъ, онъ двигаетъ

впередъ и могучіе валы его конечныхъ моренъ, состоящіе изъ колоссальныхъ каменныхъ глыбъ и представляющіе весьма значительные холмы; мало того, эти валы, повидимому, не представляютъ зам'ьтнаго сопротивленія его движенію».

Гельмгольцъ приводитъ это миѣніе, на основаніи работъ знаменитѣйшихъ изслѣдователей Альпъ—Соссюра, Форбса и Тиндаля. Не говорятъ ли каждому геологу разумъ и логика, что, приводимый Гельмгольцемъ, фактъ сдвиганія конечной морены ледникомъ гораздо достовѣрнѣе, нежели скольженіе по валунамъ и галькамъ морены, какъ думаетъ Фавръ.

Наконецъ, привожу описаніе геніальнаго Тиндалля, зна-

«Близь Осписа, но на противуположномъ берегу Аара, подымается горная стѣна изъ твердаго гранита, на которой полосы и черточки превосходно сохранены. При небольшомъ навыкѣ глазъ можетъ съ совершенною точностью прослѣдить линію, означающую уровень древняго льда: выше ея скалы шероховаты и неровны, между тѣмъ какъ подъ ней могучій дробитель—ледникъ стеръ выступы скалъ и сгладилъ ихъ ребра. Легко также можно видѣть глубину, до которой рпка (ледяная) вырыла себт русло въ древнихъ скалахъ». Затѣмъ: «Безъ сомнѣнія котловина, наполненная Мерьеленскимъ озеромъ, была вырыта въ прежнія времена вѣтвью Алечскаго ледника».

Приведя мнѣнія столькихъ знаменитостей, я считаю необходимымъ сказать еще о Крапоткинѣ, который разбирая формы фіордовъ, ясно высказываетъ свой взглядъ, говоря о стачиваніи и срѣзаніи, которымъ онъ приписываетъ отвѣсныя формы береговыхъ скалъ, прямизну долины, уничтоженіе мысовъ, углубленія передъ ущельями и проч. 1).

<sup>1)</sup> Не могу не указать еще, съ особеннымъ удовольствіемъ, на прекрасную статью г. Гелланда (въ перев. Кузнецова) «Образованіе фіордовъ, озеръ, мирковъ Норвегіи и Гренландіи». Онъ, основываясь на собственныхъ наблюденіяхъ и др., указываетъ на тъсную зависимость между конечными границами распространенія глетчеровъ и концами озеръ; оказывается, что всъ фіордовыя озера выточены въ сплошныхъ скадахъ и ледники какъ разъ достигали конца своего озера (ложа), оставляя тутъ свою конечную морену, всегда длинной осью перпендикулярную длинной оси озера. См. Горн. Жур. 1879 г. т. І Мартъ стр. 310 и особенно главу «Отношеніе между нахожденіемъ озеръ въ Норвегіи и распространеніемъ ледниковъ впродолженіи ледниковой эпохи». стр. 332.

Я полагаю, что, принимая существованіе ледниковъ толщиною отъ 1000 до 3000 футъ за реальный фактъ, отказываться признавать его дъйствіе на дно крайне странно.

Во первыхъ, глетчеръ, спускаясь отъ своего истока по болье или менъе крутому склону, движется отчасти вслъдствіе въса всей массы, но главнымъ образомъ вслыдствіе давленія вышележащихъ сныювъ и фирна, дъйствующихъ на него выпирающимъ образомъ.

Вся эта масса, спускаясь сверху сплошной рѣкой, какъ это обыкновенно бываетъ, давитъ своей громадной толщей на дно наклонной плоскости, и, достигнувъ меньшаго уклона, еще сильнѣе давитъ на дно его въ районѣ перемѣннаго движенія. Всѣ острыя, выдающіяся неровности дна, всѣ свободно лежащіе осколки и глыбы горныхъ породъ увлекаются движеніемъ и, подъ громаднымъ давленіемъ въ 1610 пудовъ на каждый квадр. футъ при толщѣ съ 1000′, начинаютъ свою истирающую дѣятельность.

Конечно, вначалѣ, при сильномъ давленіи приходится допустить раздробленіе льда и формованіе его. Поддонная часть льда таетъ и, обращаясь въ воду, поглощаетъ такое количество тепла, которое, вмѣстѣ съ уменьшеніемъ объема массы, а вслѣдствіе того, образованія пустаго пространства, понижаетъ температуру окружающей массы льда до такой степени, что вся вода снова замерзаетъ уже подъ громаднымъ давленіемъ. Тогда вмерзаютъ и валуны, и щебень, и такой перемороженный ледъ, по Фарадею, отличается своимъ постоянствомъ.

Во-вторыхъ. Неужели никому не приходитъ до сихъ поръ въ голову вопросъ: почему глетчеръ, двигаясь по ложу, способенъ иистымъ льдомъ производить такое обтачивающее дъйствіе на боковыя стънки, давленіе на которыя вовсе не такъ громадно, какъ на дно.

Почему, если на каждый квадратный футь ледникь въ 1000' толщины давить въсомъ въ 1610 пудовъ, притомъ дъйствуя твердыми валунами и кварцевымъ пескомъ, почему не долженъ онъ сильнъе истирать дно, нежели боковыя стънки. (А толща льда достигаетъ 7000')?

Я полагаю, что высота отвъсныхъ боковыхъ стънъ лед-

ника—есть м'єрило его углубленія въ почву. Стачиваніе происходить везд'є равном'єрно, особенно д'єйствуя на выдающійся рельефъ дна. Если опред'єлить время существованія ледника, то по высот'є отв'єсныхъ ст'єнь или по глубин'є русла можно опред'єлить скорость углубленія его. Или наобороть, зная скорость углубленія—опред'єлить продолжительность его жизни.

Въ третьихъ. Ледники дъйствуютъ сотни въковъ. Постоянно, ежеминутно, вода потоковъ, вытекающихъ изъ подъконечной арки, мутна до бъла; она переполнена—взвъшенными въ ней — ледниковой или каменной пылью и пескомъ. Постоянно въ поддонную морену выносятся массы крупныхъ валуновъ, щебня, гравія, галекъ, песку и ила. Это все продукты разрушенія.

Неужели эта безконечная обильная жатва не истощаетъ поля дъйствія ледника?!

Насъ поражаютъ размъры поддонныхъ моренъ или конечныхъ моренъ. А во сколько разъ большее количество матеріала уносится ледниковыми потоками въ теченіи тысячельтій?!

Такъ напр. Гелландъ приводитъ слъдующія данныя, касающіяся ледниковъ Гренландіи.

Максимумъ количества ила достигаетъ напр. въ ледникъ въ  $\Phi$  і  $\Phi$ 

Количество ила вообще изм'внчиво.

Измъряя количество воды въ ръкахъ, г. Гелландъ, основывансь на многихъ числовыхъ данныхъ, вычислилъ, что со всъхъ ледниковъ Юстедальсбрена, покрывающаго около 870 кв. килом., ръки сносятъ втеченіи сутокъ (въ іюлъ м.) около 2.000.000 килогр. ила; а соображаясь съ полнымъ количествомъ атмосферныхъ осадковъ въ означенной площади, оказывается, что въ 1 годъ ръки уносятъ 180.000,000 килогр. ила, что соотвътствуетъ объему куба, сторона котораго равна 41 метру.

Для того, чтобы перенестись въ эпоху дѣйствія ледниковъ на Кольскомъ полуостровѣ, надо себѣ представить, взятую Гелландомъ, площадь, увеличенной, по крайней мѣрѣ, въ 1000 разъ при дѣйствіи ледниковъ до 10,000 ф. толщиной; продолжительность дѣйствія громадна, конечно, но намъ неизвѣстна.

Тогла мы получимъ нъкоторое представление о количествъ перетертаго матеріала и о убыли материка.

«Ледникъ Аары, говоритъ Агассисъ, представляетъ намъ превосходный примірь огромных центральных или среднихъ моренъ, которыя образуются соединеніемъ ледниковъ Лауреръ Ааръ, справа, и Финстеръ Ааръ, слѣва; соединеніе ихъ внутреннихъ боковыхъ моренъ въ центръ образуетъ каменистую насыпь вдоль средины большаго ледника. Морена эта въ нъкоторыхъ мъстахъ достигаетъ до 60 ф. высоты при 10 верстной длинъ». Прибавлю отъ себя, что несомнънно, что поддонная морена того же ледника еще гораздо значительнъе, потому что боковыя и срединныя морены образуются изъ случайно падающихъ глыбъ береговыхъ утесовъ, а на див происходитъ такая работа, въ которой принимаютъ постоянное участіе члены тъхъ же верхнихъ моренъ, провалившихся чрезъ трещины ледника, и свои -- собственно -- поддонные валуны и глыбы.

Реклю приводить, при описаніи Пиреней, следующія измеренія Russell-Killongh. «Во время посл'єдней ледяной эпохи замерзлая рѣка, спускаясь съ горъ Оо, заливала всю долину, покатую къ съверу, и, столкнувшись съ горами Пейресурдъ, навалила у ихъ подошвы массу каменныхъ обломковъ. Эта чудовищная плотина, на которой раскинулась теперь, окруженная ясенями, деревня «Garin», имфетъ не менфе 4 километровъ длины, при 1500 метрахъ средней ширины и 240 метрахъ высоты. Масса эта въ десять разъ превышаетъ все количество земли, вынутой при прорытіи Суэзскаго канала».

Здъсь мы видимъ въ конечной моренъ количество каменнаго матеріала въ 1.440.000.000 кубич. метровъ.

Ясно, что все это количество взято изъ тъхъ горныхъ скаль, по которымь и среди которыхь двигался глетчерь. Но количество вымытаго и унесеннаго водой матеріала еще въ десять разъ больше, отом внодоть вода тизно структического

Мы поражаемся разм'врами морень, напр. Соловараки. Мы видимъ неотмученный матеріалъ, валуны и гальки, песокъ и гравій, пыль и щебень; все это составляеть груду въ 3 версты длины, 300 саженъ ширины и 40 саженъ высоты. Этотъ объемъ, собранный въ наглядной массъ, прямо говоритъ глазусколько убыло изъ скалъ матеріала, ихъ составлявшаго. Но дальше, ниже, мы видимъ у Колы массы гравія и неску изъ той же размытой Соловараки. Дальше въ губъ тянется гряда валуновъ, на нъсколько верстъ длины, продолжение того же BAHOCA. THE STORY OF HACK STREET HACK SHATCHIST HE SAN IN SOOHAH

А сколько еще, въ теченіи тысячельтій, унесено водой и такъ разсъялось по поверхности мелкой каменной пыли, вадунова и прочаго? за выпина съ выпина ва с Уогарода и свонук.

Вдоль Хибиныхъ горъ тянется боковая морена въ 40 верстъ длины, полторы версты ширины, высотой въ 70-80 саженъ. Этому громадному количеству вполнъ соотвътствовала, конечно. поддонная морена того же ледника.

Для Кольскаго полуострова приходится принять еще большее количество ледниковаго щебня и пыли, въ силу следующихъ соображеній. Толщина ледниковъ, покрывавшихъ сплошнымъ слоемъ высоты отъ 400 до 920 метровъ, должна быть принята отъ 2-3 тысячъ футъ. На этомъ основаніи давленіе, которое мы имъли раньше, высчитанное на ледниковую толщу въ 1000', должно быть утроено. Получается давленіе на каждый квадратный футъ въ 4830 пудовъ, не считая прибавочнаго увеличенія въса отъ налегающихъ скаль, моренъ — вообще. При такомъ давленіи, по моему мнінію, всі валуны и гальки особенно сильно напираютъ другъ на друга, раздробляются въ мелкій щебень, а тѣ, которые сидять близко отъ льда, вмерзаютъ - или частью, или вполнъ. Такое разможденіе валуновъ и выработка сильно измельченнаго матеріала происходять особенно въ тъхъ случаяхъ, когда, подлегающій подо льдомъ, слой валуновъ особенно толстъ. Они перемалываются въ каменную муку и затъмъ шлифують и бороздать землю.

Затемъ мы видимъ, разбирая ледниковый наносъ по различнымъ мѣстностямъ, двигаясь съ сѣвера на югъ, постоянное уменьшение валуновъ и относительное увеличение количества мелкихъ глетчерныхъ продуктовъ. Этотъ фактъ имбетъ ту же основную причину, постепенное перетираніе валуновъ. А присутствіе болье или менье крупныхъ угловатыхъ валуновъ объясняется тъмъ, что они свободно переносились, лежа на верхней поверхности ледника,

И такъ, на основани всего вышесказаннаго, надо принять, что количество песку, щебня и ледниковой пыли должно въ нъсколько десятковъ, если не сотъ, разъ превосходить количество валуновъ. А потому, только принимая во вниманіе этотъ, въчно ускользающій отъ насъ, матеріалъ, мы возстановимъ въ своемъ воображеніи картину дъйствительнаго разрушенія ледниковаго ложа и его боковъ.

При переходъ ледника съ равнины въ гору, при подъемахъ, особенно крутыхъ, ледникъ испытываетъ первоначально страшное продольное давленіе, вычислить которое мы никогда не будемъ въ состояніи, потому что не знаемъ какую часть силы расходуеть онъ на то давленіе, также значительное, которое происходить при незначительной волнистости ложа, особенно при развитіи углубленій. И такъ, испытывая громадное давленіе, ледъ дробится, таетъ, вслъдствіе развивающагося тепла, и, какъ при испареніи жидкой углекислоты, мы получаемъ твердую, сифгообразную, - такъ и здфсь, при томъ же громадномъ давленіи, развивается такой страшный холодъ, что вся вода замерзаетъ снова и ледъ, получившійся при такомъ громадномъ давленіи, при уменьшенномъ объемѣ и при чрезвычайно низкой температурь, будеть обладать особеннымъ свойствомъ, а именно - растаетъ только при такомъ давленіи, которое своими размфрами превзойдеть то, при которомъ онъ образовался. Поэтому особенно ръзко и ясно развита полировка и штриховка на основаніи бараньихъ лбовъ; здёсь ледъ становится крайне плотнымъ и вмерзшіе валуны сильно, глубоко бороздать камни, не дрогнувь въ своей твердоводяной оправъ, не вращаясь. Поэтому такъ ръзко сръзаются углы бараньихъ лбовъ, совершенно стачиваются и закругляются.

Въ Хибиныхъ тундрахъ мы можемъ это видъть ясно въ утесахъ, поднимающихся надълогомъ, отдъляющимъ первый уступъ Высокаго мыса отъ его главнаго кряжа. Здъсь та сторона скалъ, которая смотритъ на востокъ, въ сторону движенія ледника, отвъсна. Это затылокъ. Другая сторона—«лобъ», не смотря на защиту сосъдней, близко надвинувшейся скалы, совершенно сточена и закруглена. Но такъ какъ, первоначально, объ скалы составляли одну сплошную гряду и только потомъ отдълились трещиной, то можно ясно видъть насколько сръзано съ одной стороны— по относительному излишку съ другой.

Между главнъйшими вершинами Хибиныхъ горъ — Высокимъ мысомъ и Гребеньемъ, залегаетъ крутой Гангесный логъ. Верхнее ущелье его несетъ названіе «Дверей». Смотря на представляемый мной здѣсь рисунокъ, мы ясно видимъ, что даже на этой громадной высотѣ въ 3000′, ледъ настолько сильно бороздилъ скалы, что произвелъ эти выпуклыя, закругленныя формы—эти бараньи лбы. Слѣды этой страшной работы мы видимъ внизу, гдѣ, на днѣ глубокой пропасти, гигантскими грудами нагромождены оторванные утесы горъ. Пылкое воображеніе лопарсй приписываетъ происхожденіе этого адскаго хаоса, памятника разрушенія—ожесточеннымъ побоищамъ титаническихъ гигантовъ, миоическихъ «шишей», тѣни которыхъ, будто-бы, и теперь бродятъ по логамъ и лѣсамъ. Ниже, стѣны собственно ущелья совершенно вертикальны и гладко обточены льдомъ.

Склоны логовъ имѣютъ ту типичную форму, которую приводитъ Крапоткинъ къ характеристикъ дъйствія ледниковъ. Нижній желобъ лога узокъ и сдавленъ, близко надвинувшимися, отвъсными громадами грядъ. Далеко наверхъ, саженъ на 25, поднимаются эти стѣны, не расширяясь; затъмъ, отъ извъстнаго предъла, онъ расходятся постепенно, все быстръе и быстръе и этой постепенностью образуютъ закругленія. Въ результатъ получается для грядъ форма длинныхъ опрокинутыхъ корытъ, положенныхъ рядомъ, а для логовъ будетъ примънима форма того желоба, который образуется между двумя сдвинутыми корытами, параллельно положенными.

Мы нетолько наблюдаемъ здѣсь лога, выточенные льдомъ поперекъ пластованію породъ, на глубину 2000 футъ, но ясно видимъ тѣ же глубокія борозды, въ гигантскихъ размѣрахъ развитыя по всѣмъ грядамъ, по одной линіи, идущей поперекъ грядъ и параллельно озеру Имандрѣ.

Форма этихъ логовъ говоритъ сама за себя. Она могла образоваться только дъйствіемъ льда. Точно также прямолинейность указанныхъ бороздъ, съ одной гряды переходящихъ на сосъднюю, и т. д., указываетъ на то, что здъсь также дви-

48

гался ледникъ, который и выточилъ съдловину въ хребтахъ и обусловилъ однорядность колмовъ на грядахъ.

Говоря объ вытачиваніи договъ, я долженъ упомянуть, что при совершенной правильности ихъ формы, прямизнъ, они имъютъ всегда лъвый склонъ правильнъе обточеннымъ, чъмъ правый. Такъ что и отвъсная стъна совершенно выглажена и верхняя закругленность ея болье обточена. То же самое мы наблюдаемъ и въ ущельи «Двери».

Обращаясь къ вершинъ Сырой тундры, мы видимъ, какъ совершенно безразлично стачиваетъ ледникъ такой разнообразный, по твердости, матеріалъ, какъ гнейсъ и квардъ, выходящій на вершинъ скалы. Если бы не была такъ громадна стачивающая сила, то, все-таки, постоянно, болбе рыхлая порода подавалась бы сильнее, скорее, а мене податливая все более и болбе выдавалась бы острымъ гребнемъ или кряжемъ.

Но всего явственные обтачивающая сила проявляется тамъ, гдъ мы видимъ цълыя громадныя пространства выравненными подъ одно; гдв только приплюснутые каменные купола говорать намъ о существованіи когда то тамъ цізыхъ группъ и рядовъ скалъ и утесовъ. Поэтому не могу не указать вновь на характеристичный ледниковый пейзажъ у города Колы, видимый съ вершины Горфлой тундры.

Кончая главу о ледниковыхъ явленіяхъ, я считаю нужнымъ сгруппировать здъсь, еще разъ, всъ факты и доводы, которые убъдили меня въ образованіи логовъ при содъйствіи льда. Главнымъ образомъ я основываюсь на строеніи логовъ Хибиныхъ тундръ, кими жажаж вого падоток жоогож отог

- 1. Направление логовъ, на значительномъ протяжении, строго параллельное; озера и ръки того же района также параллельны между собой и направленію логовъ.
- 2. Направленіе логовъ и частей рельефа строго совпадаеть съ направлениемъ ледниковыхъ шрамовъ и бороздъ и телескопического борожденія, а следовательно и съ направленіемь движенія когда то бывших здісь ледниковь.
- 3. Полвая подчиненность рельефа всемъ уклоненіями движенія ледника.
  - 4. Горные лога совершенно прямы, чего не могло бы быть

при водномъ образованіи, такъ какъ размываніе стремится обвыходящие мысы итт. д. анкоокра - виказуно и

- 5. Горные лога тянутся поперекъ (вкрестъ) пластованія породъ; пласты поставлены на голову, и ихъ перепендикулярно проръзають лога. Стазо и прот ахивотеро з подав
- 6. Стънки логовъ выпуклы внутрь лога.
- 7. Внизу, со стороны напора, гриды, разделяющія лога, оканчиваются бараньими лбами. Уз володой в вангае отбать
- 8. Склоны грядъ, окаймляющихъ лога, гладко обточены и покрыты желобами. ... вностроукой отказакой кітиндон киняцай
- 9. На нихъ мы находимъ занесенными посторонніе валуны.
- 10. Воднаго размыванія, какъ главнаго фактора образованія логовъ, здѣсь нельзя допустить, потому что: а) Размываніе совершается всегда въ подчинении къ складчатости породы; потому образующіяся долины составляють развитіе прежнихъ, параллельныхъ линіи простиранія. b) Пласты поставлены на голову и водъ приходилось проръзать пласты перепендикулярно, чрезъ всю толщу, тогда какъ ей легче было бы свернуть въ любомъ мъстъ, на границъ пластовъ, въ сторону, по линіи простиранія. с) Порода амфиболита мъстами разбита очень глубокими и широкими трещинами, куда вода ниспадала бы каскадами, а, следовательно, ниже трещины не было бы ея обтачивающаго действія на гряде. d) Наконець, каждое изъ предыдущихъ положеній опровергаетъ объясненіе воднымъ размываніемъ. Откуда возьмутся выпуклыя стѣнки? бараньи лбы? валуны на грядахъ? подчиненность глетчерамъ? и проч.

### HOTHERTIC: SO ETOPHEN, OH HILLS ARABA TIL TO BE STEEDER LOS SERVICES

### ядонажучаю денен поднять обружает и выда выпоска в обружает в обр ROAY, MEETE ARCTRONING CALIN HOERHATO BEGINSTO VODERING

Явленія поднятія Кольскаго полуострова представляють особенный интересъ; потому, во-первыхъ, что мы находимъ здесь целую систему признаковъ поднятія отъ Сумскаго посада до Колы включительно, что говорить въ пользу повсемъстности, постепенности и плавности движенія; во-вторыхъ,

потому, что мы, мѣстами, наблюдаемъ, рядомъ съ поднятіями— и опусканія, — колебанія, а потому сильное размываніе и намываніе; въ третьихъ, потому что, при незначительной разности высотъ уровней морей и водораздѣла 1), громадности высотъ береговыхъ горъ и скалъ 2), рядовомъ расположеніи озеръ и ихъ связности на громадномъ протяженіи, невольно возникаетъ мысль о нѣкогда бывшемъ соединеніи Кандалашскаго залива и Кольской губы.

Поэтому я нам'треваюсь особенно подробно разсмотр'ть явленія поднятія Кольскаго полуострова.

Оскаръ Пешель, въ своемъ сочинении (Нов. Задачи Сравнительнаго Землев'вденія), сопоставляя факты поднятія и пониженія отдёльныхъ містностей, приходить къ тому заключенію, что, обыкновенно, полосв поднимающагося берега соотвътствуетъ полоса другаго, ближайшаго къ нему, ему противулежащаго или соотвътственнаго, -- понижающагося. Съверъ Скандинавіи повышается, югъ-понижается; неподвижная, раздъльно-переходная полоса проходить около Карискроны. Для насъ особенно интересно указаніе на тотъ фактъ, что «слъды поднятія найдены въ Старомъ залив'в (Altenbai), около Гаммерфеста, следовательно, на крайнемъ севере Европы, где прежнія береговыя линіи и остатки морскихъ раковинъ лежатъ на 6000 ф. выше уровня моря; на этой высотъ они остаются до Дронтгейма, гдф, какъ доказано, поднятіе суши въ тысячельтие составляеть 20 ф. Въ Ботническомъ заливъ, около устья Торнео, дно поднимается на 52,5 ф. въ тысячелътіе». Относительно поднятія самаго Кольскаго полуострова мы находимъ указанія у Бетлинка. Во-первыхъ, онъ, говоря о Скандинавіи и Финляндіи, приводить, какъ доказанный факть, ихъ поднятіе; во-вторыхъ, описывая окрестности Колы, онъ указываетъ слъдующіе факты: «Склоны холмовъ, окружающихъ Колу, несуть явственные следы прежняго высшаго морскаго уровня, въ видъ уступовъ и валовъ изъ галекъ; мъстами встръчается нъсколько покинутыхъ ръчныхъ руслъ, которыя когда то составляли ложе ръки Колы. Теперь эти русла лежатъ выше современнаго уровня рѣки Колы. Самый городъ Кола расположенъ на одномъ изъ таковыхъ и его огороды раскинуты по склонамъ прежнихъ береговъ».

Затъмъ, у него же находимъ указаніе на то, что, начиная отъ Кольской губы, берегъ постоянно поднимается къ западу и, не доъзжая Рыбачьяго полуострова, достигаетъ высоты въ 1000 футъ.

Въ «Отчеть по работам» въ экспедиціи на Мурманскому берегу въ лѣто 1870 г. лейтенанта барона Майделя», мы находимъ слѣдующія указанія на поднятія полуострова и его признаки.

«Въ Вард—э — баронъ Майдель нашелъ на высотъ около 150 футъ, подъ слоемъ торфа, песокъ съ мелкими ракушками, а въ другомъ мъстъ — въсколько параллельныхъ между собой рядовъ круглышей, расположенныхъ параллельно настоящему уровню мора» (берегу въроятно?).

«Въ Вадс—э, гдѣ склоны горъ отложе и ровнѣе, тамъ тянутся, до приближенной высоты 200 футъ, совершенно правильныя дюны въ видѣ волнообразной поверхности. Обозрѣвая съ вершины горы окрестность, можно по этимъ дюнамъ ясно видѣть съ какой стороны былъ прежде главный прибой волнъ. Тоже самое явленіе, но въ малыхъ размѣрахъ, встрѣчается на Рыбачьемъ полуостровѣ, въ Вайда—и Корабельной губахъ».

Миддендорфъ говоритъ о такомъ же поднятіи материка до 200' и болѣе, по берегамъ Таймырскаго края, у восточнаго берега Новой Земли и у Сибирскихъ Острововъ.

Теперь обращаюсь въ моимъ собственнымъ изслѣдованіямъ. Уже въ моей первой предварительной работѣ ¹) я указываль, что, слѣдя за очертаніями береговъ западнаго Бѣломорья, мы замѣчаемъ, что, по мѣрѣ нашего движенія на сѣверъ, берега поднимаются.

Не останавливаясь теперь на всёхъ подробностяхъ, приведу только слёдующіе факты.

<sup>1) 135</sup> METPORD. IT ATTACORDA OTE CORRESPONDED MATORILES

<sup>2)</sup> Отъ. 400 до 1000 метровъ.

<sup>1)</sup> Физико-Географическій очеркъ Кольскаго полуострова 1881 г.

Въ самой южной части западнаго побережья, въ Сумскомъ посадъ, берега совершенно низменны и состоятъ изъ невысокихъ холмовъ ледниковаго наноса, неотсортированнаго, слъдовательно типичныхъ моренъ.

Далеко въ море, въ полосъ приливо-отлива, тянутся гряды валуновъ, ясно видимыя, на нъсколько верстъ, торчащими надъводой.

Ночти тоже видимъ мы въ Сухонаволоцкой волости. Разница въ томъ, что берега состоятъ изъ низкихъ скалистыхъ лудъ, съ которыхъ ледниковый наносъ смытъ, но крупные валуны сохранились.

Въ Сорокахъ берега вообще выше; мъстами, мы находимъ не высокія, до 2 саж., обрывистыя скалы, слегка вогнутыя, нависшія. Онъ несутъ ясные признаки дъйствія воды.

Въ Кеми берега поднимаются на 5 — 6 саженъ. Въ Керети—образуютъ обрывистые утесы въ нѣсколько десятковъ саженъ высоты, выглаженные, выточенные водой, съ ясными пещерами вымыванія волною. На самомъ сѣверѣ, около Кандалакий, берега поднимаются, на восточномъ берегу отвѣсно, саженъ на 50 — 60.

Слѣдовательно, мы находимъ, вообще, что берега, отъ Сумскаго посада начиная, поднимаются постепенно на сѣверъ, дѣлаются обрывистыми и несутъ террасы; мѣстами, на утесахъ находимъ ясные признаки дѣйствія воды. Наибольшей высоты они достигаютъ у Кандалакщи.

Перехожу теперь къ отдъльнымъ признакамъ поднятія.

Между Сороками и Кемью есть группа очень высокихъ куполообразныхъ острововъ, несущихъ названіе Рамбаковъ. Поднявшись на одинъ изъ нихъ, вершина котораго достигаетъ, приблизительно, высоты въ 25 саженъ, я нашелъ на верху хорошо сохранившіеся шрамы и борозды. Вершина совершенно выглажена и закруглена, особенно съ сѣверозападной стороны. Бараній лобъ, громадныхъ размѣровъ, круто спускается отъ вершины и наконецъ совершенно отвѣсно падаетъ въ воду. На отвѣсной стѣнѣ хорошо сохранилась полировка и на ней рѣзко выдѣляются глубокіе шрамы, идущіе въ вертикальномъ направленіи. Все это на высотѣ отъ 10 до 15 саженъ надъ

уровнемъ моря. Ниже — совершенно не видно слѣдовъ этого борожденія, изъ чего надо заключить, что слѣды его стерты дѣйствовавшей здѣсь водой, которая уничтожила и шлифовку, и штриховку 1). Затѣмъ громадныя груды обкатанныхъ валуновъ, поднимающихся на нѣсколько саженъ надъ водой, говорятъ намъ о размывающемъ дѣйствіи воды, которая ихъ округлила и унесла мелкій матеріалъ.

Далѣе на сѣверъ, не доѣзжая Кеми, около Сухой губы есть такъ называемый  $\Pi y p z - n a s o n o x z$ .

Онъ представляетъ собой отвъсно обрывающуюся гранитную стъну, которая отдъляется отъ береговой линіи цълой широкой грядой береговыхъ лудъ. Онъ разбиты вертикальными, параллельными между собой, — морю и — линіи простиранія, — трещинами, по которымъ произошли сдвиги. Такъ что первая полоса луды пологимъ склономъ обращена къ морю, а отвъсная стънка, которой она обрывается къ материку, параллельна береговой линіи. За ней идетъ совершенно подобная же, падающій пластъ которой упирается въ стънку предыдущей, а задняя стънка служитъ опорой для новой такой же гряды. При сильномъ приботь, вода взбъгаетъ на двътри такихъ гряды и задерживается въ узкихъ желобахъ.

Все это пространство, заключенное между моремъ и отвъсной стѣной, имѣетъ ширину, приблизительно, въ 10 — 15 саженъ. Самыя удаленныя гряды поднимаются на высоту около 4 саженъ. По всѣмъ этимъ лудамъ, до самой стѣны, разсѣяны многочисленныя колоніи баланидъ, незначительныхъ размѣровъ. Мѣстами—онѣ сплошь покрываютъ бѣлымъ пятномъ основную мясокрасную породу; мѣстами, онѣ разсѣяны болѣе или менѣе рѣдкими группами. Присутствіе ихъ здѣсь, на значительной высотѣ надъ уровнемъ моря указываетъ, очевидно, на поднятіе берега. Кромѣ того, интересенъ тотъ фактъ, что, не смотря на дѣйствіе морской воды, въ изломахъ порода вполнѣ сохранила свою свѣжесть. Какъ цвѣтъ, такъ и плотность, цѣльность ея по всей ширинѣ лудъ одинаковы. Это, вмѣстѣ съ общей формой берега, говоритъ въ пользу недавняго поднятія.

<sup>1)</sup> Слъды ея различныхъ уровней видны на различн. высотахъ, въ видъ темныхъ горизонтальныхъ полосъ.

Этимъ же поднятіемъ надо объяснить и рядъ сдвиговъ, здъсь происшедшихъ.

Рядомъ, вскоръ за Пуръ — наволокомъ, слъдуетъ къ съверу Сухая губа. Здъсь берега, состоящіе изъ красныхъ гранито-гнейсовъ, поднимаются на очень значительную высоту. Съ правой стороны отъ въъзда особенно высоки эти обрывистыя скалы. Верхушки ихъ закруглены, а стънки, обрываясь отвъсно, образуютъ нъсколько террасъ. Въ нъсколькихъ десяткахъ саженъ отъ станціонной избы поднимается такая терраса съ характерными трещинами, ущельями, заваленными грудами валуновъ. Вдоль всей стъны слъдуетъ, внизу, нъсколько параллельныхъ береговыхъ валовъ, состоящихъ изъ плохо-об-катаннаго щебня мъстной породы—краснаго гнейса.

Такихъ береговыхъ валовъ мы находимъ три — ясно развитыхъ, и два или три — слабо выраженныхъ.

Каждый изъ нихъ имъетъ ширину около одного или полутора аршинъ; высота не превышаетъ четверти аршина. Форма ихъ кривая, и они выпуклою стороной обращены къ морю. Судя по тому, что щебень, изъ котораго они составлены, плохо обкатанъ, надо заключить, что онъ образовывался тутъ же, на мъстъ, а именно-постепенно намывался вновь изъ вышеописанныхъ береговыхъ расщелинъ. Тамъ породы сильно разрушились, и матеріалу для новообразованія валовъ было достаточно. Во-вторыхъ, изъ того же признака, выводимъ, что, въроятно, - или обкатанныя гальки смывались долой, или вода работала тутъ не долго, такъ что плотная порода, изъ которой состоять гальки, не успъла обточиться въ достаточной степени и принять видъ настоящихъ галекъ. Выше этой первой террасы мы находимъ широкую площадь, на которой также, очевидно, работала вода. Вся поверхность ея совершенно сглажена, голая, и на ней только, изрёдка, лежатъ совершенно обкатанные крупные валуны. Высота этой площади надъ уровнемъ моря достигаетъ десяти саженъ.

Эта Сухая губа представляетъ прекрасное мъсто для стоянки судовъ, на случай бури. Форма ея чрезвычайно интересна. Она представляетъ собой большой ковщъ, съ довольно узкимъ входомъ съ моря. При входъ, съ лѣвой стороны, сильно выдается

въ море крутой мысъ, сложенный изъ груды валуновъ. Это остатки размытой сельги. Часть ея, тутъ же, поднимается на берегу. Съ противуположной стороны также выдается мысъ, но онъ прямо врѣзывается въ море и мало прикрываетъ входъ въ губу. Такимъ образомъ губа защищена преимущественно отъ южныхъ и юговосточныхъ вѣтровъ. Южная часть губы, прилегающая къ сельгѣ, очень мелкая и песчаная. Сѣверная, — прилегающая къ высокимъ скаламъ, очень глубока. Расположеніе внутри губы полуострова и небольшаго островка таково, что отдѣляется самая глубокая часть губы, въ которую, притомъ, никоимъ образомъ не можетъ достигнуть волненіе. Тамъ легко помѣстился бы десятокъ шнякъ.

Сѣвернѣе Керети, въ Кузакоцкой губѣ, на Средней лудѣ, прекрасно сохранилась полировка и царапины. Теперь онѣ находятся на высотѣ около 3—4 саж. Извѣстно, что полировка хорошо сохраняется въ водѣ,—въ томъ случаѣ, если защищена отъ прибоя волнъ песчанымъ наносомъ.

Понятно, если бы этотъ небольшой островокъ, въ періодъ поднятія, хотя два-три года находился бы въ полосѣ прибоя волнъ, то работа ихъ, при помощи обильно взвѣшеннаго песку и господствующаго здѣсь сильнаго прибоя, навѣрно уничтожила бы всю полировку и царапины, а можетъ быть—не пощадила бы и шрамовъ. Поэтому, поднятіе здѣсь должно было совершаться довольно быстро.

Наоборотъ, то явленіе поднятія, которое мы имѣли въ Рамбакахъ, должно было совершаться сперва быстро, а затѣмъ—медленно; потому что наверху и царапины, и полировка сохранились; внизу, надъ водой, вся она уничтожена.

Въ Кандалакшѣ, верстахъ въ полутора отъ села, по направленію на Западъ отъ него, на высотѣ около 30—40 саженъ, далеко отъ моря, лежатъ значительныя толщи хорошо перемытаго песку. На глазъ—онъ представляетъ совершенно однообразную массу зеренъ кварца, приблизительно ровнаго зерна. Полоса эта тянется вдоль берега, въ полуверстѣ отъ него. Изслѣдуя этотъ песокъ, и желая опредѣлить его толщу, я взрылъ его и изъ глубины добылъ небольшую раковинку довольно хорошо сохранившуюся. Она принадлежитъ къ со-

временнымъ намъ формамъ, живущимъ и до сихъ поръ въ Бъломъ Моръ. Это одна изъ разновидностей Виссіпит ипааtum (по опредъленію г. Герценштейна). Хотя раковины рода Buccinum и подобныхъ часто заносятся на берегъ чайками, которыя ими питаются, но, въ данномъ случав, условія нахожденія исключають возможность такого предположенія. Тонкій песовъ (не дюнный), въ которомъ она была найдена, долженъ быль отложиться въ одной изъ прежнихъ бухтъ, принимающихъ въ себя ручейки, быстро сбъгающіе со склоновъ. Мы, и теперь, находимъ, верстахъ въ 3 отъ Кандалакши, такой эстуарій, отділенный отъ моря широкими грядами валуновъ, которыя покрываются водой только во время прилива; эта бухта глубоко вдается въ материкъ, въ формъ ковща, и принимаетъ въ себя ручей, несущій много песку. Найденный мною экземпляръ Виссіпит довольно обкатань; но, по свидътельству г. Герценштейна, даже живые экземпляры встръчаются въ совершенно подобномъ же состоянии. И такъ этотъ Buccinum undatum опредъляетъ намъ поднятіе на высоту около 40 саженъ. (Съ нимъ виъстъ найдено довольно много обломковъ, мелкихъ и обкатанныхъ, отъ ракушекъ, изъ Brachiopoda и Lamellibranchiata).

Въ этой же Кандалакшѣ впадаетъ въ море рѣка Нива. Такъ какъ мы знаемъ уже, что Кандалакша поднялась надъ уровнемъ моря на высоту до 40 саж., то, — на основаніи доказаннаго г. Головкинскимъ положенія, что, при поднятіи устьевъ, рѣка выполняетъ свое русло переносимымъ ею матеріаломъ, — мы должны бы были видѣть здѣсь, у устья, большіе песчаные наносы, дельту, сквозь которую едва пробирается нѣсколькими протоками рѣка. Въ дѣйствительности — мы видимъ совершенно противуположное. Рѣка Нива глубоко вырыла себѣ русло въ громадной толщѣ ледниковаго наноса, и до сихъ поръ еще продолжаетъ свою работу.

При верховьяхъ рѣки берега очень низменны, даже болотисты. Около устья, на большомъ протяженіи, они обрывисты и состоять изъ почти-отвѣсныхъ стѣнъ ледниковаго наноса, высотой до пяти, шести, мѣстами даже — десяти саженъ. Въ толщѣ разрѣза торчатъ громадные валуны, выполняющіе также все русло.

Мъстами, по сторонамъ главнаго ложа, отложились значительные песчаные наносы (верстахъ въ двухъ отъ Кандалакши); и теперь ръка Нива проръзала себъ русло среди этихъ прежнихъ отложеній.

Такое углубление русла указываетъ на увеличившуюся скорость теченія, а это, въ свою очередь, есть указаніе на поднятіе верховьевт ріки.

И такъ мы видъли, что Кандалакща поднимается, но верховья ръри Нивы поднимаются относительно ея устья; слъдовательно вся полоса отъ оз. Имандры 1) до Кандалакши поднимается одновременно, причемъ Имандра поднимается быстръе Кандалакши.

На озерѣ Имандрѣ мы имѣемъ цѣлый рядъ признаковъ поднятія, которые, сами по себѣ, могли бы служить достаточнымъ доказательствомъ поднятія полуострова; но, тѣмъ болѣе, когда мы имѣемъ цѣлый комплексъ признаковъ, они пріобрѣтаютъ еще большее значеніе.

Я указываль въ первомъ моемъ очеркъ 2), что песчаные берега почти отсутствуютъ на Имандръ. Какъ на Пелесмозеръ и другихъ, съвернъе лежащихъ, такъ и на Имандръ, мы, большею частью, видимъ—или низкія голыя каменныя луды и наволоки, или же—обрывистыя набережныя, какъ бы искуственно сложенныя изъ валуновъ.

Примъры такихъ набережныхъ, поднимающихся довольно высоко, мы находимъ около Разнаволока, на большинствъ острововъ, - Сявъ — островъ, Высокомъ, Палёномъ и др.; — на Желъзномъ наволокъ, состоящемъ также исключительно изъ валуновъ и поднимающемся свыше двухъ саженъ. Далъе, мы находимъ еще болъе высокія террасы въ песчаныхъ берегахъ, около Разнаволока, къ съверу отъ него. Тамъ мы видимъ ясно подмываніе горизонтально-отложенныхъ песчаныхъ слоевъ, поднимающихся на высоту до 10 саженъ.

На Высокомъ островъ сохранились ясные слъды существовавшаго прежде пролива, который отдълялъ болъе высокую, — восточную часть отъ чисто валунной—западной. Проливъ шелъ

валуцы са као окрустены и обязальных в<del>дебим и послеженых</del>

<sup>1)</sup> Гдв находятся истоки р. Нивы. 2) См. Кольск, полуост. 1881.

прямо съ съвера на югъ. Онъ представляетъ теперь широкую низменную полосу земли, окаймленную съ востока грядой валуновъ, съ запада — высокимъ береговымъ валомъ, сложеннымъ изъ разнообразнаго матеріала. Эта мъстность теперь совершенно болотиста и представляетъ сплошныя заросли морошки. Только съ съверной стороны устье бывшаго пролива представляетъ теперь песчаную полосу незначительной ширины. Все остальное пространство покрыто торфяникомъ ржаво-краснаго цвъта.

На этомъ же Высокомъ островъ мы видъли уже, на юговосточномъ берегу, хорошо сохранившіяся борозды и царапины на гладкой и отполированной поверхности луды. Такъ какъ мы видимъ эти знаки сохранившимися на высотъ отъ полуаршина—до трехъ—надъ уровнемъ воды, и притомъ верхніе—сохранились даже подъ моховымъ покровомъ (а мы знаемъ, какъ сильно разрушительно дъйствуютъ мхи и лишаи на поверхности скалъ), то мы вправъ предполагать, что здъсь поднятіе совершилось очень недавно, или, върнъе, это доказательство того, что поднятіе совершается и до сихъ поръ.

Но гдѣ же доказательства значительныхъ поднятій, — таковыхъ, которыя бы свидѣтельствовали не только о современности намъ этого процесса, но и о совершавшихся въ прежнее время, въ поледниковый періодъ?

не надо забывать, что здёсь слёды поднятія должны быть значительно выше, нежели въ Кандалакше, потому что относительное поднятіе—на стороне озера Имандры.

Спускаясь по одному изъ логовъ Хибиныхъ тундръ, называемому Медвѣжьимъ, я замѣтилъ слѣдующую особенность. Въ верховьи лога дно его выстлано громадными неправильными плитами, рѣзко-угловатыми, иногда слегка — обточенными, иногда — со шрамами. Онѣ почти совсѣмъ замыты гравіемъ и пескомъ. Далѣе, спускаясь внизъ, мы видимъ тѣ же плитообразные валуны, грудами нагроможденными другъ на друга. Песокъ смывается водой вглубь и уносится этимъ путемъ. Далѣе, вдругъ начинается такая полоса, съ которой начиная, — всѣ валуны сильно округлены и обкатаны; щебня и песку нѣтъ; только тотъ — который теперь переносится сверху водой, зале-

гаетъ на глубинъ, въ щеляхъ. Между тъмъ, мы знаемъ изъ разсмотрънія русла любаго горнаго ручья, что нижнее теченіе его особенно богато песчаными наносами; здѣсь же, въ логу, мы видимъ совершенно противное. Верховье изобилуетъ пескомъ и щебнемъ; въ устъи — ихъ почти нѣтъ. Наконецъ, около самаго нижняго конца лога, по правому берегу его, мы видимъ громадную морену, почти голую, на которой только изрѣдка разбросаны тощія сосенки; вся она состоитъ изъ совершенно круглыхъ, обкатанныхъ валуновъ; песокъ и ледниковый щебень здѣсь вымыты окончательно. Тоже самое мы видимъ ниже, внѣ лога, на большой продольной моренъ, тянущейся около Хибиныхъ горъ, по берегу.

Высота, до которой должна была подниматься вода, или на которую мы должны опустить всю мъстность, колеблется около ста—или полутораста метровъ. На первую высоту поднимается первая береговая морена; вторая, —лежащая на съверномъ склонъ Медвъжьяго лога, находится на высотъ около полутораста метровъ. Другіе слъды пребыванія здъсь, въ логу, воды, —смыты теперь, потому что размываніе, въ настоящее время, совершается съ поразительной быстротой.

Противор в читъ ли форма бараньихъ лбовъ, всего ряда склоновъ Хибиныхъ горъ, этому высокому уровню воды? Н в тъ, — потому что первые уступы поднимаются надъ уровнемъ Имандры на 300 метровъ; нижняя часть ихъ—отв в сная: начало закругленія лбовъ находится на вс в тельно, отв в сность скалъ, до высоты 100 метровъ, не можетъ противор в чить поднятію и прежнему д в йствію воды. Основаніе грядъ завалено грудами валуновъ.

Затѣмъ, около станціи Іокостровской, мы находимъ высокій берегъ, круго поднимающійся на высоту десяти,—а мѣстами—пятнадцати саженъ. Мнѣ удалось найти хорошій разрѣзъ его. Тамъ ясно видна слоистость отложенія здѣсь различныхъ матерьяловъ. На самомъ верху, подъ растительнымъ слоемъ, залегаетъ тонкій отмученный песокъ; толща этого слоя весьма значительна. Подъ нимъ—гравій и галька, и опять песокъ; въ самомъ низу—валуны и гравій съ галькой. Ясно, что подобнаго рода образованія совершенно опредѣленно указы-

вають на сортирующее дъйствіе воды. Порядокъ залеганія слоевъ указываеть на послъдовательное поднятіе.

Наконецъ, на сѣверѣ Имандры, противъ Разнаволока, мы находимъ громадный береговой выступъ, весь сложенный, на высоту около десяти саженъ, изъ слоистыхъ песковъ и гравія, различной величины зерна и — окраски слоевъ. Всѣ слои совершенно горизонтальны. Особенно рѣзко выдѣляются на желтоватыхъ и чисто-бѣлыхъ фонахъ, два ржавокрасныхъ слоя. Поверхность этой террасы совершенно горизонтальна и покрыта небольшой травой.

На Пелесмозерѣ мы находимъ высокія береговыя образованія, выраженныя въ формѣ грядъ валуновъ. Такъ какъ направленіе этихъ грядъ не соотвѣтствуетъ береговой линіи и, мѣстами, мы видимъ скалистые кряжи, тянущіеся въ томъ же направленіи, то первичное происхожденіе этихъ грядъ—ледниковое; —это слѣды ледниковаго выпахиванія, это —телескопическое изборожденіе. Въ настоящее время мы находимъ эти гряды въ такомъ положеніи. Отъ берега отдѣляется, подъ очень острымъ къ нему угломъ, коса, сложенная изъ валуновъ. Она тянется на сѣв. сѣв. востокъ. Это направленіе бывшаго здѣсь движенія ледниковъ.

Гряда валуновъ вовсе не заключаетъ въ себъ остатковъ болъе мелкаго матерьяла. Имъ соотвътствуетъ на самомъ берегу масса валуновъ, поднимающихся, мъстами, отвъсно, на высоту до 2 саженъ. Верхній уровень валуновъ составляетъ всюду горизонтальную поверхность. Всъ валуны совершенно обкатаны, округлены. Такія набережныя тянутся вдоль всего озера на протяженіи 12 верстъ. Одинаковый уровень террасъ, отсутствіе мелкаго матерьяла, круглая форма валуновъ, все это совершенно опредъленно указываетъ на поднятіе. Совершенно тоже самое находимъ мы на Пулозеръ и Мурдозеръ.

Уже вскорѣ послѣ изслѣдованій Леопольда ф. Буха, различными геологами быль констатированъ тотъ фактъ, что, доказанное еще Цельсіемъ, поднятіе Скандинавіи совершалось неравномѣрно; были остановки въ движеніи и колебанія; начиналось опусканіе, которое, послѣ продолжительной паузы, снова переходило въ поднятіе. Такъ—для Альтенфіорда доказано г. Бравэ, что восточный конецъ его повышался гораздо быстръе въ верховьи нежели въ устьи.

Именно, для верховья—поднятіе было въ 222,4', а для устья фіорда 94,4'. Такое значительное измѣненіе силы поднятія, на незначительномъ пространствѣ, чрезвычайно важно. Оно доказываетъ, что не должно быть непремѣннаго соотношенія въ скорости и степени поднятія такихъ значительныхъ площадей, какъ напр. Кольскій полуостровъ. Затѣмъ, интересно еще, приводимое тѣмъ же Бравэ, заключеніе, что нагорья вообще поднимаются быстрѣе, а прибрежныя скалы медленнѣе.

Послѣ этого предварительнаго вступленія, перехожу къ Ляйэллю. Говоря о паралельныхъ террасахъ «Гленъ-Роя» въ Шотландіи, онъ приводитъ мнѣніе Дарвина, утверждающаго, что подобныя террасы по склонамъ холмовъ происходятъ тогда, когда поднятіе совершается, хотя и очень постепенно, но при этомъ случаются продолжительныя остановки, число которыхъ прямо обусловливаетъ количество террасъ. Издали они совершенно рѣзко обозначены, вблизи—это неправильно-намытыя груды галекъ и валуновъ. У Ляйеля приложенъ рисунокъ Дарвина, доказывающій, что эти террасы—просто мѣста, имѣющія гораздо меньшій наклонъ, нежели вся боковая поверхность холма.

Обращаясь къ Соловараки 1), мы видимъ слѣдующее. Этотъ холмъ имѣетъ высоту въ 81 метръ. Склоны его настолько круты, что съ трудомъ можно спускаться по косвенно, зигзагомъ проложеннымъ тропинкамъ. Издали, напр. со стороны Колы, ясно видны двѣ террасы на сѣверной сторонѣ Соловараки. Первая, — сверху, находится на высотѣ 47 слишкомъ метровъ, вторая— 33 метровъ. Онѣ тянутся, на всемъ протяженіи Соловараки, совершенно горизонтально и параллельно между собою. Ясно, что онѣ также образовались во время остановокъ поднятія, когда вода находилась на этомъ уровнѣ и береговая волна смывала и намывала песчаные валы.

Эти двъ террасы на Соловаракъ, прежде всего, указываютъ на высшій, когда то, уровень воды до 47 м. и служатъ намъ

<sup>1)</sup> Лежащей у самаго города Колы.

доказательствомъ того, что были значительныя остановки во время ея медленнаго поднятія. Верхняя гряда, можетъ быть, соотвътствуетъ даже первоначальному уровню моря, то есть тому, который держался въ теченіи долгаго періода лътъ. Во всякомъ случаъ, Соловарака, вся, никогда не была подъ уровнемъ океана. Доказательство этого мы видимъ въ томъ, что поверхность ея представляетъ совершенно неправильную смъсь валуновъ, щебня, песку, гравія и ила. Какъ ни плохо сортируетъ море, но мы, все таки, вправъ были бы надъяться, найти—гряды валуновъ, валы изъ гравія, различной величины, съ ракушками, чисто-песчаные наносы, съ сохранившимися раковинами современныхъ моллюсокъ. Наконецъ, главное, мы должны бы были найти большую степень размыванія Соловараки около вершины ея.

За первой остановкой следовало опять равномерное поднятие до второй остановки, когда образовалась новая террасанижняя. Но и это еще не все; мы находимъ еще внизу, подъ Соловаракой, третью небольшую террасу, очевидно недавнюю, которая составляетъ третій періодъ остановки.

Въ то время, когда уровень моря стоялъ на высшемъ уровнѣ, 47 метровъ, дно моря было, въ сущности, ниже. Поэтому, то пространство, гдв лежитъ городъ Кола, также находилось подъ водой. Это имветъ большое значение для сужденія объ образованіи всей площади того полуострова, на которомъ находится Кола. Тутъ есть еще нъсколько предварительныхъ, косвенныхъ, побочныхъ соображеній. Существовалили, при такомъ уровнъ моря, ръки Кола и Тулома? Существовали, конечно. Это мы видимъ изъ образованія тъхъ слоистыхъ наносовъ, на которые я укажу на ближайшихъ страницахъ. Слъдовательно, ръки Кола и Тулома сливались здъсь вмъсть и, встръчаясь съ приливной волной, осаждали всю массу взвъшеннаго матерьяла. Самый крупный - опускался близь Соловараки, мелкій — относился дальше въ море. Мы, действительно, находимъ такое строеніе полуострова подъ Соловаракой. Въ самомъ низу, въ глубинъ, видны крупные валуны. Это остатки размытой части Соловараки. Выше - налегаютъ слои очень крупнаго гравія, перем'тшаннаго съ мелкой галькой. Все это пространство очень долго было подъ водой и вышло только тогда, когда, послъ послъдней остановки, дно поднялось метровъ на 35—36. Это было, именно, временемъ третьей остановки. Тогда эта намывная терраса составила берега ръки Колы. Всъ эти поднятія совершались, конечно, медленно и постепенно.

Поднявшись на Соловараку, можно совершенно ясно разобрать, съ высоты семидесяти метровъ 1), - старое русло и берега Колы 2). Если повернуться лицомъ прямо на съверъ, то вы видите сверху, какъ-справа, изъ за угла, вырывалась Кола и, образовавъ крутую излучину влѣво, текла на западъ; но, встрътивъ сильное сопротивление въ грядъ валуновъ, вымытыхъ изъ Соловараки, она образуетъ новую крутую излучину на стверъ и, затъмъ, на востокъ, гдъ русло ея теряется въ равнинъ. Русло возвышается на высоту около 12 метровъ надъ уровнемъ моря; форма его напоминаетъ букву S, повернутую такъ, что верхняя вътвь ея, начинаясь съ юга, идеть на съверъ и затъмъ заворачиваетъ на западъ. Самое высокое мъсто террасы находится около крутой излучины отъ запада на свверъ и затемъ на востовъ, гдв, именно, терраса быстро спадаетъ и сводится на нътъ. Русло имъетъ ширину около 30-35 метровъ; оно глубово вырыто въ наносъ. Валуны, внизу, совершенно замыты пескомъ, такъ что только верхушки торчатъ изъ наноса; выше, по склонамъ, они почти совершенно обнажены, благодаря сильному размыванію береговой волной и особенно-сильному боковому напору воды на излучинъ, Надо полагать, что, при усилившемся теченіи, быстро углублялась первая излучина, подмывавшая, вфроятно, вфтвь Соловараки, судя по громаднымъ валуннымъ глыбамъ, запружающимъ здёсь Колу. Здёсь особенно сильно происходило размываніе, и, вёроятно, вода, наконецъ, прорвала валунную плотину, добравшись до последней излучины, идущей на востокъ. Тогда воды схлынули сразу съ боковаго русла, найдя себъ прямой, болье легкій исходъ, а излучина праваго берега быстро сгладилась, вследствіе особенно сильнаго подмыванія праваго берега, по

мы не могии бы видбры того факта, котор<del>ий у пасч</del>

<sup>1)</sup> Считая не отъ уровня океана, а отъ подножія горы.

<sup>2)</sup> См. рисуновъ при таблицъ, въ концъ книги.

закону Бэра, въ такихъ бъщеныхъ потокахъ, какъ низовье ръки Колы.

И такъ, въ Соловаракъ все убъждаетъ насъ въ томъ, что и здъсь, на съверъ, происходило поднятіе, постепенное, медленное. Но гдъ было относительное поднятіе? Что поднималось скоръе,—верховья Колы и Туломы, или Кольская губа, а слъдовательно и Ледовитое море.

Мы знаемъ уже, что около Гаммерфеста поднятіе равняется 6000 ф., что на Шпицбергенъ найдены китовыя кости, цълыми грудами, на высотъ 180'; слъдовательно,—что это поднятіе простирается далеко на съверъ и съверозападъ.

Изъ моихъ изслѣдованій оказывается, что и здѣсь, какъ и въ Кандалакшѣ, дно морское и береговыя полосы отстаютъ въ своемъ вертикальномъ движеніи отъ центральной полосы Кольскаго полуострова. А слѣдовательно, здѣсь законъ Бравэ подтверждается, и относительное поднятіе находится на сторонѣ средней полосы Кольскаго полуострова. Это ясно будетъ видно изъ слѣдующаго.

Еще по самой рѣкѣ Колѣ, верстахъ въ 7 отъ конечной станціи, недалеко отъ колониста Матвѣя, находятся высокіе песчаные берега, поднимающіеся на значительную высоту, отъ шести до восьми саженъ.

Берега мѣстами совершенно отвѣсны и, въ такомъ случаѣ, представляютъ прекрасные разрѣзы наслоеній, въ которыхъ ясно видно, что всѣ слои горизонтальны; между собой чередуются крупновернистые и мелковернистые пески; мѣстами, каскадами стекающій песокъ заволакиваетъ разрѣзы. Верхній уровень этой площади также горизонталенъ. Такъ какъ такіе берега тянутся на значительномъ протяженіи, то мы должны ихъ принять за отложеніе наносныхъ массъ рѣки, въ то время, когда дно рѣки было ниже, а теченіе медленнѣе, вслѣдствіе двухъ причинъ: во 1) море несомнѣнно доходило до сихъ поръ и проникало даже до Шонга-вараки, во 2) верховья рѣки были еще значительно ниже ¹). Въ противномъ случаѣ, мы не могли бы видѣть того факта, который у насъ на лицо,—

вырываніе Колою-рікой глубокаго русла въ преждеотложенныхъ наносахъ. Слідовательно, теченіе ускорилось; а это произошло вслідствіе относительнаго поднятія верховьевъ.

Кромѣ этихъ песчаныхъ террасъ по рѣкѣ Колѣ, мы находимъ совершенно-подобныя въ Кольской губѣ, по правому
восточному берегу. Здѣсь берега поднимаются на высоту до
15 саженъ, на глазъ. Террасы развиты совершенно явственно,
такъ что мы видимъ почти отвѣсные песчаные берега, которые затѣмъ, наверху, образуютъ совершенно плоскую луговую
равнину, которая широко раскинулась на востокъ, и вдали
видны вторые—ея прежніе берега, вторичныя террасы. Толща
этихъ песковъ такъ значительна, что потребовалось, вѣроятно,
не смотря на скорость отложенія Колой осадковъ, громадное
количество лѣтъ для ихъ образованія.

Террасы развиты не только по правому берегу Колы, но и по левому, въ губе и въ самой реке, точно также, какъ и въ сосъдней ръкъ Туломъ. Въ Кольской губъ уже Бетлинкъ указывалъ на «многіе знаки, бывшаго когда-то, высшаго уровня воды», не обозначая точнье. Мы находимъ такіе признаки: 1) во многихъ озеркахъ, сохранившихся по правому и лѣвому берегу Кольской губы; 2) во множествъ прибрежныхъ торфяныхъ болотъ, которые лежатъ теперь, мъстами, на довольно крутыхъ склонахъ; 3) въ пахтахъ, т. е. отвъсныхъ скалахъ, поднимающихся прямо изъ воды, съ ясными знаками дъйствія воды. Въ ръкъ Коль мы находимъ еще береговые торосы, по левому берегу реки. Они поднимаются по высокимъ берегамъ, въ видъ крутыхъ валовъ, теперь обросшихъ травой; направленіе ихъ обыкновенно параллельно ръкъ, такъ что они объясняются задержкою на берегу, при разливахъ, плавучаго матеріала, вследствіе котораго высота валовъ все возрастала болфе и болфе. Мфстами они поднимаются на полторы сажени. по унапин св с - 2 и униво за страва ступп

Интересно сравнить рѣку Колу съ Туломой. Первая—течеть, въ общемъ направленіи, съ юга на сѣверъ. Вторая—съ западо-юго-запада на ВСВ. Если мы примемъ за доказанное, что средняя горная полоса Кольскаго полуострова, идущая съ

ENCORPORAR CHOCOCHER : DEBOTE IF CHOCKETERRIBION PROPERTY OF THE CHOCKET

<sup>1)</sup> А слъдов. теченіе медленнъе.

запада на востокъ, поднималась быстръе всего, то мы вправъ ожидать большой разницы въ «относительности» поднятій верховьевъ Колы и Туломы.

Тулома на протяжени пятидесяти версть, считая отъ города Колы, до крутаго поворота рѣки на югъ, къ Нотозеру, противъ теченія, удаляется на югъ только на шестнадцать съ небольшимъ верстъ. Поэтому мы вправѣ ожидать, что рѣка Тулома вовсе не измѣнила скорости своего теченія, что поэтому мы найдемъ выполненіе нижней части ея русла песками и не встрѣтимъ песчаныхъ террасъ по ея берегамъ.

Обратимся къ фактамъ. Мнѣ удалось проникнуть, въ теченій друхдневной экскурсій, по рікі Туломі, на 30 версть отъ города Колы, вглубь страны, противъ теченія. Это составляетъ почти половину длины ръки. (Все протяжение Туломы. отъ Нотозера до Колы, -65 верстъ). По всему среднему теченію р'яки мы находимъ наносные высокіе острова и широкую аллювіальную долину съ нѣсколькими террасами, изъ которыхъ последняя, береговая, поднимается на 3 — 5 саж. Местами, какъ напримъръ, около Харитонова острова, нъсколько ниже его, мы находимъ обрывистые песчаные берега такой же значительной высоты, которые и теперь сильно подмываются водой, такъ что по временамъ целыя стены песку, высотой въ 4 — 5 саженъ и на толщину полуаршина, отдъляются отъ нависшаго и подмытаго берега и падаютъ въ ръку. Подобное же совершенно явление наблюдается и по Съверной Двинъ, Дивпру и Дону. Но еще характериве то обстоятельство, что мъстами мы находимъ такіе нависшіе песчаные берега отдъленными отъ рѣки уже значительными песчаными пространствами, которые при наивысшемъ приливѣ не «понимаются» BOJON ROLLER REPORTED LECTED TO THE OTHER STREET SERVICES BELLEVILLE OF THE CORE TO THE CORE OF THE CO

Луговыя пространства, танущіяся на протяженіи нѣсколькихъ верстъ въ длину и 2 — 3 въ ширину, совершенно ровныя, плоскія, поросшія травой и представляющія слоистые наносы различнаго матеріала отъ разрушившихся сланцеватыхъ породъ, представляютъ самое типичное доказательство способа своего собственнаго образованія и послѣдующаго углубленія русла рѣки. Высокія террасы, бывшія прежде главными бе-

регами широкаго потока Туломы, теперь далеко отступили высторону, и прежнее русло, выполненное пескомъ, служитъ теперь ближайшими берегами, въ которыхъ, собственной силой, прорыла себъ глубокое, но узкое, ложе ръка Тулома.

Продукть этого размыванія мѣстами отлагается въ видъ переносныхъ песковъ, перемётовъ, случайныхъ низменныхъ острововъ; къ таковымъ надо отнести Матрешкинъ островъ, низменный, чисто песчаный, но покрытый очень густой растительностью.

Судя по деревьямъ, на немъ растущимъ, ему должно быть около тридцати или сорока лѣтъ. Теперь онъ сильно размывается. Не надо забывать, что здѣсь морской приливъ дѣйствуетъ чрезвычайно сильно и проникаетъ верстъ на 25 — 30 отъ города Колы, противъ теченія. Поэтому теченіе и теперь задерживается значительно выше устья и вслѣдствіе этого остается громадное количество песчанаго матеріала. Но за то потомъ, когда совмѣстно начинаетъ дѣйствовать отливная волна и теченіе, образуется такой потокъ, что весь излишекъ песку сносится далеко внизъ, и если не доходитъ до самыхъ устьевъ, то потому, что по Туломѣ много пороговъ.

Ниже по теченію, мы находимъ на лѣвомъ берегу, около крутой излучины, гдѣ лежитъ первый порогъ рѣки Туломы, въ 7 верстахъ отъ Колы, глинисто-известковые слои сѣраго или голубовато-сѣраго цвѣта. Толща этихъ намывныхъ образованій лежитъ на самомъ берегу и поднимается на высоту около 3 саженъ. Мѣстами, замѣчаются внутри сохранившіеся остатки древесныхъ обломковъ, которые включены въ эту глину. Остатковъ раковинъ здѣсь, противъ ожиданія, не найдено, хотя я убѣжденъ, что эти пласты отлагались въ такихъ же солоноватыхъ водахъ, какія теперь находимъ въ Кольской губѣ.

Наконецъ, въ самомъ устьъ ръки Туломы, около города Колы, по правому берегу, мы находимъ надъ самой поверхностью воды, на крутомъ заворотъ, интересный разръзъ. Вся высота его не болье двухъ аршинъ. Въ самомъ низу мы видимъ синеватую глину, налегающую на какіе то ржавые слои гравія. На глину налегаютъ, постепенно увеличивающіеся въ

зернъ, слои песку, который постепенно переходить въ гравій, въ свою очередь опять постепенно переходящій въ самый тонкій песокъ, и затъмъ, опять послъдній переходъ къ крупному гравію и галькамъ, къ которымъ примъшаны и лъсные остатки. Эта перемежаемость слоевъ ясно указываетъ на колебанія дна Кольской губы. Первая, нижняя глина отлагалась, конечно, въ отдаленныхъ отъ устья мъстахъ губы, т. е. въ то время, когда морской уровень былъ выше современнаго, въроятно на 47 метровъ (см. выше — Соловараку). Затъмъ, при постепенномъ поднятіи дна, теченіе усилилось, потому что во 1) море отступило дальше, во 2) потому что верховья поднялись выше; поэтому тамъ, гдъ отлагалась глина, сталъ отлагаться песокъ, затъмъ гравій; потомъ послъдовало обратное колебаніе почвы, море опять надвинулось въ ръку Тулому, и опять только одна глина доносилась до Колы; наконецъ, при новомъ поднятіи, постепенно отложились крупные слои песку и гравія, которые теперь поднимаются надъ водой. Всюду мы видимъ здёсь отложение массы песку въ губъ и особенно сильное размывание острововъ по реке Туломе. Такъ Немецкій островъ, Татарскій островъ, а выше, Матрешкинъ и Харитоновъ-сильно размываются и уничтожаются. Такъ какъ я про нихъ говорилъ въ предварительномъ отчетъ, читанномъ въ общемъ собраніи, то я не буду повторять доказательствъ. А сто и дверен Т две

Теперь сведемъ къ общему результату всъ отдъльные выводы, полученные нами изъ наблюденій по ръкъ Туломъ.

Рѣка эта прежде представляла очень широкій потокъ, который вливался въ далеко-проникавшій на ЮЗ. рукавъ Ледовитаго океана. Паденіе прежней Туломы было весьма незначительно. Если теперь приливъ, при высотъ отъ 8'—9'—10' 1), проникаетъ на пространство 25 верстъ, то при прежнемъ уровнъ моря, который стоялъ выше современнаго на 47 метровъ (почти 22 саж.), приливная волна (если только не обыкновенный уровень морской губы) достигала самаго Нотозера.

Поэтому надо полагать, что при такомъ незначительномъ паденіи, а сл'ядовательно и малой скорости теченія, р'яка не-

1) По моему мизнію до 12'.

сла мало матеріала, и посл'єдовательно отлагала его, по м'єр'є поднятія, сперва — ближе къ верховьямъ, потомъ— все дальше и дальше къ устью, получая ускореніе теченія на верху и постепенно размывая осадки, прежде отложенные:

- Тулома постепенно углубляла свое русло, какъ мы видимъ по высокимъ, обрывистымъ, слоисто-песчанымъ берегамъ; это происходило: 1) вследствіе поднятія верховьевъ и 2) вследствіе (меньшаго) поднятія устьевъ, которое обусловило отступаніе моря, а потому ослабило задерживающую приливную волну. Размываніе острововъ и береговъ происходить особенно быстро потому, что теченію помогаеть приливная и отливная волна; соединение отливной волны съ силой течения обусловливаеть быстрый перенось взвъшеннаго матеріала. Кромъ общаго поднятія верховьевъ Туломы относительно ея устьевъ, мы замвчаемъ колебанія, которыя доказываются-первоначальнымъ размываніемъ русла, зат'ямъ выполненіемъ его, которое шло неравном врно (наслоеніе глины, песковъ и гравія около Колы), и изъ последующаго постепеннаго поднятія, которое перешло, наконецъ, въ быстрое, выдвинувшее окончательно всю Кольскую косу. Всв эти колебанія совершались въ последнее время. такъ какъ, при уровнъ моря выше современнаго на 47 метровъ, тутъ не могли отлагаться ясно - слоистые осадки; они отложились тогда, когда Кола-ръка текла по старому руслу.

Следовательно, первоначально верховья поднимались гораздо быстре устьевь; затёмъ полоса поднятія передвинулась въ устью и Тулома выполняла свое русло слоистыми осадвами; затёмъ опять верховья поднялись значительно относительно устья и это поднятіе продолжается до сихъ поръ.

Изо всего, что мы нашли относительно поднятія Кольскаго полуострова, можно сдёлать слёдующій выводъ. Средняя часть, горная полоса полуострова, тянущаяся съ запада на востовъ, поднимается; это обусловливаетъ также и поднятіе севернаго и южнаго береговъ полуострова, но склоны въ Ледовитому океану и Белому морю, вследствіе неравномерности поднятія, дёлаются все круче и круче.

Кром'в того поднятіе средней полосы полуострова совер-

шается неравномфрно; западный конецъ поднимается быстръе восточнаго, поэтому мы не находимъ ни одной значительной ръки, текущей съ востока на западъ. Всъ ръки текутъ или прямо съ запада на востокъ (Суоми-іокки въ Нотозеро) или съ юго-запада на СВ. (Печа) (Тулома). Следовательно, главный центръ поднятія лежить гдь нибудь на Западь, по линіи, которую можно провести приблизительно такъ: отъ Лопарскаго становища на Терскомъ берегу, между Поноемъ и Бабьей ръкой, черезъ Пелмесъ-озеро, - около Имандры, и дальше на западъ - по южному берегу озера Энаре. (Можно изобразить поднятіе Кольскаго полуострова, такъ-какъ я его себъ представляю, на основани всъхъ вышеприведенныхъ данныхъ, слъдующей моделью. Представимъ себъ карту Кольскаго полуострова наклеенной на мало-гибкій картонъ, который прикрупленъ къ горизонтальной палку такъ, что она проходить подъ только что намъченной линіей (Энаре, - Пелесмо-Поной-Баб.). Палка укрѣплена шарниромъ около восточнаго конца такъ, что можетъ свободно вращаться въ вертикальной плоскости. Положимъ горизонтально карту; возьмемъ за свободный конецъ палки, около озера Энарэ и поднимемъ его немного. Произошло поднятіе только на запад'в, но всл'єдствіе его вся средняя линія полуострова поднялась, а Мурманскій, Терскій и Кандалакскій берега хотя тоже поднимутся, но нізсколько отстанутъ, вслъдствіе гибкости картона. При этомъ, хотя грубо, но, все-таки, относительность движеній везд'в сохранится и объяснится прямизна Туломы и сбиваніе съ двухъ направленій, поочередно, рфки Колы).

Разсмотримъ теперь другіе факты, которые касаются также поднятія Кольскаго полуострова или объясняются имъ. Обратимъ, прежде всего, внимание на то, какъ далеко проникало море при своемъ прежнемъ высшемъ уровнъ?

yersa n syo noguatic aposonancered to curs uops. . .

Относительно рпки Колы мы имбемъ следующія данныя. Вследствіе крутизны паденія въ нижнемъ ся теченіи, мы видимъ, что приливъ здъсь далеко не дъйствуетъ на такое значтельное разстояніе, какъ въ Тулом'є; вся приливная волна адерживается первымъ порогомъ. Затъмъ мы знаемъ, что

уровень ръки Колы у Шонга вараки поднимается надъ уровнемъ Кольской губы на 11 метрова. Поэтому, если (какъ доказано на основани террасъ Соловараки) поднять уровень моря на 47 метровъ, то морская вода проникнетъ гораздо дальше Шонги вараки. Но этого мало; допуская выраженіе \*поднять уровень моря\*, мы собственно перифравируемъ его точный смысль. Дно прежде было ниже на 47 метровъ. И если мы равном врно опустим в дно русла ржки Колы у самаго ея устья и около Шонга вараки, то это будеть не върно. Мы видимъ теперь ускореніе теченія, а, следовательно, прежде дно у верховьевъ было относительно еще ниже. Поэтому, если мы понижаемъ городъ Колу на 47 метровъ, то станцію Кицы необходимо понизить по крайней мъръ на 50 метр. (Ст. Кицы лежить на 40 версть по ръкъ Колъ выше города т. же и. по теченію). Станція Кицы поднимается надъ уровнемъ моря на 55-60 метровъ. (Несоотвътственность разностей наклоновъ для первыхъ 22 верстъ, отъ моря до Шонги-въ 11 метр. и отъ Шонги до Кицъ, для последнихъ 18 верстъ, въ 44 метра,была объяснена раньше; отъ перваго порога до Шонги - 18 версть -- можно фхать на лодкъ; слъдующія 18 отъ Шонги до Кицъ — невозможно; это сплошные пороги). И такъ, если мы опустимъ Кицы на 50 метровъ, то можемъ ожидать, что море проникло бы до этого предела, приблизительно.

Обращаемся теперы къ озеру Имандръ. Относительное поднятіе не обусловливаеть поднятія уровня озера; точно также, какъ поднятіе этого последняго не доказывало бы поднятія надъ уровнемъ моря. Для такихъ горныхъ озеръ нужно принять во вниманіе характеры котловины и ся береговь. Уровень Имандры могъ быть выше послъ стаиванія ледниковъ. Затъмъ вода промыла себъ русло около Зашейка. Но мы имъемъ доказательство того, что озеро поднялось относительно Кандалакши, а Кандалакша сама поднялась на 80 метровъ. Отсюда мы выводимъ абсолютное поднятіе около 100 метровъ, доказательство котораго и находимъ на берегахъ Хибиныхъ горъ.

Мы находимъ по берегамъ озера Имандры, особенно по вападнымъ, следы такого - высшаго уровня воды, от дуждая

Такъ, около Іокострова, общирное болотистое пространство

71

тянется на западъ; около Утичьяго наволока, по Западному берегу, такое же низменное, ровное пространство тянется далеко вглубь отъ берега и окаймлено кругомъ отвъсными скалами (вторичныя террасы). Противъ Хибиныхъ тундръ, по Западному берегу, у подножія громадныхъ Чауно-тундръ, громалное торфяное болото тянется на 8 верстъ ширины (между Чаунами и Имандрой) и на нъсколько версть длины вдоль берега. Зная, что поднятіе на Запад'в совершается быстр'ве, мы можемъ прямо заключить, что это - дно озера выступило на поверхность, а воды сдвинулись къ крутымъ Хибинымъ горамъ. Поэтому, если мы возьмемъ даже одинъ изъ незначительныхъ признаковъ поднятія, напр. слоистые пески у Разноволока, поднимающиеся на 10 саженъ, то и тогда уже, поднявъ уровень воды нъсколько выше ихъ, мы затопимъ все пространство между Хибиными-и Чауно-тундрами, все пространство между Имандрой и отрогами Чауно-тундръ по берегу Іокостровской Имандры (между Зашейкомъ и Іокостровомъ). Тогда все озеро займетъ громадное пространство въ 30 верстъ ширины и 90 длины, или 2700 кв. верстъ. Окаймленное со всъхъ сторонъ громадными берегами, поднимающимися надъ поверхностью воды на 800 метровъ съ востока и отъ 400 до 600 съ запада, оно будетъ тянуться длинной полосой, какъ бы замкнутое въ корридоръ, продолжение котораго мы находимъ въ Пелесмозеръ и Колозеръ, отдъленныхъ другъ отъ друга ничтожной полосой земли въ одну версту ширины; низменная, болотистая, она очевидно недавно выступила изъ надъ уровнемв моря. Для такихъ горвыхъ озеръ нужно идов

Примъните сюда еще поднятіе всего озера надъ моремъ на 100 метровъ, (какъ оно выведено на основаніи данныхъ, добытыхъ въ Кандалакшъ), т. е. допустите, что оно опустилось на эту величину и вы невольно представите себъ сліяніе озера Имандры съ Кандалашскимъ заливомъ, бушующимъ здъсь среди этихъ гигантскихъ скалъ Хибинскихъ и Чаунскихъ горъ.

Конечно, нельзя окончательно утверждать о бывшемъ когда либо соединении Кандалашской губы съ Кольской, хотя водораздѣлъ поднимается только на 135 метровъ абсол. в., до тѣхъ поръ, пока не скажутъ свое слово зоологи. Нерѣдко высказывались предположенія о соединеніи различных бассейновь, а затім изслідованіе фауны низшихь животных доказывало противное (такъ напр. Вл. Чернявскій доказаль свочими изслідованіями распространенія мизидь, что никогда не было соединенія Балтійск, моря съ Білымь чрезъ Ладогу и Онежское озеро).

Что касается зоологическихъ данныхъ, касающихся собственно Имандры, то мы знаемъ слѣдующее. Г. Плеске сообщилъ мнѣ, что та фауна озера, которую онъ изслѣдовалъ, — рыбы по преимуществу, принадлежатъ къ чисто-прѣсноводнымъ формамъ. Тѣ немногіе виды изъ морскихъ, которые тамъ попадаются, принадлежатъ къ числу тѣхъ, которые всегда подницаются въ прѣсноводныя рѣки и озера для метанія икры. Нѣкоторые виды, какъ, напримѣръ, кумжа, форма — родственная форелямъ, заходитъ въ озера изъ пороговъ, въ которыхъ обыкновенно держится.

Такимъ образомъ, пока, мы не имѣемъ подтвержденія соединенія Имандры съ Кандалашской губой. Но окончательное слово должно быть сказано только тогда, когда будутъ основательно изслѣдованы всѣ члены озерной фауны сравнительно съ Бѣломорской и преимущественно—моллюски, ракообразныя (амфиноды) и низшія. Тогда, имѣя обстоятельное описаніе зоогеографическихъ разностей, подобное данному для мизидъ г. Чернявскимъ, мы будемъ въ состояніи судить, откуда-куда разселились виды.

сился въ низины оставши. Ук. АВАКТыми лединками, во 2) на

## жения жения какие и теперь часто тамъ бы-

бенно сильная сортировка этого матеріала. Во 1) онь сно-

Вывались главнымъ образомъ, на двухъ родахъ доказательствъ: прямомъ, нахождения на извъстной высотъ моллюсокъ, береговыхъ валовъ, отпечатковъ высшаго уровня на скалахъ, террасахъ и пр., или же нахождени наслоенныхъ песковъ тамъ, гдъ оничтеперь не могутъ отложиться.

по Поэтому, собственно вопросъ о размывании тъсно связанъ съ доказательствами поднятия и потому и уже въсколько разъ касался его. Пироване В. Д. диви вику эонантори одванави

Но теперь, принявъ уже за несомнънный фактъ, общее поднятие Кольскаго полуострова, причемъ центръ поднятия лежитъ на западъ, я постараюсь свести въ общее цълое, представить общую картину той геологической дъятельности атмосферной и ръчной воды, какъ она проявилась на полуостровъ въ явленіяхъ размыванія и намыванія.

Въ ту эпоху, когда весь полуостровъ, вмѣстѣ съ Финляндіей и Скандинавіей, представляль сплошное ледниковое движущееся поле, тогда особенно много заготовлено было валуновъ и рыхлаго матеріала, получавшагося при усиленномъ перетираніи коренной горной породы. Несомнічно, что громадное количество ледниковаго щебня и прочаго было снесено въ Ледовитый океанъ, какъ это и доказываютъ описанія сфвера Скандинавіи и Лапландіи Карла Фохта и Бётлинка, но гораздо большая часть сохранилась на мъстъ, въ видъ мощной толщи ледниковаго наноса, сплошной пеленой застилающаго всь матерыя горныя породы полуострова. Чтобы имъть понятіе объ этой толщі, приведу въ примітрь разрівь тилля, находящійся между Койкиничами и Сумскимъ посадомъ, по дорогъ изъ Повънда къ Бълому морю. Толща достигаетъ до 15 саженъ; громадные саженные валуны, съ острыми углами и ребрами, включены мъстами въ преобладающую смъсь песчаочеть недатого выпушни изг. нистой глины со щебнемъ.

Послѣ стаянія общаго ледниковаго покрова началась особенно сильная сортировка этого матеріала. Во 1) онъ сносился въ низины оставшимися мѣстными ледниками, во 2) на обнаженныхъ частяхъ онъ особенно быстро смывался такими почти тропическими ливнями, какіе и теперь часто тамъ бываютъ, и какихъ мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ. (Въ Ильинъ день—20 іюля 1880 года на Имандрѣ).

Конечно, тъ громадныя толщи (въ десятки саженъ) ледниковаго наноса, которыя покрывали всю страну, долго предохраняли ея поверхность отъ размыванія и только сами подвергались бурной дъятельности стремительныхъ потоковъ. При

этомъ выполнялись осадками глубокія котловины, и сортировался матеріалъ. Стекающая вода выполняла всь долины и углубленія, образуя озера, переръзанныя поперекъ и раздъленныя между собой моренами и каменными болванками сельгъ, которыя перекрещивали всю страну. Въм этихъ поледниковыхъ озерахъ уровень воды стоялъ значительно выше теперешняго, потому что только впоследствии образовались промывы въ естественныхъ валунныхъ плотинахъ прорвавшимися потоками, и, лежащія на различныхъ уровняхъ, озера соединились живыми струями воды. Прорывъ одного озера обусловливалъ переполнение и прорывъ другаго, нижележащаго, и т. д. Такъ произошли первыя ръки Кольскаго полуострова. Громадная толща ледниковаго наноса продолжала смываться. Горные потоки несли валуны и щебень, которые скатывались далеко вглубь озера. Потомъ они заносились пескомъ и иломъ, образовывавшими въ верховьи озера наносные берега; среди нихъ пробивался дальше потокъ. Такого пименно образованія тъ песчаные, полосатые слои наноса, которые мы находимъ на северномъ конце Иманары, около Разнаволока. Очевидно это-наносы горнаго, чрезвычайно круго падающаго, ручья -Куреньги, берущаго начало въ Пелесмоверъ; стремительныя воды его, задержанныя спокойными водами озера Имандры. уровень котораго долженъ быль быть выше современнаго, по крайней мірь, на 20 — 25 сажень, осаждали свой тяжелый матеріаль на протяженіи нъскольких версть и уходили чрезь р. Ниву въ Бълое море, ноказ динокой ко йник динтунгов

Толщи ледниковаго наноса дали матеріаль для образованія новыхъ намывныхъ, слоистыхъ наносовъ и они, въ свою очередь уже, послужили матеріаломъ для новаго размыванія и образованія новыхъ наслоеній, происходящихъ теперь.

ному количеству крупных обкатанных валуновь по берегамъ Имандры, Колозера, Пелесмозера и др. 2 Гдф рыхлый матеріалъ, соотвътствующій остаткамъ моренъ възвидъ грядъ валуновь на сушъ, въ озерахъ и ръкахъ?

весь песонъ, щебень, гальки, гравій и илъ спесены водой, потоками, ручьями, ръками въ озера и, настью, уже совер-

шенно выполнили ихъ, вытъснивъ воду, и, теперь, обсохли Такова напр. долина около Шонги-вараки. Мы находимъ здёсь ясно разсортированный матеріальний посравуя озера, посравний матеріальной посравуя озера, посравний посрав

Во время истекшихъ тысячельтій возрасло количество мелкаго обкатаннаго матеріала (ила, песку, гравія и галекъ) и убыло - крупнаго; валуны и щебень перетерлись, обкатались, поломались и, вообще, размельчились. Поэтому, то количество валуновъ и щебня, которое мы теперь находимъ, еще относительно мало; потому-то мы и не можемъ себъ составить даже приблизительнаго понятія о количествъ, унесеннаго водой, мелваго матеріала, продукта д'ятельности ледниковъ и текучей Такъ произошли первыя ръки Кольскаго полусстрова. Грацов

Обратимся къ фактамъ. Соловарака представляетъ намъ одну изъ наилучше сохранившихся моренъ. Я уже описывалъ ее и приводилъ ея размъры. Мы находимъ въ ней неотсортированный ледниковый матеріаль; она тянется съ юга на съверъ почти на протяжении 3-хъ верстъ длины и 300 саженъ песчаные, полосатые слои наноса, которые ын наничиш

Мы имбемъ доказательства чрезвычайно сильнаго ея размыванія. А именно: уровень моря поднимался на 47 метровъ выше современнаго и достигалъ до <sup>3</sup>/<sub>4</sub> ея высоты; сохранились следы этого уровня на ея северномъ склоне. Мы находимъ следы разрушительнаго действія волнь, во-первыхь, на самой Соловаракъ, а во-вторыхъ, въ продуктахъ, отложившихся около ея подножія. Следы размыванія выказались на горё въ виде вогнутыхъ линій ея боковыхъ склоновъ, въ видъ вымытыхъ изъ нея валуновъ, нагроможденныхъ при основании, и массы сортированнаго матеріала, взятаго отсюда же и отложившагося у подножія кан новито для новито разменя прижумня у тося у т

Весь, взвъшенный въ ръкахъ-Колъ и Туломъ, матеріалъ относился дальше въ губу; но во время приливовъ возможно было, что онъ отлагался около Соловараки; размываемые пески Соловараки отчасти относились также въ губу, но главнымъ образомъ осаждались на мъсть, потому что разъ, при приливъ, осъвшіе на дно пески, не могли быть подняты съ большой глубины ослабъвщимъ теченіемъ. Затъмъ, далье, въ эту же Соловараку връзалась Кола ръка, которой старое русло я описалъ; она сильно подмывала основание горы и обусловливала последующее смываніе, прежде отложенныхъ моравном Бри с ть величины верень песку-говораном брина

- Далве, отъ Соловараки на свверъ, тянется длинная гряда валуновъ, которые, то скрываясь подъ водой, то обнажаясь, образують корги, на которыхъ сотнями сидять былыя чайкимойвы и клуши. Гряды эти тянутся по срединъ губы и дълять ее, на протяжени нъсколькихъ верстъ, на два русла,правое — Колы, лѣвое — Туломы. Это остатки такой же или той же самой морены; несомненно, что море размыло до основанія значительную часть Соловараки, и если мы не въ правъ признать всей гряды, то значительная часть ея составляеть сохранившееся основание этой морены. На восточной сторонъ особенно хорошо видны продукты размыванія горы.

Здесь Кола представляеть стремнины, катящія крупные валуны; понятно, что при такой значительной скорости ръка несетъ массу песку и гравія и при помощи ихъ, какъ мы и видимъ въ дъйствительности, сильно подмываетъ берега. Вслъдствіе закона Бэра, особенно примѣнимаго въ данномъ случаѣ, Кола быстро отступаетъ на право, т. е. на востокъ, и съ лъваго берега мы находимъ груды валуновъ, засыпавшихъ ея прежнее русло; съ праваго берега скалистые утесы ясно подпотому, тамъ, тдъ были первопачально всь усл. диат чукотоп

ите Следы двухъ уровней воды, находимые нами на Соловаракъ, указываютъ на то, что и уровни Колы и Туломы были значительно выше. И зная, какъ это доказалъ пр. Головкинскій, что, при поднятіи верховьевь, ріка вырываеть себі русло, а вижсти съ тимъ, что террасы одинаковой послидовательности отложенія одновременны, мы можемъ опредъленно сказать, что песчанымъ террасамъ Кольской губы соотвътствують такія же песчаныя террасы по рекамъ Коле и мы находимъ намываліс слосвъ различныхъ осалковъ-жимокуТ

Онъ поднимаются теперь отъ 5 до 10 саженъ надъ уров немъ ръки. Конечно наносы эти отложились при наивысшемъ уровнъ моря и при наибольшемъ передвижении осадковъ. Это должно было происходить въ эпоху, непосредственно последовавшую за ледниковымъ періодомъ. Широкая долина ръки Тутолщиной до 10 саж. Однообразіе слоевъ и приблизительная равномѣрность величины зеренъ песку—говорять въ пользу того, что громадная рѣка несла массу матеріала безъ усиленій теченія по временамъ.

Тотъ фактъ, что мы около устьевъ этой рѣки находимъ илисто-глинистые слои значительной толщины, говоритъ въ пользу того, что здѣсь въ рѣкѣ происходило естественное отмучиваніе, и что поэтому, еще выше, ближе къ Нотозеру, мы найдемъ крупный гравій и гальки.

Затъмъ, при послъдующихъ поднятіяхъ, эти песчаные наносы, въ свою очередь, послужили матеріаломъ для размыванія. Русло ръви постепенно углублялось въ нихъ и вымываемыя части сносились ниже, гдъ снова отлагались въ видъ мелей и острововъ. Весь этотъ песокъ, илъ и глина взяты прямо готовыми изъ громадныхъ толщъ ледниковаго наноса. Если долина, въ 65 верстъ длины, 3—4 ширины и на 10 саж. глубины, выполнена песками, то какое количество материка убыло для образованія этого переноснаго матеріала. Это составляетъ объемъ приблизительно въ 325.000.000 кубическихъ саженъ.

Такъ какъ повышеніе верховьевъ совершалось постепенно, то происходило послѣдовательное перемѣщеніе скоростей, а потому, тамъ, гдѣ были первоначально всѣ условія для отложенія осадковъ, потомъ, при увеличеніи скорости, осадки эти снова смывались. Такъ какъ наибольшія скорости оставались, все возрастая, послѣдовательно, во времени, у верховьевъ, а скорости опредѣленной величины также послѣдовательно передвигались къ устью, то однѣ и тѣ же отмели переходили постепенно отъ верховьевъ къ устьямъ. И если мы находимъ теперь сильное размываніе устьевъ, то конечно потому, что скорость въ нихъ продолжаетъ возрастать. Въ устьяхъ Туломы мы находимъ намываніе слоевъ различныхъ осадковъ-песчаныхъ и глинистыхъ, значеніе ихъ мной выяснено раньше.

одинъ примъръ мы видимъ явственно два нераздъльныхъ процесса — прежнее размываніе и намываніе и современное. Уконо на атпрохомоги отко онжественно

- Обратимъ теперь особенное внимание на размывание и об-

разованіе наносовъ аллювіальнаго періода, считая относящимися сюда всё таковые процессы после ледниковаго періода.

Я уже показаль на Туломъ, что мы имъемъ громадное количество перемытыхъ осадковъ; редко-где мы находимъ въ сохранности ледниковый наносъ въ такомъ видь, какъ онъ отлагается въ конечной и поддонной моренахъ. Если мы обратимся къ озеру Имандръ и ея береговымъ Хибинымъ тундрамъ, то мы поражаемся однимъ фактомъ; - гдъ тъ пески и илъ, которые должны были выноситься по долинамъ въ озеро и отлагаться тамъ въ видъ слоевъ мощной толщи? Принимая во вниманіе, что озеро сравнительно узкох при своей длинь, а береговая площадь, съ которой смываются въ него осадки, громадна, мы могли бы ожидать, что все оно выполнено песками и иломъ. Въ дъйствительности мы видимъ противное. Въ Имандръ мы почти вовсе не находимъ песчаныхъ наносовъ. Всюду берега состоятъ изъ валуновъ; дно, которое, при замвчательной прозрачности воды, видно на значительную глубину, до 5 саж., состоить также только изъ крупныхъ валуновъ.

Только на сѣверѣ, у Разнаволока, сохранились песчаные слои. Фактъ этотъ объясняется тосподствующимъ здѣсь сильнымъ сѣвернымъ вѣтромъ, поднимающимъ волненіе на большую глубину и потому переносящимъ весь песокъ, послѣдовательно, на югъ, къ рѣкѣ Нивѣ.

Надо полагать, что, по мъръ поднятія съверной части Имандры, послъдовательно возрастала возможность прорыва у Зашейка, а потому, послъ его образованія, всъ пески были смыты по тому же направленію. Только такимъ способомъ, по моему мнѣнію, можно объяснить отсутствіе песчаныхъ наносовъ на Имандръ.

Наобороть, на озерахъ Пуль и Мурдь мы видимъ чрезвычайное богатство песчаныхъ отложеній, а потому и верхнее теченіе рыки Колы изобилуєть песками. Это говорить выпользу того, что, до поднятія теперешней водораздыльной полосы, смываніе изъ Пелесмозера, Колозера, а можеть быть и и Имандры, совершалось въ этомъ съверномъ направленіи 1).

массу живыхь, текучихь, работающихь водь, кот<del>орыя уновила наз толис</del> вівтэтуэто атазиници одан мінавамкаявумональномиль онноми, онноми

- Помимов фактовъ, дающихъ намъ доказательство предшествующаго размыванія, мы находимъ еще много интереснаго въ дъятельно совершающемся теперь размываніи.

ное мы находимъ на ръкъ Нивъ на праводинции и колы, самое дъятельное мы находимъ на ръкъ Нивъ на праводинции и пронива по праводинции пронива праводинции праводин

Такъ какъ рѣка течетъ по направленію меридіана съ сѣвера на югъ, то правый берегъ ея обрывистье лѣваго; вообще же оба берега весьма круты. Доказательство приложимости здѣсь закона Бэра мы находимъ въ двухъ фактахъ—1) въ существованіи обваловъ на подмытомъ правомъ (западномъ) берегу, 2) въ песчаныхъ отмеляхъ тянущихся вдоль другаго берега.

Ранъе уже, въ первой главъ, я привелъ числа, опредълющія уклонъ ръки, а потому ея скорость. А именно, было мной вычислено, что уклонъ русла Нивы превосходитъ крутизной уклонъ р. Невы въ 20 разъ. Поэтому количество выносимаго матеріала и быстрота этого процесса должны происходить съ замѣчательной энергіей; дъйствительно, мы видимъ, мѣстами, совершенно ясно, какъ крупные валуны, болѣе человѣческой головы, катятся и скачутъ по дну; какъ мутна вода, не смотря на двукратную фильтрацію въ двухъ плесахъ. Разумѣется, при такой энергіи совершающихся здѣсь процессовъ, мы вправъ ожидать, что размываніе вообще совершается чрезвычайно быстро, и что поэтому возможно, что современное русло Нивы вовсе не такого древняго образованія, какъ это кажется при видѣ его громадныхъ обрывистыхъ береговъ.

относительно размыванія и намыванія на Кольскомъ полуостров'я прихожу

смыты по тому же направление: Только такима способомы, по

- -хq-1) Послъ станванія главной толщи ледниковаго покрова происходило особенно дъятельное смываніе наносовъ, покрывавшихъ всю странуменнеронет віткидон од отте очот узакон
- 2) Въ это время образовались озера. Масса горныхъ по-

токовъ смывала наносъ въ котловины или озера и образовала слоистые песчаные наносы.

- Вслѣдствіе послѣдовавшаго поднятія образовались новые водостоки и уровень многихъ озеръ сильно спалъ. Поэтому выступили наружу прежніе наносы, въ видѣ широкихъ и высокихъ слоистыхъ острововъ и полуострововъ. (У Разноволока на Имандрѣ).
- потому новое размывание прежних осадковъ; углубление руслъ ръкъ; перенесение наносовъ отъ центра материка къ окраинамъ материка къ окраина къ
- 6) Выполненіе многихъ озеръ и котловинъ вполнѣ этими новоотлагающимися осадками, датого васстоом от выполнения о
- онн 7) Окончательное уничтожение следовъ прежде-размытыхъ моренъ, главную массу матеріала которыхъ мы должны теперь искать въ глубине морей и океана.
- 8) Изобиліе песковъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ (Пулозеро, Мурдозеро, Тулома, среднее теченіе Колы) и полное отсутствіе въ другихъ (Колозеро, Пелесмо, Имандра, Кандалашская губа) указываютъ на различныя условія размыванія и намыванія, и главнымъ образомъ на направленіе, по которому совершалось послѣднее.
- 9) Теперь особенно сильно совершается размываніе по всему Кольскому полуострову. Покровъ весь смыть, коренныя породы обнажены и сильно разрушаются при посредствѣ атмосферныхъ дѣятелей (разности температуръ (отъ+30 до-35 Цельзія), ливней, снѣговъ, горныхъ потоковъ и пр.).
- 10) Мѣриломъ дѣйствующихъ теперь факторовъ размыванія могутъ служить наблюденія надъ Нивой, Туломой и Колой (опредѣленіе скорости, количества воды и осадковъ, проносимыхъ въ 1 секунду); мѣриломъ прежняго — тѣ результаты, которые мы находимъ въ видѣ сохранившихся наносовъ.

слъдов. приблизительно на 18 кило разность разна 80 метр.)

мелкихъ осадковъ, потому что въ послъ ледниковый періодъ мы имъли именно массу живыхъ, текучихъ, работающихъ водъ, которыя уносили изъ толщъ ледниковаго наноса всъ его легко подвижныя части.

вка Представляемые имной присунки и разрезъ потносятся откъ Кольскому полуострову.

Рисунки составляють или оригинальные наброски, — сдъланные мной на мъстъ, или же только снимки съ эскизовъ, находящихся въ моихъ альбомахъ. Большая часть ихъ относится къ наиболье интереснымъ побережьямъ Имандры. Именно это виды всего плоскогорія Хибиныхъ тундръ, ихъ береговой цъпи, высшаго пункта— Высокаго Мыса, логовъ, разръзы ихъ; затъмъ виды Имандры съ высоты горъ; всъ они представляютъ интересъ въ геологическомъ отношеніи.

Карта, представляемая мной, составлена главнымъ образомъ по десятиверстной картъ, изданной Главнымъ Штабомъ. Мнъ принадлежитъ только нанесеніе высокихъ горъ и нъкоторыя поправки. Сюда относится матеріалъ къ точному описанію Имандры, состоящій изъ приведеннаго въ систему списка береговыхъ названій.

Разръзъ полуострова составленъ мной не по одной прямой линіи, а по тому пути, который нанесенъ на картъ. Именно, вотъ названіе пунктовъ, чрезъ которые прошелъ разръзъ.

На югъ, отъ Кандалакши — по Нивъ, чрезъ озеро Имандру, чрезъ Пелесмозеро, Колозеро, Пулозеро, Мурдозеро, по ръкъ Колъ въ Кольскую губу.

Отношеніе масштабовъ вертикалей и горизонталей равняется приблизительно 75; именно для вертикалей 1 дюймъ соотв'єтствуетъ 50 метрамъ; для горизонталей—1 д.—3 1/2 верстамъ.

он энванивая котовщения приводо виденти в приводо в приводо в приводо в приводом в при в приводом в приводом в приводом в приводом в приводом в при в приводом в применти в приводом в применти в применти в применти в применти в пр

Разръзъ, прилагаемый къ данной статъъ, уменьшенъ противъ предъидущаго, (который я имълъ честь демонстрировать въ засъданіи Геологическаго Отдъленія Общества) въ пять разъ. Поэтому масштабъ для горизонталей равняется (17¹/2) семнадцати съ половиной верстамъ въ 1 дюймъ; масштабъ вертикалей двумъ стамъ пятидесяти метрамъ въ дюймъ. Отношеніе масштабовъ приблизительно 1:75. (Разность составляетъ—250 м. × 75 = 18750 и 1,066781 м. × 17¹/2 = 18668,7; слъдов. приблизительно на 18 кило разность равна 80 метр.).

## Синсокъ высотъ Сътредъления съ определения поль-

a-Кандалакша, деревня, лежащая при впаденіи р $\pm$ ки Нивы в $\pm$  Кандалашскую губу, при уровн $\pm$  моря.

Линія вл'єво отъ *а* горизонтальна—это уровень моря. (Каєдалашская губа).

ав - ръка Нива; длина линіи 12 верстъ. нам Пваров учас

bc—первый «плесъ» или плесово озерко, длина 4 версты; высота надъ ур. моря 50 метровъ.

cd—ръка Нива; длина участка 5 верстъ.

de-Пинозеро; длина 5 верстъ; высота абсол, 79 м.

еf—рѣка Нива; длина линін 7 верстъ.

fg—озеро Имандра; длина 89 верстъ; высота надъ ур. м. 110 метровъ.

gh—Куреньга ручей, длина 4 версты.

hi-Пелесмозеро; длина 15 верстъ; высота 135 метр.

і—Возвышеніе при і—водораздѣлъ между Пелесм-озеромъ и Колозеромъ, шириной въ  $1^1/_2$  версты; абсол. высота  $136^1/_2$ — 137 метровъ.

ік-Колозеро; длина 15 версть; высота 135 метр.

kl—рѣка безъимянная; длина  $5^1/_2$  верстъ.

lm—Пулозеро; длина 8 верстъ; высота 110 метр.

m—n—Мурдо-іокки; — длина 4 версты.

и—о—Мурд-озеро; длина 13 верстъ; высота абсол. — 100 метровъ,

o-p-q-r-s-рька Кола; общая длина 48<sup>1</sup>/<sub>2</sub> верстъ.

р-станція Кицы.

q—Шонга-варака; высота уровня — 11 метр.

S - городъ Кола у уровня Кольской губы.

Высшій пункть перешейка, не вошедшій въ разрѣзъ, лежитъ на самомъ берегу озера Имандры (fg), приблизительно около середины его длины; высота его равна 920 метр., что на разрѣзѣ при принятомъ масштабѣ составило бы высоту почти въ 4 дюйма, тогда какъ высшій водный пунктъ—hik—поднимается на 135 метровъ, что составляетъ немногимъ больше полудюйма.

## Списокъ высотъ, опредъленныхъ барометрически на Кольскомъ перешейкъ.

- 1. Сырая тундра, около Зашейка, на южномъ берегу озера Имандры. Широта 67° 30′ с. ш. Высота (абсол.) 380,7 метра.
- 2. Высокій мыст въ Хибиныхъ горахъ; на восточномъ берегу озера Имандры. Шир.  $67^{\circ}$  50'. Абсол. высота 920.7 м.
  - 3. Уровень озера Имандры. Абсол. высота 108,8 м.
- 4. Овечья Варака. Широта 68° 30'с. ш. На берегу ръки Колы, въ 3 верстахъ къ съверу отъ станціи Кицы. Абсол. высота 184,7 м.
- 5. *Шонга варака*. Широта 68° 40'. На берегу рѣки Колы, около станціонной избы, въ 22 верстахъ на югъ отъ города Колы. Абсол. высота 54 метра.
- 6. Соловарака. Широта 69°. При сліяній рѣкъ Колы и Туломы, около города Колы. Абсол. высота 81,5 м.
- 7. Горплая тундра. Широта 69°. Въ 4 верстахъ къ съверу отъ города Колы, на правомъ берегу Кольской губы. Абсол. высота 257 метровъ.
- 8. Заборная варска. Между Кандалакшей и Зашейкомъ. Широта 67° 10'. Абсол. высота 148 м.
  - 9. Плест Нивы. Широта 67° 15'. Абсол. высота 79 метр.
- 10. Высота озера Имандры надъ Плесомъ рѣки Нивы 86 метровъ. Слѣдов. по этому вычисл. абсол. высота озера Имандры 165 метр.
- 11. Станція Кицы, по рікі Колі. Абсол. высота 55—60 метр.
- 12. Уровень ръки Колы у Шонга вараки. Абсол. высота 11 метровъ.
  - 13. Колозеро. Абсол. высота 135 м.
  - 14. Пелесмозеро. Абсол. высота 135 м.
- 15. Водораздила (лежащій между Колозеромъ и Пелесмозеромъ). Абсол. высота 136,5 м.
  - 16. Первый плёст Нивы. Абсол. высота 50 метр.
  - 17. Пулозеро. Абсол. высота 110 метровъ.
  - 18. Мурдозеро. Абсол. высота 100 метр.

#### 

и Мьстами въ этомъ инейсъ наблюдаются гивадовые про-

### . втани отвызват. На кольскомъ полуостровъ.

Куреньга-варака, при съверномъ конць озера . Киоку Т како оП . 1

- а) Въ небольшомъ разстояніи отъ гор. Колы находимъ на правомъ берегу довольно высокую «пахту», т. е. береговую скалу, очень крутую, съ уклономъ градусовъ въ 60°; высота ея—до 6 саженъ. Здѣсь наблюдаемъ выходы очень мелкозернистаго порфировиднаго гранита; въ основной массѣ породы находимъ крупныя включенія: бълаго квариа, бълаго ортоклаза и еще другія болѣе мелкія зерна, собранныя гнѣздами розоваго цвѣта.
- b) Верстахъ въ 20 отъ гор. Колы, по самой рѣкѣ Туломѣ, у втораго порога, наблюдаются выходы весьма мелкозернистаго гнейса, тонкослоистаго, съ пропластками черной матнезіальной слюды. Мъстами гнейсъ почти переходитъ въ слюдяной сланецъ. Порода характерна своей тонкослоистостью и мелкой складчатостью.

Простираніе SO-NW подъ  $<290^\circ$  до запольятьна ахило Уголъ паденія пластовъ  $37^\circ$  на SW этирана имацьятьна

Основная порода весьма Афрутойовоськой Свебита

вішов) Горилая тундра, въ 7 верстахъ съверу отъ гор. Колы.

На вершинъ горы (высота 257 метровъ) наблюдаются выходы коренной породы—тонкослоистаго, мелкозернистаго гнейса краснаго цвъта съ черной волнистостью (струистостью), которая зависитъ отъ выдълившейся въ тонкіе пропластки магнезіальной слюды. Въ основной массъ довольно крупныя включенія, гнъздообразные апрегаты — граната; величина гнъздъ достигаетъ 1 сантиметра. ко

взята касательная) подътугломъ 297°—305°, потому

- орга Надение пластовът весьма значительное обнив поставлены а совершеннот на голоду, и повидимому, и имъютъ педва замътпри уклонъ окътюту оплатона в динтия вед-опиодом в доставодна Мъстами въ этомъ гнейсъ наблюдаются гнъздовые пропла тки кварца молочнаго цвъта.

3. По ръкъ Колъ. Во многихъ мъстахъ выходы однообразнаго гранита, мелкаго и средняго зерна, краснаго цвъта.

4. Куреньга-варака, при съверномъ концъ озера Имандры.

Выходы былаго сіснита весьма крупнаго зерна; онъ состоитъ изъ сахарно-бълаго полеваго шпата (ортоклаза), достигающаго величины отъ 3 до 5 сантиметровъ, и большихъ и
толстыхъ табличекъ серебристо-бълой каліевой слюды, которая
не разсъяна нигдъ случайно, а собрана въ массы до 2 сант.
толщины.

нкы Напластованіе почти горизонтальное. витуплання и венья -

Простираніе съ запада на востокъ. Едва заматный уклонъ въ 20 от в тор. по самой рекулогута

мь, у втораго порога, наблюдатей акихакий йінэропа Вере

5. Въ Хибиныхъ тундрахъ; горы эти находятся на восточномъ берегу Имандры, около средины озера. Они состоятъ изъ роговообманковаго сіенита чернаго цвѣта. Роговая обманка является въ видѣ ясно-образованныхъ призматическихъ кристалловъ; ортоклазъ— зеленовато сѣраго цвѣта, также кристаллами значительной величины.

Въосновной массъ преобладаетъ полевой шпать тортов илазга просвъчивающій слегка, голубовато свраго пръта в зна

нин Недвлимыя лего являются въ видъ прекрасно гразвитыхъ кристалловъ, сплошь и рядомъ сростающихся между собой, потывскольку недвлимыхъ вивство Изломъ этого ортоклаза стекловидный съ слегка-жирнымъ блескомъквана втака

анов Роговая обманка — уже въ значительно меньшемъ количествъ. Большею частью ез недълимыя собраны гнъздовидно изъ аггрегатовъ хорошо-развитыхъ кристалловъ столбчатой формы. -шо Иногда находимъ въ породъ такія мѣста, гдѣ кристамы роговой обманки весьма тонки и являются въ формъ игловиднаго налета, въ которомъ бываютъ включены, по черному фону, крупные кристаллы оргоклаза — съраго чвътал вид форм морьм

Часто въ основной породъ разсъяны крупныя гнъздообразныя скопленія *лучистаю камна*, величиной до 5 сант.

Простираніе идеть съ юго-юговостока на сѣверо-сѣв. западъ.

Простираніе идеть съ юго-юговостока на сѣверо-сѣв. западъ.

6. Сырая тундра. Близь Зашейка, при южномъ концѣ озера Имандры, по западному его берегу. Выходы мелкозернистаго гнейса съ обильными включеніями граната. Простираніе пластовъ ССЗ-ЮЮВ.

яктоПласты падають на западъ подъ зугломъ въ 18 от 20° годо

Здесь также находимъ толстый кроющій пласть кварца, какъ и на Горелой тундре повещености пандановата

7. Высовій островъ, среди озера — Имандры, противъ Хибиныхъ горъ. Онъ состоитъ изъ свътлаго зеленовато съраго хлоритовато сланца. Порода чрезвычайно мелкозернистая, почти афанитовая. Выходы его наблюдаются въ береговыхъ лудахъ. Тутъ же можно видъть прекрасную ледниковую полировку, царанины и штриховку. валитор понириля

напластование неопредъленное пре воде котовкак двали

- Выходы обыкновенно *краснаго* имелкозернистаго *инейса* безо всякихъ включеній. «этомуни» «хыминадэн ыниринэя пон

# больше. Максимум; — В мм. Кристаллическиуь менфанных в вовсе . Rqom orange vyaqqo ymoнданав оп. . Полесков:

въ лудахъ наблюдаются выходы страго и краснаго гнейса средняго зерна, съ жилами кварца и большими кристаллами ортоклаза и плагіоклаза. Красный цвътъ преобладаеть и въ

немъ черная магнезіальная слюда мъстами образуетъ сплошныя прослойки, но въ основной массъ вообще преобладаетъ кварцъ и полевой шпатъ бълаго цвъта. Среди этой основной массы изръдка вкраплены таблички черной слюды. Здъсь ясно выражена волнистость слоевъ слоевъ слоевъ слоевъ слоевъ

2. Сумъостровъз Мелкозернистый у гнейсь пъраснаго и съраго цвътовъз (Образцы взяты съ юговосточной оконечности острова), 1984 за вистровополного въз втели озмощи вощи

-порода состоить изъ сильно преобладающаго полеваго шпавта-об. Сырвяетундразь Близь Зашейка, при казаклоторо-

Частью не превосходять одного миллиметра. Ортоклаза розовато или слегка дымчато-розоваго цвъта, съ жирнымъ блескомъ, полураковистымъ изломомъ, такъ что его трудно отличить отъ кварца.

Стекловидный, просвѣчивающій, дымчатый и мѣстами желтоватаго цвѣта ортоклазъ такъ плотно перемѣшанъ съ кварцемъ, что нетрудно одно принять за другое. Мѣстами попадаются недѣлимыя чисто-красной окраски; мѣстами совершенно прозрачныя, съ серебристымъ блескомъ. Нѣкоторыя недѣлимыя ортоклаза значительно выдѣляются изъ общей массы своей величиной, достигая 2 — 3 милм. Большею частью ортоклазъ является здѣсь зернистымъ; если встрѣчаются отдѣльные кристаллы, то очень плохо образованные. Но мѣстами, очень рѣдко, въ особенности тамъ, гдѣ нѣсколько значительной величины недѣлимыхъ смыкаются вплотную, мы встрѣчаемъ совершенно ясно-развитые кристаллы, которыхъ 2 плоскости клинопинакоидовъ очень хорошо развиты.

Квариз—свътло-дымчатаго и розовато-дымчатаго цвътовъ, просвъчивающій, —мъстами безцвътный и совершенно прозрачный. Величина недълимыхъ около одного мм. или нъсколько больше. Максимумъ — 3 мм. Кристаллическихъ недълимыхъ вовсе нътъ. Зерна кварца —округлыя, съ жирнымъ блескомъ. Въ общей основной массъ, по количеству, кварца гораздо меньше, нежели ортоклаза.

зернистый кварцъ, перемъщанный съ преобладающимъ ор-

стами и главнымъ образомъ гнейсъ состоитъ только изъ этихъ двухъ минераловъ.

Въ другихъ мъстахъ проходятъ слоями ръдко разбросанныя чешуи слюды, черной, магнезіальной, сильно блестящей. Тамъ ясно выражена слоистость. Плоскости, въ которыхъ расположены чешуйки слюды, очень сближены между собой, такъ что здъсь гнейсъ становится типичнымъ, но вмъстъ съ тъмъ зерна основной массы становятся здъсь гораздо мельче.

Мъстами, въ породъ, въ тъхъ именно пунктахъ, гдъ исключительно находимъ кварцъ и ортоклазъ, составляюще плотную основную массу, мы изръдка встръчаемъ отдъльныя недълимыя олиго-клаза, въ видъ ясно выраженныхъ табличекъ съ блестящими серебристыми плоскостями, на которыхъ ясно развита полисинтетическая штриховатость.

Кварцъ, какъ я уже сказалъ, въ большинствъ случаевъ дымчатаго, желтоватаго и розоватаго цвътовъ, но часъо попатаются отдъльныя крупныя зерна — бураго, красно-бураго и и темно-краснаго цвътовъ, что опять-таки очень приближаетъ его къ преобладающему здъсь, въ видъ случайныхъ включеній, гранату, зерна котораго разсыпаны во множествъ, котя и незначительной величины. Все это придаетъ породъ желторозовый цвътъ съ карминовыми и краснобурыми пятнами.

Мъстами зерна граната скопляются цълыми массами, образуя гнъзда, въ которыхъ преобладающею составною частью является черная магнезіальная слюда и въ ней массами вклютиены округлыя зерна граната. «П. ... и окольная слюда и въ ней массами вклютиены округлыя зерна граната. «П. ... и окольна ней уп. ...

Сообразно съ тъмъ, что мъстами, на тамъ, гдъ гнейсъ явлияется плотной зернистой породой, магнезіальная слюда вполны отсутствуеть, на другихъ слояхъ, гдъ ясные всего выражена слоистость, магнезіальная слюда является въ такомъ значительномъ количествъ, что придаетъ породъ почти черный сплощи ной цвътъ, тонкими прослойками, отстоящими другъ отъ друга на 5 мм. звизвановия опиченноси империя

имындан виминдец внадшаном вдодон взя вмокадоо жимаТ бы дай. Кварцъ преимущественно слегка-дым имазокой имимодин

з. Сороки (Сороцкая волость). Выходы гнейса краснаго и съраго цвътовъ. Гнейсъ мелкозернистый, порфировидный;

91

включенія полеваго шпата ортоклаза краснаго цвъта и плагіоibyxa munepa 108B. клаза бълаго цвъта.

- Простираніе на NO подъ угломъ въ 35°; паденіе пластовъ ныя чешуй слюды, черной из магнелально 65 с чемоглу такопиWИ

Тамъ ясно выражел 87-277 - пошеской живую кінэры дес-

Та Гнейсъ этотъ по мъстамъ сильно измъняется по характеру.

Сородкій гнейсь весьма близовъ въ Сумъ островскому. Тотъ же гнейсъ, но съ значительно меньшимъ количествомъ слюды въ составъ, бълаго цвъта, по преимуществу матра //

-тоГнейст состоить изъ ортоклаза, совершенно втакого же характера, съ стекловиднымъ жирнымъ блескомъ, безцвътнаго или серебристаго, составляющаго главную основную массу. Кристалличность плохо выражена. импланформо имплитовью до

Квариз-большею частью совершенно прозрачный; мъстами, въ особенности крупныя недълимыя, - темнодымчатыя. Встръчаются такія прослойки, въ которыхъ преобладаеть крупнозернистый кварцъ; тутъ же мы находимъ зерна кварца мясокраснаго или же кровяно-краснаго цвътовъ. Чешуйки магнезіальной слюды разбросаны изръдка и въ безпорядкъ.

Эта порода гранито-гнейса переходить въ совершенно черный гнейсь, съ громаднымъ преобладаніемъ черной магнезіальной слюды въ составъ; таблицы ея достигають значительной величины въ 5, 6, 7 - 10 мм. и среди ея почти исчезають незначительныя зерна полеваго шпата и кварца. Въ переходной полосъ мы находимъ преобладание олигоклаза надъ ортоклазомъ.

4. Пуръ-наволокъ. Простирание гнейса идетъ совершенно параллельно берегу, на N, съ уклономъ къ западу въ 200; тнейст праснаго првта. Вододон вотонидов понтоги коток

вы Паденіе пластовъ на югозападъ. Угодъ паденія 60° - 70°.

-и Порхарактеру своему тнейсь очень близко подходить къ подробно описанному: Сумъ-островскому: оти фиторингол лион

вту Кварцъ и полевой в шпатъ нявляются попять замъчательно схожими. Ортоклазъ преимущественно мясо-краснаго и цвъта. Олигоклазъ безцвътный, просвъчивающій и совершенно бълый. Кварцъ преимущественно слегка-дымчатый. Большое количество слюды каліевой и магнезіальной разбросано въ бези съраго певтовъл Гиейсъ мелковернистый, порфирсияной

5. Якъостровъ, около Кеми. Около пароходной стоянки выходы крупно-зернистаго гнейса. Простираніе NO -20°; паденіе (NW -70°) Уголь паденія 5° оддя атэдин дэйэн Т

Ясно-тонкослоистая порода, почти волокнистая, чернаго цвъта съ слегка зеленоватымъ оттънкомъ. Преобладающая основная масса состоить изъ черной магнезіальной слюды, къ которой примъшиваются изръдка зерна кварца. Слюда совершенно чернаго цвѣта; хорошо развитыя большія поверхности базопинакоида ея табличекъ отличаются сильнымъ блескомъ. хотя, конечно, при этомъ вовсе не наблюдается побъжалости.

Зерна кварца обыкновенно около 1 мм. величиной, краснобураго и зеленовато-желтаго цевтовъ; хорошо развитыхъ кристалловъ его вовсе не наблюдается. не окожо атепра 1. Т

Совершенно прозрачный полевой шпать, ортоклазь, хорошо развитые кристаллы котораго принимають изредка серебристый блескъ. Черная магнезіальная слюда хорошо окристаллизована. Подъ микроскопомъ таблички ея преобладаютъ во всей массъонь бураго цвъта; ортоклазъ подъ микроскопомъ совершенно прозраченъ осовите тодине заточност амонькоо а в своточит

.... (Штуфъ этотъ взятъ съ высокаго каменистаго кража, тянущагося параллельно берепу) эпумпэнн амидохан ым амата Е.

На самомъ берегу Якъ-острова развитъ очень крупнозернистый гранито-гнейсь, въ которомъ хорошо развитые кристалы ортоклаза достигаютъ величины до трехъ сантиметровъ.

и Полевой шпатъ дымчатаго и слегка красноватаго цвъта. Мфстами онъ до такой степени схожъ съ кварцемъ, тучто съ трудомъ можно бываетъ отличить ихъ, котя и въ очень крупныхъ индивидуумахъ. Кварцъ тутъ темнодымчатый опридто да

но Нъсколько восточнъе развитъ такого же карактера гранито-гнейсь съ гнъздообразными включеніями слюды, черной няетт ярко-зеленый цанть гиянамдо йодогод и йоналаісянам

Ватъмъ находимъ еще значительное количество граната. Ири этомъ кварцъ красноватаго цвъта. Отъ этого зависитъ красная, даже малиновая окраска породы. Въ ней разбросаны черныя пятна, - это гитада магнезіальной слюды. Кварцъ-бураго, вкраснаго и дымчатаго цвфтовъщогваней вооди-околи отве

700 6. С ухая Туба (недовзжая Кеми). Наблюдаются выходы

гнейса, изобилующаго жилами чистаго бълосивжнаго кварца и слюдянаго сланца чернаго цвъта инчеститута на ожива нава

Гнейсъ имъетъ здъсь простираніе съ СЗ на ЮВ. подъ угломъ въ 75° ин Паденіе пластовъ на югозападъ подъ угломъ въ 140°-50° и пластовъ на югозападъ подъ угломъ.

Тя Гнейсъ краснаго цвъта съ черными полосами, зависящими отъ мъстнаго переполнения породы магнезіальной слюдой.

втиненовато-чения породы стами намидом в нами

Мъстами здъсь порода является такъ сильно метаморфозированной, что сильно напоминаетъ по своему характеру шлаки.

7. Кереть. Около нижнято конца пороговъ, на правомъ берегу ръки, находится выходъ основной горной породы чернаго, темнозеленаго и луково-зеленаго цвътовъ. Здъсь существуетъ двъ разности этой породы. Одна — темная, почти черная, крупнозернистая, плотная. Въ ней ясно различимъ лабрадоръ, котораго недълимыя достигаютъ величины въ 3 — 4 сантиметра. Въ большомъ количествъ эпидотъ луковозеленаго яркаго цвъта, но онъ преобладаетъ въ другой разновидности. Затъмъ мы находимъ преимущественно черную роговую обманку и черную магнезіальную слюду съ сильнымъ блескомъ. Краснобурый, просвъчивающій полевой шпатъ — ортоклазъ встръ чается въ видъ отдъльныхъ зеренъ, изръдка разбросанныхъ въ основной массъ. Магнезіальная слюда въ хорошо развитыхъ табличатыхъ кристаллахъ.

Въ другой разности преобладаетъ луковозеленый эпидотъ въ отлично развитыхъ кристадлахъ Подъ микроскопомъ онъ почти совершенно безцвътенъ; въ тонкихъ пластинкахъ онъ прозраченъ и, при вращени анализатора, ясно и ръзко мъняетъ ярко-зеленый цвътъ въ буровато-фіолетовый и бурый, мъстами — въ розовый. Другія недълимыя, при совершенной прозрачности — въ параллельныхъ Николяхъ, — при перекрестномъ положеніи осей — только затемняются.

Мъстами наблюдаются небольшія гнъзда совершенно бълаго, плохо-просвъчивающаго полеваго шпата, плагіоклаза, повидимому олигоклаза. Это составляеть переходную полосу

между мелко-и крупно-зернистой разностями. Здѣсь именно мы и находимъ крупныя недѣлимыя лабрадора 3—4 санти-метровъ; здѣсь же находится и бѣлый олигоклазъ, дуково-зеденый эпидотъ—отдѣльными массами, въ хорошо-развитыхъ крис-таллахъ. Если допивановального да хадота од да 011 да вторыя

Затьмъ самая мелкозернистая разность заключаетъ также громадное преобладающее количество эпидота прави деверей оп

8. Кузакоцкая губа. Средняя луда. Плотная, мелкозернистая порода сланцеватаго сложенія. Цвѣтъ сѣрозеленый, мѣстами темносѣрый и чернозеленый. Слои такъ тонки, чтотолько перемежаемость болѣе свѣтлыхъ группъ слоевъ съ болѣе темными даетъ возможность ясно различать эту сланцеватость на нѣкоторомъ разстояніи.

Параллельно слоямъ расположились очень мелкія чешуйки бурой магнез, слюды, которой даже самыя крупныя недѣлимыя недостигаютъ величины въ 1 мм. Они обусловливаютъ еще болѣе совершенную сланцеватость. Но наибольшую плотность придаетъ породѣ—преобладающій здѣсь въ основной массѣ и, такъ сказать, цементирующій все во едино, мелкозернистый зеленый хлоритъ.

- Простираніе породы на ЮВ. подъдугломъ въ 20° ка пад деніе пластовъ пидетъ подъдугломъ въ 40° на ЮЗ. въздиннова

9. Величанка въ Кандал. губъ. Наблюдаются выходы обывновеннаго красно-съраго гранита съ простираніемъ съ съвера на югъ, съ легкимъ уклономъ въ 15° на востокъ; паденіе весьма незначительное на западъ.

# 1755 квадр. версть: АЧНАМИ ОЧЭКО КВ. в. приходится на Хибинскую Им., 525 на токостровскую и 480 кв. в. на Ба-

Такимъ образомъ, поверхность озера ванимаеть илощаль въ

Озеро Имандра, имъющее громадное значеніе, какъ для всякаго путешествующаго по полуострову, такъ и для мъстныхъ жителей, какъ единственное удобное средство для сообщенія между отдаленными мъстностями, (такъ какъ ни дорогъ, ни лошадей нътъ, а олени лътомъ бываютъ угнаны за сотни верстъ), тянется прямо съ съвера на югъ, на протяжении 89 верстъ. Оно лежитъ между широтами 67°20′ и 68°10′.

Высота его надъ уровнемъ моря была мной опредвлена

двуми способами. Во первыхъ, непосредственнымъ сравненіемъ моихъ барометрическихъ данныхъ въ опредъленный день и часъ съ данными ближайшей метеорологической станціи въ Кеми; при этомъ, при введеніи всѣхъ поправокъ, получена высота въ 110 м. Во вторыхъ, воспользовавшись целымъ рядомъ собственныхъ наблюденій, производившихся ежедневно по 5 разъ, начиная отъ уровня моря въ Кандалакшъ, и попутно, при всъхъ главнъйшихъ максимумъ и минимумъ рельефа, я получилъ величину въ 165 метровъ. Промежутокъ времени, истекшій между наблюденіями двухъ крайнихъ станцій (Кандалакша-Имандра) равнялся почти суткамъ (14. Канд.-3 час. поп. 15. Им. 12 час. дня). Такимъ образомъ, разница двухъ наблюденій равняется 55 метрамъ и, в роятно, средняя величина въ 130 метровъ соотвътствуетъ дъйствительной.

OF OF PAA. XAPAIASSISSESTATION HOLVOOTPOBA.

При своей значительной длинъ въ 90 верстъ, озеро это имъетъ весьма различную ширину по разнымъ мъстностямъ. Такъ, мъстами, оно не шире 10 верстъ, даже, можетъ быть, --8; но за то, мъстами, ширина достигаетъ 30 верстъ, напр. между Хибиными горами и Монча-тундрами. При южномъ же своемъ концъ Имандра достигаетъ ширины въ 35 верстъ. Благодаря крупнымъ мысамъ и полуостровамъ, глубоко връзающимся въ озеро, оно разбито на три отдъльныя части: 1)-Съверную - Большую или Хибинскую Имандру, 2) Среднюю или южную-Іокостровскую и 3) Бабинскую, - которая, при южномъ концъ Іокостровской, образуетъ крутой заворотъ на западъ, длиною до 40 верстъ вонасетиченее видова вінес

Такимъ образомъ, поверхность озера занимаетъ площадь въ 1755 квадр. верстъ, изъ которыхъ-750 кв. в. приходится на Хибинскую Им., 525 на Гокостровскую и 480 кв. в. на Ба-Озеро Имандра, пивнощее громадное значение, помумый

-то Берега, покаймляющие озеро, почти всюду круго поднимаются кверху, образуя чли отдельныя возвышенности, какъ напр. по западному берегу—Сырая тундра, Воронья т. и пр., или же-сплошныя гряды скаль, достигающія значительной высоты.

88 Съверная часть, Хибинская Имандра заключена среди двухъ паралдельныхъ горныхъ цвией: съ востока Хибины Тундры, достигающія высоты 1000 метровъ, съ запада Чауны-түндры и ихъ продолженія Монча т., Нюда тундры, Лоудуст т. и, наконецъ, Вороньи тундры, дел онацетвной делон

Такъ какъ главныя цепи геръ параллельны и простираніе породъ идеть почти съ съв. на югъ, причемъ пласты поставлены на голову и съ запада (Сырая Тундра) и съ востока (Хибины), то я полагаю, что мы имбемъ, въ данномы случав, натуральную синклинальную складку горной породы, послужившую естественнымъ водоемомъ и, современемъ, (съ минованіемъ ледниковаго періода) образовавшую озеро.

Все громадное водное пространство этого озера усъяно массой большихъ и малыхъ острововъ, а берега изръзаны мысами и заливами.

Число острововъ достигаетъ 90; изъ нихъ главнъйше Ершъвъ Бабинской Имандръ и Сявт остр. и Высокій въ Хибинской.

число мысовъ (наволоковъ) доходитъ до 78, причемъ многіе изъ нихъ образованы значительными горами. Заливы, въ колич. 64, глубоко изръзывають берега; такъ напр. Монча губа и Витигуба връзываются на 20 верстъ (на западъ) въ материкъ.

Озеро принимаетъ въ себя 26 ръкъ и ръчекъ и на берегу его высится 17 горъ, изъ которыхъ многія занимають громалныя площади; такъ Хибины тундры простираются на 2400 6. За Лисьимъ наволокомъ открывается Бабинскатофайля

Глубина озера, повидимому, не соотвътствуетъ его величинъ; хотя, въ точности, она мнъ неизвъстна, но при поъздкахъ я наблюдалъ часто, далеко отъ береговъ, что ясно видно дно. Въ самомъ глубокомъ, по показанію лопарей, д мъсть, мной были сделаны промеры и найдена глубина только въ 25 сажень. (Къ съверу отъ Высокаго Острова, противъ Хибигистин-нярка, Отъ Маланьина острова въ 3 верстах(жоот стхин

Хотя у меня, въ путевыхъ тетрадяхъ, вимъется массатматерьяла, на половину уже обработаннаго, для составленія детальнаго описанія озера Имандры, но, не им'я теперь совершенно времени для такой работы, я отлагаю ее до будущаго времени, а теперь прилагаю только, въ видъ сыраго матерьяла, списокъ географическихъ названій, исюда относящихся в Наряду съ русскими, приведены ни вибстноя, глопарскія названія. Матерыяль обработань вы систему, грасположенную такъ, что начиная съ южнаго конца озера, отъ Зашейка, можно послъдовательно слъдить за береговой линіей по лъвому берегу; затъмъ точно также по правому: нифи кынавилима в начата на также по правому:

- Къ этому же списку у меня имъется попарскій физикогеографическій словарь, подинъ списокъ съ котораго я передалъ въ Императорское Русское Географическое Общество их)

вапіемъ ледниковато періода) образовавшую

#### Bee rpowagage so. AALHAMN HOQIEO of osepa webare

Острова, заливы, бухты, губы, мысы, наволоки и горы, береговыя.

Начиная съ юга, отъ Зашейка по лъвому берегу.

- 1. Первый островъ съ лѣвой руки *Красивый островокт* Мотии-сольно лежитъ приблизительно въ 4 верстахъ готъ Зашейка.
- 2. Около него Каринг Наволокъ Кари нярка. олобута 1-
  - 3. За нимъ тотчасъ же Сырая пуба Сары-лухта да вода
- 4. и Сырая Тундри-Сары уайвинь. гтольяния одек
- -1.55. Потомъ Лисій наволокъ -- Лысть-няркъ въ 7 верстахъ отъ Зашейка. «педитооди педит наволокъ навът задвиося нав
- 6. За Лисьимъ наволокомъ открывается Бабинская Иман-дра Ахии-леуверт на западъ. Диомидия преве внибут 1
- -дай Маланенна острова Мялынь суола осволо в 3 зверсть въ окружности: , в воерей вто озвана дотови в дальнован в дука
- 8. Ложесный островокт— Иястъ-мычи. Оба эти послъдніе острова лежать въ 3 верстахъ отъ Лисьяго наволока.
- 9. Затъмъ Кяміевт наволокт Кянгт-густнымь или Кянгт-густнымы или как или ка
- 11. На немъ Утичій наволокъ Ландычь-няркт. Наволокъ этотъ около 100 сажданны длины придаго образования образования при веремения в тенеры при веремения веремени
- 12. Маринина остров. Марино-суола. Маленькій островов около 100 сажень въ окружности. Отъ Могильнаго берега, именно отъ Ландычь нярка на разстояніи меньше версты.

- 13. Сыпуная пуба Міоло-лухті лежить рядом'ь съ Ландычь-няркомь.
- 4. Зувет же остярки наволока Аюпи-няркого эж дэйд . За
  - 15. Хаба-губа Супп-лухтъ. эмоковон зимок Н. 74
- 16. Туть же *Горькіе острова—Каримъ суолы*. Всего три острова: два небольшихъ, третій еще меньше.
  - 17. Рядомъ съ ними Соленыя горушки Суолы-ярмынь.
- 18. Сънный наволокъ— Хэйндуйбъ-наркъ Всего около 17 или 18 верстъ отъ Зашейка, заоводило манакодидой. 16
  - 19. Сънная губа Хэйни-Лухтг. иннемож онзек .23
  - 20. Потомъ Нестеровъ островъ Нестеръсуолъ. 87.
  - 21. Рядомъ въ 2 верстахъ Областной остров. Иыло-Соуничь.
  - 22. Спиной наволокь 2-й Хэйньдуйбълд-подуй.
  - 23. Жарг-Губа-Пуорг-Илухтг-Шенкг, ихиндэ 1. да
- -0qп 24. Порт наволокт Нуарт-нярктыны виоминады . 7 с.
  - 25. Болото-Хвостъ. Пичи-нэнкъ. ладот ахынидих авит
  - 26. Корожная салма. Куоркт-чалмгониомина П. 86
- -ым 27. Нопа-маленькая горушка на берегу. проб. . С.
  - 28. Ручей Гнилая рычка-Мяречь вуй.
- 29. Бабинская пристань Ахки-сямь-горни-кыкь.
  - 30. Ръка Чуна. Кушт-Кинчтогован отвиромнодоП это
- . 131. Городки Лан-нынчь (было жительство).
- -бык 33. Рычка Кислухан Соппы Кынчымен вН ... выоко-эвк
- -00 234. Пемный наволокъ. Лингвуды пиркъ. оболо заказверь
- 35. Вочу-губа-ламбина. Тамъ гдвач Кислухарови Чуна ръка Уотчъ-лумболъ. мерка Потодов компония под 20
  - 36. Жельзный наволокъ. Рувъ-няркъ. Пошилод Ед:
- .бкон 37. Желпзная пубал Рувс-мухтг. дино патинан 1.40
- 39. Сыпуній наволокт—Сыть энирмынь рверсть 30 отъ Зашейка.
- н пу 40. Еловый наволока, Кусь-нярка сто по по по вы
  - 41. Долгая губа. Кукист-лоутичького тиминей . Сд
  - 42. Карица пуба. Карт лухты. П. подразника .07
  - 43. Карицъ наволокъ. Карицъ-няркъляна аттий 17

0099

98	Ф. ХАБ <b>АВВИВИЧЕЙКАН</b> О ПОЛУОСТРОВА.	OPOLPA
ecl. 44	. Илоская губа. Тулпъ лухтъ.	13 Chiminian
	. Рядомъ Іокостровская станція.	лычь-няркомъ.
	. Здёсь же острова Кириво-острова.	A
	. Еловый наволокг. Кустъ-няркг.	
	. Передняя губа. Ыбдыстълухтъ.	
	. Передній островт. ПЫбдыстт-лух	
	ъ ними Соленыя горушки - Суолы-За	
	Осипова губа. Осьпеска-лухтъ.	
	. Корабельный островокъ. Карбысъ-с	
	Ячесно каменный наволокъ. Уыбска	
	. Кислая губа. Соптъвунъ.	
	.) Овечии вострова (Зыптуки). Ламби-	
	. Курга-ръка. Кургъ-нюкъ. 2 вистопы	
	Чернухина пуба. Нерго-лухто.	
	. Переимокъ наволокъ. Тіунъ-гармычь	*
	Хиостъ. Пичи-нэнкъстог схынидиХ	
	. Переимочная губа Тгунг-леуда-луз	
	. Ловушкинскіе островки въ Кислой	
	unas provina Mapene aga: Mare	
-	Холкт островт (5 версть въ окруж	
	ереимочнаго наволока Руыдъ-суолъ.	
	. Сявт островт. 9-10 верстъ въ он	
	оросшій однимъ сплошнымъ ельником	
	ми тальковаго, хлоритоваго сланцевъ,	
	уолг. На немъ есть переимокъ, т. е.	
	и; около одной версты длиной; онъ	
-	п-ламбина. Тамъ итър Гото киооп	
	Ловушкинская варака. Пьяртмъ-вар	
	Большой Голомень берегг. Ыльдный	
	Пътушни острова 3 небольшихъ (Кол	
	Поворотный наволокъ. Пойндъ-лын	
	Спес-варака. Спес-варь сможовым	
	Куркъ-губа. Куркенъ-лухтъ.	Зашейка.
	Высокій островт. Чахки-суоль 3 в	
100	Кэнтищій островъ. Кингжсуоль.	
	Витти губа. Йиттъ-вунъ. Л. годи	
		Land Control of the C

71. Виттъ ръка Нійтъ-кушкъ. вноковом винаря. 81.

72. Сучья губа, Коужет лукто поконы визмонно	4. As
73. Сучій наволокъ. Коужъ-няркъл вода канов	5. Us
74. Ямка —пригубокъ и ръчка к Хоудыни очены	G. Pa
75. Ямкинг наволокъ. Хоуды-наркъ. казашь Е	105
76. Павловт наволокт, Павдтавля, онын-гинд Л	106
77. Спъшный наволокъ. Кирыть-няркълития М	107.
78. Китг Камень. Валест-няркт над винтиянИ	108.
79. Говенный островока, между Спѣшнымъ наво.	л. (и) Китъ
камнемъ. Пышки-суолъ, дв. дохох. днемы твогхох	110.
80. Рикт островт. Рихкт-суолт или Спрый ост	p063.
81. Спрая тайбола. Рика-тайбола. гишктэвП	112.
82. Кура-губа. Корше-удычь выклау Р вымого	113.
83. Поворотный наволокъ. Пойнднынгъ-няркъ.	
84. Гнилово варака Шау-варычь и сипатодо	
эта 85. Лисицыны наволокы. Ремь-нярынчь. выший	.116.
0.0 D	Кынпъ-к
87. Монча-губа. Моджь вунь. огозви пывотро!!	117.
88. Клёщевт кимень, Иысть-ярь. опан двоімо д	118.
89. Нюда-ръка. Нюды-Йоккг около Мончей губ	10.F
90. Сальный островь. Вуый-суоль польшилося	120.
91. Ипиная губа. Ивэнг-лухтъ новая пошагод	121.
92. Черезъ 5 верстъ Гангест наволокъ. Ангист-к	уткинчь
93. Корабельный наволокъ. Кармг-няркъ.	123.
94. Егоргевт островъ. Йоркъ-солнынчь. в до до	HIHNET
95. Гольцовые острова. Вдычь-суолы. эонця.	124.
96. Ядовиновъ наволовъ. Ядвинг-нярынчь.	125.
97. Ядовинова островъ. Ядвина суолъ. потхогН	XOIMBER
98. Коймъ-острова (2) Коймъ-суолы. НанарээП	126.
99. Досчаные берега. Лудъ-куада-мацъ. приде Х	127
100. Койма губа. Койма-лухта. аполоден атниТ	
101. Ровг наволокт (2). Роу-дуены. воут выдин	129
102. Зимникъ (Зимній трактъ). Берегъ. винициН	OST
103. Плоская губа. Тулпъ-лухтъ. гводтоо пынов.	131
104. Румяный камень наволокъ. Руменска (ярь) ня	ркъ.
1. Кушаковъ арешникъ. Чауры дтоо ыноянжы П	133
0 L'a 37	134
3. Авонасьева губа. Анасъ лухтъ.	

100	п. ведгарцева.	
4	. Леонасьевъ наволокъ. Анасъ-няркъ. вочт ваву	
5	. Избная губа. Пыртъ-лухтъ-нынчы отовен йіру	7.
6	. Разнаволокъ. Разняркъ д и слобутири - оки й . 3	1
1	5. Зашеект Неунишику. Хом. тишину в казына ко	37
1	06. Крыкъ-наволокъ. Чору-няркъ. воння зволен	7.
1	07. Мякитинская губа. Мыкыть-лухть.	775
	8. Микитина ръка: Мыкыріонкъ. мемел вили .80	
	09. Еловый наволока. Кусь-наркь состыминовоТ	
1	10. Хохловъ камень. Хохель ядинкъ о-миния	9HM8H
	11. Пасомка-Пастмычь (пригубокъ) 5 верстъ отъ За	
	12. Пастминъ наволовъ. Пастмы-няркъл проди	
1	13. Соломка. Чуолмычъльнори-лицой ладух-пиций.	18
1	14. Соломкинъ наволокъ. Чуолмы-няркъ одово П.	18
	15. Өедоткинъ наволовъ. Хуадытъ-нярвъ. О. ИН 1.	
	16. Криппаканда (губа) версты 3 глубины въ	
	5. Вылья пуба. Выль-лухтъ, — е пры к.йвя-ап	
1	17. Почтовый наволокъ. Почтырь няркъ: присом	18
1	18. Кеміевъ наволокъ рядомъ съ Маланьинымъ ос	стр.
1	. Нюда-рыка, Пюды-Поккалейный жиннив .11	8
1	120. Большаго камня губа. Уыдныдъ-лухтъ.	
	21. Большой камень наволокъ. Уыдныдъ-няркъ.	
	22. Ноппончъ. Верстъ 18 отъ Зашейка (Щелье).	
	23. Горушкинъ берегъ тянется по прямому напра	
длин	ы вер. 6 Вальдъ-Ярмынъ-рынтъ. водго вывидок А	
1	24. Гладкое болото. Шилисъ-венкъ. эменомия Т.	:0
. 1	25. Сырыя сопки. (Сопка въ болотъ-сырыя горуш	ки или
холм	7. Ядовинова острова. Ядвина стийка-сэтхон (ими	.6
1	26. Песчаный наволовъ Упсупи-няркъ.	
1	127. Хэрпейка-Хіерпилул-лау Правеново раминизо Д С	
1	128. Тинтъ наволокъ. Тинтъ-няркъ. вода пило А :0	
1	129. Нирма губа. Нярмъ-лухть (2) вистопин вос 1.	
	130. Нирминъ островокъ. Нярмихтъ суолынчъ.	
1	131. Еловый островъ. Кусъ-суолъ. вода выпосы в	10
- ]	132. Руслицы островки 2. Тывалла.	
1	133. Пыжиковы островки. Чалинина возвижи	
.1	134. Котъ-наволокъ. Кот-няркъ.	2.
1	135. Ловушкинъ наволокъ. Пятымъ няркъ. Овноо А	.8.

136. Дикій островъ. Конты суолъ п вторыя аманимутан
137. Сивжная рвка. Выдсъ-іоккъ.
138. Гремяха ручей. Кымды вуй, нэквм) вяником Э : 27 г
139. Горная рука Чапись-іоках На поруд вау ІН . 871
140. Болотный наволокъ. Ленкъ-няркъ анвходтам .471
141. Зуячье кинтище. Суытъ-кингъ. (Верстъ 20 въ стор.
176. Луконкинь ручен. Нукина мура суапнык (атакат ато
142. Ломшъ наволокъ. Ломшъ нярнычъ.
143. Сосновъ наволокъ. Акцымъ-біедзи-няркъ.
144. Кокоринъ наволокъ. Сункы-няркъ.
145. Гусевъ наволокъ. Чуанъ-няркъ.
146. Поворотный наволокъ. Пойндлынгинкъ-няркъ, римплочо
147. Пахта губа. Пауты лухтъл воду ввидеотой овг
148. Пахтъ наволокъ. Пауты няркъ пындеотой 181
149. Пикколя губа версты 2 длины Питклынчъ. 981
150. Ръчка Питка. Питка вуй. портиности в ветем при
151. Питка островъ. Питка-суолъ-дтов вынагата 181
152. Содомный наволокъ. Лады-наркъ.
153. Избная губа. Пыртъ-лухтъ (маленькая) СТХУК-БДУВХ
154. Горькіе острова. Коркмъ-суолъ-повен-мюр. 381
155. Калмъ островъ. Калмъ суолъ.
156. Колбдъ островъ. Колбдъ-суодъ.
157. Іокка-острова. Іокка-суола-Нуркись суола.
158. Около Пыртъ лухты Лисій островъ. Ріемы суолынчъ.
159. Овечій остр. Ламби суоль (всь въ одной губь).
160. Салмъ остр. Чуолмы-суолъ. зноводтро для в. 201
161. Мордъ остр. Мордъ-суолъ. аводтоо понови вен
162. Ровдникинъ остр. Шишникъ-суолъ.
. 163. Тики-губа. Тики лухть. 190 диосовая дтовы дег
164. Калвъ-губа. Калвъ-лухтинчъ-упол визонапот Эет
-да 165. Тулья губа. Туль-дух тълопован в 165. Туль Туль Туль Туль Туль Туль Туль Туль
166. Золотой ели наволокъ. Кольвузы-няркъ (версты 3 длины).
167. Рокъ наволочекъ. Чуормы няркъ.
тин 168. Гангусъ губа. Ангисъ духтъ подтоо підопий 1001
169. Тъсная ръка. Мастынгъ-юкки, макот полозыя помер
200. Верегъ Чернухиной губы по динимих и по 200
171. Чернухина губа. Нердъ-лухтъ Чернухинъ наволокъ

н. кудрявцева.
Няргупиняркъ высота превосх. Высокій островъ, а длина до
137. Сивжная рька. Пыдсъ-ісккъ.
172. Смолинка (маленькая салма). Тырляхт-нычь. 881
173. Щука ручей. Нюкишъ-нура-уайныкъ, вандо Г. 281
174. Матрехины сыпушки. Мадренъ-мяллы токод .041
141. Зуячье кинтише. Сумтаждуй сторо сторы 1751гор.
176. Лукошкинъ ручей. Нукишъ яура уайныкъ втяват сто
177. Ямка береги аликатынгы диоловы ашмо 142. 142.
178. Григорьевъ наволовъ. Рыка-нярычъ. (Противъ Токъ
144. Кокоринъ наволокъ Сункы-няркъ.
179. Могильный остр. (версты 20 въ окружи.). Ланги-
146. Поворотный наволокъ. Пойналынгинкъ-наркърныкоу
180. Котельная губа. Кіент лухты Пахта губа 180.
181. Котельный островокъ. Кень-лухтъ-суолынчъ. 841
182. Таутъ наволокъ. Таутъ-уайвинчъ. вкожний се 1
150. Ръчка Питка. Пит. втоур-илор "сводтромпо 150.
184. Нагильный островъ. Наули суоль пто вяти 151.
185. Ямка губа версты 3 длины. Отъ Іокострова версть 8.
153. Избная губа. Пырть-лухть (маленькая) "дтхул-вдукХ
- 186. Чоли-наволовъ. Чоуняркъ. вностое візасо 1.461
187. Бълая губа (верстъ 10 длины). Ыны-монъ.
188. Бълая ръка. Ынъ-монъ-докълодто дадиой адл
189. Шежь островокъ (въ этой губъ). Пежа суолъ.
. «гр. 190. Сейдъ островъ. Сейда-суолъ. гтов Полож 861
191. Пойова салминка. Пуапинчъ дтоо вірово 159.
192. Лонгъ острововъ. Чирмикъ суолълго смаво .001
193. Избной островъ. Пыхтъ суолъ. чтоо гадоМ 131
194. Лоудусъ ръка. Лудъ-нирма-йоккъ назавида С С С
195. Пасть наволокъ (около Хибиныхъ горъ). Рэть няркъ.
196. Степановы горушки. Тяппендь ярм вул-сапад .401
197. Куаккенсъ наволокъ. Куакрысъ. Противъ Сявъ-
острова, на немъ стоитъ бълый крестъ). Въ Хибиныхъ горахъ.
198. Песчаный наволокъ. Уындыст-наркъ. и гло Т. 701
199. Высовій островъ (версть 6 — 7 въ окр.). Противъ
V/D 00:

самой высокой точки Хибиныхъ тундръ: Чахки-суолъ . 601

171. Чернухана губа, Нердъ-лухтъ Чернухинъ наводтож

200. Въ Хибиныхъ горахъ противъ Сякъ остр. Медвъжій

201. Къ югу отъ него Гангесій носъ-логъ. Лоудусъ ръка еще далее въ югулинами канонинан 202. Высокій мысъ (къ съверу, у подножія стоитъ станціонная изба, противъ Высокаго острова). Чахки-Суолы-нюнъ. 203. Середній логь; очень кругой. У выровочений до 222 204. Къ «Дверямъ» ведетъ Шестимежій логъ, по которому ходили легендарные «шиши». Юмья-Коръ. (Логъ-Коръ). 205. Гребене - утесистыя торы, въ Хибиныхъ тундрахъ, выходять на Долгій логь, къ Гольцову ручью; между ними приходится ущелье «Двери» Уксъ, т. е. узкое ущелье съ на-227. Островокъ Гальцовый. Влимканэмки имыннэджомодт 228. Свътлыя пактицы ниже предъимавиченаю . 306ыс.; 207. Бабій носъ. Аки-нюнъ версть 7 отъ избы. п-лоня ду р 229 Ровать салма. Раудь чуолиы вай аворако 7.802 230. Наволокъ Роватъ салмил живонови Тинаниви 2002 11 210. Паленый островъ Курбы-суолъ. Наискось Гальцовой ръки Паленыхъ острововъ 2. Одинъ южный около 100 саженъ въ окружности. Другой съверный большой, около 1 версты длины и около 3 верстъ въ окружности. 211. Чауны-Тундры. Ирвасій островъ полверсты въ окружн. 212. Айнъ-Деубъ-Няркъ-наволокъ, въ 8 верс. отъ Разнавол. 213. Противъ него Голецъ острова, 150 саж. въ окружн. 214. Коймостровъ (тамъ же) 2) версты въ окружи. 482 215. Вороньи Тундры-горы съ острыми ръзкими очертан. 216. Конъ-островъ 3 версты въ окружности. Кунъ-Суолъ. 217. Противъ него Румяный камень Наволокъ Румскіе Вътубу назадъ: дики-няркъ. 218. Красивая Губа. Анасъ-лухтъ около Разнаволова. 219. Красивый наволокъ Анасъ-няркъ. праднекаМ 782 238. Набная губа Пыртъ-лухтъ-нунчь / вполовен 888 Лоудусъ Тундра (по лѣвому берегу. быш-кіеды-няркъ. 239. Прамой берегь на 5 ве сренуТ, киндор пими в В к. .. Чуны Тундры, въ губъ, отъ средины озера 20 верстъ. За широкимъ логомъ начинаются Моняа Тундры, длинная

пъпь горъ; онъ кончаются низкими Нюда тундра. За низкимъ

242. Кунчишъ-губа, верстъ 5 длины. Кунчисъ-духтъ.

241. Кунчишъ-наволокт, моро имноров студи смоноковн

#### вавинская имандрад ат офтад орго

201 Es cer ora hero l'afrecia hoca-nora. Lovaves phra

- 202. Высовій мысь (къ сфверу, у полновів стоить стан-221. Начинается у Березоваго наволока Лысть-няркъщий
  - 222. Веревочная губка. Нуора-лухтъ от півдодо 802
- 223. Острововъ Веревочный. Нуора-суолъ.
  - 224. Гальцовыя пахты. Бдычь-пауты. эмпоминоток прикох
- 205. Гальцовый наволокъ. Вдычь-няркъ. внедей 1.00
- 226. Нахты Гольцовыя т. е. щелье т. е. Бараньи лбы до 10 севыс. Вдыньдичьть т. ступителье «Двери» Уксъ. т. ступительности
  - 227. Островокъ Гальцовый. Вдычь-соулынчъ-мын под жомост
- 228. Свътлыя пахтицы ниже предъидущихъ, саж. 20 выс.; 207. Бабій носъ. Аки-июнь версть 7 отъжинуви-конаду
  - 229. Роватъ салма. Раудъ чуолмычъны вношью 1 802
  - 230. Наволовъ Роватъ салмы. Раудъ-чуолмы-нярвъ
- 231. Островъ Роватъ верстъ 15 вругомъ. Высота почти такая же какъ и Высокій остр., что противъ Хибиныхъ. Рожень вы окружности Пругой сверный большой. Споуд Така

## 

- . 12. Айнь Деуба Наткук-кэпик Жуынсь-лукть Надуе Дений А. 212
- .н.ж. 233. Наволокъ Толстой. Кысь-няркълон авитод 1.812
- 234. Пальничный или Опаленый остр. Курбысъ суолнычъ, 215. Ворбили Тундры торы жмогуда 020 жжэ йнанасы
- 216. Конт-острольной жихтъ-кимсъ-суольоство ней вы

#### Въ губу назадъ:

- 236. Камка туба. З верст. Камка лухтъ.
- 237. Маленькій Камка остр. Камка суолынчь.
- 238. Наволовъ Конь-камень заканчиваетъ Камку-губу. Хя-Toygver Tyngar (no resemy bepery. быш-кіеды-няркъ.
- 239. Прямой берегъ на 5 вер. длины. Хябышкіеды-няркъ-Чуны Тундрыяцва губфо ота средины озора 20 вытнец
- 240. Островокъ Хябышъ-кіеды-суолынчъ т. е. Конькамендыь горжовь жончаются визкими Нюда тупдра, свостоский
  - 241. Кунчишъ-наволокъ. Кундичлусъ-няркъ. Дв. амологовън
  - 242. Кунчишъ-губа, верстъ 5 длины. Кунчисъ-лухтъ,

- 243. Ручей Кундислухтъ-віой. Ручьемъ этимъ кончается губа и поворотъ назадъ.
  - 244. Чеверезъ наволокъ. Чеверезъ лудняркъ. (Въ губу).
  - 245. Чеверезъ салма. Чеверезъ-лудъ-чуалме.
  - 246. Чеверезъ губа версть 6 глубины. Потомъ назадъ.
- 247. Пасма ръка впадаетъ съ зап. на вост., большая ръка верстъ 30 длины.

#### 276. Выступаська в недередей йом в д Пренты. Протикъ

- 248. Кожаный наволовъ. Нянгъ-гдыйбы-нярвъ. Противъ него -
- 249. Островъ Іормы верстъ 25 или 30 кругомъ. Выше Сырой Тундры.

На верху обнаженный изръзанный берегъ. Много губъ и наволоковъ.

- 250. Песчаный наволовъ на берегу Вундысъ тойбы-няркъ. Берегъ идетъ въ губовину.
  251. Вундысъ губа. Вундысъ-лухтъ.

  - 253. Вундысъ јокки. Рѣка Вундысъ. Горъ (тундръ и варакъ) наимено
  - 254. Оптлухтъ-няркъ.
  - 255. Палашкинъ наволокъ. Уппалакща-няркъ.
  - 256. Уппалакша губа. Уппалакша лухтъ.
  - 257. Островъ Оппа-суслъ.
- 258. Оппа лухтъ. Это сос. глубь или верховье губы, впад. ручеекъ Уппалакши и здёсь же Бабинскій погость въ 1 вер. отъ бер. Прямой берегъ тянется на 20 вер.
  - 259. Плавунный наволокъ дояв Н
  - 260. Куликовъ берегъ. Карака-рентъ.
- 261. Заясь остр. Хорть, Версть 7, 8 кругомъ. Высота нъсколько превосходить Высокій остр. Хортъ-суолъ.
  - 262. Куликовъ наволокъ. Карака-рентъ-няркъ.
  - 263. Еловый берегъ. Кусъ-суолы-рентъ. Противъ него.
  - 264. Еловый островъ. Кусъ-суолъ.
  - 265. Конга наволовъ. Верстъ 7 прямой берегъ,
  - 266. Конга салма. Конга чуальма,
  - 267. Коппе губа. Копга-лухтъ.

ΓŢ
. 1
ъ.
BE
r.a.
ВЪ
EI
Ĉ.
'n
М-
0-
TH.
ie
ъ
И
ь.
q
0
Н

Печатано по распоряженію С.-Петербургскаго общества Естествопспыта телей.

Спб., Тип. В. Демакова, Новый пер., д. № 7.

) переше

## Старое русло р. Колы.

