

Въ продажт имтются слъдующія работы

Ив. Шевырева.

Общій обзоръ жизни вредныхъ насткомыхъ и способовъ борьбы съ ними. СПБ. 1900. Ц. 50 коп.


Права первенства по вопросу о внекорневомъ питаніи. СПБ. 1904 г. Ц. 25 кон.

0 вредныхъ въ садоводствъ насъкомыхъ Харьковской губ. Бронзовки и Слоники. Харьковъ. 1890. Ц. 10 коп.

Монашенка и спутники ея въ лѣсахъ средней и восточной Россіи лътомъ 1894 г. СПБ, 1895. Ц. 10 коп.

Приложенія къ отчетамъ Лісному Департаменту:

- 1. Виткорневое питаніе больных деревьевъ. Съ 5 рисунками. СПБ. 1903. Ц. 30 коп.
- 2. Загадка коробдовъ. 3-е изданіе, исправленное и дополненное. Съ 70 рисунками. СПБ. 1910. Ц. 50 коп.
- 3. Паразиты и сверхпаразиты изъ міра насвкомыхъ. Вып. 1-й. Способы изследованія. Паразиты озимой ночницы. Съ 62 рисунками. СПБ. 1912. Ц. 75 коп.



Главное Управление З-ва и 🤝 З-лія. Лёсной Департаментъ.

Третье приложеніе къ отчетамъ Лъсному Департаменту по изслъдованію вредныхъ насъкомыхъ.

Ив. Шевыревъ.

ПАРАЗИТЫ и СВЕРХПАРАЗИТЫ

ИЗЪ МІРА НАСІБКОМЫХЪ.

выпускъ і.

Способы изслѣдованія. Паразиты озимой ночницы.

Les insectes parasites et hyperparasites

par Iv. Chewyreuv.

Изданіе автора при пособіи Лъсного Департамента

Съ 62 рисунками.

Типографія т-ва "Общественная Польз



7 19481 525 33 05

Jn. Cel. M. Jl. 46.

Главное Управленіе 3-ва и 💝 3-лія. Л'ёсной Департаментъ.

Третье приложеніе къ отчетамъ Лѣсному Департаменту по изслѣдованію вредныхъ насѣкомыхъ.

Ив. Шевыревъ.

ПАРАЗИТЫ и СВЕРХПАРАЗИТЫ ИЗЪ МІРА НАСІЬКОМЫХЪ.


выпускъ і.

Способы изслѣдованія. Паразиты озимой ночницы.

Les insectes parasites et hyperparasites par Iv. Chewyreuv.

Изданіе автора при пособіи Лѣсного Департамента.

Съ 62 рисунками.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія т-ва "Общественная Польза", СПБ., Б. Подъяческая, 39. 1912. 1973 г.

INTERNATIONAL CONTRACTOR AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE

ОГЛАВЛЕНІЕ.

- 172

									CTP.
Предисловіе									5
Часть первая.									
Способы изслъдованія.									
1. Непреодолимое затруднение									7
2. Новый путь									23
3. Наблюденія надъ живыми насткомыми									39
Часть вторая.									
Паразиты озимой ночницы.									
1. Два паниска.									
Охота и кладка									63
Живорожденіе у панисковъ									85
Гибель паразитовъ									94
Домашнее воспитаніе									100
Личинка зеленоглазаго паниска									110
Искусственное разведение паразитовъ .									116
Непредвидънный конецъ									122
Литературныя данныя			٠	٠		٠	٠		124
2. Эникоспилъ и офіонъ.									
Вскрытіе									134
1-я стадія			:	•	•	•	•		140
Имаго	•	•	•	•	•	•	•	•	142
		•	:	•			•	•	144
Скудость лабораторныхъ наблюденій.			•	•		•			149
Молодыя личинки			•		•	i	•		154
Сверхпаразиты						•	•	•	158
Обзоръ литературы							•	•	162
Основныя отличія.								•	102
	•	i	•	•	•	•	•	•	
3. Ихневмонъ и амблитэлъ.									
Путешествіе въ чемоданъ									171
Охота и смерть амблитэла									176
Помощь изъ Кіева									182
Личинка амблитэла									185
Охота и кладка ихневмона									191
Личинка ихневмона		•		•	•	•			199
4. Дополненіе къ живорожденію па	ни	CH	OE	ъ					204
Книжный указатель									213

OTHERRIE

THE SECTION OF SHARE STREET

. aryn Rusolf A

предисловіє.

Эта работа посвящена изученію жизни паразитныхъ насѣкомыхъ, главнымъ образомъ на вздниковъ, принадлежащихъ къ четыремъ большимъ семействамъ отряда пленчатокрылыхъ (Нутепоptera), а именно: Ichneumonidae, Braconidae, Chalcididae и Proctotrupidae. Сборъ матеріаловъ для работы и первыя попытки обрабатывать ихъ начаты были мною 30 лътъ назадъ, въ 1881 и 1882 годахъ, когда впервые, еще юнымъ студентомъ Харьковскаго университета, я занялся изученіемъ послѣзародышеваго развитія наѣздниковъ, какъ темой, заданной на медаль. Хотя послъднею и была тогда увънчана моя работа, но изъ нея напечатана только та часть, которая касалась мъстной фауны (71) 1), часть же, содержавшая описаніе явленій превращенія, не была опубликована. Къ счастью, у меня сохранились черновики этой работы и дневники того времени, а главное-значительная часть собранныхъ тогда и точно пом'вченныхъ матеріаловъ въ спирту и на булавкахъ. Съ обработки этихъ матеріаловъ я и началъ пять лътъ тому назадъ подготовку настоящей работы, послъ чего обратился къ матеріаламъ позднъйшихъ сборовъ.

Приступая къ работъ, я думалъ ограничиться описаніемъ новыхъ формъ, т. е. описаніемъ превращеній, которымъ подвергаются наъздники въ ихъ личинковомъ состояніи, но въ послъдніе годы обстоятельства сложились такъ благопріятно, что явилась возможность значительно расширить предълы намъченныхъ задачъ. Сначала я работалъ въ домашней обстановкъ, въ своей квартиръ, гдъ недостатокъ мъста очень ограничивалъ задачи моихъ работъ. Въ это время Русское Энтомологическое Общество оказало мнъ весьма существенную помощь, выразившуюся въ

⁴⁾ Стоящія въ скобкахъ цифры, набранныя жирнымъ шрифтомъ, указываютъ работу по списку, напечатанному въ концѣ книги; цифры, помѣщенныя въ тѣхъ же скобкахъ послѣ запятой, набранныя простымъ шрифтомъ, указываютъ страницы или таблицы этой работы.

предоставленіи мнѣ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ микроскопа и бинокуляра Цейсса и кромѣ того разрѣшило совершенно свободный доступъ къ богатой библіотекѣ Общества, за что приношу Совѣту Русскаго Энтомологическаго Общества мою глубокую благодарность.

Въ 1907 г. условія работы рѣзко измѣнились къ лучшему. Благодаря просвъщенному вниманію Директора Лъсного Департамента, А. Ф. Кублицкаго-Піоттухъ, была въ указанномъ году учреждена при постоянной комиссіи по лѣсному опытному дълу Энтомологическая Лабораторія Лъсного Департамента, завъдываніе которой было возложено на меня. Тогда явилась возможность продолжать начатую работу въ болъе широкихъ размфрахъ, приступивъ къ наблюденіямъ надъ живыми насфкомыми и надъ проявленіемъ у нихъ инстинкта. Черезъ годъ къ лабораторіи быль прикомандировань для помощи зав'єдывающему В. И. Плотниковъ, въ лицъ котораго я нашелъ очень цъннаго сотрудника, доставившаго для нея не мало новыхъ весьма интересныхъ матеріаловъ. Многое было получено при помощи завъдывающихъ энтомологическими станціями: въ Кіевѣ-профессора В. П. Поспълова и въ Тулъ-А. А. Сопоцько, а также отъ энтомолога Главнаго Управленія Удъловъ, К. Э. Демокидова и проф. И. К. Тарнани въ Новой Александріи, за что приношу всъмъ названнымъ лицамъ мою искреннюю благодарность; наконецъ, то же чувство благодарности я долженъ выразить извъстному знатоку систематики нашихъ наъздниковъ Н. Р. Кокуеву, въ Ярославлъ, опредълявшему всъхъ наъздниковъ (сем. Ichneumonidae и Braconidae), надъ которыми мнъ удалось произвести наблюденія.

Въ изложеній не нахожу возможнымъ придерживаться систематическаго порядка, такъ какъ матеріалы обрабатывались и обрабатываются по мѣрѣ ихъ поступленія и прежде всего живые матеріалы. Приведеніе въ систему результатовъ изслѣдованія можетъ быть сдѣлано въ концѣ работы, при выводѣ общихъ положеній, вытекающихъ изъ полученныхъ данныхъ.

Первая часть настоящаго выпуска была напечатана въ 10-й—12-й книжкахъ «Сельскаго Хозяйства и Лъсоводства» за 1911 годъ.

Оригинальные рисунки (кром'ь фотографическихъ) изготовлялись съ препаратовъ и непосредственно съ натуры, какърис. 22-й, 23-й и 24-й, В. В. Фаусекомъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Способы изслѣдованія.

1. Непреодолимое затруднение.

На прилагаемыхъ рисункахъ (рис. 1 и 2) изображена самка одного изъ на вздниковъ, называемаго пимплой. На заднемъ концъ брюшка ея находится длинный яйцекладъ, которымъ она прокалываетъ внъщній покровъ своей жертвы и вводитъ въ нее яичко. Фотографіи для рисунковъ сдъланы В. И. Плотниковы мъ въ то время, когда пимпла совершала кладку яйца въ предложенную ей куколку, завернутую въ мягкомъ не прозрачномъ коконъ. На рис. 1 она только что подогнула брюшко съ яйце-

кладомъ и уперлась остріемъ его въ куколку, а коготками лапокъ ухватилась за волокна кокона; на лѣвой части рис. 2 она погрузила яйцекладъ въ куколку уже до половины, а на правой части еще глубже—въ этотъ моментъ и должно пройти яйцо. Въ мѣстѣ отхожденія яйцеклада отъ брюшка, помѣченномъ на рисункѣ точкой и крестикомъ, находятся тонкія пленки, которыя натягиваются и приподымаются,



Рис. 1. Пимпла (Pimpla instigator L.), начинающая сверлить куколку, вложенную въ коконъ. (Слегка увеличено). Ориг.

какъ ясно замътное вздутіе, проходящимъ подъ ними яичкомъ, но этотъ моментъ не удалось уловить на фотографію.

Куколка послѣ отложенія въ нее яичка обнаруживаетъ въ теченіе нѣсколькихъ дней или недѣль признаки сохраняющейся въ ней жизни, т. е. если взять ее въ это время пальцами или пинцетомъ и слегка пожимать, то она тотчасъ же начинаетъ дергать въ разныя стороны концомъ брюшка совершенно такъ

какъ дѣлаютъ вполнѣ здоровыя куколки. Съ теченіемъ времени способность эта у зараженной куколки пропадаетъ и брюшко ея остается неподвижнымъ при всѣхъ раздраженіяхъ, между тѣмъ какъ у здоровой куколки отзывчивость брюшка на раздраженія сохраняется вплоть до выхода изъ нея бабочки.

Въ теченіе многихъ лѣтъ сохранялись у меня куколки разныхъ бабочекъ, здоровыя и зараженныя личинками паразитныхъ наѣздниковъ. Пользуясь только что указаннымъ признакомъ, т. е. подвижностью и неподвижностью брюшнаго конца куколокъ, я отбиралъ обыкновенно зараженныхъ отъ здоровыхъ. Часть зараженныхъ помѣщалъ въ пустыя коробочки и скляночки для вывода въ нихъ того наѣздника, личинки котораго заключались въ куколкахъ. Другую часть зараженныхъ куколокъ предусмотрительно клалъ въ спиртъ для того, чтобы впослѣдствіи разсмотрѣть и описать заключающихся въ нихъ личинокъ наѣздника, выходъ котораго ожидался изъ куколокъ, положенныхъ въ пустыя баночки. Дѣйствительность, однако, каждый разъ спу-



Рис. 2. Положеніе пимплы передъ прохожденіемъ яйца. (Ест. велич.).

тывала мои расчеты. Изъ куколокъ, отложенныхъ для вывода паразита, никогда не выходилъ одинъ видъ наѣздника, а всегда ихъ было нѣсколько—2, 3, 4 вида и болѣе. При такомъ разнообразіи полученныхъ видовъ оказывалось совершенно невозможнымъ рѣ-

шить не только правильно, но даже съ какой нибудь долей въроятности, какому изъ полученныхъ видовъ соотвътствуетъ та или другая изъ личинокъ, сохранявшихся въ заспиртованныхъ куколкахъ.

Былъ, напримѣръ, такой случай. Собралъ я однажды болѣе сотни зараженныхъ куколокъ бабочки-боярышницы (Aporia crataegi L.) и около трети ихъ положилъ тогда же въ спиртъ, чтобы зимою, когда будетъ свободнѣе, изслѣдовать ихъ содержимое, а изъ остальныхъ куколокъ вывелъ въ теченіе лѣта три вида наѣздниковъ. Разсмотрѣвъ зимою заспиртованныхъ въ куколкахъ личинокъ, я нашелъ, что ихъ можно раздѣлить тоже на три партіи: у однѣхъ замѣтенъ близъ середины верхней челюсти, на внутренней сторонѣ ея, тонкій острый зубецъ, отдѣленный отъ челюсти округленной выемкой (рис. 3, 6);

у другой группы личинокъ тоже есть зубецъ на томъ же мѣстѣ, но тупой, короткій и безъ указанной округлой выемки (рис. 3,a); наконецъ, у личинокъ третьей партіи на внутреннемъ краю верхней челюсти нѣтъ никакого зубца (рис. 3,o).

Конечно, каждая изъ этихъ трехъ партій личинокъ соотвѣтствуетъ какому нибудь изъ трехъ видовъ вышедшихъ наѣздниковъ. Но какому какая? Разрѣшить этотъ вопросъ было совершенно невозможно. Куколка бабочки, изъ которой вышелъ наѣздникъ, уже не содержитъ его личинки, ибо эта превратиласъ въ вышедшаго наѣздника, а потому и нельзя сказать, какая она была—съ зубцемъ на челюсти или безъ зубца, и если съ зубцомъ, то съ тупымъ или съ острымъ. Съ другой стороны, заспиртованныя личинки, хотя я и нашелъ способъ отличать ихъ




Рис. 3. Верхнія челюсти (mandibulae) взрослыхъ личинокъ трехъ видовъ навздниковъ. Увелич. около 100 разъ. Оригин.

другъ отъ друга, тоже ничего рѣшающаго въ данномъ отношеніи не говорятъ, да никогда и не скажутъ, такъ какъ взрослые наѣздники, по которымъ только и можно было бы опредѣлить виды этихъ личинокъ, не вышли изъ нихъ и никогда не выйдутъ, ибо личинки уже мертвы.

Въ другомъ случаѣ, когда въ заспиртованныхъ куколкахъ можно было различать личинокъ тоже трехъ видовъ, изъ куколокъ, оставленныхъ на выводъ, вышли наѣздники только двухъ видовъ. Звѣсь, стало быть, третій видъ вслѣдствіе случайности весь попалъ въ спиртъ, будучи въ личинковомъ состояніи, и эти личинки третьяго, не давшаго взрослой формы, вида еще болѣе спутали отношенія. Къ каждому изъ двухъ вышедшихъ видовъ съ одинаковымъ правомъ могла быть отнесена каждая изъ трехъ формъ личинокъ, сохраненныхъ въ спирту.

Въ такомъ безвыходномъ положеніи я находился много разъ, несмотря на мою благоразумную предусмотрительность, выражавшуюся въ предварительномъ помъщении части зараженныхъ куколокъ въ спиртъ. Надо было искать иного выхода изъ даннаго положенія. Тогда я сталъ осторожно вскрывать зараженныхъ куколокъ, для чего выбиралъ тъхъ изъ нихъ, которыя не только потеряли способность движенія, но у которыхъ гибкость брюшка совершенно утратилась. Потеря подвижности и гибкости брюшка у зараженныхъ наъздниками куколокъ совершается обыкновенно въ слъдующемъ порядкъ. Сначала, пока паразитъ молодъ и малъ, пока онъ еще не причинилъ существеннаго вреда своему хозяину, т. е. куколкъ, эта, какъ было сказано, столь же отзывчива на пожиманія, какъ и всякая здоровая куколка. Поэтому, когда я дълалъ вышеописанный отборъ здоровыхъ отъ зараженныхъ куколокъ, часто случалось, что спустя недълю или двъ послъ раздъленія ихъ, при новомъ пересмотръ куколокъ, признанныхъ здоровыми, снова находилъ въ числѣ ихъ такихъ, которыя потеряли способность двигать брюшкомъ. Это произошло потому, что въ теченіе протекшаго времени паразитная личинка въ куколкъ подросла и истощила организмъ своего хозяина настолько, что онъ уже потерялъ силы отвѣчать на раздраженія движеніемъ брюшка. Однако, внутреннія ткани куколки и стѣнки ея тѣла въ это время еще настолько свъжи и гибки, что брюшко легко поддается насильственному сгибанію, послѣ чего остается неподвижнымъ въ томъ положении, какое ему придастъ внъшняя сила. Здоровая же куколка тотчасъ выпрямляетъ конецъ брюшка, какъ только сила, сгибавшая его, прекращаетъ свое дъйствіе. При дальнъйшемъ развитіи паразитной личинки, когда она достигаетъ полнаго роста, всъ соки куколки переходятъ въ организмъ паразита и внутри ея можно найти въ это время лищь ничтожные остатки кое-какихъ органовъ, которые подсыхаютъ, какъ и стънки куколки. Въ это время брюшко уже не поддается сгибанію, а если усиленно надавливать на него, то ломается. Особенно сильно затвердъвають стънки выъденной куколки послъ того, какъ паразитная личинка изготовитъ въ ней свой коконъ, въ которомъ окукливается, причемъ часто членики брюшка куколки растягиваются и тогда она дълается замътно длиннъе здоровыхъ куколокъ.

Вотъ такихъ совершенно затвердѣвшихъ куколокъ я и беру теперь для вскрытія. Паразитныя личинки въ нихъ вполнѣ за-

кончили свой ростъ и кормленіе, имъ остается только окуклиться, чтобы превратиться потомъ во взрослыхъ крылатыхъ на вздниковъ, а это, я полагаль, онъ могуть совершить и внъ своихъ хозяевъ. Поэтому я вскрываю осторожно такихъ куколокъ, вынимаю находящихся въ нихъ личинокъ и стараюсь разсмотръть, не умерщвляя и не повреждая ихъ, отличающіе ихъ признаки. Записываю таковые и соотвътственно занумеровываю личинокъ и описанія, послѣ чего кладу личинокъ или обратно въ куколки, изъ которыхъ вынулъ, или въ пустыя скляночки, заткнутыя комочкомъ слегка увлажненной ваты. Надъюсь, что при такихъ условіяхъ онъ пройдутъ спокойно свое дальнъйше развитіе, для котораго имъ нътъ надобности въ кормъ, и превратятся въ наъздниковъ. Теперь-то я буду знать, изъ какихъ личинокъ какіе выходять нафздники, такъ какъ признаки личинокъ замъчены и записаны мною. Но, увы! и на этотъ разъ успъхъ былъ только въ немногихъ случаяхъ и лишь частичный.

Въ значительномъ большинствъ случаевъ вынутыя изъ куколокъ личинки постепенно сохли и превращались въ трупы, и только изръдка онъ окукливались и превращались во взрослыхъ наъздниковъ. Приведу для примъра два случая: взрослыя личинки наъздниковъ пимплы и тероніи (Pimpla, Theronia) часто переносили благополучно переселеніе изъ куколокъ въ стеклянный цилиндрикъ, но личинки наъздниковъ ихневмона и аномалона (Ichneumon, Anomalon), будучи вынуты изъ куколокъ, въ которыхъ онъ паразитировали, ни разу не окуклились, не смотря на многочисленныя мои попытки добиться этого 1).

Такъ обстоитъ дѣло со взрослыми личинками наѣздниковъ. Еще въ худшее положеніе попадаетъ изслѣдователь, желающій ознакомиться съ молодыми стадіями ихъ развитія — съ личинками, которымъ надо еще кормиться. Въ этомъ случаѣ безъ вскрытія хозяина, т. е. гусеницы или куколки, содержащей па-

⁴⁾ Бертумье, авторъ новъйшей капитальной монографіи о навздникахъ рода ихневмонъ и близкихъ къ нему, говоритъ, что личинки этихъ навздниковъ легко переносятъ такое переселеніе. Однако, онъ не указываеть ни одного примъра изъ собственной практики, а ссылается на успѣшный опытъ Дю Бюисона (R. du Buysson) съ личинкою одного вида рода ихневмона (Ichneumon rubens Fons.), причемъ даетъ, со словъ только что названнаго наблюдателя, ея описаніе и изображеніе, относительно которыхъ будетъ показано мною въ своемъ мѣстѣ, что какъ то, такъ и другое, совершенно невърны (5, 257).

разита, нельзя обойтись, но при этомъ, какъ выражается Бе ртумье, однимъ ударомъ будутъ убиты и паразитъ и его жертва. Притомъ, какъ распознать съ увъренностью, продолжаетъ тотъ же авторъ, что найденная внутри личинка принадлежитъ тому, а не другому наъзднику? Существуетъ для этого только одно практическое и удобное средство—наблюдать гусеницу или куколку, зараженную въ неволъ той или другой самкой заранъе извъстнаго паразита, «но этотъ способъ былъ испытанъ и не далъ результатовъ, на какіе надъялись» — поясняетъ названный ученый (5, 256).

Создался такимъ образомъ заколдованный кругъ, изъ котораго нътъ выхода. Создалось безвыходное положение, въ которое попадалъ всякій изслѣдователь, пытавшійся изучить и описать натадниковъ въ личинковомъ состояніи. Конечно, я имъю въ виду при этомъ только тъхъ изъ наъздниковъ, личинки которыхъ живутъ внутри непрозрачныхъ жертвъ. Внъшній паразитъ, высасывающій своего хозяина снаружи, проводитъ всю жизнь на глазахъ наблюдателя, который поэтому можетъ совершенно безпрепятственно слъдить за всъмъ его развитіемъ, начиная отъ яйца и до превращенія во взрослаго на вздника. Значительно облегчается дёло наблюдателя и въ томъ случае, когда паразитъ находится внутри прозрачнаго хозяина (напримъръ, въ личинкъ Cecidomyia, въ яичкахъ водныхъ насъкомыхъ и др.), сквозь покровы котораго легко наблюдать все, что дълается внутри. Такіе прим'тры, однако, р'тдки. Въ громадномъ большинствъ случаевъ покровы хозяевъ остаются совершенно непроницаемыми для взоровъ наблюдателя.

Казалось бы, что возможно еще одно сочетаніе условій, при которомъ наблюдатель могъ бы дать описаніе личинки паразитнаго наѣздника, жившей внутри хозяина. Я подразумѣваю ту личинку, которая развивается не въ куколкѣ, а въ гусеницѣ, и которая, по окончаніи развитія, выходитъ изъ гусеницы наружу, прорывая для этого ея кожу, послѣ чего дѣлаетъ себѣ рядомъ съ трупомъ жертвы коконъ и въ немъ окукливается. Здѣсь имѣется моментъ свободной жизни паразитной личинки— между моментомъ выхода ея изъ гусеницы и моментомъ закоконированія, время, продолжительность котораго измѣряется иногда цѣльми часами, чего вполнѣ достаточно для подробнаго осмотра личинки и для составленія ея описанія. Однако, и такимъ путемъ сдѣланныя описанія въ энтомологической литературѣ крайне

рѣдки и не полны. Зависить это отъ того, что нѣтъ вполнѣ достовѣрныхъ внѣшнихъ признаковъ, по которымъ можно было бы заранѣе отличить гусеницу, содержащ ую въ себѣ паразита отъ здоровой гусеницы, чтобы взять зараженную домой и подвергнуть ее наблюденіямъ. Только одинъ способъ для этого и существуетъ—вскрыть гусеницу, но тогда погибнетъ и она и ея паразитъ. Опять тотъ же заколдованный кругъ, что съ кукол-ками.

Необходимымъ слѣдствіемъ всего вышеизложеннаго является заключеніе, что въ энтомологической литературѣ не могутъ существовать изображенія и описанія личинокъ тѣхъ наѣздниковъ, которые развиваются внутри хозяевъ, за исключеніемъ вышеуказанныхъ отдѣльныхъ случаевъ. Однако, если мы обратимся къ энтомологическимъ книгамъ, то должны будемъ признать только что высказанное заключеніе несогласнымъ съ дѣйствительностью, такъ какъ съ давнихъ временъ появлялись и появляются подобныя изображенія и описанія и даже не въ маломъ числѣ. Тѣмъ не менѣе воздержимся пока отъ признанія нашего вывода неправильнымъ. Разсмотримъ сначала критически то, что даютъ книги по данному вопросу, а потомъ уже обсудимъ правильность сдѣланнаго заключенія.

Дъло вотъ въ чемъ. Ознакомленіе съ большимъ количествомъ личинокъ наъздниковъ, прошедшихъ черезъ мои руки, показало мнъ, что всъ существующія въ книгахт изображенія и описанія ихъ могутъ быть раздълены по отношенію къ ихъ достовърности на три отдъла, насколько это касается вышеотграниченной области внутренностныхъ паразитовъ. Въ первый отдъль войдутъ такія описанія, которыя даютъ только общія черты, одиваково приложимыя къ большинству личинокъ не только на-

*вздниковъ, но и другихъ семействъ отряда пленчатокрылыхъ насѣкомыхъ. Это — схематическія изображенія и описанія, не заключающія въ себѣ ничего характернаго для личинокъ наѣздниковъ и столь же подходящія къ личинкамъ всякихъ осъ и пчелъ. Для поясненія сказаннаго приведу два примѣра, заимствованные изъ французской и американской энтомологической литературы.



Рис. 4. Варослая личинка навадника ихневмона (*Ichneumon rubens* Fons.), по Ветthои mieu.

Авторъ вышеназванной капитальной работы о европейскихъ наъздникахъ, Бертумье, даетъ изображение личинки одного

изъ видовъ рода ихневмонъ (*Ichneumon rubens* Fons.), воспроизведенное мною на рис. 4-мъ (5, tb. 9, f. 3), а другой американскій, очень извъстный энтомологъ, Рэйли, далъ изображеніе одного изъ видовъ рода офіонъ (*Ophion*), перепечатанное

мною на рис. 5-омъ (45, 108). Разсматривая эти изображенія, всякій энтомологъ, сколько нибудь знакомый съ личинками пленчатокрылыхъ насѣкомыхъ, согласится съ тѣмъ, что, если исключить одну подробность перваго рисунка, о которой будетъ




Рис. 5. Взрослая личинка навздника офіона (Ophion macrurum. L.), но Riley.

сказано ниже, то подъ ними можно подписать съ одинаковымъ правомъ названія личинокъ большинства на вздниковъ, осъ и пчелъ. Эти изображенія подходятъ къ нимъ одинаково, такъ какъ не заключаютъ въ себѣ ни одной частности и не выходятъ изъ области схемы, т. е. общихъ очертаній. Рисунокъ Рейли избранъ мною ради имени названнаго ученаго, пользующагося въ энтомологіи вполнѣ заслуженной почетной извѣстностью, но онъ взятъ изъ работы, напечатанной въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія, и пожалуй, нынѣ можетъ быть разсматриваемъ, какъ устарѣвшій. Поэтому привожу для сравненія одинъ изъ новѣйшихъ рисунковъ, напечатанный въ 1909 году въ работѣ итальянскаго ученаго д-ра Мартелли (33, 256), изображающій, какъ подъ нимъ




Рис. 6. Варослая личинка паниска (Paniscus testaceus Grav.), по Martelli.

подписано, личинку наѣздника паниска (рис. 6). Сравнивая эти оба рисунка, мы можемъ съ полнымъ правомъ сказать, что названія насѣкомыхъ, подписанныя подъ ними, могутъ быть перемѣщены одно на мѣсто другого безъ всякаго ущерба для ясности и понятности изображеній и того,

что они должны изображать. Можно было бы привести еще много примъровъ подобнаго рода изображеній, разсыпанныхъ въ энтомологическихъ работахъ разныхъ авторовъ, какъ старыхъ, такъ и новъйшихъ, но двухъ приведенныхъ, принадлежащихъ наиболъе авторитетнымъ ученымъ, я полагаю, достаточно. Понятно, что такія изображенія сопровождаются часто и соотвътствующими описаніями, т. е. такими, которыя ничего опредъленнаго не описываютъ.

Ко второму отдълу я отнесу немногія изображенія и описанія, въ которыхъ сдъланы попытки дать указанія на тѣ или другія особенности, свойственныя изображаемому роду или виду, но которыя, по сравненіи ихъ съ моими матеріалами, оказались не соотвътствующими дъйствительности. Приведу нъсколько поясняющихъ примъровъ изъ нъмецкой и американской литературы, но сначала скажу нъсколько словъ по поводу вышеприведеннаго рисунка 4-го.

Если мы попробуемъ опредълить по этому рисунку число и порядокъ размъщенія дыхалецъ, т. е. дыхательныхъ отверстій, изображенной личинки, такъ называемыхъ стигматъ (маленькіе кружочки по бокамъ тъла личинки), то должны будемъ сказать, что ихъ у личинки тт паръ и что первыя двъ пары сидятъ на межтульъ и затульъ, т. е. на 2-мъ и 3-мъ кольцахъ туловища, а остальные 9 паръ помъщаются на слъдующихъ за туловищемъ брющныхъ кольцахъ, какъ и сказано въ описаніи разбираемаго автора. Въ дъйствительности же взрослыя личинки

рода ихневмонъ имѣютъ только 9 паръ дыхалецъ, какъ это свойственно взрослымъ личинкамъ большинства насѣкомыхъ, причемъ 1-ая пара дыхалецъ помѣщается на предтульѣ, т. е. на 1-мъ кольцѣ туловища, вслѣдъ за головой, а прочія 8 паръ на первыхъ 8 брюшныхъ кольцахъ; нѣтъ, слѣдовательно, дыхалецъ на межтульѣ и затульѣ и на послѣднемъ, 9-мъ, кольцѣ брюшка. По этой причинѣ изображеніе и описаніе, данныя Бертумье, должны быть отнесены къ обѣимъ намѣченнымъ категоріямъ: они схематичны и невѣрны.



Рис. 7. Головка взрослой личинки навздника пимпла (Pimpla inquisitor Say), по Howard.

Къ разсматриваемой второй категоріи существующихъ изображеній и описаній должны быть отнесены, напримѣръ, два рисунка, данные извѣстнымъ американскимъ энтомологомъ Говардомъ. На одномъ (25, 9), который воспроизведенъ здѣсь на рис. 7, изображенъ головной конецъ личинки наѣздника—пимпла (Pimpla inquisitor Say), и на немъ хорошо видны верхнія челюсти этой личинки, одна изъ которыхъ отмѣчена мною буквою—а. Челюсти эти, судя по рисунку, очень короткія и сидятъ въ углахъ рта на далекомъ разстояніи одна отъ другой, такъ что концы ихъ не только не соприкасаются, но между ними значительный промежутокъ, по длинѣ превосходящій длину

каждой челюсти. Такое устройство и расположеніе верхнихъ челюстей, дъйствительно, встръчается у личинокъ нъкоторыхъ наъздниковъ, напр., у тъхъ, которые относятся къ групцъ офіоновъ (Ophionini), какъ это будетъ показано мною впослъдствіи, но у личинокъ пимплъ (Pimplini) верхнія челюсти настолько длинны, что не только достигаютъ своими концами одна другой, но даже перекрещиваются. Поэтому я увъренъ, что если бы Говардъ далъ возможность той личинкъ, съ которой сдъланъ этотъ рисунокъ, превратиться во взрослаго наъздника, то она превратилась бы не въ того, названіе котораго подписалъ подъ рисункомъ его авторъ.

Въ той же работъ названный ученый далъ (25, 35) сильно увеличенное изображеніе личинки очень мелкаго на вздникадибрахиса (Dibrachys boucheanus Rtzb.). На этомъ изображеніи не видно ни одного дыхальца, какъ будто бы личинка совствиъ ихъ не имъетъ, а между тъмъ они у нея есть, и при томъ большомъ увеличеніи, при какомъ изображена личинка, они должны быть ярко видны; ничего не говорится о дыхальцахъ и въ описаніи, сопровождающемъ рисунокъ. Дізло въ томъ, что расположеніе дыхалецъ у взрослыхъ личинокъ на вздниковъ семейства толстоножекъ (Chalcididae), къ которому принадлежитъ дибрахисъ, очень своеобразно и, какъ будетъ указано впослъдствіи, даетъ возможность сразу узнавать ихъ и отличать отъ личинокъ другихъ, близкихъ семействъ. Дыхальца у нихъ въчислъ 9 паръ расположены на межтульъ и затульъ, т.-е. на 2-мъ и 3-мъ кольцахъ туловища, и на 7 первыхъ кольцахъ брюшка; слѣдовательно, не имъютъ дыхалецъ: предтулье и 2 послъднія кольца брюшка. Вотъ этой особенности Говардъ и не воспроизвелъ на своемъ рисункъ, а потому рисунокъ его не совпалъ съ дъй-

Къ той же категоріи рисунковъ, лишь отчасти вѣрныхъ, я долженъ отнести два очень извѣстныхъ рисунка знаменитаго нѣмецкаго ученаго Рацебурга, которые со времени своего первоначальнаго появленія въ литературѣ, въ 40 годахъ прошлаго столѣтія, много разъ перепечатывались въ позднѣйшихъ зоологическихъ и энтомологическихъ учебникахъ и руководствахъ. На нашемъ рисункѣ 8-мъ перепечатаны данныя Рацебурго мъ (40, 1, 80—87, tb. IX, fig. 11—20) изображенія молодыхъ личинокъ наѣздника-аномалона (Anomalon circumflexum L.). Происхожденіе этихъ личинокъ и ихъ изображеній слѣдующее.

Рацебургъ производилъ изслъдование молодыхъ гусеницъ сосноваго шелкопряда, залегавшихъ на зиму въ почвенномъ по-



Рис. 8. Молодыя стадіи развитія личинки наївдника аномалона (Anomalon circumflexum L.), по Ratzeburg.

кровъ, и нашелъ въ нихъ личинокъ паразитныхъ наъздниковъ двухъ сортовъ (42, 147 — 148). Однъ личини были находимы въ гусеницахъ большими сообществами, по нъсколько десятковъ



и даже болье 150 личинокъ въ одной гусениць, другія же попадались по одиночкъ: по одной, по деъ и очень ръдко по три личинки въ одной гусеницъ. Первыхъ Рацебургъ отнесъ всъхъ къ навзднику микрогастеру (Microgaster globatus L.), а вторыхъ, т. е. одиночныхъ, къ одному виду на вздника-аномалона (Апотаlon circumflexum L.) и совътуетъ относить къ этому виду даже и тъхъ личинокъ, найденныхъ при подобномъ изслъдованіи, которыя имъютъ совершенно иную внъшность, ибо личинка этого вида въ первой стадіи выглядитъ, по его объясненію, со-



Рис. 9. Взрослая личинка того же навздника; 18съ боку, 19-съ брюшной стороны и 20-головной конецъ и ротовыя части, no Ratzeburg.

вершенно иною, чтмъ въ последующихъ стадіяхъ. Затъмъ дано было и поясненіе, что такъ слѣдуетъ поступать несмотря на то, что уже въ его время найдено было болѣе 40 видовъ наѣздниковъ, паразитирующихъ въ разныя времена года на счетъ сосноваго шелкопряда, ибо въ значительномъ количествъ встръчаются въ зимующихъ гусеницахъ только два вышепоименованные вида. Сдълавъ послѣднее, совершенно произвольное, допущение, Рацебургъ подвергъ себя риску приписать названнымъ на вздникамъ чуждыхъ имъ личинокъ. Принявъ это во вниманіе, можно было впередъ сказать, что въ данныхъ рисункахъ должны быть неточности. Къ тому же ему не удалось наблюдать линьки, путемъ которой каждая изъ нарисованныхъ личинокъ переходила бы въ другую, а

• безъ этого наблюденія, удостов ряющаго связь между разными формами личинокъ, соединение ихъ на рисункъ и въ описаніяхъ, какъ разныя стадіи личинокъ одного вида, является совершенно искусственнымъ.

Дъйствительность вполнъ подтвердила правильность только что сдъланнаго вывода. При моихъ изследованіяхъ паразитовъ зимующихъ гусеницъ сосноваго шелкопряда, которыя будутъ изложены въ другомъ мъстъ, я имълъ возможность убъдиться, что рацебурговская фигура 15-я (рис. 8) представляетъ собою головку 1-й стадіи личинки натадника метеора (Meteorus versicolor Wsm.) и никакого отношенія къ превращеніямъ аномалона

не имъетъ. Что касается фигуръ 11, 12, 14 и 16, то возможно, что они относятся къ разнымъ видамъ рода аномалона, но также и къ видамъ группы офіоновъ, имъющихъ подобныхъ же личинокъ, а въ гусеницахъ сосноваго шелкопряда паразитируютъ на вздники этой группы, что было извъстно и Рацебургу, указывающему нъсколько такихъ видовъ (40, III, 257) 1). Наконецъ, фигуры, представленныя на нашемъ рис. 9-мъ, върны лишь отчасти, такъ какъ на фигуръ 20-й показано довольно большое разстояніе между концами верхнихъ челюстей, а въ дъствительности челюсти эти налегаютъ концами одна на другую; на фигуръ же 18-й не изображено ни одного дыхальца и въ описаніи личинки ничего не сказано о ихъ существованіи, а между тъмъ личинка эта имфетъ ихъ въ числф 9 паръ.

То же приходится сказать и о другомъ, не менъе извъстномъ, рисункъ Рацебурга, изображающемъ личинокъ микрогастера (40, I, 62, tb. IX f. 26-32). Здѣсь, а также и въ описаніи, взрослой личинкѣ этого наѣздника приписано 7 паръ дыхалецъ, помъщающихся на первыхъ семи кольцахъ брюшка, а въ дъйствительности у нея ихъ 8 паръ, изъ которыхъ одна пара, не зам'вченная авторомъ, пом'вщается на межтульъ. 2) Далъе, верхнія челюсти у этой личинки на концахъ пилообразно зазубрены, а на рисункъ Рацебурга онъ изображены гладкими. Неправильны изображенія и прочихъ ротовыхъ частей, напр., не показаны хорошо развитыя двухчленистыя щупальца на нижней губъ и на нижнихъ челюстяхъ. Наконецъ, при опредъленіи вида, къ которому относятся разбираемыя изображенія. мы находимъ у Рацебурга самыя неопредъленныя указанія. Въ одномъ мѣстѣ своей книги (40, 62) онъ называетъ его Micro-

2) Этотъ недостатокъ указанъ былъ еще въ 1865 г. докторомъ Реингардомъ (44, 204) и подтвержденъ Сёра (Seurat), а позднъе

провъренъ мною.

¹⁾ Въ новъйшемъ общемъ обзоръ жизни насъкомыхъ, которое сдълано въ книгъ д-ра Шарпа "Насъкомыя", сообщается по поводу превращеній аномалона: "конечно, весьма возможно, что четыре стадіи устанавливаемыя Рацебургомъ, въ дъйствительности вовсе и не выражають истиннаго числа происходящихъ у этого вида линекъ. Не можеть быть, однако, никакого сомнёнія лишь относительно того, что вев наблюдавшіяся имъ формы личинокъ были, действительно, различными фазами одного и того же вида (70, 411]. Мы видъпи, что сомиъніе не только могло, но и должно было быть и что правильность его вполнъ подтверждается дъйствительностью.

gaster nemorum Hrtg., въ другомъ же (40, 71) — M. ordinarius Rtzb., а изъ другой его работы, написанной позднѣе (42, 148) мы узнаемъ, что это былъ M. globatus L.

Казалось бы, можно зам'втить, что едва ли видовыя отличія могуть распространяться на личинокъ на'вздниковъ, но на это могу сообщить, что такія отличія найдены мною и будуть указаны для личинокъ н'вкоторыхъ видовъ н'всколькихъ родовъ (напр., въ родахъ: Ichneumon, Pimpla и Anomalon), а раньше меня видовыя отличія были указаны для личинокъ рода Platygaster (Ганинъ, Р. Магсhal). Въ настоящемъ случа'в в'вроятность нахожденія такихъ отличій усиливается т'ємъ обстоятельствомъ, что три вида, названные Рацебургомъ, отнесены посл'є него къ двумъ различнымъ родамъ, причемъ посл'єдній изъ вышепомиенованныхъ видовъ остался въ род'є микрогастеръ, а два первыхъ перешли въ новый родъ (Apanteles). Стало быть, зд'єсь уже возможно нахожденіе у личинокъ и родовыхъ отличій.

Чтобы покончить съ рисунками, отнесенными мною ко второй категоріи, остается разсмотрѣть рисунки англійскаго ученаго Ньюпорта, изображающие особенности внъшняго и внутренняго строенія личинокъ на вздника-ихневмона (Ichneumon atropos Curt.), добытыхъ имъ изъ куколоыъ бабочки-бражника (Sphinx ligustri L.) (35, 85, tab. IX). На его рисункахъ изображена взрослая личинка и ея части при такомъ сильномъ увеличеніи, при которомъ хорощо видны не только нервные узлы и перемычки, но и тончайшія въточки, идущія отъ нихъ; изображены и другіе, столь же мелкіе органы, но на существованіе дыхательныхъ отверстій нѣтъ и намека. Не сказано о нихъ ни слова и въ описаніи. Можно подумать, что эта личинка совершенно лишена дыхалецъ, а между тъмъ она имъетъ ихъ въ числь 9 паръ. Что касается изображенныхъ Ньюпортомъ болбе молодыхъ личинокъ ихневмона, то я думаю, что они доизвъстной степени върны, но, вспоминая о томъ, что изъ личинокъ, служившихъ для этихъ изображеній, взрослые на вздники не вывелись, опасаюсь, что не вст шансы находятся на сторонть, признающей данныя изображенія правильными.

Итакъ, подводя общій итогъ тому, что даютъ намъ описанія и рисунки двухъ разсмотрѣнныхъ категорій, приходится сказать что лишь въ лучшихъ, очень немногихъ, случаяхъ они изображаютъ личинокъ в ѣ р о я т н о тѣхъ наѣздниковъ, названія которыхъ подъ ними подписаны. Полной достовѣрности здѣсь нѣтъ,

ибо ни одинъ авторъ не можетъ поручиться за то, что личинки, служившія ему для изображеній и описаній, вынутыя для того изъ кормившихъ ихъ хозяєвъ, а потому погибшія, непремѣнно превратились бы въ того наѣздника, который вывелся изъ личинокъ, оставшихся въ нетронутыхъ хозяєвахъ. Безъ такого ручательства нѣтъ научной точности, а потому приходится признать, что вполнѣ достовѣрныхъ изображеній и описаній личинокъ наѣздниковъ, живущихъ внутри непрозрачныхъ хозяєвъ, въ особенности же ихъ молодыхъ стадій, въ разсмотрѣнной нами до сихъ поръ литературѣ не существуетъ.

Перейдемъ, наконецъ, къ третьей категоріи существующихъ изображеній и описаній. Сюда я отношу тъ изъ нихъ, которыя были сдъланы съ личинокъ, полученныхъ отъ опредъленныхъ самокъ, жившихъ въ неволѣ и клавшихъ яички въ непрозрачныхъ хозяевъ на глазахъ наблюдателя, послъ чего эти хозяева вскрывались въ опредъленные сроки и добытыя изъ нихъ паразитныя личинки служили для описаній и рисунковъ. При такихъ условіяхъ возрастъ изображенной личинки и принадлежность ея къ тому или другому виду наъздника могутъ быть указаны съ полной точностью. Однако, если мы обратимся къ литературъ и поищемъ въ ней работъ, произведенныхъ только-что указаннымъ способомъ, то увидимъ, что количество ихъ ничтожно. До последнихъ леть ихъ было такъ мало, что могла быть сказана въ научной работъ та фраза французскаго ученаго Вертумье, которую мы приводили раньше, а именно что этотъ способъ (наблюденія надъ самкой въ неволъ) былъ испытанъ, но не далъ тъхъ результатовъ, какихъ отъ него ожидали. Послъ того какъ напечатана была эта фраза, появились работы Сёра (50, 60), П. Маршаля (29, 257) и Сильвестри (51, 17), въ которыхъ названные ученые съ превосходнымъ искусствомъ примънили этотъ способъ для того, чтобы прослъдить и описать всъ стадіи развитія 3-4 видовъ микроскопически малыхъ на вздниковъ, развивавшихся внутри тлей, гусеницъ и другихъ непрозрачныхъ хозяевъ.

Прибавимъ къ этимъ матеріаламъ то, что даютъ работы, въ которыхъ прослѣжено развитіе наѣздниковъ внутри прозрачныхъ хозяевъ, каковы, напримѣръ, личинки комарниковыхъ мухъ (Cecidomyia), минирующія гусеницы (Lithocolletis, Simaëthis), и яички водныхъ насѣкомыхъ, и мы получимъ полную картину того, что сдѣлано по изученію личинокъ наѣздниковъ, паразитирующихъ

внутри хозяевъ. По приблизительнону подсчету, который былъмною произведенъ, число видовъ такихъ наѣздниковъ ¹) не превосходитъ трехъ десятковъ, изъ которыхъ ²/₃ приходится на долю микроскопически малыхъ формъ (сем. Proctotrupidae и Chalcididae) и ¹/₃ на долю болѣе крупныхъ наѣздниковъ (сем. Braconidae и Ichneumonidae). Если принять во вниманіе, что перечень только однихъ названій существующихъ видовъ наѣздниковъ занимаетъ въ извѣстномъ каталогѣ Дала Торре (Dalla Torre) нѣсколько томовъ, то, конечно, придется согласиться съ тѣмъ, что число точно описанныхъ личинокъ разсматриваемой категоріи ничтожно.

Установление такого взгляда на то, что даетъ литература по данному вопросу, очень важно въ виду необходимости делать научныя, т. е. основанныя на точныхъ фактахъ, обобщенія. Потребность въ такихъ обобщеніяхъ существуетъ, но авторы, которые рискують дълать заключенія, опираясь на столь мало обоснованные факты, приходять къ ложнымъ выводамъ. Прекрасный примъръ такого рода обобщеній даетъ намъ профессоръ Аннеги въ томъ мъстъ его руководства, гдъ говоритъ о занимающихъ насъ личинкахъ (23, 475). По словамъ его, паразитныя личинки, живущія внутри тела других насекомых, находятся въ отношеніи дыханія въ тъхъ же условіяхъ, какъ водныя личинки, пребывающія постоянно подъ водою. Въ теченіе всей жизни внутри хозяина дыхательная система ихъ совершенно замкнута и только тогда, когда паразить собирается покинуть свою жертву, появляются у него дыхальца, черезъ которыя воздухъ проникаетъ въ трахейныя трубки 1).

Впослѣдствіи будетъ показано мною, что это положеніе Аннеги справедливо только по отношенію къ 1-й стадіи развитія разсматриваемыхъ личинокъ, такъ какъ очень многія изъ нихъ

получаютъ дыхальца уже во 2-й стадіи и число дыхалецъ послѣ этой стадіи часто бываетъ такимъ же, какъ у взрослой личинки, т. е. у 5-й стадіи. Вина за неправильность приведеннаго обобщенія падаеть, конечно, не только на его автора, но главнымъ образомъ на тъхъ изслъдователей (Рацебургъ, Ньюпортъ, Сёра), которые дали ему невърныя основы для этого обобщенія. На самомъ дѣлѣ возможности для обобщеній по данному вопросу не было и нътъ. Чтобы приступить къ нимъ, необходимо сначала отказаться отъ всего, что было получено при помощи тъхъ пріемовъ изслъдованія, которые до сихъ поръ преимущественно употреблялись и которые не устраняли условій случайности, т. е. отказаться отъ изученія личинокъ, взятыхъ изъ однихъ особей, и приписыванія ихъ взрослымъ натздникамъ, полученнымъ изъ другихъ особей. Надо признать, что на этомъ пути въ поискахъ истины изследователи встречаютъ непреодолимое препятствіе. Но знаніе истинныхъ фактовъ необходимо, безъ него нътъ движенія впередъ, ибо нътъ возможности обобщеній. Поэтому необходимо сначала поискать новаго пути къ нахожденію этихъ фактовъ, для чего надо примънить новые методы изслѣдованія и попытаться подойти къ предмету съ новой стороны. Къ ръшенію этой задачи мы и приступимъ.

2. Новый путь.

Начнемъ съ простого разсужденія. Извѣсто, что личинки насѣкомыхъ линяютъ, т. е. каждая личинка, по мѣрѣ того какъ растетъ, сбрасываетъ шкурку, ставшую для нея узкой и короткой, и появляется въ новой, болѣе просторной, часто отличающейся тѣми или другими признаками отъ сброшенной шкурки. Этими признаками характеризуются возрасты личинокъ, а количествомъ сброшенныхъ шкурокъ опредѣляютъ число возрастовъ, проходимыхъ личинкой при всемъ ея развитіи. Изложенное относится къ личинкамъ всѣхъ насѣкомыхъ. Это общее правило. Если такъ, то оно должно относиться и къ личинкамъ наѣздниковъ, что и подтверждаютъ личинки тѣхъ видовъ, которые паразитируютъ на своихъ хозяевахъ снаружи. Послѣднее давно было замѣчено, изображено и описано. Нѣтъ основанія думать, что личинки, паразитирующія внутри своихъ жертвъ, не подчиняются тому же закону роста и линьки. Онѣ тоже долж-

¹⁾ Впоследствіи я надеюсь опубликовать ихъ списокъ.

²⁾ Тоже самое вызскаваль и Seurat на основаніи своихь изслѣдованій нѣкоторыхь изъ разематриваемыхь нами личинокь. Излагая свои общіе выводы, онъ выражается такъ: "le système trachéen se complique au fur et à mesure des besoins de la larve; il est entièrement clos, et l'entrée de l'air se fait à travers la peau et la membrane, très fine, des dernières ramifications tracheéennes". И далъе: "A la sortie de l'hôte, les stigmates s'ouvrent, et l'entrée de l'air se fait par ces stigmates" (50, 106 et 153).

ны линять, но замътить и наблюдать линьку у нихъ не возможно безъ вскрытія хозяина, а послѣднее, какъ было уже сказано, дълаетъ безцъльнымъ самое вскрытіе, такъ какъ послъ него погибаютъ оба: паразитъ и жертва. Тъмъ не менъе, хотя и не возможно наблюдать линьку въ этихъ условіяхъ, она все-таки должна совершаться, а въ такомъ случаъ это явленіе, т. е. линька, и дасть намъ ключъ къ решенію поставленной задачи. Неть надобности вскрывать хозяина, такъ какъ наблюдать процессъ линьки для нашей цъли не надо, нужны только результаты линьки, т. е. сброшенныя личинкою шкурки. Оставимъ хозяина, напримъръ куколку бабочки, цълымъ, дадимъ паразитной личинкъ спокойно пройти все развитіе и превратиться во взрослаго на вздника и дадимъ ему вылет вть изъ куколки. Тогда, опред вливъ навздника, мы будемъ знать, какой видъ паразита развивался въ куколкъ, а внутри ея найдемъ тъ шкурки, которыя сбросила личинка этого вида. По числу найденныхъ шкурокъ опредълимъ, сколько возрастовъ или стадій прошла личинка при своемъ развитіи, а разсмотрѣвъ и сравнивъ одну съ другой шкурки, мы найдемъ признаки, по которымъ могутъ быть отличаемы возрасты.

Вотъ, казалось бы, самый простой способъ ръшенія задачи. Въдь паразитная личинка, жившая въ куколкъ, никуда изъ нея не переселялась и провела въ ней всю свою жизнь, а куколка все время оставалась снаружи совершенно цёлой, слёдовательно, ничего изъ нея исчезнуть не могло. Теперь паразитной личинки нътъ, такъ какъ она окуклилась и превратилась въ вылетъвшаго наъздника, но собственно личинка, именно эта, намъ и не нужна. Намъ нужно знать признаки, которые характеризовали ее во всъхъ ея возрастахъ, а признаки эти будутъ найдены по оставленнымъ въ куколкъ шкуркамъ. Послъ того мы обратимся къ заспиртованнымъ матеріаламъ, вскроемъ сохраняющихся тамъ куколокъ, извлечемъ изъ нихъ паразитныхъ личинокъ и раздълимъ ихъ на виды и возрасты, руководствуясь признаками, которые указали намъ оставленныя наъздникомъ шкурки его личинокъ. Выведенный изъ куколки наъздникъ оплатитъ такимъ образомъ заботы о его сохраненіи и воспитаніи, такъ какъ дастъ намъ въ руки цѣнные документы, точно характеризующіе всю его прошлую жизнь во всѣхъ стадіяхъ, начиная съ яйца, скорлупа котораго оставлена имъ тамъ же, въ куколкъ. Но если бы даже шкурки молодыхъ личинокъ по какой нибудь

причинъ и не дались намъ въ руки, то послъдняя шкурка, т. е. шкурка върослой личинки, сброшенная ею при окукливаніи, во всякомъ случать будетъ найдена, а для насъ и эта шкурка въ высшей степени цънна, такъ какъ по ней мы узнаемъ признаки, характеризующіе сбросившую ее взрослую личинку даннаго вида натадника, и будемъ умъть отличать ее отъ личинокъ натадниковъ другихъ видовъ, вылетавшихъ изъ другихъ куколокъ той же бабочки 1).

Остается только приступить къ исполненію нам'вченнаго. При выводъ наъздниковъ изъ куколокъ я старался всегда размъщать послѣднихъ по особымъ стаканчикамъ и пробиркамъ, насколько позволяль запась имъвшейся у меня посуды, а остатокъ складывалъ въ общее помъщение, такъ какъ куколокъ мнъ присылали иногда тысячами. Такимъ путемъ выводилъ въ каждомъ стаканчикъ на вздника и находилъ тамъ же ту именно куколку, изъ которой онъ вывелся, чего нельзя было достигнуть при содержаніи куколокъ въ общемъ помъщении. При умерщвлении и накалывании на булавки натадниковъ подкалывались подъ нихъ, на тъ же булавки, и куколки, изъ которыхъ они вышли. Запасы такимъ образомъ наколотыхъ на вздниковъ съ куколками въ моихъ энтомологическихъ ящикахъ довольно большіе и разнообразные. Есть на вздники, которые стоять и ждуть своей очереди съ 1881 года. Таковъ же и спиртовой матеріалъ, хотя нъсколько бѣднѣе, такъ какъ многое изъ него было попорчено при попыткахъ знакомиться съ личинками на вздниковъ прежнимъ способомъ. Теперь мнъ предстоитъ снять съ булавки одну изъ такихъ куколокъ и поискать находящіяся въ ней шкурки личинокъ наѣздника, который наколоть надъ куколкой, извлечь ихъ и приняться за ихъ изученіе.

Однако, что легко сказать, не всегда легко сдѣлать. Куколка была на булавкѣ много лѣтъ. Все въ ней совершенно высохло и, кромѣ искомыхъ шкурокъ, въ ней еще находится коконъ, который дѣлаютъ внутри куколокъ паразитныя личинки большинства наѣздниковъ передъ своимъ окукливаніемъ. Коконъ этотъ совершенно плотно и очень прочно прилипаетъ къ стѣнкамъ куколки, такъ что послѣднія приходится отдѣлять отъ него кус-

¹⁾ Возможность отличать взрослыхъ личинокъ разныхъ родовъ навздниковъ по сброшеннымъ ими при окукливаніи шкуркамъ была указана Гартигомъ еще въ 1837 году, но далѣе этого общаго указанія названный ученый въ опубликованныхъ имъ работахъ не пошелъ (22, 156)

ками, даже послѣ предварительнаго размачиванія или кипяченія въ чистой водѣ. Далѣе, шкурки, которыя надо найти, это комочки ничтожной величины, почти микроскопическіе, чрезвычайно легко затеривающієся среди того сора, который накопляется при разламываніи куколки и разрываніи кокона. Такимъ путемъ цѣль не можетъ быть достигнута, надо пустить въ дѣло иную технику, болѣе совершенную. Въ виду этого я измѣняю образъ дѣйствій. Чтобы размягчить хитинъ, составляющій стѣнки куколки и ткани искомыхъ шкурокъ, я кипятилъ куколки не въ чистой водѣ, а въ растворѣ ѣдкаго кали (отъ 50/0 до 100/0). При этомъ оказалось, что коконы наѣздниковъ, заключавшіеся внутри куколокъ, почти нацѣло растворялись отъ дѣйствія ѣдкаго кали, а хитинъ совершенно размягчался и свободно поддавался всякому сгибанію и разгибанію, не ломаясь.

Прежде чѣмъ приступать къ этимъ опытамъ, нахожу необходимымъ освъдомиться предварительно въ книгахъ, сколько же шкурокъ надо найти въ каждой куколкъ, иначе-сколько разъ должна слинять личинка наъздника въ теченіе всей ея жизни. Послъдствія этой предварительной справки чуть было не погубили всего дѣла. Прежде всего, конечно, направляюсь къ Рацебургу, который описаль 5 стадій развитія личинки аномалона (A. circumflexum L.), и къ удивленію своему нахожу тамъ нъчто весьма странное. О томъ, чтобы личинка эта при переходъ изъ одной стадіи въ другую линяла, онъ не говоритъ ни слова, хотя линьку, повидимому, допускалъ. Въ первомъ томъ своего извъстнаго сочиненія о наъздникахъ (40, 1, 82 и 83), вышедшемъ въ 1844 году, онъ сообщаетъ, что одна изъ молодыхъ формъ личинокъ аномалона была находима имъ въ зимующихъ гусеницахъ сосноваго шелкопряда, заключенная обыкновенно въ особомъ мъшкъ или цистъ (нашъ рис. 8, фиг. 16 и 17, стр. 17). Пытаясь объяснить происхождение этого мѣшка, Рацебургъ высказываетъ предположение, что это есть отставшая отъ тъла личинки и не сброшенная ею старая шкурка, которая при дальнъйшемъ ростъ личинки распадается на незамътныя частички, а эти послѣднія разсосутся въ жировомъ тѣлѣ. Согласиться съ тѣмъ, что хитиновая шкурка, въ особенности ея толстыя ротовыя части, могутъ разсосаться, я конечно не могъ, но сверхъ того меня огорчило также, что у Рацебурга не нашлось подтвержденія возможности нахожденія въ куколкѣ сброшенныхъ личинкою шкурокъ. Немного позднъе Эриксонъ реферироваль эту работу въ своемъ годовомъ Обзоръ энтомологическихъ работъ (15, 69), и замътилъ по поводу объясненія Рацебурга, что если бы стънки цисты образовались изъ старой шкурки, то на ней были бы найдены дыхательныя отверстія и ротовыя части, чего Рацебургомъ не было найдено, а потому это и не можетъ быть шкуркой отъ линянія. Съ такимъ замъчаніемъ Рацебургъ согласился во второмъ томъ указанной его работы, вышедшемъ въ 1848 году, но вопроса о линькъ совсъмъ не коснулся (стр. 4). Наконецъ, въ третьемъ томъ того же сочиненія, вышедшемъ въ 1852 году, Рацебургъ, перечисляя вопросы, которые нуждаются въ болъе точныхъ будущихъ изслъдованияхъ, называетъ и вопросъ о линькъ (стр. VII). Вотъ и все. Эта справка только набросила тънь сомнънія на возможность предположеннаго мною сохраненія сброшенныхъ шкурокъ паразитной личинки внутри хозяина 1).

Перехожу къ другимъ, новъйшимъ авторамъ. Подъ редакціей французскаго энтомолога Андрэ изданъ, да и до сихъ поръ издается, цълый рядъ томовъ подъ общимъ заглавіемъ: «Виды пленчатокрылыхъ Европы и Алжира». Беру изъ нихъ томъ, изданный въ 1888 году и посвященный одному изъ крупныхъ семействъ наъздниковъ (Braconidae), составленный знатокомъ этого семейства, Т. Маршаллемъ, и читаю въ немъ по данному вопросу слъдующее (32, 36): «Личинки, паразитирующія внутри хозяєвъ, не имѣютъ заднепроходнаго отверстія и не подвергаются линькамъ, а потому внутри хозяина не бываетъ ни изверженій ихъ, ни сброшенныхъ шкурокъ». Позднъе ученый американскій энтомологъ Говардъ далъ объясненіе причины такого явленія (24, 975). Онъ говорить, что у внутренностныхъ паразитовъ не бываетъ линьки по той же причинъ, по какой не совершается выдъленія изверженій: то и другое повлекло бы за собой воспаленіе въ организм' хозяина и причинило бы ему преждевременную смерть. Наконецъ, въ вышедиемъ въ 1904 году крупномъ руководствъ по энтомологіи профессора Аннеги

¹⁾ Шарпъ въ своей книгъ "Насъкомыя" говоритъ, что линяніе у личинокъ наъздниковъ, паразитирующихъ снаружи, совершается "не такъ, какъ это описано Рацебургомъ для внутренностныхъ паразитовъ, которые, по его свидътельству, смъняютъ свою, весьма нѣжную кожицу, сбрасывая ее почти незамътными глазу, мелкими обрывками" (70, 413). Для меня совершенно не понятно, гдъ у Рацебурга Шарпъ нашелъ описаніе линьки, хотя бы одной личинки наъздника; кромъ того, что мною выше приведено, у него ничего нъть по данному вопросу.

приводится вышеприведенное мнѣніе Т. Маршалля безъ возраженія (23, 496).

Таковы были результаты моихъ книжныхъ исканій: не только ничего утѣшительнаго, но для составленнаго мною плана изслѣдованій они были прямо убійственны. Все на линькѣ я основаль, на возможности нахожденія шкурокъ паразита внутри его хозяина, и эта основа плана была разрушена, такъ какъ линьки то здѣсь не бываетъ, да и не можетъ быть, потому что она причинила бы воспаленіе хозяину и наступающую затѣмъ смерть обоихъ, какъ хозяина, такъ и паразита. Только при моемъ литературномъ невѣжествѣ можно было строить подобный планъ. Впечатлѣніе было сильное, подавляющее, и подъ вліяніемъ его около двухъ недѣль я ходилъ, какъ въ воду опущенный.

Но время шло, а съ нимъ пришли спокойствіе и способность хладнокровно разсуждать. Прежде всего я припомнилъ, что не всѣ ученые, писавшіе о занимающихъ насъ личинкахъ, были такъ единодушны въ отрицаніи у нихъ линьки. Такъ, двое изъ старыхъ русскихъ ученыхъ, Мечниковъ (34, 91) и Ганинъ (17, 400), вполнъ опредъленно указали, что личинки тэлеаса и платигастера (Teleas, Platygaster), которыхъ они наблюдали, линяли по два раза до окукливанія, а потомъ швейцарскій профессоръ Бюніонъ (10, 463), замѣтилъ одну линьку у молодой личинки энцирта (Encyrtus fusciollis Dalm.). Однако, позднъйшій французскій изсл'єдователь, П. Маршаль (29, 257; 30, 546 и 619), не подтвердилъ, что личинки платигастера линяютъ дважды до окукливанія, такъ какъ у нѣсколькихъ видовъ этого рода онъ могъ удостовърить только одну линьку молодыхъ личинокъ. Относительно же энцирта онъ пришелъ къ обратному заключенію, замѣтивъ у его личинокъ и вторую линьку при переходѣ въ третью стадію. Наконецъ, изслівдованіями Сёра (50, 63 и 106), была установлена одна линька у молодыхъ личинокъ микрогастера (Apanteles glomeratus L.).

По странной случайности молодыя личинки всѣхъ только что названныхъ четырехъ родовъ наѣздниковъ представляютъ собою существа микроскопически-мелкія, у которыхъ, слѣдовательно, сбрасываемыя шкурки по величинѣ своей, являются ничтожной малостью, почти атомами. Быть можетъ, благодаря такой ничтожной величинѣ эти шкурки не причиняютъ воспаленія въ организмѣ хозяина, а потому линька въ этихъ случаяхъ и существуетъ, но я имѣю дѣло съ крупными личинками крупныхъ

на вздниковъ, у которыхъ сброшенныя шкурки конечно крупнъе и, оставаясь при этомъ условіи въ организмъ хозяина, могутъ въ самомъ деле вызвать роковыя для него последствія, указанныя Говардомъ, почему въ данномъ случать линьки не бываетъ. Въ виду этого соглащаюсь допустить, что личинки избранныхъ мною на вздниковъ при переход в изъ одной стадіи въ другую не линяютъ и отказываюсь искать въ куколкахъ сброшенныя ими шкурки, но послѣдняя линька, совершаемая личинкой при окукливаніи, никъмъ не отрицается 1), стало быть, эту послъднюю шкурку я и буду искать. Для меня эта шкурка, какъ раньше было объяснено, имъетъ тоже большое значение. Во всякомъ случать, и по отношенію къ прочимъ шкуркамъ, положеніе вещей въ куколкъ не измънится отъ того, какой взглядъ на нихъ высказанъ тъмъ или другимъ авторомъ, какъ бы ни было авторитетно его имя. Следовательно, непосредственно къ ней, къ куколкъ, надо обратиться съ вопросомъ и въ ней прежде всего искать его разрѣшенія, а не рыться въ библіотекахъ. Если паразитная личинка въ молодости линяла и оставила свои шкурки въ куколкъ, то я ихъ найду и тогда буду правъ, а если нътъ, то получу, по крайней мъръ, послъднюю шкурку и нанесу окончательный ударъ своему заблужденію относительно предыдущихъ шкурокъ, послъ чего постараюсь забыть о немъ поскоръе.

Не безъ волненія вынулъ я изъ ящика булавку, на которой были наколоты куколка бабочки боярышницы (Aporia crataegi L.) и вышедшая изъ нея пимпла (Pimpla instigator F.). Куколка снята мною съ булавками и опущена въ пробирку, въ которую налито не много раствора ъдкаго кали, и началось кипяченіе ихъ на спиртовой лампочкъ. Начался опытъ, который черезъ какихъ нибудь полчаса покажетъ, кто правъ.

Съ чувствомъ понятнаго удовлетворенія могу сообщить теперь, что черезъ полчаса истина была на моей сторонѣ. А что можетъ быть волшебнѣе того момента, когда начинаешь ощущать и, наконецъ, убѣждаешься, что ты съ нею на одной сторонѣ? Эти ощущенія даютъ полное забвеніе всѣхъ предшествовавшихъ волненій и огорченій, и такъ легко послѣ того является прощеніе виновникамъ ихъ: пускай они сами теперь считаются съ «вос-

¹⁾ Только одинъ такой примъръ, по моему маловъроятный, я нашелъ у Ганина, по изслъдованіямъ котораго личинка Ophioneurus, ни разу не слинявъ, переходитъ тоже безъ линьки непосредственно въ куколку (17, 431).

паленіемъ», влекущимъ за собою смерть обоихъ, какъ хозяина, такъ и паразита. Поворотъ этотъ совершился при слъдующихъ обстоятельствахъ.

Послъ нъсколькихъ вскипаній жидкость изъ пробирки, сильно побуръвшая, но прозрачная, была перелита въ неглубокую стеклянную чашечку съ плоскимъ дномъ. Куколка, находившаяся въ ней, переложена въ другую такую же чашечку, но пустую. Затъмъ, я беру стеклянную пипетку съ резиновымъ шарикомъ, оттянутую на концѣ подъ паяльной трубкой въ тонкую трубочку, слегка на кончикъ согнутую. Этотъ кончикъ трубочки вставляю въ куколку черезъ отверстіе, которое сдълала въ ней пимпла при выходъ, и, нажимая резиновой шарикъ, пускаю въ куколку сильную струю чистой воды, наполняющей пипетку. Струя первой пипетки выносить изъ куколки только тотъ бурый растворъ, которымъ наполнилась она во время кипяченія, но при дъйствіи струи второй пипетки изъ куколки выносятся водой комочки изверженій личинки, а съ ними ея послѣдняя шкурка, т. е. та, которую она сбросила при окукливаній, а также экзувій куколки 1). Въ этомъ удивительнаго и неожиданнаго еще ничего нътъ. Давно извъстно, что паразитная личинка, какъ и личинки большинства пленчатокрылыхъ, ничего не извергаетъ изъ себя въ теченіе всей своей жизни, и только передъ окукливаніемъ выпускаетъ сразу въ одинъ пріемъ весь запасъ накопившихся въ ней изверженій. Послѣ того личинка окукливается и куколка сбрасываетъ съ себя шкурку личинки, которая ложится между куколкой и изверженіями бывшей личинки, отдъляя отъ нихъ куколку. Плавающую въ водъ шкурку личинки беру иглою и переношу въ каплю глицерина на предметномъ стеклъ. Послъ того переношу куколку боярышницы въ новую чашечку и снова лью въ нее воду изъ пипетки. Такимъ путемъ мн удается добыть еще дв шкурки которыя, кладу вм ст съ первой.

Теперь я вскрываю куколку, т. е. раздѣляю ее на части и осматриваю ихъ внутреннюю сторону подъ бинокуляромъ Цейса, при умѣренномъ увеличеніи, въ 23 раза. Царапая слегка иглами осматриваемыя стѣнки, нахожу еще двѣ шкурки, запутавшіяся среди остатковъ трахейныхъ, т. е. дыхательныхъ, трубочекъ ку-

колки. При этомъ я имѣю возможность убѣдиться, что отъ кокона, который былъ сдѣланъ паразитной личинкой передъ окукливаніемъ въ куколкѣ бабочки и который я находилъ, когда размачивалъ куколокъ въ чистой водѣ, теперь отъ этого кокона не осталось и слѣда. Онъ весь растворился въ кипящемъ растворѣ ѣлкаго кали.


Итакъ, при первомъ же опытъ мнъ посчастливилось найти въ куколкъ 5 шкурокъ, что, какъ показали дальнъйшія изслъдованія, не всегда удается. Бываетъ, что одна или нъсколько шкурокъ затериваются или же находятся только части ихъ, преимущественно головы, а иногда только однъ челюсти. Это происходить по следующей причине. Личинка, достигшая полнаго роста, начинаетъ прясть внутри куколки свой коконъ, для чего выпускаеть содержимое прядильныхъ железъ, черезъ отверстіе, находящееся на нижней губъ. Это содержимое превращается на воздух въ нить, которую личинка приклеиваетъ въ разныхъ мъстахъ куколки, прикасаясь къ нимъ нижней губой, для чего она поворачивается въ куколкъ во всъ стороны, кругомъ. Вотъ при этихъ-то движеніяхъ она плотно прижимаетъ своимъ тъломъ къ стънкамъ куколки однъ шкурки, а другія запутываетъ въ нитяхъ ткани кокона и, можетъ быть, разрываетъ ихъ. Подъ конецъ, всъ четыре шкурки оказываются на наружной сторонъ кокона и въ значительной степени оплетены нитями, составляющими его ткань, а внутри кокона лежитъ только одна послъдняя, пятая шкурка, сброщенная личинкой при окукливаніи. Вотъ потому-то и нельзя было найти шкурокъ молодыхъ личинокъ въ куколкахъ, просто размоченныхъ въ чистой водѣ, онѣ скрывались тогда въ ткани кокона, но какъ только ткань эта растворилась отъ дъйствія ъдкаго кали, пакурки свободно проявились.

Подбодренный достигнутымъ успѣхомъ, беру другую куколку той же бабочки, изъ которой также вылетѣла пимпла, но другого вида (Pimpla brassicariae Poda). Обрабатываю ее тѣмъ же способомъ и добываю изъ нея 4 шкурки, а пятая, вѣроятно, затерялась. Прежде чѣмъ приступить къ разсматриванію добытыхъ шкурокъ и сравненію ихъ другъ съ другомъ, я изслѣдовалъ такимъ же способомъ третью куколку все той же бабочки, изъ которой вылетѣлъ третій наѣздникъ-теронія (Theronia atalantae Poda), и тогда разнообразіе запасовъ 1881 года было исчерпано, насколько это касается крупныхъ наѣздниковъ. Но

¹⁾ Экзувій—оболочка, которая сбрасывается куколкой при превращеніи ея въ окрыленное насъкомое.

изъ этой куколки я получилъ нѣчто большее, чѣмъ изъ двухъ предыдущихъ. Въ ней были найдены: трупъ высохшей личинки, распарившійся отъ кипяченія въ растворѣ ѣдкаго кали, и 9 шкурокъ отъ линянія. Здѣсь, внутри куколки, произошла какая-то загадочная исторія—откуда въ ней трупъ и почему такое обиліе личинковыхъ шкурокъ Вскорѣ дѣло объяснилось, какъ только я приступилъ къ сравненію шкурокъ, найденныхъ въ разныхъ куколкахъ.

Начинаю съ послѣдней шкурки, т. е. съ 5-й самой крупной, находившейся внутри кокона наѣздника въ первой куколкѣ. Прежде всего обращаю вниманіе на ротовыя части, а изъ нихъ на верхнія челюсти. Вотъ тутъ-то и нашлась разгадка того при-



Puc. 10. Верхняя челюсть (mandibula) двухъ видовъ пимпла и тероніи: a—Pimpla instigator F., б—P. brassicariae P o d a, в—Theronia atalantae P o d a. Увелич. около 100 разъ. Оригин.

мѣра, о которомъ я сообщилъ въ началѣ настоящей работы. Челюсть, съ тупымъ зубцомъ близъ середины ея внутренняго края (рис. 10 a), была найдена въ шкуркѣ, которую оставила первая пимпла ($P.\ instigator\ F.$); совершенно гладкая челюсть (рис. 10 δ), была въ шкуркѣ второй пимплы ($P.\ brassicariae\ Poda$), взятой изъ второй куколки, и, наконецъ, третья шкурка, т. е. шкурка тероніи, была снабжена челюстью, близъ середины которой сидѣлъ острый зубецъ, отдѣленный отъ нея круглой выемкой (рис. 10 θ). Рисунокъ, который на страницѣ 9-й былъ для насъ такой неразрѣшимой загадкой, воспроизводится на этой страницѣ со всѣми желательными объясненіями.

Обращаюсь къ разсмотрѣнію трупа и шкурокъ, взятыхъ изъ третьей куколки, т. е. той, гдѣ развивалась теронія. Мертвая личинка, какъ сказано, разварилась и сдѣлалась мягкой. Она по-

лупустая, но цѣлая, и въ ней сохранилось бурое содержимое, которое переливается внутри личинки при переворачиваніи и затемняєть картину. Я дѣлаю надрѣзъ на кожѣ личинки и въ образовавшуюся дыру направляю струю воды изъ пипетки. Выливающаяся обратно изъ личинки вода уносить все ея бурое содержимое, послѣ чего просвѣтлѣвшая кожа дѣлается доступной осмотру во всѣхъ подробностяхъ строенія. По ротовымъ частямъ сразу узнаю въ ней взрослую личинку первой пимплы (P. instigator L.), а сравненіе добытыхъ съ нею шкурокъ отъ линянія показываетъ, что 4 шкурки сброшены были этой же личинкой въ молодыхъ возрастахъ, а другія 4 шкурки сброшены молодыми личинками тероніи и одна—ея взрослою личинкой.

Въ этой куколкъ боярышницы совершилась слъдующая драма. Первоначально паразитировала въ ней пимпла и благополучно развивалась въ четырехъ первыхъ возрастахъ, но когда она перешла въ 5-й возрастъ, къ этой куколкъ прилетъла теронія, которая, почуявъ, что въ ней есть паразитная личинка, просверлила оболочку куколки и отложила свое яичко на эту личинку. Вылупившаяся изъ яичка личинка тероніи принялась немедленно высасывать свою жертву, т. е. паразита, развившагося на счетъ куколки боярышницы, пріостановила ходъ его дальнъйшаго развитія и благополучно прошла затъмъ все свое развитіе. Превратившись подъ конецъ въ окрыленную форму, теронія, этотъ сверхпаразитъ, вылетъла изъ куколки на свътъ Божій, оставивъ на мъстъ своего отрожденія и развитія трупъ первичнаго паразита, т. е. личинки пимплы, на счетъ которой она выкормилась.

Выяснивъ ходъ только что изложенной драмы и вооружившись умѣніемъ различать личинокъ, паразитировавшихъ въ куколкахъ боярышницы, перехожу къ спиртовому матеріалу, т. е. къ склянкѣ, въ которой хранились взрослыя личинки тѣхъ же наѣздниковъ, очень давно вынутыя изъ куколокъ и положенныя въ спиртъ. Высыпаю все содержимое склянки на блюдечко, отвертываю у каждой личинки верхнюю челюсть, разсматриваю ее подъ лупой и, соотвѣтственно нахожденію ышеописаннаго зубца, раскладываю личинокъ по тремъ склянкамъ, на которыя предварительно наклеилъ билетики съ названіями трехъ моихъ наѣздниковъ. Все это было сдѣлано въ 1906 г., а куколки и личинки хранились, какъ было сказано, съ 1881 года, стало быть 25 лѣтъ пришлось имъ ждать, пока явилась возможность раздълить ихъ по видамъ. Описаніе же всего этого напечатано впервые только въ 1911 году, т. е. ровно черезъ 30 лътъ послъ начала наблюденій ¹).

Что касается шкурокъ, пребывавшихъ въ куколкъ внѣ ко-кона, т. е. шкурокъ болѣе молодыхъ личинокъ, то и онѣ даютъ возможность отвѣтить на нѣкоторые весьма существенные вопросы относительно ихъ отличительныхъ признаковъ, но не на всѣ. Шкурки эти стянуты многочисленными складками, которыя при осторожномъ растягиваніи иглами расправляются, но по отнятіи иголъ вновь складываются, вслѣдствіе чего общую форму тѣла иногда бываетъ трудно возстановить. Число и распредѣленіе дыхалецъ легко опредѣляются, такъ же, какъ форма головы и ея частей, особенно верхнихъ челюстей. Здѣсь я не буду говорить объ особенностяхъ внѣшняго строенія этихъ личинокъ потому, что онѣ будутъ подробно изображены и описаны въ другомъ мѣстѣ. Перехожу къ изложенію своихъ дальнѣйшихъ опытовъ примѣненія новаго пріема изслѣдованій.

Беру куколокъ болѣе позднихъ сборовъ, куколокъ сосновой ночницы (Panolis variegata Poda.), которыя были собраны въ 1894 году въ Рожновомъ бору Владимірской губ. Изъ нихъ вывелись у меня тогда два вида навздниковъ: ихневмонъ (Ichneumon pachymerus Hrt.) и аномалонъ (Anomalon circumflexum L.). Такъ же кипячу куколокъ, взятыхъ съ булавокъ, какъ и предыдущихъ, и каждый разъ получаю послъднюю шкурку, т. е. лежавшую въ коконъ, въ полной исправности и всъ части ея прекрасно можно разсмотрѣть, но шкурки болѣе молодыхъ личинокъ здѣсь не даются въ руки. Нахожу только ихъ головы, да и тѣ большей частью разрушенныя и полуразрушенныя. Тутъ потребовалось больше терптнія, чтмъ въ предыдущемъ случать. Для ускоренія кипячу по 3—5 куколокъ сразу, тъмъ не менъе на изслѣдованіе каждой такой партіи требуется нѣсколько часовъ. Мало-по-малу, изъ разныхъ куколокъ подбираются, наконецъ, ряды разныхъ, постепенно увеличивающихся, головокъ. Въ одномъ ряду 5 головокъ, въ другомъ 7 и въ третьемъ 8.

Этого достаточно, чтобы разобраться въ томъ, что будетъ найдено въ заспиртованныхъ куколкахъ, къ изслѣдованію которыхъ и приступаю. Этихъ куколокъ я не кипячу въ ѣдкомъ кали, а вымачиваю 2—3 сутокъ въ чистой водѣ, чтобы сколько нибудь возстановить упругость тканей, затвердѣвшихъ отъ дѣйствія спирта. Потомъ разрѣзываю оболочку куколки продольно ножницами или переламываю ее сначала въ мѣстѣ соединенія брюшка съ туловищемъ. Сильная струя воды изъ пипетки, направленная на открытыя внутренности куколки, отрываетъ отъ нихъ и уноситъ мелкія частицы, и тогда дѣлается замѣтной личинка, скрывающаяся въ куколкѣ. Сравнивая форму головы и челюстей найденной личинки съ тѣми, которыя были найдены при кипяченіи, я отношу ее къ тому или другому виду названныхъ наѣздниковъ и даже могу опредѣлить возрастъ личинки.

Въ первомъ примъръ, для котораго взяты были куколки боярышницы, во встхъ заспиртованныхъ куколкахъ заключались только взрослыя личинки, такъ какъ въ спиртъ были положены тогда лишь тѣ изъ куколокъ, брюшко которыхъ затвердѣло и не сгибалось при надавливаніи на его кончикъ, а у большинства куколокъ ночницы брюшко было при укладываніи ихъ въ спиртъ мягкое и легко поддавалось сгибанію, такъ какъ въ нихъ еще не закончилось кормленіе паразитныхъ личинокъ, пребывавшихъ тогда въ разныхъ возрастахъ, болѣе или менѣе близкихъ къ послъднему. Иногда затвердъвшія внутренности куколокъ, слишкомъ долго сохранявшихся въ спирту, не поддавалиеь дъйствію водяной струи, личинки же, скрывавшіяся среди нихъ, разламывались на куски, и матеріалъ получался плохого качества. Въ такомъ случав я кипятилъ куколокъ въ растворв вдкаго кали, сдѣлавши на ихъ покровахъ надрѣзы, и тогда весь жиръ и всѣ мускулы, все не хитиновое содержимое куколки растворялось, посл'в чего легко было отмыть струею воды изъ вскрытой куколки искомую личинку и шкурки. Конечно, содержимое паразитной личинки растворялось при этомъ также и наполняло ее, какъ мѣшокъ, но оно легко удаляется изъ нея черезъ надръзъ на кожъ, простымъ надавливаніемъ иглы, а еще лучше новой струею изъ пипетки. Тогда вся оболочка личинки получалась безукоризненная.

Вообще, кипяченіе въ ѣдкомъ кали примѣнялось мною къ личинкамъ всѣхъ возрастовъ, потому что такимъ путемъ можно получить для описанія и рисунковъ наиболѣе чистый матеріалъ. Остается отъ личинки только ея прозрачная кожа, которую легко можно подвергать микроскопическому изслѣдованію и открывать въ строеніи ея такія особенности и подробности, которыя

¹⁾ Въ 1907 краткое сообщение о паразитизмъ теронии было напечатано мною въ "Русскомъ Энтомологическомъ Обозрънии" (73, 1).

при наружномъ осмотрѣ цѣлой личинки ускользаютъ отъ взора. Особенно вѣрно послѣднее замѣчаніе по отношенію къ ротовымъ частямъ. Иногда кожица получается черезъ-чуръ прозрачной и безцвѣтной, вслѣдствіе чего ея не видно подъ микроскопомъ. Въ такомъ случаѣ я окрашиваю ее, прежде чѣмъ заклеить въ препаратъ, коричневой анилиновой краской (Bismarkbraun), которая хорошо воспринимается хитиномъ.

Замътивъ, что коконы наъздниковъ, находившиеся въ куколкахъ, вполнъ растворяются въ такомъ кали, я попробовалъ кипятить въ немъ и тѣ коконы наѣздниковъ, которые были сдѣланы ихъ личинками по выходъ изъ гусеницъ. До сихъ поръ мы говорили о такихъ паразитахъ, которые заражаютъ куколокъ и въ куколкахъ проходятъ все развитіе, но теперь я имъю въ виду тъхъ наъздниковъ, которые кладутъ яички внутрь гусеницъ, какъ это дълаетъ, напримъръ, офіонъ, и все развитіе которыхъ совершается въ гусеницахъ. Паразитная личинка достигаетъ въ гусеницъ полнаго роста и выходитъ изъ нея наружу черезъ отверстіе, которое прорываетъ въ кожъ хозяина, послъ чего тутъ же, рядомъ съ трупомъ жертвы, дълаетъ себъ коконъ, внутри его оканчиваетъ свое развитіе и превращается во взрослаго окрыленнаго офіона, который вылетаетъ изъ кокона черезъ прогрызаемую имъ дырочку. Коконы такихъ натвядниковъ часто бываютъ окружены веществомъ, похожимъ на вату и всегда бываютъ плотнъе и прочнъе, чъмъ коконы, дълаемые въ куколкахъ. Въ этомъ свободно лежащемъ коконъ мы можемъ разсчитывать найти только одну личинковую шкурку-той вполнъ взрослой личинки, которая сдѣлала коконъ и въ немъ окуклилась, а всъ болъе раннія шкурки она оставила въ трупъ гусеницы, изъ которой вышла и который часто лежитъ близъ кокона. Коконовъ такихъ у меня имъется порядочный запасъ, и вст они наколоты на тт же булавки, на которыхъ помъщаются вылетъвшіе изъ коконовъ натадники. Имъю также въ спирту и трупы гусеницъ, изъ которыхъ вышли творцы коконовъ. Гусеницу я вскрываю въ водъ и, такъ какъ паразитная личинка оставила въ ней очень мало содержимаго, легко нахожу при помощи цейссовскаго бинокуляра шкурки, оставленныя молодымъ паразитомъ, а коконъ кипячу въ растворъ ъдкаго кали, гдъ онъ большей частью вполнъ растворяется (если растворъ достаточно крѣпокъ) или почти вполнѣ и получаю изъ него шкурку послъдней личинки.

Иногда содержимое такого кокона оказывается болъе сложнымъ. Я ожидаю найти въ пробиркъ, гдъ онъ растворился, кучку изверженій личинки, ея посклѣднюю шкурку и экзувій, а нахожу, кром'т этого, распаренный трупъ личинки и 4 или 5 личинковыхъ шкурокъ, вмѣсто одной. Это значитъ, что вылетѣвшій изъ кокона на вздникъ, наприм. микрокриптъ (Microcryptus), наколотый на булавку надъ кокономъ, не есть истинный творецъ и обладатель последняго, а захватчикъ его, сверхпаразитъ. Подобно тому, какъ поступала въ выше разсказанномъ примъръ теронія, такъ и здісь мать этого вылетівшаго изъ кокона микрокрипта нашла въ лѣсу въ предыдущемъ году готовые коконы офіона, почуяла, что въ нихъ заключены личинки, которыхъ могутъ высосать ея дътки и воспользовалась представившимся случаемъ для ихъ обезпеченія. Каждый коконъ она просверлила и отложила въ него свое яичко, послъ чего истинный строитель кокона-лежащая въ немъ личинка офіона, сдълалась жертвой, какъ была нѣкогда ея жертвою гусеница, въ которой она развивалась. Теперь же на счетъ личинки офіона внутри ея собственнаго кокона выкармливается личинка микрокрипта, достигаетъ полнаго развитія и, превратившись въ окрыленнаго наъздника, прогрызаетъ себъ выходное отверстіе въ стънкъ захваченнаго чужаго кокона, а затъмъ вылетаетъ изъ него и попадаетъ ко мнъ на булавку вмъстъ съ кокономъ, чтобы повъдать намъ объ истинныхъ условіяхъ своего воспитанія. А есть энтомологи, которые считаютъ этого, вылетъвщаго изъ кокона, микрокрипта за истиннаго его творца и владъльца, и причисляютъ его къ полезнымъ насъкомымъ, полагая, что онъ уничтожаетъ вредныхъ гусеницъ. Однако, кипячение въ ѣдкомъ кали открываетъ намъ истинную природу такихъ «полезныхъ» дъятелей. Особенно много ихъ хранится у меня въ ящикъ съ надписью «крипты» (Cryptini—Phygadeuon, Cryptus, Hemiteles и проч.). Здъсь при каждомъ случаъ кипяченія въ ъдкомъ кали подколотаго подъ на вздникомъ кокона, срывается маска «полезности» съ находящагося надъ кокономъ крипта. Все это сверхпаразиты, завладъвшіе чужими коконами, напр. коконами метеора, микрогастера, офіона, эникоспила, кампоплекса и другими коконами дъйствительно полезныхъ для насъ паразитныхъ дъятелей. Наъздникъ-монодонтомеръ (Monodontomerus) долго считался, да и до сихъ поръ нъкоторыми считается, за полезнаго паразита перваго ряда и только мои изслъдованія, основанныя на примѣненіи ѣдкаго кали, представили его «полезную» дѣятельность въ истинномъ освѣщеніи. Въ главѣ о монодонтомерѣ и криптахъ мы еще вернемся къ подробностямъ этого явленія, а теперь дѣло идетъ объ указаніи общаго способа его обнаруженія. Тѣмъ же способомъ легко распутываются и еще болѣе сложныя отношенія сверхпаразитизма, представляемыя паразитами 3-го, 4-го и т. д. рядовъ, которые въ природѣ не рѣдки. Тотъ же монодонтомеръ можетъ развиваться на счетъ личинокъ тероніи, паразитировавшихъ на личинкахъ пимплы, а личинокъ монодонтомера могутъ въ свою очередь высосать личинки дибрахиса (Dibrachys) и т. д.

Бываютъ случаи, когда въ одного хозяина нѣсколько самокъ наѣздниковъ отложатъ послѣдовательно свои яички, изъ которыхъ потомъ вылупляются личинки. Но въ одномъ хозяинѣ можетъ развиться до конца большей частью только одна личинка—та, которая вылупилась первою, остальныя же обыкновенно погибаютъ въ томъ или другомъ возрастѣ отъ ея челюстей, которыми она ихъ прокалываетъ и какъ бы душитъ. Трупы ихъ вмѣстѣ со шкурками одолѣвшей и преуспѣвшей побъдительницы легко обнаруживаются въ покинутомъ хозяинъ послѣ кипяченія въ ѣдкомъ кали. Это случаи совмѣстнаго паразитизма, такъ же легко разбираемые при помощи ъдкаго кали, какъ и случаи сверхпаразитизма. Всегда: трупы личинокъ—это жертвы, а отъ побъдителя остались въ хозяинъ только шкурки.

Коконы пилильщиковъ (Lophyrus, Nematus и прочіе Tenthredinidae) растворяются также, хотя и не вполнъ, въ растворъ ѣдкаго кали и тѣ изъ нихъ, которые дали наѣздниковъ, я такъ и обрабатываю, послъ чего получаю заключавшіяся въ нихъ личинковыя шкурки на высосанные ими трупы хозяевъ-Кажется, что кипящій растворъ ѣдкаго кали, представляетъ собою универсальный растворитель для всякаго рода выдъленій прядильныхъ железъ всѣхъ гусеницъ и личинокъ. Отъ куска шелковой ленты, пролежавшаго въ немъ нъсколько дней, осталось небольшое количество какого-то очень мелкаго порошка. При помощи вымачиванія въ немъ зимнихъ гнѣздъ златогузки (Porthesia chrysorrhoea L.) мнъ удавалось въ нъсколько дней совершенно растворить паутинную ткань, которою молоденькія гусеницы оплетаютъ листья въ гнъздъ. Послъ того несдерживаемые паутиной листья свободно распадались и все содержимое гназда смывалось въ стаканъ, а жгучее свойство волосковъ, покрывавшихъ гусеницъ

и ихъ шкурки, такъ невыносимо препятствовавшее изслѣдованію гнѣздъ въ сухомъ состояніи, совершенно исчезало.

Итакъ, собираніе и храненіе куколокъ, труповъ гусеницъ и коконовъ, изъ которыхъ вышли опредъленные паразиты, и обработка ихъ вышеописаннымъ способомъ въ такомъ кали-вотъ средство, при помощи котораго разрушается покровъ, такъ долго скрывавшій отъ міра ученыхъ послѣдовательность превращеній внутренностныхъ паразитовъ насъкомыхъ, послъдовательность, которая оставалась до сихъ поръ непроницаемою тайной. При помощи этого метода является возможность совершенно точно установить преемственную связь между всёми формами превращеній паразита, какъ бы разнообразны онъ ни были; является возможность точно установить истинныя отношенія, какъ въ случаяхъ простого паразитизма, такъ и во всъхъ его осложненіяхъ. Точность, достигаемая при этомъ способъ изслъдованія, даетъ вполнъ научную основу вытекающимъ изъ него выводамъ, совершенно устраняя отъ нихъ вліяніе какихъ бы то ни было случайностей. Этимъ путемъ разсматриваемая отрасль энтомологіи можетъ, наконецъ, выйти изъ тупика, въ которомъ она безсильно топталась, какъ во времена Рацебурга, такъ и въ самые послъдніе годы.

з. Наблюденія надъ живыми насъкомыми.

Указавъ на положительныя стороны вышеописаннаго метода, примѣненнаго мною, я нахожу необходимымъ указать и на отрицательную его сторону. Пользуясь имъ, мы вполнѣ устраняемъ возможность повторенія такихъ ошибокъ, въ какія, какъ было показано, впали напримѣръ Рацебургъ и Говардъ въ данныхъ ими изображеніяхъ и описаніяхъ личинокъ наѣздниковъ. Но этотъ методъ не всегда даетъ, какъ было сказано, матеріалъ, вполнѣ пригодный для сужденія о всѣхъ стадіяхъ развитія личинокъ и во всѣхъ ихъ частяхъ, ибо иногда, вмѣсто полныхъ шкурокъ молодыхъ личинокъ, мы находимъ только ихъ головки и тогда, при неимѣніи дополнительнаго спиртоваго матеріала, возстановить форму всего тѣла личинки невозможно. Наблюденія мои надъ живыми молодыми личинками, особенно во время процесса линьки, показали, что у нѣкоторыхъ видовъ сбрасывае-

мая при линькѣ шкурка бываетъ такъ тонка и нѣжна, что нѣтъ возможности обработать ее никакимъ способомъ. Если взять ее на иглу, чтобы перенести изъ одной капли въ другую или расправить на ней складку, она прилипаетъ къ иглѣ, какъ паутина, не смачивается при погруженіи въ жидкость и не смывается съ иглы; если другою иглой помочь ей отстать отъ цервой, она прилипаетъ къ другой и тогда рвется иглами на клочки. Столь тонкія шкурки (встрѣчающіяся, конечно, не у всѣхъ видовъ), если не растворяются при кипяченіи или вымачиваніи въ ѣдкомъ кали, то механически при этомъ разрушаются. При такомъ способѣ изслѣдованія можно считать обезпеченнымъ полученіе полной личинковой шкурки для всякаго вида наѣздниковъ только взрослой личинки, той наиболѣе прочной шкурки, которая сбрасывается личинкой при окукливаніи.

Кромѣ того, изучая содержимое нашей пробирки, мы можемъ читать написанную часто весьма четкими буквами исторію прошлаго и можемъ устанавливать по ней этапы, черезъ которые проходила жизнь личинки. Тъмъ же путемъ мы можемъ познавать отношенія, которыя имѣли мѣсто въ случаяхъ простого паразитизма и въ случаяхъ его осложненій, какъ сверхпаразитами такъ и совмъстнымъ паразитизмомъ. Въ обоихъ случаяхъ, однако, мы являемся только читателями того, что написано о прошлыхъ событіяхъ, но не зрителями этихъ событій. Число линекъ и ихъ послъдовательность мы устанавливаемъ, но процесса линьки, перехода одной стадіи въ другую, не видимъ; явленія осложненнаго паразитизма удостов фряемъ во всей ихъ послъдовательности, но теченія событій, которыя при этомъ совершались, не наблюдаемъ. При такой постановкъ предметомъ изученія нашего является умерщвленная природа въ лицъ тъхъ представителей ея, которые хранились на булавкахъ или въ спирту и обработаны ѣдкимъ кали въ пробиркъ. Но для полнаго пониманія связи, существующей между явленіями и ихъ отдёльными моментами, чтобы вполнъ вникнуть въ причины установившихся отношеній, необходимо быть зрителемъ событій и при томъ такимъ зрителемъ, который можетъ вмъщиваться въ совершающіяся событія и направлять ихъ въ ту или другую сторону. А для этого существуетъ только одинъ способъ: вести наблюденія надъ живыми насъкомыми, надъ живыми наъздниками, содержимыми въ неволъ. Выше я привелъ весьма пессимистическій отзывъ французскаго энтомолога Бертумье объ этомъ способъ наблюденій, который,

по словамъ его, былъ уже испытанъ, но не далъ результатовъ, какихъ отъ него ожидали. Не будемъ, однако, придавать рѣ-шающаго значенія этому мнѣнію, памятуя о томъ, что другой французскій энтомологъ, знаменитый Фабръ, съ необыкновенной плодотворностью примѣнялъ этотъ способъ въ теченіе многихъ лѣтъ къ насѣкомымъ, очень близко стоящимъ къ нашимъ наѣздникамъ, ко многимъ представителямъ того же отряда пленчатокрылыхъ. Если это было осуществимо тамъ, почему не можетъ осуществиться здѣсь?

Однако, осуществленіе этой идеи оказалось возможнымъ только при той обстановкѣ, которую дала учрежденная три года назадъ лабораторія. Впослѣдствіи будутъ изложены мною сдѣланныя при этомъ наблюденія относительно каждаго вида или группъ ихъ въ отдѣльности, теперь же нахожу необходимымъ сообщить о тѣхъ общихъ чертахъ принятыхъ мною пріемовъ наблюденія, которыя относятся одинаково ко всѣмъ насѣкомымъ, подвергавшимся наблюденію. Начну съ добыванія живыхъ наѣздниковъ.

Постояннымъ источникомъ полученія живыхъ на вздниковъ служатъ для меня посылки съ куколками и гусеницами бабочекъ, присылаемыя по почтъ изъ лъсничествъ или отъ моихъ друзей-энтомологовъ. Большею частью это бываютъ куколки, а гусеницъ присылаютъ ръже и о нихъ я буду особо говорить. Посылаемыхъ куколокъ закупориваютъ обыкновенно въ прочные деревянные ящики и пересыпають ихъ опилками или мохомъ, или опавшей листвой, а случается, что перекладываютъ ватой. Такъ поступаютъ съ куколками голыми, т. е. открыто лежащими или висящими, но если куколки въ коконахъ, то пересыпать или перекладывать ихъ чемъ бы то ни было неть настоятельной надобности. Изъ полученной посылки я сейчасъ же отбираю, какъ раньше было описано, зараженныхъ куколокъ, т. е. не шевелящихъ брюшкомъ, и размъщаю ихъ по 2 — 3 въ небольшіе закрывающіеся стаканчики, которые заготовлены въ лабораторіи сотнями. Здоровыми куколками, т. е. шевелящими брюшкомъ, я воспользуюсь впоследствіи, чтобы давать ихъ для зараженія наъздникамъ, которые выведутся въ стаканчикахъ, и потому кладу ихъ для храненія на холодъ, зимою — между оконныхъ рамъ, а льтомъ-въ комнатный ледникъ.

Стаканчики съ зараженными куколками устанавливаются въ ряды на столахъ и каждый день по нъсколько разъ осматриваются. Вышедшій изъ куколки на таку держится обыкновенно

или на стънкахъ стаканчика или на крышкъ его, причемъ въ послѣднемъ случаѣ для перемѣщенія наѣздника надо перенести крышку съ нимъ на другой, рядомъ поставленный, пустой стаканчикъ; а если онъ держится на стѣнкахъ, то, снявъ крышку, надо опрокинуть другой такой же стаканчикъ на первый, и, потряхивая ихъ, заставить на вздника переполэти въ приставленный стаканчикъ. Когда изъ куколокъ выводятся наъздники разныхъ видовъ и половъ, то я раздъляю ихъ въ разныя помъщенія. Самокъ одного вида собираю въ одно общее помъщеніе, а самокъ другого-въ другое, причемъ самцы ихъ также раздъляются и держатся отдёльно отъ самокъ. Куколокъ, изъ которыхъ вышли на вынимаю изъ стаканчиковъ и собираю соотвътственно видамъ наъздниковъ. Такимъ образомъ я получаю: 1) покинутыхъ паразитами куколокъ, относительно которыхъ точно извъстно, какіе именно виды паразитовъ изъ нихъ вышли и 2) завъдомо дъвственныхъ самцовъ и самокъ выводящихся на вздниковъ. Послъднее обстоятельство пригодится намъ впослъдствіи.

Выводящіеся на вздники могуть жить въ невол в продолжительное время-мъсяцами, если кормить ихъ и поить. Сейчасъ, т. е. 23 февраля 1911 г., живетъ у меня самка одного вида (Pimpla examinator F.), вылетъвшая изъ куколки 13 іюля 1910 года и давшая уже нѣкоторое потомство. Помѣщенія, въ которыхъ содержатся на вздники, разнообразны. Это-деревянные садки со стеклянными стѣнками и потолкомъ и съ дверцами на двухъ сторонахъ; кубическія клѣтки (въ 2 вершка) изъ мелкой металлической сътки съ такою же крышкой и, наконецъ, такія же кубическія или цилиндрическія (діаметръ—11/2 верш., высота—2 верш.) клътки, въ которыхъ металлъ замъненъ картономъ и кисеей или тюлемъ. Послъднія, т. е. картонно-кисейныя клътки, наиболье пригодны. Въ нихъ на вздники достигаютъ наибол ве глубокой старости. Въ металлическихъ клъткахъ у нихъ довольно скоро обламываются коготки на лапкахъ, а потомъ отпадаютъ мало-по-малу и членики лапокъ, послъ чего наъздникъ теряетъ способность чистить свои усики, которые составляють его главнъйшій освъдомительный органъ. Для чистки усовъ у него имфется на первой паръ ногъ особое приспособление, состоящее изъ выемки при основаніи перваго, т. е. основного, членика лапки. Поднявъ переднюю ножку къ основанію усика онъ прикасается къ нему этою выемкой, пригибаетъ лапку къ голени и прижимаетъ къ ней усикъ, послѣ чего протаскиваетъ его до самаго конца между выемкой и голенью, счищая съ него такимъ образомъ приставшій соръ. Когда лапка отвалилась, чистить усики нечѣмъ, и эта потеря дѣлается для него смертельной. Нечищенные усы волочатся передъ нимъ, какъ плети, онъ перестаетъ владѣть ими и скоро умираетъ. Таковы у наѣздниковъ внѣшніе признаки наступленія старости, внаменующейся прежде всего потерею коготковъ и члениковъ лапокъ. Эта старость съ ея роковымъ концомъ наступаетъ и у тѣхъ, которые живутъ въ тюлевыхъ клѣткахъ, но значительно позднѣе.

Кормленіе на вздниковъ производится такимъ образомъ. На пластинкъ стекла дълаю маленькій мазокъ медомъ, пускаю на него изъ пипетки каплю воды и подвигаю стекло къ тюлевому цилиндрику, въ которомъ живетъ навздникъ. Этотъ спокойно держится на потолкъ своего помъщенія, я снимаю крышку и ставлю ее вмъстъ съ наъздникомъ надъ каплей съ медомъ. Его освъдомительный органъ быстро даетъ ему знать, что тутъ есть нъчто ароматное, сладкое и жидкое, чего можно попробовать. На вздникъ переходитъ на стекло и начинаетъ поглощать сиропъ. Насытившись, онъ снова всползаетъ на свой потолокъ и чиститъ усы, а я тымъ временемъ пристраиваю его съ крышкой туда, откуда взялъ, и перехожу къ другому питомцу, гдф повторяется то же. Если натадникъ держится на сттикт клатки, то снявъ крышку или дно (которое также снимается), прикладываю открытый край клетки къ стеклу около сладкой капли и, такъ какъ это происходитъ передъ окномъ или передъ лампой, на вздникъ направляется къ свъту и на пути къ нему встръчаетъ каплю, къ которой съ жадностью припадаетъ. Его заднія ножки еще на краю клѣтки, я потихоньку тяну клѣтку и тѣмъ оттягиваю его отъ капли, тогда онъ дълаетъ 1-2 шага впередъ и всъ его ножки на стеклъ, послъ чего я покрываю его этою клъткой и жду, пока онъ насытившись всползетъ на ея стѣнки, послѣ чего закрываю клѣтку и перехожу къ слѣдующему. Сдѣлавъ медовые мазки на 2-3 стеклянныхъ пластинкахъ, можно кормить сразу 2-3 наъздниковъ и, пока они кормятся, заниматься другимъ дъломъ.

Кормленіе на вздниковъ въ общихъ садкахъ, гд в ихъ много, производится н сколько иначе. На стеклянную пластинку кладу меду н сколько больше и пускаю на него 3—5 капель воды. Подношу садокъ къ окну или къ ламп в, поворачиваю его такъ, чтобы та сторона, гд в находится дверка, была обращена ко мн в,

а противоположная къ источнику свъта и, когда большая часть питомцевъ соберется на освѣщенной сторонѣ, открываю немного дверку на задней сторонъ и вдвигаю въ садокъ пластинку съ сиропомъ, послѣ чего дверка закрывается, садокъ же помѣщается такъ, чтобы свътъ по возможности равномърно его освъщалъ. Скоро тотъ или другой изъ заключенныхъ замѣчаетъ сладкую жидкость и пристраивается къ ней. Находятся подражатели и постепенно все населеніе садка, иногда довольно многочисленное, располагается, какъ стадо на водопоъ, вокругъ лакомаго напитка, причемъ одни всползаютъ на другихъ и сосутъ склонившись съ нихъ, а тъ, увлеченные тдой, позволяютъ сидть на себт, ничтыт не выражая своего недовольства. Случаются, однако, и стычки, когда вновь пришедшій, найдя всѣ мѣста занятыми, старается протискаться впередъ, а сосъди не пускаютъ его. Мало-по-малу кормящіеся насыщаются и отходять, вокругь жидкости становится свободнѣе, но и жидкости уже почти нѣтъ, и опоздавшіе долизываютъ послѣдніе ея слѣды. finds the description of the second

Мелкіе наъздники и тъ изъ крупныхъ, которые сбрасываютъ яйца, содержатся въ стаканчикахъ. Каждый стаканчикъ закрытъ крышечкой, которая состоитъ изъ металлическаго ободка и припаянной къ нему мелкой металлической съткъ. На этой съткъ я дълаю снаружи небольшой мазокъ медомъ и пускаю на него одну каплю воды, которая скоро протекаетъ на внутреннюю сторону крышечки и повисаетъ на ней. Узникъ стаканчика находитъ эту каплю и насыщается. Капля высыхаетъ, но остатки меда остаются на съткъ и при слъдующемъ кормленіи достаточно пустить на нее только одной воды.

Какъ часто надо кормить наѣздниковъ? Въ началѣ моихъ наблюденій я старался кормить ихъ ежедневно, но это было очень хлопотно и я сталъ кормить черезъ день, потомъ еще увеличилъ промежутки, теперь есть такіе (наименѣе интересные), которыхъ кормлю разъ въ недѣлю, и они живутъ, не умираютъ. Казалось бы, можно упростить кормленіе тѣмъ, что ставить въ садки большіе запасы пищи и оставлять ихъ тамъ, не вынимая послѣ насыщенія. Такъ я и дѣлалъ въ началѣ, но оказалось, что это упрощеніе связано съ большимъ неудобствомъ. Наѣздники часто падали въ поставленный имъ запасъ жидкой пищи и пачкались такъ, что потомъ никакъ не могли очистить себя отъ липкаго сиропа, что ускоряло наступленіе смерти.

Итакъ, въ садкахъ и клъткахъ содержатся отдъльно дъвствен-

ныя самки и самцы. Это даетъ возможность соединять ихъ по временамъ въ одномъ помѣщеніи и наблюдать ихъ браки. Всѣ спеціалисты, которые занимались изученіемъ наѣздниковъ, жалуются на то, что имъ или совсѣмъ не приходилось наблюдать спариванія этихъ насѣкомыхъ, или удавалось очень рѣдко. Слѣдствіемъ недостатка въ такихъ наблюденіяхъ явилась нѣкоторая путаница въ описаніяхъ представителей разныхъ половъ одного и того же вида. Руководствовались при этомъ сходствомъ внѣшности, что нерѣдко вводило въ заблужденіе даже опытныхъ систематиковъ. Рацебургъ, напримѣръ, приписалъ нѣкоторыхъ представителей группы криптовъ (Cryptini), въ качествѣ самцовъ, къ самкамъ рода ихневмонъ (Ichneumon) и разобрался въ такихъ ошибкахъ лишь впослѣдствіи—отчасти самъ, отчасти ихъ указали другіе позднѣйшіе изслѣдователи.

Не рѣдки и противоположные примѣры, т. е. описаніе самцовъ и самокъ одного вида, какъ разныхъ видовъ. На этой почвѣ разыгрался у меня небольшой конфликтъ съ уважаемымъ Н. Р. К о к у е вы мъ, который такъ радушно помогаетъ мнѣ всегда своей превосходной опытностью въ систематикѣ наѣздниковъ. Этотъ конфликтъ благополучно разрѣшился къ нашему взаимному удовольствію, и я сейчасъ изложу его, такъ какъ разрѣшеніе его связалось съ необходимостью уничтоженія одного изъ давно описанныхъ видовъ наѣздниковъ, что, конечно, должно быть занесено въ лѣтопись энтомологіи.

Въ разные годы и изъ разныхъ губерній были получены мною, въ довольно большомъ количествѣ, куколки сосновной ночницы (Panolis variegata), изъ которыхъ между прочими наѣздниками выводились каждый разъ два вида ихневмоновъ, опредѣленные Н. Р. К о к у е в ы м ъ какъ Ichneumon pachymerus Н а r t. и Ichneumon aciculator R a t z b ¹). Во всѣхъ посылкахъ оба эти вида были представлены десятками экземпляровъ, но всегда только одного пола: I. pachymerus были исключительно самки, а I. aciculator только самцы. Весьма естественно, что мнѣ пришло въ голову

¹⁾ Воть перечень лѣсничествъ и губерній, изъ которыхъ они были получены: 1894 г. — Рожновъ Боръ Владимірской губ. и Камышловское л-во Пермской губ.; 1896 г.—Суводская дача Вятской губ.; 1901 г.—Изюмское л-во Харьковской губ.; 1906 г.—Лабонарское л-во Виленской губ., Новоалександровское л-во Ковенской губ. и Нейгутское л-во Курляндской губ.; 1907 г.—оба послѣднія л-ва; 1909 г.—Куртамышское л-во Оренбургской губ.

предположеніе: не есть ли *I. aciculator* самецъ для самки *I. pachy- merus*, каковое предположеніе и было высказано мною въ письмѣ
къ Н. Р. Кокуеву. Въ отвѣтъ я получилъ указаніе, что самецъ *I. pachymerus* давно описанъ Весмаэлемъ въ Брюсселѣ '), а
потому мое предположеніе падаетъ само собой, но что самка *I. aciculator* до сихъ поръ не описана, да и самцовъ этого вида
со временъ Рацебурга, описавшаго его въ 50-хъ годахъ прошлаго столѣтія (40, III, 172), никто до меня не находилъ, почемумоя
находка этого ихневмона и на такомъ обширномъ пространствѣ
является особенно интересной.

Послѣ этого письма, въ 1910 г., я снова начинаю выводить на вздниковъ изъ куколокъ сосновой ночницы изъ Куртамышскаго л-ва Оренбургской губ., и обращаю особенное вниманіе на эти оба вида. Сначала выводятся самцы (I. aciculator), какъ это почти всегда бываетъ у насъкомыхъ, и я тщательно изолирую ихъ, потомъ появляются самки (I. pachymerus) и этихъ я тоже уединяю. Затъмъ, пускаю самца I. aciculator въ помъщение самокъ І. распутетия и съ удовольствіемъ вижу, что онъ немедленно принимается за ухаживанія, которыя не встр'вчаютъ никакого сопротивленія: парочка быстро соединилась и въ это время была покрыта мною стаканчикомъ, чтобы оплодотворенная самка не затерялась потомъ среди дѣвственныхъ. Послѣ того пускаю другого самца къ этимъ же самкамъ и опять наблюдаю быстро соединившуюся пару, которую также уединяю. Всъ бывшіе тогда у меня самки I. pachymerus были оплодотворены такимъ образомъ самцами I. aciculator. Немедленно было послано извъщение о совершившемся событіи въ Ярославль, къ Н. Р. Кокуеву, а позднъе отослалъ ему же для провърки мои опредъленія этихъ самцовъ и самокъ, уже наколотыхъ на булавки, и имълъ удовольствіе получить ихъ обратно съ этикетами: Ich. pachymerus Hart., какъ на самкахъ, такъ и на самцахъ. Стало быть, видъ Ich. aciculator Ratzb. отошелъ въ въчность, отошелъ, какъ говорять составители каталоговъ, въ синонимы. Былъ описанъ въ 50-хъ годахъ прошлаго столътія, съ тъхъ поръ никто не находилъ его до меня, а теперь появился на моментъ, какъ особенно интересная находка, чтобы пройдя подъ моимъ стаканчикомъ, снова исчезнуть, но уже навъки. Какъ же быть теперь съ тѣмъ самцомъ, котораго описалъ Весмаэль, какъ самца *I. расhymerus*? Я не знаю—это дѣло систематиковъ, а не мое. Во всякомъ случаѣ, къ виду *Ich. расhymerus* онъ не имѣетъ никакого отношенія и долженъ уступить свое неправильно занятое мѣсто истинному его обладателю. Такъ проникаетъ истина въ науку: хотя и медленно, но безповоротно. Находка, сдѣланная за Ураломъ въ 1910 г., пройдя черезъ Ярославль и Петербургъ, освѣтила то, что было затемнѣно въ 1844 году въ Брюсселѣ.

Изъ тѣхъ же куколокъ ночницы выводились у меня самцы и самки другого наѣзника, оба пола котораго были описаны Гравенгорстомъ (Gravenhorst) подъ названіемъ Ісhneumon bilunulatus Gr. Къ этимъ самкамъ я пускалъ сначала самцовъ предыдущаго вида, но изъ этого ничего не вышло: они оставались другъ къ другу глубоко равнодушными. Когда же пустилъ къ нимъ супруговъ, назначенныхъ имъ только что названнымъ ученымъ, спариванія состоялись немедленно. На этотъ разъ глазъ систематика не ошибся и правильно соединилъ представителей разныхъ половъ въ одинъ видъ.

Наблюденія надъ спариваніями въ лабораторіи объяснили между прочимъ причину, по которой столь малому числу изслѣдователей удавалось наблюдать этотъ актъ у наѣздниковъ на свободъ. Спаривание продолжается у нихъ въ громадномъ большинствъ случаевъ очень короткое время: полминуты, минуту, двъ. Кромъ того, самка, однажды оплодотворенная, у большинства видовъ не спаривается вторично до конца жизни. Одного оплодотворенія ей достаточно на всю жизнь и послѣ того она не уступаетъ никакимъ ухаживаніямъ и никакимъ насиліямъ самцовъ. Это тъ виды, которые въ другой моей работъ (72, 95) названы мною однобрачными — uninuptae. Ръже встръчаются среди наъздниковъ и многобрачные-m ultinuptae, о которыхъ мнѣ придется еще говорить, равно какъ о ненормальныхъ отклоненіяхъ, наблюдаемыхъ иногда въ половыхъ отношеніяхъ однобрачныхъ видовъ. Понятно, что при такой краткости спариванія и неповторяемости его оно должно было ускользать отъ взоровъ наблюдателей, желавшихъ видъть его на свободѣ, въ условіяхъ случайности.

Итакъ, изолированіе по отдѣльнымъ стаканчикамъ куколокъ, изъ которыхъ выводятся наѣздники, представляетъ два существенныхъ преимущества: 1) по выходѣ наѣздника получается

¹⁾ Онъ быль описанъ, какъ новый, подъ названіемъ *Ichneumon trucidus*, но впослъдствіи ошибка эта была открыта и *I. trucidus* Wesm. вошель въ каталоги, какъ синонимъ къ *I. pachymerus* Наг t. (57, 97).

куколка, изъ которой можно добыть одну или нѣсколько личинковыхъ шкурокъ вышедшаго, точно опредѣленнаго, наѣздника и 2) мы получаемъ завѣдомо дѣвственныхъ самцовъ и самокъ, спариванія которыхъ можемъ наблюдать, и провѣрять такимъ образомъ правильность отнесенія ихъ систематиками къ одному или разнымъ видамъ, а такой способъ провѣрки единственно возможный и непререкаемый, какъ непререкаема видовая доподлинность личинокъ, описываемыхъ по оставшимся отъ нихъ шкуркамъ.

Оплодотворенныя самки, предназначенныя для дальнъйшихъ наблюденій, отдъляются и каждая получаетъ особый номеръ по общему списку, который для каждаго вида ведется отдъльно. Для самцовъ ведется другой списокъ и они также въ случаъ надобности изолируются и получаютъ свои номера. Въ каждомъ спискъ отмъчается названіе хозяина, изъ котораго вышелъ натъздникъ, время его выхода, время спариванія, номеръ самца или самки, съ которыми спариваніе совершалось, и время смерти. Дальнъйшія наблюденія надъ изолированными самками состоятъ главнымъ образомъ изъ наблюденій надъ кладкою яицъ въ предлагаемыхъ куколокъ.

По этому поводу я долженъ дать слѣдующее разъясненіе. Наѣздники, выходящіе изъ куколокъ, должны быть раздѣлены по отношенію къ кладкѣ яицъ на двѣ группы. Самки одной группы кладутъ яички въ гусеницъ, гдѣ личинки ихъ проходятъ лишь первыя стадіи развитія, не мѣшая гусеницамъ достигнуть полнаго роста и окуклиться, послѣ чего паразитныя личинки совершаютъ и доканчиваютъ свое дальнѣйшее развитіе въ куколкахъ, въ нихъ же окукливаются и превращаются въ наѣздниковъ, выходящихъ изъ куколокъ. Слѣдовательно, чтобы наблюдать кладку и первыя стадіи развитія наѣздниковъ этой группы, надо имѣть и предлагать имъ для кладки гусеницъ, такъ какъ въ куколокъ онѣ класть не станутъ. Самки наѣздниковъ другой группы, напротивъ—кладутъ только въ куколокъ, а гусеницъ нетрогаютъ и проходятъ въ куколкахъ все свое развитіе.

При тѣхъ лабораторныхъ условіяхъ, въ которыхъ производится моя работа, приходится отказаться отъ наблюденій надъразвитіємъ наѣздниковъ первой группы, потому что въ лабораторіи нѣтъ возможности имѣть постоянно запасы живыхъ гусеницъ. Кормить ихъ нечѣмъ. Лабораторія помѣщается въ боль-

шомъ городъ, на 4-мъ этажъ, среди 5-6-этажныхъ домовъ, передъ которыми, если и видна какая нибудь чахлая растительность, то и та находится подъ особой охраной ея владъльцевъ. Моимъ гусеницамъ для корма ее никто не дастъ. За нимъ надо ъздить за городъ, а это требуетъ такого расхода времени, какой можно позволить себъ лишь для исключительныхъ случаевъ, но не для ежедневныхъ и постоянныхъ работъ. Другое дълокуколки. Ихъ не надо кормить, а нужно только хранить на холодъ, и всегда можно имъть ихъ въ изобиліи. Если истощаются запасы, присланные изъ лъсничествъ, то я обращаюсь къ заграничнымъ продавцамъ. Въ иностранныхъ этномологическихъ журналахъ, особенно въ еженедъльныхъ, всегда можно найти объявленія, въ которыхъ за плату, часто весьма умфренную, предлагають сотни и тысячи живыхъ куколокъ самыхъ разнообразныхъ видовъ бабочекъ. Этимъ источникомъ я пользуюсь по временамъ для того, чтобы пополнять и разнообразить свои запасы. Конечно, не безъ чувства сожальнія отказываюсь я отъ постоянныхъ наблюденій надъ паразитами гусеницъ, но, пока паразиты куколокъ даютъ интересный матеріалъ для этихъ наблюденій, можно забыть на время о паразитахъ гусеницъ. Тъмъ не менъе, хотя случайно и отрывочно, мнъ все-таки удалось произвести въ лабораторіи и надъ этими паразитами нъсколько интересныхъ наблюденій, которыя будутъ мною изложены.

Для кладки яйца въ куколку самка на вздника сначала сверлитъ оболочку жертвы яйцекладомъ или сверломъ, погружаетъ его въ нее на опредъленную глубину и впускаетъ черезъ него въ куколку яичко. Пріемы сверленія и процессы, которые при этомъ наблюдаются, у разныхъ на вздниковъ различны, поэтому описанія ихъ будуть даны при описаніи развитія отдівльныхъ видовъ, а теперь прибавлю только одно замѣчаніе: не всякое сверленіе сопровождается откладываніемъ яйца. При видъ подходящей жертвы у самки на вздника брюшко подгибается обыкновенно какъ бы само собою, инстинктивно, сверло приставляется къ жертвъ и сверленіе начинается часто независимо отъ того, есть ли у самки яйцо, готовое для кладки, и можетъ ли она выпустить его изъ себя. Неръдко бываетъ, что самка, просверливъ куколку и погрузивъ въ нее яйцекладъ, вынимаетъ его обратно, ничего не отложивъ, и равнодушно уходитъ. Кромъ того, самки наъздниковъ сверлятъ иногда совсъмъ не для кладки яйца, а для того, чтобы сдълать ранку и черезъ нее

напиться крови своей жертвы. На рис. 11 изображена пимпла, которая, просверливъ куколку бабочки, погрузила въ нее яйцекладъ нъсколько разъ до самаго основанія, направляя его въ разныя стороны, послѣ чего изъ раны выступила капля крови. Тогда пимпла, сдълавъ шагъ назадъ, вытянула обратно яйцекладъ, но не весь, а такъ, что кончикъ его остался въ ранъ, и жадно припала ртомъ къ той каплъ крови, которую добыла такимъ жестокимъ способомъ. Этотъ моментъ переданъ В. И. Плотниковымъ на фотографическомъ изображении нашего рисунка. Выпивъ всю каплю, пимпла опять сдълала шагъ впередъ, снова погрузила яйцекладъ и снова начала ковырять имъ внутренности беззащитной жертвы, которая судорожно дергала концомъ брюшка въ разныя стороны и больше ничъмъ не



Рис. 11. Пимпла (Pimpla instigator L.), пьющая кровь своей жертвы. Ест. велич. Оригин.

могла отвътить на такую неистовую жестокость своего мучителя. Выступила новая капля и пимпла такъ же поглотила ее, какъ первую, послѣ чего опять начала то же, но я прогналъ ее наконецъ. Въ виду такихъ нравовъ, нужно съ большой осторожностью отнестись къ показаніямъ тъхъ авторовъ, которые говорять, что они видъли, какъ совершается кладка яицъ у наъздниковъ, и даютъ ея описанія. Часто они видъли только

сверленіе, но не кладку. Явленія, которыя совершаются при настоящей кладкъ, т. е. при прохождении яйца черезъ сверло, доступны наблюденіямъ въ лупу и будутъ мною описаны, но никто изъ авторовъ, писавшихъ о кладкѣ, объ этихъ явленіяхъ ничего не говоритъ.

Кромъ оплодотворенныхъ самокъ, я разсаживаю по отдъльнымъ клѣткамъ и снабжаю номерами по общему видовому списку и дъвственницъ. Эти самки также способны класть яйца, но изъ отложенныхъ ими яицъ выводятся только самцы. Главная цъль моихъ занятій-полученіе личинокъ для ихъ описанія, а для этой цізли безразлично, будеть ли личинка отъ оплодотворенной или отъ дъвственной самки.

Для каждой кладущей самки отводится особый листокъ бумаги, на который заносятся постепенно всъ кладки, сдъланныя ею, съ указаніемъ: когда сдівлана кладка, номеръ ея по порядку и названіе куколки, въ которую отложено яйцо. Каждая такая куколка помъщается въ особый стеклянный цилиндрикъ, заткнутый

ватой, и въ него же кладется билетикъ, на которомъ отмъчено: названіе и номеръ самки, положившей яйцо, и номеръ кладки. Впосл'ъдствіи, когда выходить изъ куколки въ цилиндрик' новый ната дникъ, онъ получаетъ очередной номеръ по общему списку этого вида, куда онъ также заносится, а по билетику его разыски вается листокъ его матери и тамъ дълается отмътка противъ кладки соотвътствующаго номера о времени его выхода, съ указані емъ пола и номера, полученнаго имъ по общему списку, въ послъднемъ же дълается указаніе, отъ какихъ родителей онъ пропроизошелъ. Для поясненія привожу по нѣсколько строкъ, какъ изъ общихъ списковъ самцовъ и самокъ одного вида воспитанныхъ въ лабораторіи на вздниковъ, такъ и изъ таблицы кладокъ одной самки.

Общій списокь самокь (\$\mathbb{Q}) Pimpla instigator.

Время вы- вы- лета изъ кукол- ки. 2	мен кладки Мен кладки	Время клад- ки.	Названіе куколки.	Число дней раз- витія.	Время с риванія № д или	и	смер-	дней
15. IV.16	3 8	I.21	Sphinx euphorbii	86	27.IV. &	18.	VI.8	53
33. VI.10 1	5 6	V.11	Spilosoma lubricipeda	30	14.VI. &	60.	VII.17	37
37. VI.25 -	-14	V.21	Gastropacha pini	25	26.VI. &	77.	VII.15	21
39. VIII-9.3	3 1	VI.15	Aporia crataegi	25	9. VII. &	72.	1)	
			To see canyors	(88)				

18. VI. 10. 3 2 I.15	Panolis variegata 8	36 27.IV♀ 15. V.31	52
49. VI. 7.29 5 V.7	Gastropacha pini	31 холостякъ.VII.10	33
60. VI. 10.15 9 V.13	Arctia villica 2	8 14.VI.♀ 33. VII.27	47
72. VI. 16.15 16 V.24	Aporia crataegi 2	23 26.VI. ♀ 37. VII.24	39
		.9.VII.♀ 39. ²)	100.00

15-я ♀ Pimpla instigator. Кладки.

Время кладки.	№ клад	Названіе куколки,	Время вылета и №			
кладки.	ки.	въ которую отложено яйцо.	3	φ		
V.10	5	Arctia villica	VI.4.3 49	First and the same of		
V.11	6	Spilosoma lubricipeda	national Ellipsian	VI.10.♀ 33		
V.13	9	Arctia villica	VI.10. & 60			
V.21	14	Gastropacha pini	Plot a subject	VI.25.♀ 37		

¹⁾ Поставлена на холодъ 26.VIII и найдена тамъ мертвой 2.X.

²) Спаривался съ 2-мя самками.

Тѣ самки, которымъ я не даю куколокъ для кладки, но которыхъ кормлю и пою, оплачиваютъ свое содержаніе хорошею платой, но соверщенно неожиданной. Не имѣя во что отложить созрѣвшія и готовыя для кладки яички, онѣ сбрасываютъ ихъ, усыпая ими полъ и стѣнки своего помѣщенія. Чрезвычайно трудно услѣдить моментъ, когда яичко сбрасывается, но мнѣ удалось нѣсколько разъ наблюдать это. Самка банхуса (Banchus) сбросила при мнѣ послѣдовательно три яичка, положивъ ихъ одно на другое. Всѣ они вышли черезъ половую щель, находящуюся при основаніи яйцеклада, а не черезъ яйцекладъ. Самка сидѣла при этомъ на стѣнкѣ внутри опрокинутаго стаканчика, я же съ лупою въ рукахъ набдюдалъ черезъ стекло, какъ яички выходили.

Оболочка яичекъ такъ тонка и нъжна, что, кажется, должна порваться при малъйшемъ прикосновении иглы или пинцета, когда я пытаюсь собирать ихъ. Благодаря тонкости оболочки яичко, оставленное нетронутымъ, скоро начинаетъ подсыхать и въ тотъ же день сморщивается, какъ сухая пленка. Мать отложила бы яйцо, если бы нашла подходящую жертву, внутрь влажной среды, въ кровь и въ жиръ гусеницы или куколки, гдъ развитие зародыща въ яйцъ протекало бы благополучно, а сброшенное яичко остается среди сухости комнатнаговоздуха и отъ того зародыщъ въ немъ погибаетъ. Это соображеніе внушаетъ мнѣ мысль о необходимости осматривать почаще помъщенія тъхъ самокъ, которымъ я не даю куколокъ для кладки, и собирать сброшенныя ими яички, чтобы класть ихъ тотчасъ же въ воду. Каждый день по нъскольку разъ я произвожу такой осмотръ, осторожно прикасаюсь концомъ смоченной иглы къ найденному яичку, которое прилипаетъ къ иглѣ, и погружаю его въ воду въ особой для каждаго вида чашечкъ, гдъ яичко отдъляется отъ иглы и плаваетъ на поверхности воды. Кақъ хозяйка собираетъ ежедневно яйца, которыя несутъ ей куры, такъ и я собираю яички, сбрасываемыя самками моихъ на вздниковъ, которыя въ этомъ отношении совершенно уподобляются домашней птицъ.

Болѣе крупныя яйца, въ 1 мм. длин. и около того, легко находить простымъ глазомъ и брать иглою, какъ сказано, но для сбора мелкихъ яичекъ, въ $^{1/2}$ мм. и менѣе, приходится прибѣгать къ инымъ пріемамъ. Мелкихъ самокъ, дающихъ мелкія яички, я разсаживаю подъ опрокинутыми стаканчиками на сте-

клянныхъ пластинкахъ. Передъ осмотромъ беру другіе совершенно чистые стаканчикъ и пластинку, перемъщаю сюда самку и послъ того оставленное ею помъщение осматриваю насквозь подъ лупой. На каждое найденное при этомъ на пластинкъ и на стънкахъ стаканчика яичко сейчасъ же пускается капля воды и, когда всѣ яички найдены, направляю на нихъ струю изъ пипетки и смываю въ подставленную плоскодонную чашечку. Самки нѣкоторыхъ видовъ несутъ такія мелкія яички, что даже и черезъ лупу трудно ихъ замътить. Такую самку, а она можетъ быть и крупною, какъ напримъръ самка анамалонъ, я помъщаю въ цилиндрическую кисейно-картонную клѣтку, опрокинутую, причемъ кисейная крышка делается дномъ, и ставлю ее надъ стеклянной плоскодонною чашкой, наполненной водою. Сброшенныя самкою при такихъ условіяхъ яички падаютъ черезъ ячейки кисеи (довольно крупныя) прямо въ воду, гд в нахожу ихъ при помощи бинокуляра.

Въ яичкахъ многихъ видовъ наѣздниковъ, положенныхъ въ воду, немедленно начинается развитіе зародышей, а черезъ 2—3 дня вылупляются изъ яицъ личинки, которыя плаваютъ по водѣ изгибаясь, закрывая и раскрывая свои страшныя серповидныя челюсти. Но не у всѣхъ видовъ удается получить такимъ образомъ личинокъ и, кромѣ того, есть виды, самки которыхъ совсѣмъ не сбрасывали у меня яичекъ. Почему это происходитъ и у какихъ видовъ—это умѣстно будетъ обсудить позднѣе, а теперь приведу только примѣры. Самки родовъ пимпла и банхусъ (Вапсhus) сбрасываютъ яички, дающія личинокъ; самки родовъ аномалонъ и эникоспилъ (Enicospilus) сбрасывали много яичекъ, но личинокъ изъ нихъ не удалось получить, наконецъ, самки ихневмона и криптовъ (Cryptini) ни разу не сбрасывали яичекъ, сколько я ихъ не держалъ.

Этимъ способомъ полученія личинокъ на вздниковъ я пользуюсь, гдв можно, въ широкихъ разм врахъ, но получаю только 1-ю стадію, такъ какъ для перехода личинки во вторую ей нужно кормиться, для чего нужны соки отсутствующаго хозяина, а я могу предложить только чистую воду, которая зам внить корма не можетъ. Для полученія личинокъ 2-й и слъдующихъ стадій остается только одинъ путь: вскрываніе въ опредвленные сроки куколокъ, въ которыхъ отложены яички. Такъ и поступаю. Внутренности вскрытой куколки или гусеницы промываются струей воды изъ пипетки, при чемъ выносится водою

живая паразитная личинка, а на мѣстѣ ея нахожденія въ куколкѣ лежатъ сброшенныя ею шкурки и скорлупа яичка. Иногда шкурки держатся на заднемъ концѣ тѣла личинки и вмѣстѣ съ нею выносятся водой.

Шкурки, добытыя изъ живой жертвы, даютъ гораздо болѣе цѣнный матеріалъ для сужденія объ особенностяхъ внѣшняго строенія соотвѣтствующихъ имъ стадій, чѣмъ тѣ шкурки, которыя получаются изъ сухихъ куколокъ послѣ вылета изъ нихъ паразита. Въ послѣднемъ случаѣ онѣ бываютъ часто попорчены, какъ было уже сказано, взрослой паразитной личинкой при переворачиваніяхъ ея въ куколкѣ во время постройки кокона и, кромѣ того, онѣ скомканы, въ этомъ состояніи засохли и съ трудомъ поддаются расправленію даже послѣ кипяченія, между тѣмъ какъ шкурки изъ живої у хозяина совершенне цѣлы, очень мало смяты, мягки и легко расправляются. Расправленныя на предметномъ стеклѣ шкурки окрашиваются бурой бисмарковой краской и заклеиваются въ канадскій бальзамъ.

При разсматриваніи добытой личинки возникаетъ затрудненіе. Она настолько мала, что мелкихъ подробностей ея строенія, напримъръ распредъление дыхалецъ, строение нижней губы и проч., нельзя точно разсмотр вть даже при помощи бинокуляра; вмъстъ съ тъмъ, она настолько крупна и непрозрачна, что разсматривать ее цъликомъ подъ микроскопомъ не возможно. Въ виду такого затрудненія при изображеніи этой личинки и при описаніи ея поневолъ приходится ограничиться схемой, общими мъстами, какъ и поступали всъ авторы, описанія которыхъ были выдълены мною раньше въ первую категорію. Но такія описанія ни къ чему не нужны. Какъ же выйти изъ затрудненія? Личинка сама указываетъ путь къ этому. Она дала намъ шкурки предыдущихъ стадій и по этимъ шкуркамъ, разсматривая ихъ подъ микроскопомъ, можно составить подробное описаніе всѣхъ мельчайшихъ особенностей внъшняго строенія тъхъ стадій личинки, которыя она уже перешла. Остается превратить и настоящую стадію, т.-е. добытую личинку, въ ея пустую шкурку, для чего необходимо удалить изъ личинки все ея содержимое: мускулы, жиръ, кишечникъ и проч., и тогда останется отъ личинки одна внъшняя хитиновая прозрачная оболочка, т.-е. то, что намъ надо.

Эта операція превосходно прод'єльвается надъ личинкой при помощи вымачиванія ея въ раствор'є тедкаго кали или кипяче-

ніемъ въ немъ, сдълавъ на личинкъ предварительно надръзъ, на спинъ, тамъ гдъ образуется трещина при линяніи, чтобы растворъ могъ проникнуть внутрь, или разрезать личинку пополамъ. При кипяченіи молодыхъ личиною следуеть брать слабо насыщенный растворъ, въ $2^{0}/_{0}$ — $3^{0}/_{0}$, иначе нъжныя шкурки ихъ дълаются слишкомъ тонкими, прилипаютъ къ игламъ и легко рвутся. Дальнъйшее обращение съ полученной кожицей то же, какъ съ шкурками, сброшенными при линяніи. Въ растворъ ъдкаго кали почти все содержимое личинки растворяется вполнъ, за исключеніемъ хитиновой выстилки передней и задней кишекъ и трахей. Растворяется и средняя часть кишечника съ его содержимымъ, состоящимъ изъ жидкой, полупрозрачной массы животнаго происхожденія. Этотъ же способъ, примѣненный къ личинкамъ другихъ насѣкомыхъ, даетъ тотъ же результатъ, за исключеніемъ однако, содержимаго кишечника, которое у растительноядныхъ личинокъ, какъ вещество растительнаго происхожденія, не поддается дъйствію ъдкаго кали, но оно, не удерживаемое растворившимся кишечникомъ, прекрасно вываливается изъ личинки черезъ сдѣланный на ней передъ кипяченіемъ разрѣзъ. Такъ обрабатывалъ я личинокъ ор ѣхотворокъ (Cynipidae) и пчелъ (Mellifera).

При этомъ способъ обработки личинокъ приходится отказываться отъ описанія ихъ внутренностей. Но что же д'влать: оставаться въ области схемы тоже нельзя и приходится чъмъ нибудь пожертвовать. Притомъ, моя главная цъль-описаніе внъшности личинокъ, а потому анатоміи ихъ я буду очень мало касаться. Впрочемъ, невольно я натолкнулся на способъ при помощи котораго можно до нѣкоторой степени, не вскрывая личинокъ, облегчить разсмотрѣніе и описаніе ихъ внутренняго строенія, особенно молодыхъ, первыхъ стадій развитія. Вылупившаяся изъ яйца, положеннаго въ воду, личинка имъетъ кишечникъ не прозрачный благодаря тому, что онъ наполненъ остатками питательнаго желтка. Если эту личинку еставить на нѣсколько дней въ водѣ, то постепенно кишечникъ просвѣтляется и тогда становятся хорошо зам'тными многіе внутренніе органы, напримъръ, прядильныя железы, мальпигіевы сосуды, половой зачатокъ, которые послѣдующей обработкой и окраской карминомъ хорошо фиксируются въ препаратъ заклеенной личинки. Просвътляется такимъ образомъ и 2-я стадія, вынутая изъ хозяина и положенная въ воду. Личинка въ водъ можетъ жить нъсколько дней, у Рацербурга она жила 4 дня и даже, по его словамъ (40, I, 82.), увеличилась въ ростъ. У меня также личинки разныхъ возрастовъ оставались живыми въ водъ по 4 дня и даже болъе, при чемъ не разъ пришлось наблюдать ихъ линьку. Подъ бинокуляромъ всъ подробности этого процесса корошо видны.

Слѣдуетъ имѣть въ виду, что почти всѣ личинки первыхъ стадій не могутъ переносить близкаго сосѣдства себѣ подобныхъ. Каждая, почуявъ сосѣдку вблизи, тотчасъ схватываетъ ее своими страшными челюстями и очень быстро убиваетъ. Такія сцены часто приходилось наблюдать въ водѣ, а потому впослѣдствіи я старался уединять личинокъ, чтобы не получать вмѣсто нихъ обезображенные трупы. Убившая рѣдко дѣлаетъ попытки полакомиться убитой и не разрываетъ ее, а только наноситъ въ разныхъ мѣстахъ глубокія раны своими длинными серповидными челюстями, которыя могутъ только вонзаться и колоть, но не рѣжутъ и не рвутъ, послѣ чего побѣжденная превращается въ измятый трупъ, на который побѣдительница не обращаетъ никакого вниманія.

Вернемся къ живымъ личинкамъ, которыя оставлены въ куколкахъ для вывода изъ нихъ взрослыхъ наѣздниковъ. Развитіе ихъ совершается съ различной быстротою въ зависимости отъ сезона: весною и лѣтомъ—скорѣе, осенью и зимой бываетъ очень затяжнымъ. Лѣтомъ, при открытыхъ окнахъ, къ вліянію лѣтняго тепла присоединяется вліяніе влажности воздуха и при наличности этихъ двухъ условій развитіе наѣздниковъ идетъ быстро. Зимою же, когда начинается въ комнатахъ топка печей, устанавливается въ воздухѣ лабораторіи такая сухость, которая не только задерживаетъ развитіе личинокъ, но у многихъ и совсѣмъ его пріостанавливаетъ.

Развитіе ихъ до послѣдней стадіи, пока личинки находятся среди влажныхъ внутренностей пожираемыхъ хозяевъ, идетъ почти одинаково хорошо, какъ лѣтомъ, такъ и зимой, но, когда личинка достигла полнаго роста и сдѣлала коконъ внутри сухой оболочки опустошенной ею куколки, тогда наступаетъ критическій моментъ, который не для каждой личинки разрѣшается благополучно. Она сдѣлала почти все, что было ей предназначено: перемѣстила въ себя все содержимое хозяина, слиняла установленное число разъ, достигла полнаго роста, построила коконъ и теперь только одно остается сдѣлать, чтобы послѣ того на-

чать неме дленно превращаться въ куколку: ей нужно выпустить изъ себя изверженія. Въ теченіе всей жизни она только поглощала и ничего, кромъ сбрасываемыхъ при линяніи шкурокъ, не отдавала. Ни разу не выпустила она изъ себя ни одного комочка изверженій. Теперь насталъ моментъ сдълать это, въ одинъ пріемъ освободиться отъ того, что копилось и сохранялось въ ея кишкъ въ теченіе всей прошлой жизни.

Извъстно, что у всъхъ безногихъ личинокъ пленчатокрылыхъ (осъ, пчелъ, наъздниковъ и проч.) средняя и задняя кишки разобщены, т. е. полость одной не имъетъ сообщенія съ полостью другой, въ теченіе всѣхъ стадій развитія, за исключеніемъ послъднихъ моментовъ послъдней стадіи, когда это сообщеніе, наконецъ, устанавливается, а потому эти личинки физически лишены возможности выдълять из ь себя экскременты до наступленія указанныхъ послѣднихъ моментовъ. Вотъ этотъ моментъ, когда устанавливается сообщеніе между средней и задней кишками, и является роковымъ для многихъ изъ воспитанныхъ зимою въ лабораторіи личинокъ. Сообщеніе установилось-изверженія изъ личинки выходятъ свободно и послѣ того такъ же свободно совершается превращение ея въ куколку. Но въ тъхъ условіяхъ, въ которыхъ личинки живутъ въ лабораторіи зимою, что-то мѣшаетъ установленію этого сообщенія между кишками, а потому изверженія изъ личинки не выходять и она, не будучи въ состояніи окуклиться, лежить, корчится все слабъе и слабъе, малопо-малу подсыхаетъ, буръетъ и превращается въ трупъ, а не въ живую куколку.

Въ той же лабораторіи лѣтомъ ничего такого не бываетъ и ничто не мѣшаетъ личинкамъ окукливаться. Я думаю, что сухость лабораторнаго воздуха зимою и есть причина, задерживающая установку сообщенія между кишками и дѣлающая невозможнымъ выходъ изверженій. Стало быть, чтобы помочь личинкамъ, надо держать ихъ во влажномъ воздухѣ и зимою. Это осуществляется слѣдующимъ способомъ.

Проходя по улицѣ, я вижу въ окнѣ цвѣточнаго магазина комнатную теплицу, внутри которой стоятъ цвѣты въ горшкахъ. Видъ сочной зелени цвѣтовъ и видъ сырой земли въ горшкахъ внушаютъ мысль, что воздухъ въ теплицѣ долженъ быть влажнымъ—а это мнѣ и надо. Приторговываю теплицу, но прошу предварительно сдѣлать въ ней указываемыя мной измѣненія.

Фирма 1) согласна, и черезъ двѣ недѣли доставляетъ въ лабораторію заказанную теплицу. Фотографія этой теплицы будетъ дана впослѣдствіи. Она раздѣлена на два не сообщающіяся отдѣленія: одно, занимающее 1/3 всего пом'єщенія, назначено для выкармливанія въ немъ гусеницъ, другое, подъ которое отведено 2/3 помъщенія, назначено для содержанія въ немъ зараженныхъ полочкахъ, образующихъ двускатную горку. Вся теплица деревянная, но дно ея покрыто цинкомъ и въ отделеніи куколокъ на него насыпанъ промытый песокъ, который отъ времени до времени смачивается, благодаря чему воздухъ въ тецлицъ всегда влажнъе комнатнаго. Далъе, внутри теплицы проведены металлическія трубы для водяного отопленія, при помощи котораго является возможность воспитывать насъкомыхъ не только при условіи сохраненія влажности воздуха, но и при повышенной температурѣ. Когда въ комнатѣ $+16^{\circ}$, въ теплицѣ $+20^{\circ}$, и эта температура удерживалась въ теченіе всей зимы, за исключеніемъ лишь тахъ моментовъ, когда теплица открывалась, ежедневно по утрамъ, для провътриванія. Въ теплицъ дъло воспитанія наъздниковъ принимаетъ лучшій оборотъ. Количество погибающихъ передъ окукливаніемъ личинокъ сводится до небольшаго 0/0, съ которымъ можно примириться.

Въ лабораторіи, съ самаго начала ея возникновенія, имѣется другое, противоположаго характера, учрежденіе—комнатный ледникъ, который находится въ дѣйствіи въ теченіе лѣтняго полугодія. Зимою, какъ было сказано, холодильникомъ для лабораторіи служитъ помѣщеніе между рамами окна, обращеннаго на сѣверъ, а съ наступленіемъ весны все, что хранилось здѣсь, перемѣщается въ комнатный ледникъ. Передъ этимъ я беру абонементъ на ежедневную доставку льда, который затѣмъ доставляется каждый день по то фунтовъ, вплоть до наступленія холодовъ поздней осени. Въ лѣтніе дни, когда температура на дворѣ достигаетъ такіе дни по вечерамъ служитель покупаетъ и кладетъ въ ледникъ дополнительную порцію, въ 5 фунтовъ. Температура въ ледникъ колеблется обыкновенно отъ + 4° до + 7°.

Содержаніе въ лабораторіи ледника обусловливается, кром'є указанной уже необходимости держать на холоду куколокъ, предназначенныхъ для зараженія паразитами, еще бол'є острой необходимостью другого рода. Въ теченіе л'єтняго полугодія, какъ мн'є, такъ и моему сотруднику по лабораторіи приходится часто и на долго у'єзжать изъ Петербурга для пос'єщенія т'єхъ или другихъ л'єсничествъ, въ которыхъ требуется производить наблюденія надъ вредными нас'єкомыми или давать указанія по борьб'є съ ними. Мы стараемся устраиваться при этомъ такъ, чтобы кто нибудь изъ насъ оставался при лабораторіи, но не всегда это удается. Случается, что у'єхавшій еще не возвратился, а остававшемуся уже наступилъ срокъ безотлагательнаго отъ'єзда. Вотъ въ этихъ случаяхъ ледникъ и оказываетъ нашимъ работамъ большую услугу.

Въ лабораторіи содержатся живыя насъкомыя, которыхъ надо кормить и поить, и которыя нужны намъ для откладыванія яицъ. День, два, три они могутъ пробыть безъ корма и питья, но затъмъ участь ихъ будетъ плачевна. Кормить ихъ надо, а для этого надо быть при нихъ кому нибудь изъ насъ, такъ какъ служителю нельзя поручить обращенія со столь деликатными созданіями. Выходъ изъ затрудненія находится въ низкой температурѣ ледника, при которой помъщенныя въ него насъкомыя впадаютъ въ оцѣпенѣніе. Многіе изъ наѣздниковъ проводятъ зиму на свободъ во взросломъ состояніи во мху, подъ корой, въ дуплахъ и т. д.; въ теченіе всей зимы они находятся въ оцепененіи, какъ бы во снъ, и не принимаютъ пищи. Если это возможно на свободъ, то можно осуществить то же и въ лабораторіи, если установить въ ней постоянную низкую температуру, близкую къ зимней. Этого мы и достигаемъ, помъщая нашихъ питомцевъ въ комнатный ледникъ.

Каждый на вздникъ съ его этикеткой помъщается въ особый стаканчикъ, на дно котораго положенъ тонкій слой гигроскопической ваты, смоченной водою. Сюда же вставляются двътри щепочки или спички, на которыя на вздникъ всползаетъ и держится на нихъ, такъ какъ на гладкой поверхности стекла онъ не можетъ держаться продолжительное время. Стаканчикъ закрывается крышкой съ съткою по серединъ и ставится на холодъ, гдъ обитатель его скоро впадаетъ въ оцъпенъніе, какъ бы засыпаетъ. Смоченная вата необходима потому, что и на холодъ сухость является главной причиной гибели на вздниковъ. Черезъ

^{&#}x27;) Мастерская при училищъ садоводства въ Стръльнъ, около Петербурга.

2-3 часа, при $+4^0$, всѣ наѣздники въ стаканчикахъ недвижимы, въ спячкѣ. Понятно, что для тѣхъ, которые содержались въ общихъ помѣщеніяхъ, стаканчики берутся болѣе крупные и въ нихъ они также держатся сообща.

При такихъ условіяхъ пребываніе на холодъ въ теченіе двухъ недъль проходитъ для наъздниковъ совершенно безнаказанно. Вернувшійся изъ разътадовъ снимаетъ ихъ съ холода, перемтьщаетъ въ комнатную температуру и черезъ 1/2 часа каждый наѣздникъ встряхиваетъ усиками, чиститъ ихъ передними ножками, задними обчищаетъ свои бока и крылья, которыя затъмъ встряхиваетъ, какъ бы разминая онъмъвшіе члены, и бодро поглощаетъ предложенную ему капельку воды съ медомъ. Въ дальнъйшемъ жизнь его идетъ, какъ будто бы никакого перерыва въ ней не было: самки такъ же продолжаютъ класть яйца и сбрасывать ихъ, какъ дълали до перерыва, самцы снова готовы къ ухаживаніямъ и свадьбамъ. Болъе продолжительное пребываніе на холод'в влечеть за собою умираніе н'якоторыхъ. Случалось, однако, оставлять на вздниковъ на холодъ болъе мъсяца и всетаки мы снимали съ него многихъ живыхъ. Что касается куколокъ съ паразитными личинками внутри, то послъднія также хорошо переносять дъйствіе холода, о чемъ подробнъе будетъ сказано впослъдствии.

Въ заключеніе этой части моей работы долженъ оговорить еще одно обстоятельство. При многочисленныхъ перемѣщеніяхъ, которымъ подвергаются крылатые наѣздники въ лабораторіи, при кладкѣ яицъ, при кормленіи, при свадьбахъ и, наконецъ, при переносѣ ихъ съ тепла въ холодъ и обратно, представляется множество случаевъ къ тому, чтобы неожиданно упустить наѣздника, дать ему возможность вылетѣть на свободу, и это случается. Большой бѣды однако отъ этого не бываетъ, если только соблюдать, какъ непремѣнное правило: во время работы надъ крылатыми наѣздниками всѣ окна и форточки должны быть закрыты. Въ такомъ случаѣ улетѣвшій не полетитъ дальше окна, гдѣ можетъ быть пойманъ и водворенъ на свое мѣсто.

Всѣмъ имъ свойственна одна особенность, которая очень облегчаетъ обращение съ ними. Они всѣ стремятся къ свѣту и направляются къ его источнику. Улетѣвшій, куда бы онъ сначала ни направился, въ концѣ концовъ прилетитъ на стекло окна. Здѣсь надо накрыть его стаканчикомъ, подъ стаканчикъ подвести листокъ бумаги и, не отдѣляя листка, стаканчикъ съ нимъ надо

перевернуть дномъ къ свъту, послъ чего наъздникъ устремится къ дну, и тогда со стороны, обращенной къ наблюдателю, листокъ бумаги можно откинуть, чтобы замънить его крышечкой. Если на вздника нужно перем встить для кормленія или для спариванія, то я кладу клътку на-бокъ, крышкой къ свъту, и наъздникъ всползаетъ на сътку крышки, послъ чего я снимаю ее и накрываю на всползаетъ на стънку стаканчика, поворачиваю послъдній дномъ къ свъту и наъздникъ-у дна. Послъ того опрокидываю стаканчикъ надъ сладкою каплей, которую на вздникъ скоро находитъ и припадаетъ къ ней. Если же надо устроить свадьбу, подношу стаканчикъ съ нимъ къ другому, гдъ заключенъ представитель другого пола, повертываю стаканчики открытыми краями другь къ другу и соединяю, послѣ чего въ томъ стаканчикъ, дно котораго обращено къ свъту, сходятся оба наъздника. При кладкъ яицъ еще меньше хлопотъ, такъ какъ при этомъ самки ръдко обнаруживвють желаніе улетъть отъ предложенной жертвы. Въ теченіе всей жизни на вздника я не прикасаюсь къ нему ни пинцетомъ, ни пальцами; только стаканчикъ съ бумажкой и указанное вліяніе свѣта помогаютъ въ обращеніи

СПБ. Мартъ. 1911 г.

Дополнительное замѣчаніе.

Послѣ того какъ были отпечатаны первые листы настоящей работы, я получилъ 91-й бюллетень энтомологическаго Бюро Д-та Земледѣлія С. А. Соединенныхъ Штатовъ, вышедшій 29 іюля 1911 года. Томъ болѣе 300 страницъ съ 28 таблицами и 74 рисунками въ текстѣ (26).

Книга эта составлена Говардомъ и Фиске и въ ней названные ученые излагаютъ подробно исторію организованнаго ими переселенія въ С.-А. Соединенные Штаты изъ Японіи и изъ Европы, въ томъ числѣ изъ Россіи, паразитовъ шелкопряда златогузки (brown-tail moth, Porthesia chrysorrhoea) и непарнаго шелкопряда (gipsy moth, Ocneria dispar). Послѣдніе, какъ извѣстно, были завезены изъ Европы во второй половинѣ прошлаго столѣтія въ С. Америку и, не найдя въ ней своихъ естественныхъ враговъ, ставящихъ предѣлы ихъ размноженію въ Европѣ, размножились до такой степени, что явились для американской са-

довой и лъсной растительности настоящимъ бъдствіемъ, съ которымъ американцы тщетно боролись разными искусственными средствами. Съ цълью помочь себъ въ этой борьбъ естественнымъ путемъ американскіе хозяева ръшили перевезти къ себъ союзниковъ изъ первоначальнаго отечества названныхъ шелкопрядовъ, т. е. ихъ паразитовъ и хищниковъ, на что правительство ассигновало очень крупную сумму и поручило организацію этого дъла выдающемуся американскому энтомологу Говарду. Между паразитами, которые были при этомъ ввезены и водворены въ Америкъ, авторы называютъ теронію (Theronia atalantae Poda.) (26, 236) и монодонтомера (Monodontomerus aereus Walk.) (26, 247 и 310). Этимъ паразитамъ будутъ посвящены особыя главы моей работы и тогда я постараюсь подробнъе обсудить характеръ и условія ихъ паразитизма, а теперь выскажу только одно замъчаніе по поводу работы Говарда и Фиске.

Если они изследують техъ куколокъ, изъ которыхъ вышли эти паразиты, по способу, указанному мною, т. е. послъ кипяченія въ растворъ такаго кали, то увидять, что оба эти паразита развивались въ куколкахъ шелкопрядовъ на счетъ поселившихся въ нихъ раньше первичныхъ паразитовъ, т. е. насчетъ личинокъ пимплы (Pimpla) или птеромала (Pteromalus), присутствіе которыхъ обнаружить всякимъ инымъ способомъ чрезвычайно трудно. При воспитаніи сверхпаразитовъ въ лабораторіи мнъ удавалось ставить ихъ въ такія условія, въ которыхъ они развивались, какъ первичные паразиты. Даже дибрахисъ (Dibrachys) воспитывался у меня такимъ же образомъ, о чемъ я разскажу подробите въ своемъ мъстъ. На волъ, однако, искусственныя условія, осуществимыя въ лабораторіи, не осуществляются, или осуществляются крайне рѣдко, а потому въ естественныхъ условіяхъ монодонтомеры, полученные изъ куколокъ бабочекъ, всегда безъ исключенія оказывались сверхпаразитами, если я примѣнялъ свой способъ изслѣдованія покинутыхъ ими куколокъ. Такое изследование Говардъ и Фиске могутъ произвести въ теченіе текущаго зимняго сезона, и послѣ того, я увѣренъ, они перестанутъ населять С.-А. Соединенные Штаты привозными монодонтомерами и тероніями.

СПБ. 9 Ноября **1**911 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Паразиты озимой ночницы (Agrotis segetum Schiff) 1).

1. Два паникса.

Охота и кладка.

Они прибыли по почтѣ, закупоренные въ деревянный ящичекъ, наполненный стружками, среди которыхъ лежали двѣ склянки, заткнутыя ватой, и въ каждой сидѣлъ живой панискъ. Посылка отправлена изъ Тулы 28 іюля, получена мною въ Петербургѣ 31 іюля. О пріѣздѣ ихъ шла предварительная переписка и даже были телеграфныя сношенія. Не безъ опасеній за благополучіе ихъ ожидалъ я панисковъ. Наконецъ, они пріѣхали, оба подвижные и бодрые, не смотря на трехсуточное пребываніе въ пути. Передъ дорогой ихъ, конечно, накормили досыта сладкимъ сиропомъ съ водою, что и дало имъ силу перенести трехъ

¹⁾ Мною предположено опубликовать рядъ наблюденій и опытовъ надъ паразитными насъкомыми, изъ которыхъ наблюденія надъ пимплами и тероніей производились въ теченіе нъсколькихъ лътъ, о чемъ я дѣлалъ по временамъ краткія сообщенія въ засѣданіяхъ Русск. Энтомологическаго Общества. Требованія текущей жизни заставляють однако начать изложение наблюдений не съ только-что названныхъ набздниковъ, а съ наблюденій надъ паразитами озимой ночницы, которыя были сдёланы мною въ теченіе одного лёта 1910 г. Въ нъкоторыхъ отношеніяхъ результаты этихъ наблюденій еще не могуть считаться законченными, тымь не менье они настолько полны и настолько расходятся съ тъмъ, что проникло въ нашу спеціальную литературу по данному вопросу (подробнъе объ этомъ изложено мною въ особой замъткъ-71), ръшительно опровергая это проникшее, что я не считаю возможнымъ задерживать изложение сдъланнныхъ уже наблюденій до времени завершенія ихъ новыми дополнительными изследо-Bahiamu.

дневную голодовку въ пути. Это сдѣлалъ, т. е. накормилъ и послалъ ихъ, А. А. Сопоцько, завѣдывающій вновь открытой энтомологической станціей въ Тулъ.





Рис. 12. Панискъ темноглазый (*Panieus ocellaris* Thoms.): а и b-срединная ячейка, с—добавочная ячейка (areola). Увел. около 3 разъ. Ориг.

Вынувъ заключенныхъ изъ ящичка, я также предлагаю имъ прежде всего пищи и питья. Кладу на бокъ чистый пустой стаканъ, дномъ къ свъту, и подношу къ отверстію его взятую изъ ящичка склянку, вынимаю изъ ея горлышка вату и панискъ вы-

летаетъ прямо въ стаканъ. Затъмъ, опрокидываю стаканъ съ панискомъ надъ кускомъ стекла съ каплей меда и воды, къ которымъ мой новый гость немедленно припадаетъ ртомъ. Такъ же поступаю и съ другимъ панискомъ. Оба проголодались и такъ увлечены теперь ъдой, что могу спокойно открыть ихъ, снявъ стаканы, и разсматривать ихъ черезъ лупу.

Оба они рыжаго или коричнево-краснаго цвѣта и очень схожи, но всетаки относятся къ разнымъ видамъ. Одинъ, болѣе крупный, съ болѣе длиннымъ яйцекладомъ и бурочерными глазами, при вечернемъ освѣщеніи, какъ потомъ оказалось, слегка отливающими темнокраснымъ цвѣтомъ—этотъ опредѣленъ, какъ

Paniscus ocellaris Thoms., a по русски я буду называть его панискомъ темноглазымъ; другой немного мельче, съ очень короткимъ яйцекладомъ, глаза его тоже чернобурые, но отливъ ихъ иной, что замѣтно только по вечерамъ при лампъ, когда глаза отливаютъ изумрудно-зеленымъ-этотъ опредъленъ, какъ Paniscus (Parabatus) cristatus Thoms., я же въ дальнъйшемъ изложеніи буду называть его панискомъ зеленоглазымъ. Указанные оттънки въ окраскъ глазъ замѣтны только при жизни па-



Р. 13. Яйцо темноглазаго паниска (Paniscus ocellaris Thoms.) съ выдвинувшейся изъ него личинкой. Увел, въ 50 разъ. Ориг.

нисковъ, но послѣ смерти глаза ихъ оказались одинаково бурочерными. Оба паниска, какъ видно по присутствію у нихъ яйцекладовъ, самки.

Онъ были раздълены въ разныя скляночки при отсылкъ по той причинъ, что объ сбрасывали яички или, върнъе сказать, не яички, а живыхъличинокъ, одътыхъ на заднемъ концъ скорлупою раскрывшагося яйца. Такихъ сброшенныхъ яичекъ бураго цвъта, съ торчащими изъ нихъ личинками (Рис. 13), нахожу въ склянкъ темноглазаго паниска—9, прилипшія къ стънкамъ и на ватъ, а у зеленоглазаго—6 и всъ у этого вида почти чернаго цвъта. Изъ письма, пришедшаго одновременно съ посылкой, узнаю, что самка темноглазаго паниска поймана въ г. Тулъ 20 іюля и сбросила, проживая у А. А. Со по ць к о до отсылки, 35 яичекъ, которыя были при

ложены въ особой скляночкъ въ спирту. Самка зеленоглазаго поймана тамъ же 25 іюля и сбросила до отсылки 15 яичекъ, тоже отдъльно заспиртованныхъ. Слъдовательно, первая въ теченіе трехъ дней пути сбрасывала, въ среднемъ, по 3 яичка въ день, а со времени своего плъненія и до прибытія въ лабораторію, въ теченіе 11 сутокъ, сбросила 44 яйца, т. е. въ среднемъ по 4 яйца въ день; зеленоглазая же самка сбрасывала въ пути по 2 яичка въ день, а со времени поимки по день прибытія, въ теченіе шести дней, сбросила всего 21 яйцо, т. е. въ среднемъ по $3^{1/2}$ яйца въ день. О томъ, что самки паниска могутъ сбрасывать яички съ личинками, А. А. Сопоцько былъ предупрежденъ заранѣе, а потому и держалъ ихъ отдѣльно и отъ каждой отдъльно собиралъ яички.



лич. въ 40 разъ. Ориг.

Когда самки насытились и всползли на стѣнки накрывавшихъ ихъ стакановъ, онъ принялись объ за исправленіе своего туалета. Тогда я перемъстилъ стаканы на чистые стеклянные кружки, чтобы собирать съ нихъ впослѣдствіи яич-Рис. 14. Яйцо паниска зеленоглаза- ки, которыя будуть еще сброго (Paniscus cristatus Thoms.). Увешены самками. Минуты черезъ двѣ послѣ того зеленоглазая

самка, сидя на стънкъ стакана, выпустила новое яичко съ торчавшею изъ него бурою головкой, за которою виднълось бълое тъльце личинки, охваченное сзади черными створками полураскрытаго яичка. Личинка прилипла къ стънкъ стакана и шевелила головой. Позднъе мнъ пришлось однажды пронаблюдать и самый выходъ сбрасываемаго яичка. Самка темноглазаго паниска сидъла (20. VIII.) на стънкъ стакана, а я разсматривалъ въ лупу ея яйцекладъ и вижу, какъ при основаніи его открывается щель, черезъ которую вываливается яичко и остается прилипшимъ на концѣ брюшка самки. Между створками яичка видна трещина и черезъ нее видна шевелящая головой личинка. Черезъ нъсколько минутъ яичко отстало отъ брюшка самки и прилипло къ стънкъ стакана, откуда было снято мною и положено для подробнаго осмотра на стекло подъ бинокуляромъ.

Необыкновенно своеобразны эти яйцо и личинка паниска. Они давно привлекали къ себъ вниманіе натуралистовъ и были

описаны и даже изображены уже въ 1771 году шведскимъ ученымъ Дегееромъ (12,850) въ его мемуарахъ по естественной исторіи насѣкомыхъ, а впослѣдствіи многіе другіе натуралисты давали ихъ изображенія и описанія. На рисункт 14-мъ изображено яйцо зеленоглазаго паниска, но еще не раскрытое, до вылупленія изъ него личинки. Оно сильно хитинизировано, черное, въ 1 мм. длины и 0,4 мм. ширины въ наибол ве широкомъ мъстъ. Одна сторона его выпуклая, а другая плоская-это нижняя, брюшная, сторона яичка, вдоль которой расходятся его створки передъ вылупленіемъ личинки. Здѣсь же у задняго, хвостоваго, конца виденъ стебелекъ, почти безцвътный, утолщенный при основаніи





Рис. 15. Микропиле яйца зеленоглазаго паниска (Paniscus cristatus Thoms.). Уведич. около 600 разъ. Оригин.

и завивающійся на конц'є въ плоскую спираль. Длина его въ развернутомъ состояніи болѣе половины длины яйца, но точно опредълить нельзя, такъ какъ при измъреніи онъ скручивается тотчасъ же, какъ только принять отъ него растягивающія его иглы.

На спинной сторонъ яичка, на нъкоторомъ разстояніи отъ передняго конца его, замътно, даже при слабомъ увеличеніи, микропиле, т. е. углубленіе съ канальцами, черезъ которые входять въ яйцо при оплодотвореніи его съменныя тъльца. (Рис. 15). Дно этого углубленія составляєть безцвѣтная, тонкая оболочка

яйца, не пропитанная хитиномъ, пронизанная канальцами, продолженія которыхъ, замътныя на темной хитинизированной части, расходятся шестью короткими лучами (0,006 мм. длин.). Эта безцвътная перепонка имъетъ вверху форму части круга, а внизу суживается угломъ, отъ котораго начинается раскрываніе створокъ яйца при вылупленіи личинки.

Яичко темноглазаго паниска имъетъ такую же форму и величину, какъ у предыдущаго, но отличается бурымъ цвѣтомъ. на иныхъ яичкахъ даже свътлобурымъ. Стебелекъ слегка желтоватый имъетъ при основаніи видъ расширеннаго пенька, отъ котораго идетъ впередъ самый стебелекъ, скручивающійся жгутомъ. Длина его больше предыдущаго, раскрученный онъ превосходитъ длину яйца. Микрополе (Рис. 16) состоитъ изъ 9



паниска (Paniscus ocellaris Thoms.). многочисленныхъ данныхъ Увелич. около 300 разъ. Ориг.

лучей, идущихъ отъ слабо хитинозированной площадки по форм' похожей на предыдущую, въ 0,05 мм. шириной въ ея наиболѣе широкомъ мъстъ.

Выступающая изъ яйца личинка имфетъ тоже очень своеобразную форму, давно отмѣченную учеными, Рис. 16. Микропиле яйца темноглазаго писавшими о панискахъ. Въ ими описаніяхъ не указаны

однако нѣкоторыя весьма существенныя особенности ея строенія. ускользнувшія отъ вниманія наблюдателей потому, в'троятно, что описываемыхъ личинокъ они разсматривали цѣлыми, безъ разчлененія на отдівльныя части и безъ предварительной обработки ихъ реактивами. 1)

Я дамъ здѣсь краткое описаніе только что вылупившейся личинки зеленоглазаго паниска, а въ другомъ мъстъ настоящей работы будетъ дано болъе подробное.

На тѣлѣ вынутой изъ яйца личинки прежде всего бросается въ глаза ея крупная свътлобурая голова, притупленная спереди, расширяющаяся къ заднему концу и занимающая четвертую часть всего протяженія личинки: длина послѣдней-і мм., а длина головы - 0,25 мм. Тъло личинки бълое, на спинной сторонъ гладкое и безволосое, очень выпуклое, на нижней сторонъ плоское, состоитъ изъ 12 члениковъ, ясно разграниченныхъ на спинъ. Задній конецъ послѣдняго, 12-го, членика снизу и отчасти на

бокахъ густо покрытъ шипиками, направленными впередъ т. е къ головъ личинки (Рис. 17). На первомъ кольцѣ тѣла, на предтульт (prothorax), помтьщаются на спинной сторонъ два дыхальца, совершенно круглыя. На прочихъ кольцахъ дыхательныхъ отверстій нѣтъ. На головѣ личинки по бокамъ отверстія рта прикрѣплена пара верхнихъ челюстей бураго цвѣта, особенной крючкообразной формы. Челюсть эта (Рис. 18) состоитъ изъ двухъ частей: изъ толстой основной части, образующей какъ бы заго (P. cristatus Thoms.). Увеподошву, и изъ тонкой, круто загнутой внутрь, заостряющейся




Рис. 17. Задній конецъличинки 1-й стадіи паниска зеленоглалич. въ 50 разъ. Ориг.

вершинной части. Каждая челюсть занимаетъ на головъ поперечное положеніе. Основная часть снабжена близъ мъста изгиба двумя сочленовыми головками, а верхняя такъ согнута внутрь,



Рис. 18. Верхняя челюсть той же

что идетъ почти параллельно основной части. Въ спокойномъ состояніи острые концы челюстей налегаютъ другъ на друга (Рис. 19).

Личинка темноглазаго паниска очень похожа на предыдущую, но только задній кончикъ поличинки. Увелич. въ 80 разъ. Ориг. следняго членика ея тела покрытъ шипиками кругомъ равномфрно

(рис. 20), а не только снизу, какъ у вышеописанной личинки. Легче всего отличаются эти личинки по ихъ помъщеніямъ: изъ бураго яичка со стебелькомъ скрутившимся въ жгутъ, высовывается личинка темноглазаго паниска, изъ чернаго яичка.

¹⁾ Наилучшія, но всетаки недостаточныя изображенія и описаніе личинокъ цаниска даны въ работахъ Нью порта (35, 71) и Нильсена. (36, 5). Первый изъ этихъ рисунковъ, изображающій 1-ю стадію паниска, воспроизведенъ въ книгъ Шарпа "Насъкомыя" (70, 413).

стебелекъ котораго закрученъ спиралью, выступила личинка зеленоглазаго паниска.

О судьбъ сброшенныхъ самками яичекъ я разскажу потомъ, теперь же займемся судьбою самихъ самокъ, которыя должны




Рис. 19. Голова той же личинки (P. cristatus Thoms.) снизу: а-боковыя продольныя дуги, 1-нижняя губа, тх-нижнія челюсти, тф-верхнія челюсти, lbr—верхняя губа, cl—ротовой щитокъ. Увелич. около 400 разъ. Оригин.

быть поставлены въ такія условія, чтобы онъ не сбрасывали яички, но пристраивали бы ихъ на гусеницъ, заготовленныхъ для нихъ мною.

Уже Дегееръ объяснилъ въ своихъ мемуарахъ, что стебелекъ, которымъ снабжено яйцо паниска, втыкается въ кожу гусеницы и такъ прочно прикръпляетъ къ ней яичко, что Дегееръ не могъ его оторвать, не оторвавъ кусочка кожи или не разорвавъ яичка. Но какъ производится втыканіе стебелька и какъ совершается кладка яйца Дегееръ не наблюдалъ и неописалъ. Вотъ это и надо намъ пополнить. Необходимо проследить, какимъ образомъ самки панисковъ откладываютъ яички

на гусеницъ и какъ производится втыканіе стебелька подъ ихъ кожу.

Но, что легко сказать, не всегда легко сдълать. Долго пришлось мнъ повозиться, прежде чъмъ удалось сдълаться очевидцемъ кладки яицъ. Изъ двухъ самокъ, которыхъ я наблюдалъ, самка темноглазаго паниска такъ и скончалась 24 августа, не обнаруживъ этого своего секрета, а самка зеленоглазаго открыла свой только 29 августа, т. е. почти черезъ мѣсяцъ послѣ первой попытки моей вывъдать отъ нея эту тайну. Такихъ попытокъ съ объими самками я много произвелъ въ теченіе мъсяца, но

вст онт были тщетны и до утомительности безнадежны. Нъмецкій энтомологъ Бришке (9, 221), заслужившій почетное имя въ энтомологіи изученіемъ жизни на вздниковъ, съ горечью говоритъ въ одной изъ своихъ работъ: «Еще никто не наблюдалъ, сколько я знаю, кладку яицъ на вздниками, даже и профессоръ Рацебургъ не наблюдалъ ее. не удалось ни разу и мнъ застать какого нибудь на вздника за этимъ занятіемъ». Послъ Бришке положение дълъ въ этомъ отношеніи мало измѣнилось и остается почти тъмъ же до настоящаго времени. Стало быть я стремился увидъть то, что многіе хотъли видъть, но что мало кому удавалось.




Рис. 20. Задній конецъ личинки 1-й стадіи паниска темноглазаго (Paniscus ocellaris Thoms.). Увел. въ 50 разъ. Ориг.

Что надо сдълать, чтобы самка паниска отложила яйцо на гусеницу? Надо соединить ихъ въ одномъ помъщеніи и тогда самка, чувствующая потребность снести яйцо, а потребность такая у нея есть, ибо она каждый день сбрасываеть яйца съ личинками, и видя передъ собою подходящую жертву, которая въ этомъ закрытомъ помъщении не уйдетъ отъ нея, конечно нападетъ на гусеницу и предпочтетъ пристроить къ ней своего дътеныща, вмъсто того, чтобы выбросить его изъ себя на произволъ всякихъ случайностей. Признавъ правильнымъ такое разсужденіе, соединяю подъ однимъ стаканомъ самку и взрослую

гусеницу озимой ночницы ($Agrotis\ segetum\ Schiff$), эту, если можно такъ выразиться, профессіональную жертву панисковъ. Но изъ этого ничего не вышло.

Гусеница сначала притворяется мертвой и лежитъ на стеклъ неподвижно въ центръ круга, свернувшись колечкомъ, а самка бъгаетъ кругомъ, какъ бы ища выхода изъ своей тюрьмы, и не обращаетъ никакого вниманія на гусеницу; потомъ гусеница развертывается и ползетъ къ стънкъ стакана, дойдя до которой пробуетъ въ разныхъ мъстахъ подняться на нее, но падаетъ, не найдя за что ухватиться, и начинаетъ ползти вдоль круга, ограниченнаго стѣнками стакана. Она не обращаетъ вниманія на самку и самка на нее. Пробую поставить ихъ въ бол'є близкое сосъдство, чтобы онъ сталкивались невольно. Кладу стаканъ на-бокъ, дномъ къ окну, и самка устремляется къ этому дну, а гусеницу бросаю въ стаканъ и слегка наклоняю его такъ, что гусеница скользитъ ко дну и тамъ сталкивается съ самкой. Опять ничего не выходить. Самка не нападаеть, только пугается и старается уйти отъ гусеницы, эта же не обнаруживаетъ никакого страха передъ панискомъ и все старается всполэти на гладкое стекло. Такъ изо дня въ день ведутъ себя объ самки.

Столь упорный неуспъхъ моихъ попытокъ и чтеніе такихъ жалобъ, какъ Бришкина, настойчиво внушаютъ желаніе прекратить эти попытки и считать ихъ предпріятіемъ вполнъ безнадежнымъ, да и усталость, которую порождаетъ неудача, настойчиво говоритъ за то же. Но нътъ, мое упорство не сдалось, оно оказалось сильнъе упорства неудачи. Помогло новое разсуждение. Обсуждая возможныя причины отказа панисковъ нападать на гусеницъ при тъхъ условіяхъ, въ какія я ихъ ставилъ, вспоминаю, что мною не было соблюдено одно, быть можеть, самое важное условіе. Весною, когда я задумалъ начать наблюденія надъ панисками, офіонами (Ophion) и другими паразитами гусеницъ озимой ночницы и когда я писалъ моимъ энтомологическимъ друзьямъ, что прошу ихъ ловить этихъ паразитовъ и присылать мнѣ живыми, то я объясняль каждый разъ, что легче всего находить и ловить ихъ при помощи свъта отъ лампы по вечерамъ. Черезъ открытое окно они влетають въ комнату на свътъ лампы, слетаются къ ней же на балконъ и какъ бы танцуютъ на бълой скатерти, застилающей столъ, или на бълой поверхности сосъдней стѣны. Сѣвшаго на столъ или на стѣну паниска или офіона надо накрыть стаканомъ, подъ стаканъ просунуть листикъ бу-

маги и тогда на вздникъ пойманъ. Вм вств съ панисками и офіонами прилетаютъ на свътъ такіе же рыжіе, длинноногіе и длинноусые эникоспилы (Enicospilus), похожіе на нихъ и своимъ сдавленнымъ съ боковъ брюшкомъ; но этихъ мнѣ не надо, нужны только первые два. Они ночныя или сумерочныя животныя еще и потому, что гусеницы озимой ночницы, за которыми они охотятся, тоже выползають изъ своихъ скрытыхъ пріютовъ въ землъ на свътъ Божій, когда свътъ уже померкнетъ. Такимъ способомъ и были пойманы присланные мнѣ паниски, а также офіоны, о которыхъ рѣчь впереди. И вотъ поди же ты, объяснивъ эту особенность панисковъ другимъ, я совершенно забываю о ней при своихъ опытахъ. Всѣ другіе наѣздники, съ которыми раньше я имълъ дъло, пріучили меня къ тому, что имъ совершенно безразлично-день или ночь, такъ какъ, если быль свътъ, дневной или отъ лампы, они одинаково клали яйца. Но у панисковъ, повидимому, иные нравы, и только теперь, когда одна самка уже умерла, я вспоминаю эту особенность ихъ и переношу свои опыты на вечеръ.

Это было 27 августа 1910 года. Гусеницы озимой ночницы содержатся у меня въ широкой стеклянной банкъ, въ которую насыпанъ слой черной просъянной земли, вершка въ $1^{1/2}$ толщиною. На поверхности земли лежатъ два кочанчика салата, которымъ гусеницы питаются. Днемъ ихъ не видно, онъ скрываются въ землъ или подъ кочанчиками, по вечерамъ же выползаютъ наружу и странствуютъ по землъ. Такъ было и въ этотъ достопамятный вечеръ: я вижу въ начинающихся сумеркахъ на поверхности земли въ банкъ гусеницу, поъдающую кусокъ увядшаго салатнаго листка. Вотъ-моментъ, благопріятный для опыта. Банка съ гусеницами переносится къ столу, на которомъ еще живетъ подъ стаканомъ самка зеленоглазаго паниска. Сегодня днемъ я уже предлагалъ ей гусеницъ, но она по обыкновенію не замѣчала ихъ. Теперь опускаю стаканъ съ самкой въ банку и самка, быстро выскользнувъ изъ него, становится всъми ножками на поверхность земли. Здъсь она начинаетъ чистить усики, но, замътивъ недалеко отъ себя мирно насыщавшуюся гусеницу, быстро направляется къ ней. Событія, совершившіяся затъмъ, передаю по точной записи, сдъланной въ тотъ же вечеръ въ дневникъ.

Самка безъ малъйшихъ колебаній всползла на гусеницу, направилась къ ея туловищу и укръпилась на немъ всъми шестью

ножками, ставъ головой къ заднему концу тъла гусеницы. Гусеница, какъ только почувствовала на себъ охотника, тотъчасъ же дълаетъ ръзкое движеніе, вродъ удара, передней половиной тъла, но самка держится на ней, и не успълъ я замътить, какъ на спинку гусеницы были воткнуты 4 стебельчатыхъ яичка, послъ чего самка отбъжала, а гусеница судорожно бъется на землъ. Вынимаю эту гусеницу и на мъсто ея кладу другую. Самка скоро замъчаетъ новую жертву, всползаетъ на нее и укръпляется такъ же, какъ на первой. Гусеница тотъ-часъ же начинаетъ быстро вертъться на одномъ мъстъ, вокругъ продольной оси своего тъла, повертываясь кверху то брюшной, то спинной стороной, а самка держится и перемъщаетъ на ней свои ножки по мъръ ея вращенія. Опять не успъль замътить, какъ на спинкъ туловища гусеницы укръплены два яйца. Все совершалось такъ быстро, что дъйствія яйцеклада и уколовъ не видалъ въ обоихъ случаяхъ. Гусеницу эту вынимаю и на мъсто ея опять кладу новую.

Самка и передъ этой не медлитъ, подходитъ къ ней и дотрогивается до нея усиками. Гусеница моментально поднимаетъ переднюю половину тѣла и ударяетъ ею по направленію нападающей, при чемъ выпускаетъ изо рта зеленую пѣнистую жидкость, часть которой должно быть попала на самку, такъ какъ эта сейчасъ же отбѣжала и начала чиститься. Черезъ нѣсколько минутъ самка возобновляетъ нападеніе и въ концѣ концовъ становится всѣми ножками, какъ въ первыхъ случаяхъ, на передній конецъ гусеницы и опять лицомъ къ ея заднему концу. Гусеница снова бъется и выпускаетъ изо рта пѣнистую слизь, послѣ чего самка отбѣгаетъ. Думая, что на эту гусеницу тоже отложено яйцо, вынимаю ее. Уже на столько стемнѣло, что очень плохо видно, особенно на темномъ фонѣ земли въ банкъ.

Перемъщаю самку подъ стаканъ и ставлю на листъ бълой пропускной бумаги, на который положена новая гусеница. Самка опять нападаетъ точно такъ же, какъ на первыхъ, а гусеница защищается только верченіемъ и самка скоро покидаетъ ее. Кладу эту гусеницу къ первымъ тремъ и прекращаю опытъ, ибо стемнъло такъ, что даже на листъ бълой бумаги съ трудомъ можно что-нибудь разглядъть. Зажигаю лампы и кормлю самку: она вполнъ заработала свой кормъ.

Итакъ—успъхъ! Долго не дававшійся успъхъ былъ наконецъ достигнутъ. Взволнованный всъмъ видъннымъ, не могу болъе

работать въ этотъ вечеръ и, сдѣлавъ необходимыя записи, ухожу изъ лабораторіи. Подробный осмотръ пораженныхъ гусеницъ откладывается до другого дня.

На слѣдующій день, въ 9 ч. утра, осматриваю вчерашнихъ жертвъ и нахожу, что на двухъ послѣднихъ гусеницъ ничего не отложено. Самка только нападала на нихъ, но яицъ не положила—должно быть, у нея не было готоваго къ снесенію яйца. Отложенныя на первой гусеницѣ 4 яичка размѣщены такъ: (На рис. 21 —изображены только 3 переднія яичка) одно между 1-мъ и 2-мъ члениками туловища, два между 2-мъ и 3-мъ и одно между




Рис. 21. Передній конець гусеницы съ тремя яичками, изъ которыхъвыдвинулись личинки 1-й стадін паниска зеленоглазаго (*P. cristatus* Thoms.). Увелич. въ 10 разъ. Оригин.

3-мъ членикомъ туловища и 1-мъ брюшнымъ. Всѣ находятся на спинной сторонѣ и ближе къ бокамъ, чѣмъ къ серединѣ. Изъ каждаго яичка выдвинулась личинка и присосалась къ кожѣ гусеницы. Два яичка, отложенныя на другой гусеницѣ, занимали подобное же положеніе между 1-мъ и 2-мъ и между 2-мъ и 3-мъ члениками туловища; личинка здѣсь изъ одного яйца уже присосалась къ гусеницѣ, но изъ другого она еще не выдвинулась, хотя головка ея уже видна черезъ раздвинувшіяся створки яйца.

Во вчерашнемъ опытъ были введены два новыхъ условія, благодаря которымъ состоялась кладка: 1) гусеница предложена въ сумер-

ки, а не днемъ, какъ было до тъхъ поръ, и 2) гусеница помъщалась на землъ или на пропускной бумагъ, а не на стеклъ, какъ было раньше. Благодаря какому изъ этихъ условій состоялась кладка? Имъютъ ли они значение оба или какое-нибудь одно? На этотъ вопросъ приглашаю отвътить мою самку.

Насыпаю въ пустой стаканъ земли настолько, что до краевъ остается 1—1¹/₂ дюйма свободнаго пространства, пускаю сюда гусеницу и приставляю краями къ этому стакану стаканъ съ панискомъ. Самка очень скоро спускается на землю, тогда снимаю верхній стаканъ и накрываю нижній съ панискомъ и гусеницей пластинкой чистаго стекла. Теперь все, что произойдетъ, будетъ видно до малъйшихъ подробностей, такъ какъ въ рукъ у меня лупа, черезъ которую можно наблюдать всъ дъйствія борцовъ на всемъ пространствъ этого ограниченнаго прозрачными стънками ристалища и при полномъ дневномъ свътъ, въ 11-мъ часу

Гусеница, лежащая на землъ близъ стънки стакана, «притворяется» мертвой, т. е. свернулась колечкомъ внутрь стакана и лежитъ неподвижно. Самка, какъ будто не замъчая гусеницы, подходитъ къ ней и переползаетъ черезъ нее, потомъ возвращается и старается проползти между гусеницей и стънкой стакана, задъвая своимъ тъломъ гусеницу. Эта моментально переворачивается и снова свертывается кольцомъ, но въ противоположную сторону, т. е. къ стънкъ стакана, при чемъ захватываетъ въ кольцо брюшко и ножки своего врага и выдъляетъ изо рта немного зеленоватой пънистой слюны, не попавшей на врага. Самка очень быстро выбирается изъ тисковъ и становится на хвостовой конецъ гусеницы. Въ этотъ моментъ я снимаю со стакана прикрывающее его стекло, такъ какъ увъренъ, что самка, увлеченная своей охотой, не захочетъ улетъть и, приблизивъ къ ней лупу достаточно близко, наблюдаю, какъ она ощупываетъ кожу гусеницы кончикомъ яйцеклада, но не колетъ, и, продолжая это дълать, перебъгаетъ на головной конецъ «притворяющейся» жертвы. Здъсь она укръпляется всъми ножками, ставъ головой къ хвостовому концу гусеницы, и упирается концомъ яйцеклада въ промежутокъ предтулья и межтулья, на боковой ихъ сторонъ. Въ тотъ же моментъ изъ щели при основании яйцеклада, на нижней его сторонъ, показывается яичко и кончикъ сверла погружается въ кожу примърно на четверть его длины. Все ясно видно въ лупу (Рис. 22). Яичко скользитъ внизъ по нижней сторонъ

сверла (при томъ положеніе, какое занимаетъ теперь конецъ брюшка самки, эта сторона обращена впередъ), а стебелекъ его остается скрытымъ внутри сверла. Какъ только яичко дошло до кожи, самка отняла сверло и яичко осталось на гусеницъ. Только теперь жертва перестала «притворяться» и, быстро развернувшись, побъжала во всю свою гусеничную прыть, ръзко взмахивая головнымъ концомъ, самка же, сдълавшая свое дъло, была уже въ сторонъ и чистила усы.

Вечеромъ повторяю опытъ въ томъ же стаканъ съ землей, но при яркомъ освъщении отъ электрической лампы, при кото-

ромъ глаза самки очень красиво отливаютъ изумрудно-зеленымъ цвѣтомъ. И на этотъ разъ положенная на землю гусеница «притворяется» и спокойно лежитъ, свернувшись калачикомъ. Самка такъ же спокойно всходитъ на ея туловище и ощупываетъ его въ нъсколькихъ мъстахъ кончикомъ сверла, но не колетъ, переходитъ на хвостовую часть, прижимается встмъ теломъ и ртомъ къ кожт гусеницы, какъ будто бы слизывая что- пившеюся личинкой въ монибудь, и кончикомъ брюшка, не вы- ментъ откладыванія (Р. пуская сверла, толкаетъ въ разныхъ мъстахъ задъ гусеницы. Затъмъ, выпускаетъ сверло и дълаетъ имъ




Рис. 22. Яичко съ вылуcristatus Thoms.). Увелич. въ 8 разъ. Оригин.

уколъ, послъ чего гусеница сразу развертывается и начинаетъ бѣжать, а самка быстро перебѣгаетъ по ней на передній конецъ, все дотрагиваясь до кожи концомъ сверла и, повернувшись головой къ хвостовому концу, упирается позади межтулья кончикомъ сверла, по которому моментально скатывается яичко и втыкается стебелькомъ въ кожу гусеницы. Тогда послъдняя дълаетъ ръзкое движение передней половиной тъла и сбрасываетъ самку, но эта вътотъ же моментъ снова на гусеницъ, и все въ тойже позъ-головой къ хвостовому ея концу, упирается концомъ сверла немного выще и впереди правой задней грудной ножки, куда скатывается новое яйцо, такъ быстро, что не успълъ проследить за его ходомъ. После этого самка прекращаеть охоту, а жертва ея корчится и катается по землъ.

Вынимаю гусеницу и осматриваю подъ лупой, при чемъ убъ-

ждаюсь, что, кромѣ тѣхъ двухъ яичекъ, выходъ которыхъ я замѣтилъ, на нее отложено и третье: надъ правой, самой заднею брюшной ножкою, близъ хвостоваго конца гусеницы. Вѣроятно,
это яичко было отложено при первомъ уколѣ гусеницы, заставившемъ ее развернуться и начать борьбу, но я не успѣлъ тогда
замѣтить его выхода, такъ какъ не ожидалъ, что яичко можетъ
быть отложено въ столь необычномъ для него мѣстѣ. Всегда
яички панисковъ откладываются на передней половинѣ тѣла ихъ
жертвъ, но не на задней, а потому дальнѣйшая судьба этого
яичка представляла особый интересъ.

Изложенныя наблюденія показывають, что для самки зеленоглазаго паниска, кладущей яйца, время дня не имѣетъ значенія. Она одинаково хорошо кладетъ какъ днемъ, при солнечномъ свѣтѣ, такъ и вечеромъ, при свѣтѣ отъ лампы, а также и въ сумерки, при недостаточномъ освѣщеніи. Обстановка же, при которой совершается кладка, имѣетъ большое значеніе, такъ какъ при встрѣчѣ съ гусеницей на гладкой поверхности стекла самка отказывалась нападать и класть яйца, но когда въ томъ же стаканѣ встрѣча враговъ совершалась въ обстановкѣ, болѣе близкой къ естественной, т. е. на поверхности насыпанной земли, борьба загоралась немедленно и сопровождалась кладкой яицъ.

Послѣ этихъ опытовъ я стараюсь ежедневно сводить самку съ гусеницами все въ томъ же стаканѣ съ землей, и большею частью она охотно нападаетъ на гусеницъ и кладетъ яйца, но не всегда. Самка эта прожила у меня до 15 сентября, послѣдняя кладка была сдѣлана ею 12 сентября, и по это число, начиная съ 29 августа, она отложила всего 26 яицъ на 16 гусеницъ. Иногда она откладывала по два раза въ день, но чаще по одному разу и на вторую предложенную ей гусеницу не обращала вниманія.

Наиболъе продолжительный перерывъ въ кладкахъ отмъченъ у меня съ і по 6 сентября, когда самка въ теченіе 4 дней отказывалась нападать и класть. По вскрытіи умершей самки въ яйцеводахъ ея было найдено 5 яичекъ, изъ которыхъ у двухъ, ближайшихъ къ выходу, скорлупа уже была черною, а у трехъ она была съровато-бълою. Съмяпріемникъ ея былъ свътлаго мутнозеленаго цвъта, съ безцвътными большими придаточными железами.

Способы нападенія самки зеленоглазаго паниска всегда были почти одни и тъ же: или она сразу садилась на туловище гусеницы

всегда лицомъ къ ея хвостовому концу, и моментально спускала яйдо; или же всходила сначала на задній конецъ гусеницы и дѣлала здѣсь загадочныя движенія концомъ брюшка или сверла, а потомъ перебѣгала на передній конецъ и, ставъ на немъ въ обычную позу, моментально откладывала послѣдовательно одно или два яйца. Я предполагалъ было, что прежде откладки яйца самка должна сначала парализовать гусеницу, уколовъ ее гдѣнибудь сверломъ, но ни разу такого предварительнаго укола и, хотя бы кратковременнаго, паралича гусеницы не замѣтилъ.

Пріемы борьбы защищавшихся гусеницъ были нъсколько разнообразнъе. Чаще всего гусеница «притворялась» мертвой и свертывалась кольцомъ, но никогда не обманывала этимъ самку, имъвшую готовое для кладки яйцо и всползавшую на нее обыкновенно безъ колебаній, послъ чего гусеница начинала вертъться на одномъ мѣстѣ, предварительно развернувщись или оставаясь свернутою кольцомъ. Въ послѣднемъ случаѣ ей удавалось иногда втянуть самку въ кольцо, гдъ охотница подвергается серьезной опасности, такъ какъ попадаетъ подъ челюсти врага. Однажды я видълъ, какъ защищавшаяся гусеница схватила челюстями голень задней ноги нападавшей самки и съ силой отбросила ее въ сторону. Въ другой разъ, схвативъ такимъ же образомъ самку, она не отбросила и не отпустила ее, а старалась, повидимому, перекусить ей ногу, чему я помъщалъ, ущипнувъ пинцетомъ кожу гусеницы на загривкъ, въ отвътъ на что она раскрыла челюсти и освободила ногу самки, немедленно отбъжавшей отъ опаснаго врага. Въ третьемъ случат гусеница при тъхъ же условіяхъ схватила самку челюстями за брюшко и тоже старалась, повидимому, прокусить его, но и тутъ я помъщалъ ей тъмъ же щипкомъ. Часто пытается обороняющаяся гусеница спастись отъ врага бъгствомъ, но при этомъ она всегда несетъ на себъ и своего врага, сидящаго большей частью на такомъ мъстъ, почти на загривкъ, куда челюстями она не можетъ достать. Б‡гущая гусеница по временамъ останавливается и рѣзкими взмахами головного и хвостоваго концовъ старается сбросить съ себя всадника, но ръдко ей это удается раньше полученія яйца. Иногда она катается и судорожно бьется на землъ, стараясь схватить челюстями наъздника, но онъ ловко увертывается и дѣлаетъ свое дѣло.

Самый, однако, страшный для на вздниковъ способъ защиты гусеницъ состоитъ въ извержени на нихъ послъдними зеленой

пънистой жидкости, дъйствіе которой смертельно для наъздниковъ. Въ дъйствительности этого пріема защиты меня убъдили наблюденія надъ другими на вздниками въ лабораторіи еще до прибытія въ нее панисковъ, о чемъ подробнъе я разскажу въ слъдующей главъ, а потому для панисковъ я старался выбирать такихъ гусеницъ, которыя утратили способность защищаться этимъ пріемомъ обороны, что въ большинствъ случаевъ и удавалось.

Выше я сказалъ, что самка другого паниска, темноглазаго




Рис. 23. Самка темноглазаго паниска (P. ocellaris Thoms.) парализуеть гусеницу. Увел, около 2 раза. Оригин.

(Paniscus ocellaris Thoms.), умерла въ лабораторіи раньше, чѣмъ удалось мнъ создать обстановку, которая оказалась благопріятной для нападеній и откладыванія яицъ. Потеря эта вскор в была возмъщена присылкой изъ Тулы отъ А. А. Сопоцько новой самки того же вида. Она была поймана въ тульскомъ увздв 27 августа и получена мною также по почтъ 3 сентября. Дорогою она отложила въ заключавшей ее склянкъ 4 яичка, изъ которыхъ высовывались живыя личинки и шевелили головками.

По прибытіи эта самка была немедленно накормлена и вечеромъ пущена въ стаканъ съ землею и съ гусеницей. Охота началась немедленно. Гусеница при видъ самки дълаетъ нъсколько ръзкихъ движеній и поспѣшно уходить, самка догоняеть ее, подымается на ножкахъ такъ, что грудь ея обращена къ жертвъ, подноситъ къ ней кончикъ брюшка съ вытянутымъ сверломъ и дълаетъ имъ уколь въ одинъ изъ послѣднихъ члениковъ тѣла (рис. 23). Сразу движенія гусеницы дізлаются медленными, она перестаетъ бізжать и все тише и тише качаетъ приподнятымъ туловищемъ. Самка всходить на него и становится на вст ножки, держась головой къ хвостовому концу. Вытянувшись на ножкахъ почти вертикально, грудью къ заднему концу жертвы, выдвигаетъ впередъ

и колетъ сверломъ очень неглубоко сзади втораго членитуловища. Въ тотъ же моментъ при основаніи сверла открывается щель, изъ которой показывается яйцо, съ торчащею изъ него личинксй быстро скатывается по нижней сторонъ яйцеклада на кожу гусеницы. Стебелекъ яйца идетъ внутри сверла и черезъ воткнутый кончикъ его



Рис. 24. Самка темноглазаго паниска (P. ocellaris Thoms.) кладеть яйцо на парализованную гусеницу. Увелич. около 2 разъ. Оригин.

проникаетъ подъ кожу (Рис. 24). Теперь самка отнимаетъ яйцекладъ и отбъгаетъ отъ гусеницы, а яичко, прочно укръпленное воткнутымъ подъ кожу стебелькомъ, остается на жертвъ, оцъпенъніе которой уже прекратилось и которая катается и корчится по землъ, какъ бы стараясь сбросить съ себя или раздавить своею тяжестью ненавистную личинку.

Вотъ описаніе еще одной охоты другого вечера. Самка

стоить на земль, бодрая гусеница ползеть мимо, самка вытягивается на ножкахъ и, не сходя съ мъста, выставляетъ впередъ конецъ брюшка, выдвигаетъ изъ него сверло и колетъ гусеницу въ бокъ. Та катится черезъ всю площадку, постепенно замирая, а съ другой стороны подползаетъ къ самкъ другая гусеница. И эту она подкалываетъ точно такъ же. Уколотая гусеница вертится, самка всходитъ на нее и укалываетъ еще разъ, послъ чего верченіе становится все медленнъе и медленнъе и, наконецъ, прекращается. Самка держится на туловищъ гусеницы четырьмя передними ножками, а двъ заднія стоять на земль. Повернулась она обычнымъ манеромъ-головой и грудью къ заднему концу жертвы, яйцекладъ выдвинутъ и кончикъ его прикладывается къ кожѣ, перемъщаясь по ней, какъ и ножки охотницы, по мъръ все затихающаго верченія гусеницы. Когда движеніе прекратилось, самка укалываетъ гусеницу, лежащую брюшной стороной вверхъ, надъ задней лъвой грудною ножкой и спускаетъ по яйцекладу яичко на кожу, послъ чего гусеница переворачивается еще разъ и лежитъ теперь спиной вверхъ. Кончикъ сверла перемъщается и колетъ позади затулья на лъвой сторонъ, куда быстро спускается второе яичко. Совершенно симметрично ему откладывается третье на правой сторонъ и въ то же время самка пригибается и что то слизываетъ на спинъ гусеницы. Кончикъ сверла снова перемъщается и колетъ между вторымъ и третьимъ брюшными члениками, но яичко на этотъ разъ выходитъ не такъ скоро: я успълъ насчитать до 40, пока оно показалось изъ половой щели. Послъ этого самка покинула гусеницу, которая уже вышла изъ оцепенения и начала быстро двигаться. Всв отложенныя яички еще не раскрывшіяся, свѣтлобурыя, наиболъе свътлое послъднее. Черезъ полъ часа они раскрылись, изъ нихъ выдвинулись личинки и присосались къ своей живой добычъ.

Приведу примъръ не вполнъ удачной охоты. Пущенная на земляную площадку гусеница свертывается калачикомъ и «притворяется» мертвой, самка подходитъ къ ней и притрогивается остріемъ сверла къ заднему ея концу, отчего гусеница моментально переворачивается и бъщенно бъетъ заднимъ и переднимъ концами. Самка отошла и боязливо прижалась къ стънкъ стакана, а гусеница начинаетъ ползти, но самка догоняетъ ее и снова колетъ въ задъ. Теперь движенія гусеницы дълаются плавными и медленными, она лежитъ на спинъ, передній и задній

концы ея плавно качаются и самка всходить на нее. Тогда гусеница поворачивается спиною вверхъ и быстро получаетъ отъ охотницы яичко, послъ чего самка перемъщаетъ кончикъ сверла и колетъ въ новомъ мъстъ. Яичко, однако, показывается не скоро, успъваю насчитать до 70 съ момента укола до его выхода изъ половаго отверствія. Тъмъ временемъ движенія гусеницы становятся болъе ръзкими, оцъпенъніе проходитъ и жертва начинаетъ ползти, а яичко показавшееся изъ отверстія чемъ то задерживается тамъ и не спускается. Гусеница начинаетъ вертъться, чъмъ заставляетъ самку перемъщать ножки и остріе сверла. Въ это время яичко начинаетъ наконецъ спускаться, но, когда доходитъ до середины сверла, гусеница переворачивается и затягиваетъ подъ себя вколотое въ ея кожу сверло, а за нимъ и брюшко самки, но эта быстро отдергиваетъ его и отбъгаетъ отъ гусеницы. Нахожу на жертвъ только одно-первое яйцо, а второго нътъ ни на гусеницъ, ни на сверлъ самки. Должно быть оно отпало раньше, чъмъ дошло до кожи гусеницы и затерялось среди песчинокъ земли.

Въ другомъ случав тоже затяжнаго выхода яичка гусеница, вышедшая изъ оцъпенънія, спаслась тъмъ, что начала зарываться въ землю и постепенно оттъсняла коловшую ее самку все болье и болье къ заду, пока эта сошла съ нея, не отложивъ яйца-Въ яичникахъ самки, повидимому, не было тогда готоваго для кладки яйца. Наконецъ, въ одномъ случав, когда яйцо также долго не выходило, освободившаяся отъ оцъпенънія гусеница такъ сильно вертълась и билась, что самка покинула ее, не выпустивъ ни одного яйца.

Самка эта прожила у меня до 16 сентября, когда я нашелъ ее мертвою въ ея клъткъ. За все время пребыванія въ лабораторіи она отложила на 6 гусеницъ 11 яицъ. Нападала очень охотно, но не каждый день. Были дни, когда она ръшительно отказывалась отъ нападеній, и даже такихъ дней было однажды четыре подрядъ, съ 4 по 9 сентября. Въ противоположность самкъ зеленоглазаго паниска эта самка нападала на гусеницъ и откладывала яички только по вечерамъ, днемъ же не обращала на нихъ никакого вниманія, какъ это было и съ первой умершей въ лабораторіи самкой этого же вида.

Сравнивая способы нападенія и кладки яицъ двухъ бывшихъ у меня видовъ паниска, можно видъть, что, помимо указанной разницы въ отношеніи ихъ къ гусеницамъ днемъ и вечеромъ,

у нихъ наблюдается весьма существенное различие въ самыхъ пріемахъ борьбы. Зеленоглазая самка идетъ на врага прямо, лицомъ къ лицу, и съ безумною храбростью дикаря открыто подставляетъ себя ударамъ его челюстей, разсчитывая лишь на свою ловкость и проворство. Другая, темноглазая, самка прибъгаетъ къ иному, коварному, но болъе совершенному способу борьбы, обезпечивающему ей безопасность. Она предварительно поражаетъ не подготовленнаго противника сбоку или сзади предательскимъ ударомъ изъ за угла и парализуетъ временно его силы, послъ чего всходитъ на беззащитнаго и спокойно втыкаетъ въ его кожу стебельки своихъ яичекъ.

Итакъ, стебелекъ внѣдряется въ кожу гусеницы при помощи сверла. Кончикъ сверла втыкается въ кожу, а стебелекъ яйца, спускающагося по наружной его сторонъ, скользить по ка-



налу внутри сверла и проникаетъ черезъ этотъ каналъ подъ кожу. Отнимая сверло отъ гусеницы, самка освобождаетъ изъ канала стебелекъ и онъ остается подъ кожей, гдв укрвпляется, повидимому, различно у разныхъ видовъ панисковъ. У меня сохранялась въ спирту гусеница зимней пяденицы (Cheimatobia brumata Рис. 25. Отложенное яйцо ры- L.), на которой были прикръплены жаго паниска съ петпеобраз- три яичка рыжаго паниска (P. testaceus нымъ стебелькомъ (Paniscus testaceus Grav.), снятое съ Grav.). Изъ этой гусеницы я выгусеницы. Увел. въ 40 разъ. рѣзалъ кусочекъ кожи съ яичками и, удаливъ съ его нижней стороны

мускульный слой, имълъ возможность убъдиться, что стебелекъ каждаго яичка образовывалъ петлю подъ кожей, какъ это показано на рис. 25. Недавно итальянскій энтомологъ, докторъ Мартелли (33, 255), далъ рисунокъ яичка этого же вида паниска, снятаго съ гусеницы вилохвоста (Dicranura vinula L.). гдъ также стебелекъ образовалъ подъ кожею петлю, почему можно думать, что петлеобразное его расположение подъ кожеюхарактерно для этого вида панисковъ.

У моихъ двухъ панисковъ стебелекъ не дълаетъ подъ кожею петли, а лежитъ совершенно прямо, проникая подъ внутренній ея слой (гиподерму), и даже вдается въ мускульный слой. Здѣсь онъ окруженъ какимъ-то чернымъ отложеніемъ, образующимъ

рядъ утолщеній на немъ въ видъ узелковъ (Рис. 26). У зеленоглазаго паниска подкожная часть яйцевого стебелька значительно короче, чъмъ у темноглазаго. На яичкахъ, которыя я добывалъ изъ яйцеводовъ вскрытыхъ самокъ, стебельки всегда и у всъхъ видовъ имъли одну форму, показанную на рис. 27 (стр. 88.), т. е. стебелекъ состоялъ изъ основной расширенной части, вродъ пенька, за которой слъдуетъ средняя болъе тонкая и короткая часть, оканчивающаяся остріемъ, при основаніи расширеннымъ съ одной, нижней, стороны (на рисункъ у нижняго яичка неправильно показано остріе равном врно расширяющееся во вств стороны). На этомъ же рисункъ видно, что образование стебелька




Рис. 26. Стебелекъ яйца темноглазаго паниска (P. ocellaris Thoms.) подъ кожею гусеницы. Увел. около 40 разъ. Оригин.

совершается во время развитія яйца въ нижнемъ отдъль яйцевой трубки и вступаетъ въ яйцеводъ яичко, уже имъя стебелекъ. Во время пребыванія въ яйцевод в стебелекъ безцв тный или слегка желтоватый, при обработкъ легко окрашивается карминомъ, особенно расширенная часть острія. Удлиненіе стебелька и окраска его въ темный цвътъ совершаются во время откладыванія яйца.

Живорождение панисковъ.

Отложенное на гусеницу яичко прилегаетъ къ ней плоской стороной, той, гдв раскрываются створки яйца, вслъдствіе чего вылупляющаяся личинка имфетъ возможность немедленно по вылупленіи приложить свой ротикъ къ источнику питанія. т. е. на кожу гусеницы, что она и дълаетъ. Вылупленіе совершается обыкновенно очень скоро послъ отложенія яйца, но

большею частью створки его раскрываются еще въ организм'ь матери и голова личинки уже выдвигается изъ нихъ при отложеніи яйца. Р'ьже вылупленіе задерживается на н'ьсколько часовъ и крайне р'ьдко на сутки или на двое сутокъ. Въ этомъ отношеніи не зам'ьтно разницы у разныхъ видовъ панисковъ. Всегда бываетъ у нихъ въ откладываемомъ яйц'ь вполн'ь развитая личинка, готовая къ вылупленію. Поэтому паниски должны быть отнесены къ числу живородящихъ и яйцеживородящихъ нас'ькомыхъ.

Желая освъдомиться, насколько распространено явленіе живорожденія среди другихъ видовъ паниска, помимо тъхъ двухъ, которыхъ я наблюдалъ живыми, обращаюсь къ моимъ энтомологическимъ ящикамъ и нахожу въ нихъ самокъ еще трехъ нижеперечисляемыхъ видовъ. Всъ онъ наколоты на булавки, мертвыя, сухія, но это не пом'єшаетъ имъ отв'єтить на заданный вопросъ. Въ брюшкъ каждой изъ нихъ заключены неотложенныя яички, а каждое яичко имъетъ сильно хитинизированную оболочку, которая поэтому не растворима въ ѣдкомъ кали; кромѣ того, по свидѣтельству того же д-ра Мартелли, стебелекъ яйца тоже хитиновый (вышеотм вченная способность его окрашиваться карминомъ заставляетъ меня въ томъ усомниться), а потому и онъ долженъ не пострадать отъ дъйствія ъдкаго кали. Стало быть, если я отломаю брюшко самки и прокипячу его въ названномъ растворъ, то сдълаю мягкими всъ хитиновыя части брюшка, а также хитиновое содержимое его, въ томъ числъ и яички, послъ чего останется только вскрыть брюшко въ водъ и извлечь изъ него искомое. Если самки эти живородящи, то въ яичкахъ, добытыхъ изъ нихъ, особенно въ тъхъ, которыя находятся въ нижней части яйцеводовъ и близки къ выходу, будутъ заключаться личинки, которыхъ можно будетъ вынуть изъ яицъ и описать. Почти такъ все и вышло, за исключениемъ одного обстоятельства-При первомъ же опытъ кипяченія я убъждаюсь, что стебельки яичекъ вполнъ растворяются отъ дъйствія ъдкаго кали, послъ чего на мъстъ прикръпленія стебелька на оболочкъ яйца остается только свътлый кружекъ. Значитъ, сомнъніе мое было правильно: вещество стебелька вовсе не хитинъ. Отказываюсь поэтому отъ ъдкаго кали и кипячу каждое слъдующее брюшко просто въ чистой водъ, отъ чего оно размягчается вполнъ до-

Результатъ изслъдованія слъдующій. Изъ всъхъ 7 изслъдо-

ванныхъ самокъ были получены такія же стебельчатыя яички съ бурою, сильно хитинизированной скорлупою, какъ у тѣхъ двухъ видовъ, представительницы которыхъ жили въ лабораторіи. Форма яичекъ и стебельковъ оставалась одинаковой у всѣхъ видовъ, но микропиле у нихъ были разныя (изображены на рисункѣ 28). Яички большей частью были раскрытыя и въ нихъ виднѣлись готовыя къ выходу личинки. Только у одной самки не было найдено въ брюшкѣ готовыхъ къ выходу личинокъ: у Р. ораси-lus Thoms., пойманной 9 іюля 1902 г. К. Э. Демоки довымъ въ Кишиневѣ, но изъ другой самки этого же вида, пойманной 4 августа 1910 г. В. И. Плотниковымъ въ пензен-







Рис. 28. Микропиле яичекъ панисковъ: лѣвый рис.—Paniscus testaceus Grav. var., средній—P. opaculus Thoms. и правый—P. gracilipes Thoms. Сильно увелич. Оригин.

ской губ., было извлечено 14 яичекъ, изъ которыхъ въ 12 заключались готовыя къ выходу личинки. У одной самки рыжаго паниска (*P. testaceus* Grav.), которая вывелась зимою въ лабораторіи (изъ коконовъ *Cuculia*, присланныхъ изъ Германіи) и прожила около двухъ недъль до вскрытія, было найдено по одному яичку съ готовой личинкой въ нижнемъ концѣ каждаго яйцевода, а выше лежали бурыя яички, но еще съ зародышами (Рис. 27). У другой самки того же вида, пойманной 11 мая 1903 г. К. Э. Демок и довымъ, оказалось въ яйцеводахъ 16 яичекъ и всѣ съ готовыми личинками. Далѣе, у двухъ самокъ того же вида (var. *melanura* Thoms., изъ Германіи—безъ даты) найдено въ яйцеводахъ: у одной—35 яицъ, изъ которыхъ въ 24 были вполнѣ готовыя личинки, а у другой онѣ были найдены въ 16 изъ 23 добытыхъ яичекъ. Наконецъ, одна самка *P. gracilipes* Thoms (отъ Н. Р. Кокуева-безъ даты) содержала 22 яич-




Рис. 27. Яйцеводъ и яичникъ рыжаго паниска (Paniscus testaceus G г.). Вверху (а—b) пучекъ изъ 8 яйцевыхъ трубочекъ; а—яйцевая камера; b—камера съ питательными клътками; с—лъвый яйцеводъ съ тремя яичками, изъ которыхъ нижнее открылось и въ немъ видна личинка; d—общій яйцеводъ; е—симепріемникъ съ питательной жельзой. Увелич. около 30 разъ. Оригин.

ка, въ числъ которыхъ 5 были съ личинками. Присоединяя къ 7 изслѣдованнымъ такимъ образомъ самкамъ названныхъ трехъ видовъ паниска трехъ жившихъ въ лабораторіи самокъ темноглазаго и зеленоглазаго панисковъ мы можемъ, кажется, безъ большой опасности впасть въ ошибку сдълать выводъ, что живорожденіе и яйцеживорожденіе есть общее свойство самокъ панисковъ и, если самки какого нибудь еще не изслѣдованнаго вида окажутся яйценесущими, то такой случай правильнъе будетъ считать исключеніемъ, а яйцеживорожденіе принимать пока за общее правило.

Итакъ, живородящая самка паниска носитъ въ чревъ своемъ вполнъ развитыхъ личинокъ, готовыхъ выставить головки изъ

яицъ, раскрыть свои крючковидныя челюсти и вцъпиться ими въ то, что будетъ передъ отверстіемъ ихъ алчущихъ ртовъ. Передъ нимъ же, пока личинки въ тълъ матери, нъжная стънка материнскаго яйцевода, да немного выше твердая скорлупа сосъдняго яичка, при крывающая тылъ заключенной въ немъ личинки отъ вооруженнаго челюстями братца или сестрицы. Очевидно, что матери не обходимо какъ можно скоръе избавиться отъ этихъ опасныхъ дътенышей, способныхъ всадить свои челюсти въ нъжныя ткани ея внутреннихъ органовъ. Ей грозитъ отъ нихъ серьезная опасность и даже смерть. На такія мысли навело меня вскрытіе и осмотръ яичниковъ тъхъ двухъ самокъ темноглазаго паниска, которыя скончались въ лабораторіи. Но прежде чімъ разсказать, что было въ нихъ найдено, считаю необходимымъ сказать нъсколько словъ о яичникахъ и яйцеводахъ панисковъ, изображение которыхъ дано на рис. 27. У разныхъ видовъ они отличаются лишь длиною яйцеводовъ и числомъ яйцевыхъ трубочекъ.

На рисункъ изображенъ одинъ изъ двухъ парныхъ яйцеводовъ, соединяющихся внизу въ общій непарный яйцеводъ, который открывается наружу половымъ отверстіямъ. Вверху каждый яйцеводъ кончается яичникомъ, состоящимъ изъ восьми яйцевыхъ трубочекъ, расположенныхъ пучкомъ. У верхняго конца общаго яйцевода прикрѣпленъ сѣмепріемникъ съ его питательной железой, а въ нижній конецъ впадаютъ выводные протоки ядовитой и смазочной железъ (не изображенныхъ на рисункъ). Яйцевыя трубочки яичника у основанія расширень, а къ вершинъ постепенно суживаются и каждая изъ нихъ дълится пережимами на двойныя камеры, изъ которыхъ въ нижней развивается яйцо на счетъ содержимаго верхней камеры, заключающей въ себъ питательныя клътки. Яички въ яйцевыхъ трубочкахъ по мъръ созръванія растуть вифстф съ заключающими ихъ камерами, а лежащія надъ ними питательныя камеры постепенно уменьшаются вслѣдствіе поглощенія питательныхъ клѣтокъ развивающимися яичками. Болъе близкія къ зрълости яички находятся въ нижнихъ концахъ яйцевыхъ трубочекъ, въ верхнихъ же тонкихъ концахъ видны крупныя камеры питательныхъ клътокъ съ только что обособившимися отъ нихъ мелкими яйцевыми камерами, содержащими только зачатки яицъ. Буквою а на рисункъ отмъчено близкое къ зрѣлости, но еще не имѣющее стебелька яичко, усвоившее почти все содержимое своей питательной камеры, отмѣченной буквою b, въ которой однако еще видны немногочисленныя остающіяся питательныя клѣтки. Въ одной изъ среднихъ яйцевыхъ трубочекъ видно созрѣвшее яичко, имѣющее стебелекъ и готовое къ выходу въ яйцеводъ, куда оно уже проникло основной частью со стебелькомъ. Вокругъ этого яичка уже нѣтъ эпителіальнаго слоя, образующаго стѣнки яйцевой камеры вокругъ яичка а и вокругъ остальныхъ, болѣе молодыхъ. Въ парномъ яйцеводѣ мы видимъ три яйца, въ которыхъ во время пребыванія ихъ здѣсь совершается развитіе личинокъ. Въ нижнемъ яйцѣ оно уже закончилось, створки его раздвинулись и внутри черезъ просвѣчивающую скорлупу видна готовая къ выходу и къ пожиранію жертвы личинка.

Яйцеводы вскрытыхъ мною самокъ темноглазаго паниска содержали не по три яичка, какъ у той, что на рисункъ, а значительно болъе и были длиннъе; яйцевыхъ трубочекъ въ яичникахъ у нихъ было по четыре. Въ яйцеводахъ первой самки, умершей 24 августа и тогда же вскрытой, я нашелъ 8 яичекъ въ лѣвомъ яйцеводъ и 9-въ правомъ. Выше, въ трубочкахъ яичника, находились зачатки яицъ въ яйцевыхъ камерахъ. Въ лѣвомъ яйцеводъ 4 первыя яичка, считая снизу, имъли совершенно бурыя скорлупки, но еще не раскрылись и личинокъ въ нихъ не было видно; надъ ними лежало 5-е, свътлобурое, раскрывшееся яичко и изъ него уже выдвинулась голова личинки; потомъ шли два яичка съ бълой, еще даже не пожелтъвшей, скорлупою и изъ нихъ нижнее, т. е. 6-е, яичко было такъ же широко открыто, какъ свътлобурое, и въ немъ двигала головой и раскрывала челюсти вполнъ готовая личинка. Во время вскрытія 5-е и 6-е яички вывалились изъ яйцевода черезъ дырку, найденную мною въ стънкъ его въ этомъ мъстъ, и всплыли на поверхность воды, въ которой производилось вскрытіе. Возможно, что эту дырку я сдълалъ по неосторожности моими иглами, но возможно также, что прорывъ яйцевода былъ сдъланъ живо шевелившимися личинками. Изъ правого яйцевода я вынулъ 9 яичекъ: 5 первыхъ, считая снизу, были бурыя, потомъ-два свътлобурыхъ и два бълыхъ. Ни въ одномъ изъ яичекъ этого яйцевода личинокъ не было видно и и всъ яйца были закрытыя.

Семь бурыхъ яичекъ (4 изъ лѣваго и 3 изъ праваго яйцеводовъ) были положены на комочки ваты во влажной камерѣ (2 были попорчены при выниманіи), гдѣ черезъ 6 дней, т. е. 31 августа, изъ пяти яичекъ вылупились личинки, которыя были воспитаны мною до 2-й стадіи и одна до 3-й, но потомъ погибли (послѣдняя была раздавлена гусеницей). Два яичка лѣваго яйцевода, вывалившіяся изъ него во время вскрытія, содержали живыхъ личинокъ, въ челюстяхъ которы тъ я нашелъ, подъ бинокуляромъ, обрывки дыхательныхъ трубочекъ, принадлежавшихъ, конечно, ихъ матери. Обрывки эти были осторожно вынуты мною иглами, послъ чего личинки положены на приготовленную для нихъ жертву, къ которой онъ присосались немедленно. Однако, недостаточно хитинизированныя и слишкомъ тонкія скорлупки яичекъ этихъ недоносковъ скоро стали подсыхать и заворачиваться внутрь, отчего личинки втянулись въ яички и 28 августа найдены мертвыми.

Здѣсь мы имѣемъ очень интересный случай преждевременнаго и, вѣроятно, болѣзненнаго развитія и вылупленія личинокъ въ двухъ наиболѣе молодыхъ яичкахъ лѣваго яйцевода—въ 5-мъ и 6-мъ, въ то время, когда въ старшихъ четырехъ развивались еще зародыши, превратившіеся въ личинокъ во влажной камерѣ только черезъ 6 дней. Весьма возможно, что это преждевременное вылупленіе двухъ болѣе молодыхъ личинокъ въ тѣлѣ матери и движенія ихъ головокъ и челюстей послужили причиной ея внезапной смерти, такъ какъ она умерла безъ всякой видимой причины. Самка эта, какъ было сказано раньше, не откладывала яицъ на гусеницъ, но сбрасывала ихъ, и за все время своей жизни въ неволѣ, съ 20 іюля по 22 августа, сбросила 49 яицъ—всѣ съ личинками, послѣ чего перестала сбрасывать и, проживя еще два дня въ тѣхъ же условіяхъ, какъ раньше, была найдена 24 августа мертвой.

Еще болѣе поразительныя вещи были найдены въ яйцеводахъ другой самки темноглазаго паниска, умершей и вскрытой 16 сентября. Когда покровы вскрытаго брюшка ея были раздвинуты, на поверхность воды всплыло 24 раскрывшихся бурыхъ яичка, вывалившихся изъ яйцеводовъ, и изъ всѣхъ изъ нихъ выдвинулись подвижныя личинки, однѣ—на половину, другія только высунули головки. Оба яйцевода были порваны и продырявлены во многихъ мѣстахъ до такой степени, до какой моя неосторожность при вскрытіи ни въ какомъ случать не могла бы ихъ повредить. Внутри яйцеводовъ нашлось еще 5 бурыхъ не раскрывшихся яичекъ съ готовыми личинками въ нихъ и 6 бѣлыхъ яичекъ съ зародышами. Въ яйцевыхъ трубочкахъ имѣлись яйцевыя камеры съ зачатками яицъ.

Всего, слѣдовательно, въ двухъ яйцеводахъ этой самки было

35 яичекъ, изъ которыхъ въ 29 яичкахъ заключались вполнѣ развитыя личинки, а въ 24 изъ нихъ личинки уже вылупились и выдвинулись наружу. Почти у всѣхъ всплывшихъ личинокъ виднѣлись во рту куски материнскихъ трахей, такъ опутывавшіе ихъ челюсти, что удалить ихъ не повредивъ личинокъ было очень затруднительно. Я положилъ ихъ на ночь въ чистую воду и на другой день увидалъ, что у большинства куски трахей сами отдѣлились отъ отверстія рта и плавали по поверхности воды, а у другихъ они еще держались на челюстяхъ, но легко могли быть отдѣлены иглою. Всѣ личинки послѣ того были положены на приготовленныя для нихъ жертвы, къ которымъ онѣ тотчасъ же присосались.

Можно сомнъваться въ правильности только что даннаго объясненія причины смерти первой самки, но въ настоящемъ случать возможность какого бы-то ни было сомнтнія совершенно исключается наглядной очевидностью этой причины. Несчастная мать выносила въ тълъ своемъ такихъ страшно опасныхъ для нея дътенышей, отъ которыхъ ей необходимо было избавиться какъ можно скоръе и во чтобы то нистало, но что-то помъшало ей это сдълать и послъдовала катастрофа. Личинки прорвали стънки яйцеводовъ, выпали изъ нихъ въ полость брюшка, запутались среди многочисленныхъ дыхательныхъ трубочекъ, густою сътью переплетающихъ всъ внутренніе органы матери, и рвали ихъ, раздвигая и смыкая свои челюсти. Въ результатъмоментальная смерть матери, а за нею, конечно, должна послъдовать и смерть детенышей, такъ какъ въ трупе матери для нихъ нътъ подходящей пищи, ибо имъ нужна добыча сочная и живая. Жестокость-безцѣльная и не поддающаяся никакому сравненію, но, чтобы не совершилась эта жестокость, самка должна была сама поступить жестоко: она должна была выбросить изъ себя своихъ личинокъ не на приготовленную для нихъ добычу, за отсутствіемъ таковой, а куда бы то ни было: на листъ, на землю, на камень-на върную смерть, что она по временамъ и дълала. Жестокость отношеній обоюдная.

Обычай сбрасыванія яичекъ довольно широко распространенъ среди наѣздниковъ, но у тѣхъ изъ нихъ, которые принадежатъ къ яйценесущимъ, этотъ обычай вовсе не обусловливается такой страшной необходимостью, какъ у живородящихъ панисковъ. Тамъ онъ является слѣдствіемъ непрерывной работы яичниковъ, производящихъ и отправляющихъ въ яйцеводы все

новыя и новыя ячки. Чтобы дать мъсто вновь поступающимъ, самка должна выкидывать изъ своихъ яйцеводовъ ранъе поступившія, хотя бы она и не успъла найти для нихъ подходящей добычи. Въ яичникахъ панисковъ совершается, конечно, то же самое явленіе, обусловливающее необходимость постепеннаго освобожденія яйцеводовъ отъ болъе зрълыхъ яицъ, но къ этому условію у нихъ прибавляется еще, какъ у живородящихъ, настойчивая необходимость освободить тъло матери отъ опасныхъ для нея вполнъ созръвшихъ плотоядныхъ дътокъ.

Такое же явленіе, т. е. возможность вылупленія личинокъ въ тѣлѣ матери, удостовѣрено еще въ 1738 году у живородящихъ мухъ Рео м ю ро м ъ, который писалъ въ своихъ мемуарахъ, что личинки ихъ дважды рождаются: одинъ разъ—выходя изъ яйцевода въ тѣло матери, и вторично—при выходѣ изъ ея тѣла черезъ заднепроходное отверстіе, черезъ которое, какъ онъ полагалъ, онѣ выходятъ наружу нормально, не причиняя смерти матери. Новѣйшій изслѣдователь жизни паразитныхъ двукрылыхъ, Па нтэль, обсуждая наблюденіе Рео м ю ра и подтверждая его, указываетъ на ненормальность этого явленія, такъ какъ слѣдствіемъ его бываетъ гибель личинокъ и мухи, для выхода изъ которой онѣ пользуются не тѣмъ отверстіемъ, о которомъ говорилъ Рео м ю ръ, а прорываютъ для того тонкую оболочку брюшка самки между составляющими его члениками (38,67, 85, 89 и 163).

Съ своей стороны, могу подтвердить объяснение Пантэля тъмъ, что сообщилъ мнъ мой новый сотрудникъ по лабораторіи, А. В. Яцентковскій, относительно одной саркофаги (Sarcophaga affinis Fall.), переданной имъ мнъ для изслъдованія. Эта муха была поймана (11. VП. 11. въ Сувалкской губ.) среди гусеницъ монашенки (Ocneria monacha L.), скопившихся подъ кольцомъ изъ гусеничнаго клея, и тогда же заключена была въ пустую склянку, не плотно закрытую. Черезъ два дня муха лежала въ ней мертвая и вокругъ нея ползали крошечныя личинки, а другія еще выползали изъ ея брюшка черезъ тонкую перепонку между его члениками. Въ склянку былъ налитъ тогда же спиртъ и зимою она была передана мнъ. Размочивъ муху въ водъ, я вскрылъ ея брюшко и нашелъ въ полости его личинокъ, а также въ нижней части яйцевода. Въ перепонкъ, соединявшей членики брюшка, замътны были во многихъ мъстахъ неправильныя дырочки. oundings a character of the property of the contract of the co

Bodingania napasnyoso na sadophi oniny auronasay napisahi ing

Гибель паразитовъ.

Прежде чѣмъ начать изложеніе исторіи благополучнаго развитія паразитовъ на гусеницахъ въ лабораторіи я долженъ замѣтить, что весьма многочисленны были случаи въ ней, кончавшіеся для паразитовъ не благополучно. Съ объясненія причинъ этого явленія я и начну. Можно указать слѣдующія причины такихъ неудачъ: 1) болѣзнь и преждевременная смерть гусеницъ вслѣдствіе зараженія какими то низшими организмами; 2) сопротивленіе, которое оказывали гусеницы высасывавшимъ ихъ паразитнымъ личинкамъ, и 3) откладываніе панисками нежизнеспособныхъ яицъ и личинокъ.

Гусеницы озимой ночницы, которыхъ я давалъ панискамъ для откладыванія яицъ, были присланы 26 іюля А. А. Сопоцько изъ Тульской губ., гдв онв въ теченіе льта 1910 года сильно страдали отъ болъзни, причиняемой микроскопическимъ грибкомъ, который, какъ сообщилъ мнѣ знатокъ этихъ бользней А. А. Ячевскій, принадлежить къ виду Tarichium megasperтит Cohn. Но въ гусеницахъ, присланныхъ мнѣ, проявилась не эта бользнь, а другая, по мнънію того же А. А. Ячевскаго, въроятно бактеріальнаго происхожденія. Снаружи она выражалась въ томъ, что у взрослой или близкой къ тому гусеницы свойственная ей сфрая окраска переходила въ свътлобурую, прерывшуюся мъстами еще болъе свътлыми пятнами, причемъ на поверхности гусеницы выступалъ бурый сокъ, послъ чего гусеница переставала кормиться, съеживалась и умирала. Вскрывая такихъ гусеницъ, я находилъ жировое тъло ихъ слившимся въ однообразную массу, похожую на уплотненную вату, и всегда оно давало въ водъ бълую муть, между тъмъ какъ у здоровыхъ гусеницъ жировое тъло состоитъ изъ лентообразныхъ лопастей, ясно отграниченныхъ одна отъ другой, молочнобълаго цвъта и не дающихъ въ водъ никакой мути. Изъ 16 гусеницъ, на которыхъ были отложены яички панискомъ зеленоглазымъ, 8 гусеницъ умерли вскоръ послъ кладки и у 5 изъ нихъ была ясно выражена эта болъзнь. Въ томъ числъ погибли вст первыя гусеницы, на которыхъ было отложено по 4, 2 и 3 яйца.

Переходя ко второй изъ указанныхъ причинъ неудачнаго воспитанія паразитовъ въ лабораторіи, я приведу примѣръ изъ

дневника, чтобы охарактеризовать борьбу, которую ведетъ гусеница съ высасывающими ее паразитами. Раньше я разсказалъ уже, какъ самка зеленоглазаго паниска отложила вечеромъ 31 августа на одну гусеницу три яичка, размъстивъ ихъ такимъ образомъ: одно на спинъ затулья, немного лъвъе середины, другое на правой сторонъ у основанія задней грудной ножки и третье на той же сторонъ, но надъ заднею брюшною ножкой, почти у задняго конца гусеницы. Къ утру слъдующаго дня изъ всъхъ яичекъ выдвинулись личинки и присосались. Первая лежала поперекъ спины гусеницы головой къ лѣвой ея сторонѣ, вторая направилась внизъ и присосалась впереди основанія ножки и третья тоже направилась къ нижней сторонъ и присосалась между двумя последними члениками тела. Гусеница была вполнъ бодрая и очень подвижная, часто бросалась на спину, каталась и корчилась. Упражненія эти окончились тѣмъ, что 5 сентября я нашелъ личинку, бывшую у нея на спинъ и остававшуюся въ 1-й стадіи, побуръвшей и метрвой. Повидимому, она была придавлена при катаніи и корчахъ гусеницы. Изъ яичка, сидъвшаго у грудной ножки, ничего не видно, личинка въ него втянулась. Самая задняя личинка, повидимому, благоденствуетъ, перешла во вгорую стадію и продолжаетъ

Каждую гусеницу, на которую отложены яички, я держу обыкновенно въ особой стеклянной плоской чашечкъ (8 мм. глубиной), накрытой такою-же, но немного большею, чашечкой, что даетъ возможность осматривать гусеницу со всъхъ сторонъ. Гусеница, о которой идетъ ръчь, спокойно лежитъ на брюшной сторонъ. Желая осмотръть ее, подымаю чашечки надъ собой и вижу черезъ лупу, что гусеница загнула голову внизъ, вытянула челюсти и ощупываетъ ими свою грудь во всъхъ ея складкахъ; наконецъ, дотянулась до третьяго членика груди и прикоснулась къ яичку, которое прикръплено у основанія грудной ножки. Если бы изъ него выдавалась личинка, она была бы теперь схвачена челюстями гусеницы, но личинка, какъ сказано, втянулась въ яйцо и гусеница ее не тронула. Потомъ ставлю чашечку подъ бинокуляръ и наблюдаю, какъ гусеница загибается кольцомъ на правую сторону, направляя челюсти къ заднему концу тѣла, гдѣ укрѣплено третье яичко, и вижу, что скорлупа его разорвана вдоль середины, такъ же, какъ и находящаяся въ немъ, сброщенная сосущею личинкой, первая шкурка. Наконецъ гусеница дотянулась

головой до мъста нахожденія этого яйца, схватываетъ челюстями его скорлупу и ръзкимъ движеніемъ какъ бы хочетъ сорвать его, но челюсти попали на прорванное мъсто скорлупы и ничего не захватили. Попытки повторяются, но съ тъмъ же успъхомъ. На этотъ разъ она не добралась до личинки. На слъдующій день нахожу въ чашечкъ на стеклъ трупъ личинки 2-й стадіи, а скорлупа яичка осталась на прежнемъ мъстъ. У отпавшей паразитной личинки оторвана вся задняя четверть тъла и видна большая рана на спинъ сзади головы. Гусеница, слъдовательно, явно восторжествовала уже надъ двумя паразитами и сохранила бодрость и подвижность.

Для точнаго уясненія того, что здѣсь произошло, и для выясненія участи третьяго паразита пришлось умертвить и вскрыть побѣдительницу, послѣ чего были вырѣзаны изъ нея кусочки кожи, къ которымъ прикрѣплялись яички, и положены въ воду для размачиванія подсохшихъ труповъ личинокъ. Черезъ сутки можно было ясно видѣть, что у первой личинки, помѣщавшейся на спинѣ, была на боку большая рана, черезъ которую выступало наружу содержимое личинки. Не было сомнѣнія, что эта личинка была раздавлена гусеницей во время катанія и корчей на спинѣ. Вторая личинка, сначала сосавшая на грудной сторонѣ гусеницы, а потомъ втянувшаяся въ яйцо, имѣла также рану на спинѣ, сзади головы, и эта рана была сдѣлана, конечно, челюстями гусеницы. Наконецъ, 3-я личинка была сорвана въ моментъ линьки, при переходѣ въ третью стадію.

Мать, пристроившая яички на эту гусеницу, не была достаточно осмотрительна и, размѣщая ихъ слишкомъ поспѣшно, выбрала такія мѣста, гдѣ имъ угрожала явная опасность. Прежде всего поражаетъ прикрѣпленіе яичка у задняго конца гусеницы, т. е. въ такомъ мѣстѣ, куда гусеница можетъ во всякое время дотянуться челюстями и сорвать безпокоющую ее личинку. Это гусеница и сдѣлала. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ эта же самка, равно какъ и другая, которую я наблюдалъ, обѣ всегда безъ исключенія откладывали яички только на переднюю частъ тѣла своей жертвы, куда челюсти ея или совсѣмъ не могутъ добраться или могутъ лишь при крайнемъ напряженіи силъ гусеницы, пока она еще не истощена сосаніемъ паразита. Неудачно было приприкрѣплено и находившееся на спинѣ яичко: оно помѣщалось почти на хребтѣ гусеницы, лишь немного лѣвѣе, и не въ желобкѣ, которымъ отдѣляются членики тѣла другъ отъ друга, а на

поверхности самаго членика. Нисколько не удивительно, что при такомъ выставленномъ положеніи личинки гусеницѣ скоро удалось раздавить ее своею тяжестью во время судорожныхъ передвиженій на спинѣ. Наконецъ, грудное яичко было черезчуръ низко прикрѣплено, вслѣдствіе чего личинка, выдвинувшаяся изъ него, слишкомъ рано проникла на грудную сторону, раньше, чѣмъ гусеница ослабѣла настолько, чтобы утерять способность дотянуться челюстями до задняго края своей груди, гдѣ присосалась личинка, и куда, какъ мы видѣли, челюсти гусеницы свободно проникали.

Часто приходилось мнѣ видѣть, что гусеница, до которой самка только дотронулась усикомъ или ножкой, поспъшно отъ нея убъгала, но по временамъ останавливалась, загибала голову назадъ и ощупывала ртомъ всю заднюю половину своего тъла, какъ бы желая найти на немъ что-то и сорвать или раздавить его непрерывно смыкавшимися и размыкавшимися челюстями. Не найдя ничего, она продолжала свой бъгъ, но потомъ опять останавливалась и обыскивала такъ же свою другую сторону. Чего она при этомъ искала? Отложенныхъ яичекъ? Мнѣ приходило въ голову продълать надъ гусеницей такой опыть: пристроить какъ нибудь искусственно яички съ личинками на задней половинъ ея тъла, чтобы посмотръть потомъ, найдется ли у гусеницы достаточно ума, чтобы понять, что боль которую она чувствуетъ въ мъстахъ сосанія личинокъ, происходить отъ нихъ и что для спасенія себя она должна ихъ умертвить. Сдълаеть ли она это? Какъ мы видѣли, она это сдѣлала, и безъ вмѣшательства моихъ опытовъ, а вслъдствіе оплошности клавшей яички матери, и продълала при этомъ цълый рядъ различныхъ, но вполнъ цълесообразныхъ дъйствій.

Гусеницу высасывали одновременно три личинки въ трехъ разныхъ мѣстахъ и она не потерялась отъ такого обилія враговъ, не стала безтолково бросаться то на одного, то на другого, а направила свои силы на каждаго по очереди и, покончивъ съ однимъ, принималась за другого. Корчами и катаніемъ на спинѣ одолѣла первую личинку; подгибая голову внизъ, дотянулась челюстями до второй и нанесла ей смертельную рану. Послѣ того перестала обращать вниманіе на этихъ двухъ, хотя здѣсь еще оставались стебельчатыя скорлупки яицъ съ трупами личинокъ, и начала столь же успѣшную борьбу съ третьей, самою задней личинкой, послѣ удаленія которой

спокойно ползала и спокойно отдыхала, безъ корчъ, безъ перевертываній. Въ каждомъ случать она проявила какъбы пониманіе, что именно ей надо раздавить и поранить—не скорлупу яичка, а личинку, и не удалить ее непремтенно, а только поранить, чтобы умертвить. Мы видтели, что она старалась сорвать скорлупу задняго яичка и даже разорвала ее, но она дтелала это только до ттехъ поръ, пока въ яичкте скрывался задъ сосавшей ее личинки, а какъ только личинка была вырвана изъ него и убита, пустая скорлупа перестала привлекать ея вниманіе. Кромте этой скорлупы, еще два яичка съ трупами на ней остаются, но они уже ее не смущаютъ.

Выше я сказалъ, что гусеница, убъгающая отъ прикоснувшейся къ ней самки, изслъдуетъ челюстями поверхность всего своего тѣла, куда только можетъ достать, хотя бы не было отложено на нее ни одного яичка. Тоже дълаетъ она и въ томъ случаъ, когда одно или нъсколько стебельковъ съ яичками воткнуто въ ея кожу. Изъ этихъ яичекъ личинки еще не вышли и не начали причинять ей боль своими острыми челюстями и сосаніемъ, но онъ сдълаютъ это потомъ, черезъ нъсколько часовъ или черезъ день и даже два, а гусеница теперь предвидитъ это и принимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы не допустить грядущаго событія. Какъ будто она уже испытала его и знаетъ хорошо, какой опасностью грозять ей въ будущемъ эти, теперь не причиняющія боли, яички. Можно бы сказать, что туть совсѣмъ не въ предвидѣніи дѣло и не въ знаніи, а просто она желаетъ избавиться отъ посторонняго тъла, прикръпившагося къ ея кожъ и раздражающаго ее въ настоящій моментъ, безъ всякаго отношенія къ будущему. Но тогда, почему же гусеница, о которой я только-что разсказалъ, успокоилась по умерщвленіи сосавшихъ ее личинокъ и примирилась съ тъмъ, что на кожъ ея остались прикръпленными три постороннія тъла, т. е. тъ же стебельчатыя яички, но безъ живыхъ личинокъ, два съ трупами и одно пустое? Она какъ будто бы сознаетъ, или инстинктъ говорить ей, что теперь никакой опасностью они не грозять ей и она нисколько не старается избавиться отъ нихъ. Инстинктъ и сознаніе—двъ параллельныя прямыя, которыя сходятся въ безконечности *).

Третьей причиной, обусловливавшей неудачу моихъ попытокъ воспитанія личинокъ паниска въ лабораторіи, было, какъ я скавалъ, то обстоятельство, что иногда самки откладывали на гусеницъ такія яички, изъ которыхъ впослѣдствіи ничего не выходило. Такъ, напримѣръ, самка зеленоглазаго паниска отложила 9 сентября два яичка, утромъ и вечеромъ, на двухъ бодрыхъ гусеницъ. Объ этихъ яичкахъ въ моемъ дневникѣ такія отмѣтки: 11 сентября—яички еще не открылись; 14-го и 15-го—тоже; 16-го—яички слегка открылись, но личинки изъ нихъ только проглядываютъ, нисколько не высунулись, гусеницы малоподвижны; 18-го—тоже, гусеницы неподвижны; 20-го—гусеницы мертвы, личинки изъ яицъ не выдвигались и высохли.

Другой примъръ съ тою же самкой. Вечеромъ 12 сентября отложено одно яичко на бодрую гусеницу; 13-го яичко открылось, но личинка еще не выдвинулась изъ него; 14-го личинка выдвинулась и присосалась, голова ея совершенно безцвътная; 16-го личинка мертва и высохла, не втянувшись обратно въ яйцо, гусеница бодрая. Подобныя же записи имъются въ дневникъ относительно еще двухъ яичекъ, отложенныхъ этой же самкой, и о трехъ, отложеннихъ самкой темноглазаго паниска. Откладываніе неспособныхъ къ развитію яицъ и личинокъ наблюдается иногда и у живородящихъ мухъ, о чемъ сообщаетъ Пантэль (38, 72), объясняя это явленіе громадной ихъ плодовитостью, вследствіе которой не для всехъ яицъ хватаетъ достаточно питательныхъ матеріаловъ, чтобы въ нихъ развились сильныя, вполнъ жизнеспособныя личинки. Это объяснение къ панискамъ, однако, не подходитъ, такъ какъ плодовитость ихъ за границы умфренности совсфмъ не выходитъ.

Одинъ разъ яичко было пристроено самкой такъ неудачно, что безъ моего вмѣшательства личинка, выдвинувшаяся изъ него, должна была бы погибнуть. Я уже сказалъ, что воткнутыя въ кожу яички всегда прилегаютъ къ ней своей нижнею плоской стороной, той, гдѣ раздвигаются створки яйца, вслѣдствіе чего выступающая изъ передняго конца яичка головка личинки тот-

eronia castella saggantal mora Bread himera

^{*)} Многія изъ паразитныхъ мухъ—тахинъ откладывають, какъ извъстно, свои яички также на кожу гусеницъ. Въ громадномъ большинетъ случаевъ я замъчалъ, что эти яички помъщались обыкновенно

на передней половинѣ гусеницы. Здѣсь такое размѣщеніе ихъ могло быть слѣдствіемъ того, что къ моменту нахожденія гусеницы мною, она успѣвала очистить от яицъ заднюю половину своего тѣла, ибо яички тахинъ укрѣцляются на кожѣ гусеницъ очень не прочно; возможно, однако, что и тахины, подобно панискамъ, стараются класть яйца на переднюю часть тѣла гусеницы.

часъ находитъ у отверстія рта кожу гусеницы, къ которой и присасывается. У этого же яичка стебелекъ былъ такъ воткнутъ, что яичко прикасалось къ кожѣ только заднимъ своимъ концомъ, а передній конецъ яйца былъ обращенъ вверхъ, вслѣдствіе чего выдвинувшаяся изъ него головка не могла достать до кожи гусеницы и безпомощно поворачивалась во всѣ стороны въ воздухѣ. На другой день личинка выдвинулась изъ яйца на половину и все-таки не могла дотянуться до кожи. Тогда я на-клонилъ яйцо иглою настолько, что голова личинки прикоснулась къ кожѣ и въ тотъ же моментъ челюсти личинки въ нее вонзились. Сосаніе послѣ этого началось немедленно и личинка не отрывалась отъ жертвы до наступленія линьки, послѣ чего все пошло благополучно.

Домашнее воспитаніе.

Яички и личинки панисковъ получались въ лабораторіи, какъ объяснено, двумя путями: одни были сброшены самками, другія были пристроены ими на гусеницъ. Участью первыхъ займемся потомъ, теперь же проследимъ судьбу обезпеченныхъ, прикрепленныхъ матерями къ постоянному источнику питанія. Третьяго сентября второю самкою темноглазаго паниска было отложено на гусеницу первое яичко съ выдвинувшейся изъ него личинкой, какъ это было раньше описано мною. Стебелекъ, проникшій подъ кожу, прочно прикрѣпляетъ яйцо къ гусеницѣ; задній конецъ тѣла личинки, скрытый въ скорлупъ яйца, усъянный шипиками, направленными впередъ, столь же прочно удерживается ими въ скорлупъ; впереди личинка оканчивается двумя крючковидными острыми челюстями, которыя вонзились въ кожу гусеницы, послъ чего связь между паразитомъ и жертвой сдълалась неразрывной. Личинка прикръплена къ ней на обоихъ концахъ: сзади-стебелькомъ, впереди челюстями, и при такихъ условіяхъ гусеница никакъ не можетъ сбросить съ себя паразита, хотя все дълаетъ для того, что можетъ. Она бросается на спину и корчится, упираясь въ землю разными точками тъла, потомъ перевертывается, бъжитъ вдоль стѣнъ заключающаго ее помѣщенія и трется о нихъ то однимъ то другимъ бокомъ, но на паразита ничто не дъйствуетъ. Изгибаясь самымъ неестественнымъ образомъ, она ощупываетъ челюстями свою спину, но изогнуться такъ, чтобы достать до яичка съ личинкой никакъ не можетъ. На заднихъ двухъ третяхъ своего тѣла она можетъ достать челюстями до каждой точки, но не на загривкѣ, не на передней трети тѣла, гдѣ бока и спина совершенно не доступны челюстямъ, а здѣсь-то и сидитъ ненавистная личинка. Она укрѣпилась въ складкѣ кожи за третьимъ членикомъ туловища, правъе середины его и направлена головкой къ правому боку гусеницы.

Въ такихъ, почти непрерывныхъ, передвиженіяхъ и корчахъ гусеницы проходитъ три дня, послъ чего совершается первая

линька паразита. Все время личинка не отрывала своего рта отъ жертвы и непрерывно сосала, теперь она должна сдълать кратковременный перерывъ. На серединъ головнаго покрова ея образуется трещина вдоль желобка, ограничивающаго срединную продольную пластинку черепа, и продолжается на шкурку вдоль середины спины до задней четверти тъла. Изъ трещины




Рис. 29. Передній конецъ гусеницы съ личинкой паниска въ 4-й стадіи. Подъ личинкой видны три сброшенныя ею шкурки. Увелич. около 5 разъ. Оригин.

выдвигаются голова и тѣло новой личинки, которая ощупываетъ отверстіемъ рта кожу гусеницы впереди мѣста сосанія первой личинки. Очень скоро вновь появившаяся раскрываетъ свои челюсти, приставляетъ ихъ къ жертвѣ и смыкаетъ, при чемъ онѣ вонзаются въ кожу, а между ними, по серединѣ, прикладывается отверстіе рта и сосаніе возобновляется. Задній конецъ личинки не мѣняетъ мѣста и остается внутри скорлупы яйца и первой шкурки, которая такимъ образомъ покрываетъ сверху заднюю четверть новой личинки, а съ боковъ и снизу охвачена ею почти вся задняя половина. Челюсти старой шкурки не были вынуты при линькѣ изъ кожи и остались въ ней, новыя же вонзились въ новомъ мѣстѣ, отчего связь паразита съ жертвою еще укрѣпилась:

кром то стебелька, его прикр тпляютъ къ ней уже двт пары челюстей.

Гусеница продолжаетъ быть подвижной и не даетъ хорошо разсмотръть, что дълается внутри паразита. Черезъ два дня, 8 сентября вечеромъ, замъчаю подъ паразитной личинкой вторую сброшенную ею шкурку, тоже укръпленную челюстями къ кожъ гусеницы, а личинка, перешедшая въ 3-ю стадію и снова подросшая, еще продвинула впередъ головку и присосалась въ новомъ мъстъ. Задній конецъ новой личинки опять остался на прежнемъ мъстъ и покрытъ теперь двумя сброшенными шкурками. Проходитъ еще два дня и личинка снова линяетъ, сбрасываетъ третью шкурку и переходитъ въ 4-ю стадію (рис. 29). Челюсти сброшенной шкурки опять остались въ кожѣ гусеницы, а головка новой личинки продвинулась еще впередъ и присосалась почти сзади третьей грудной ножки. Движенія гусеницы сдълались медленными, она почти не ползаетъ, а корчится и перевертывается. По временамъ лежитъ неподвижно бокомъ, на той сторонъ, гдъ сосетъ паразитъ, котораго такое положеніе, повидимому, нисколько не безпокоитъ. Но меня безпокоитъ, и очень, одно обстоятельство.

Гусеница ложится на брюшную сторону, спиной вверхъ; соспины ея свъсилась внизъ паразитная личинка, значительно подросшая и потолстъвшая. Желтовато-бълое тъло ея, гладкое и блестящее, покрыто очень тонкой прозрачной кожицей, сквозькоторую видны бълыя крупинки жироваго тъла, передвигающіяся отъ времени до времени вмъстъ съ потокомъ крови и подъ ними видно содержимое кишечника, сначала янтарно-желтаго цвъта, а потомъ слегка бурѣющее. Тѣло личинки такъ надулось отъ поглощенныхъ соковъ, что, кажется, готово лопнуть, особенно при неосторожномъ прикосновеніи къ ней. Гусеница загибаетъ голову въ бокъ и книзу и старается дотянуться челюстями до середины своего тъла, но челюсти встръчаютъ на пути тъло паразитной личинки. Одна челюсть, правая, касается его своей внъшней стороной и скользить по немъ. Если бы гусеница могла чуть-чуть круче изогнуться, передній край челюсти вонзился бы въ личинку, но то же случится и при дальнъйшемъ ростъ паразита въ толщину, благодаря чему тёло его войдеть въ предёлы досягаемости острыхъ челюстныхъ зубцовъ. Возможность этого и возбуждаетъ во мнъ опасенія. Тъмъ не менъе, еще два дня проходять спокойно и въ теченіе ихъ я наблюдаю, какъ по мъръ утолщенія личинки силы гусеницы все бол ве истощаются и она двлается все мен'те сцособной къ напряженіямъ для изгиба, необходимаго чтобы достать челюстью до тонкой кожицы разжир'тешаго паразита.

12 сентября личинка линяетъ въ 4-й разъ и переходитъ въ 5-ю стадію. Челюсти четвертой шкурки тоже остались въ кожѣ гусеницы, которая теперь почти недвижима, лишь слабо корчится. На другой день нахожу ее лежащей на спинѣ и неподвижной, а паразитъ все еще сосетъ ее, припавъ головкою впереди третьей грудной ножки. Скоро, однако, прекращается сосаніе, паразитъ отдѣляетъ головку и прикладываетъ ее къ разнымъ мѣстамъ груди своей жертвы, но не присасывается. Задній конецъ его тѣла остается на прежнемъ мѣстѣ, а головка перемѣщается, дотягивается до ротовыхъ частей гусеницы и при-




Рис. 30. Взрослая личинка—самка паниска зеленоглазаго (Paniscus cristatus Thoms.). На нижней сторонъ двухъ предпослъднихъ члениковъ тъла видны имагинальные диски яйцеклада. Увелич. въ 8 разъ. Оригин.

жимается къ нимъ. Полураскрытыя челюсти ея неподвижны и потому не страшны теперь для паразита, прикладывающагося къ нимъ своимъ прощальнымъ поцълуемъ. Наконецъ, отдъляется отъ гусеницы и задній конецъ паразита, который окончательно отваливается отъ жертвы (Рис. 30).

Полагая, что ростъ и кормленіе паразитной личинки совершенно закончены и что теперь она будетъ прясть коконъ, перекладываю ее въ узкій стеклянный цилиндрикъ, въ которомъ ей не потребуется расходовать много прядильнаго матеріала на укръпленіе кокона къ стънкамъ помъщенія. На другой день, однако, нахожу личинку на днъ цилиндрика почти неподвижною, а пряденіе кокона еще и не начато. Значитъ—она не докормилась,

поэтому снова прикладываю ее къ покинутой и неподвижной жертвъ, но изъ этого ничего не выходитъ. Паразитъ извивается и падаеть съ гусеницы, но не присасывается. Должно быть, кожа истощенной гусеницы слишкомъ подсохла и загрубъла для тонкаго сосательнаго органа паразитной личинки, а потому я предлагаю ей новую жертву, съ болъе нъжною кожей. У меня есть много коконовъ на вздника эникоспила (Enicospilus ramidulus Grav.), полученныхъ изъ гусеницъ сосновой ночницы (Panolis variegata), и въ нихъ заключаются взрослыя личинки этого наъздника, живыя, приготовляющіяся къ окукливанію. Я вскрываю нъсколько коконовъ, вынимаю изъ нихъ осторожно личинокъ, кладу ихъ на плоское дно стеклянной чашечки и на одну изъ нихъ перекладываю изъ цилиндрика личинку паниска. Эта немедленно охватываетъ кольцомъ новую жертву, вдавившись тупымъ заднимъ концомъ въ одинъ ея бокъ, а головкой съ отверстіемъ рта-въ другой, и сосаніе начинается, о чемъ можно судить по ритмическимъ движеніямъ въ кишечникъ.

Личинка эникоспила, около $1^{1/2}$ см. длин., желтовато-бълая, безногая, способна дълать только слабыя движенія головой, совершенно беззащитная, лежитъ, какъ мѣшокъ, на ³/4 наполненный жидкостью, которую личинка паниска перекачиваетъ теперь въ себя. Сосаніе началось въ 10-мъ часу утра и къ тремъ жертва почти высосана: задняя половина ея, гдѣ находился ротъ сосуна, совствить пуста и сжалась, въ передней же еще есть нъкоторое количество соковъ, но цвътъ кормилицы подозрителенъ, ибо она слегка побуръла, что указываетъ на смерть ея и начавшееся разложение. Личинкъ паниска нужны свъжие, здоровые соки, изъ живаго хозяина, этими же она можетъ отравиться, въ виду чего перекладываю паразита на новую личинку того же эникоспила и сосаніе немедленно возобновляется. Вечеромъ нахожу паразита отвалившимся отъ жертвы, которая въ задней половинъ, куда былъ приложенъ его ротикъ, почти пуста, но въ передней еще есть порядочный запасъ соковъ. Перемъщаю къ ней головку паразита и сосаніе возобновляется.

На другой день, 15 сентября, паразитъ окончательно отвалился отъ своей вполнъ высосанной жертвы и шевелится около нея. Подъ бинокуляромъ вижу, что на нижней губъ личинки паниска открылось отверстіе прядильной железы (рис. 31) и изъ него выступила маленькая капелька густой, прозрачной жидкости. Личинка прикладывается этой капелькой къ стеклу, тотчасъ же отнимаетъ

отъ него головку и опять прикладывается вновь выступившей капелькой въ другомъ мѣстѣ. Въ каждой точкѣ прикосновенія остается часть жидкости и тянется за головкой въ видѣ тонкой безцвѣтной нити—это личинка начала прясть коконъ. Перекладываю ее въ узкій цилиндрикъ и на другой день нахожу ее въ коконѣ, полупрозрачномъ, безцвѣтномъ, но внутри она еще прядетъ. 17 сентября коконъ сдѣлался чернымъ, не прозрачнымъ, онъ состоитъ изъ тонкой, плотной матеріи, довольно легко разрывающейся. 8 октября изъ этого кокона вышелъ самецъ—темноглазый панискъ (*P. ocellaris* Thoms.).




Рис. 31. Голова взрослой личинки паниска зеленоглазаго ($P.\ cristatus$ T h o m s.) снизу: a—боковая продольная хитиновая дуга, отдъляющая верхнюю сторону головы отъ нижней, b—нижнечелюстная дуга, c—нижнечелюстная перемычка, d—нижнегубная дуга, e—отверстіе прядильной железы, f—щупальце нижней челюсти, g—щунальце нижней губы. Увелич. около 125 разъ. Оригин.

Итакъ, все развитіе паниска темноглазаго, отъ момента выхода личинки изъ матери—3 сентября, до вылета самца изъ кокона—8 октября, продолжалось въ лабораторіи 35 дней. Изъ нихъ 12 дней, съ 3 по 15 сентября, ушли на кормленіе и ростъ личинки; въ теченіе этого времени она линяла 4 раза, въ среднемъ, черезъ каждые три дня; 2 или 3 дня пошло на изготовленіе кокона и, наконецъ, около трехъ недъль продолжался періодъ окукливанія и развитія взрослаго насъкомаго въ куколкъ.

Почти въ томъ же порядкъ совершалось развитіе личинокъ. и другого паниска, зеленоглазаго (Paniscus cristatus Thoms.). Яйцо было отложено 30 августа. Черезъ полчаса изъ него показалась головка личинки, которая немедленно вонзила челюсти въ кожу гусеницы, причемъ она лежала, какъ и всегда, поперекъ своей жертвы, направивъ голову къ боковому краю. Гусеница бодрая и очень подвижная, все время быстро ползала по кругу вдоль стъны своего прозрачнаго помъщенія и по временамъ всячески корчилась и переворачивалась. В роятно, всл дствіе безпокойства, причиняемаго такой подвижностью жертвы, кормленіе и развитіе паразита по временамъ пріостанавливалось, такъ какъ пребываніе его въ 1-й стадіи затянулось до 7 сутокъ и только 6 августа вечеромъ личинка, наконецъ, слиняла впервые, послъ чего подвижность гусеницы очень мало уменьшилась. 10 сентября подъ личинкой видны уже двъ шкурки, 12-го гусеница сдълалась малоподвижной и можно было разсмотръть, что подъ нею уже три шкурки и что челюсти 2-й и 3-й шкурокъ не воткнуты въ кожу. Четвертая линька совершилась утромъ 14 сентября, причемъ личинка немного перемъстила свой задній конецъ, но не вынула его окончательно изъ сброшенныхъ шкурокъ. Челюсти последней шкурки остались на этотъ разъ въ кожъ. Головка паразита присосалась на лѣвой сторонѣ снизу гусеницы, позади третьяго груднаго членика.

Въ первомъ часу дня паразитъ отвалился отъ гусеницы и, прикладываемый снова, не присасывается. Даю ему свъжую личинку эникоспила, онъ охватываетъ ее кольцомъ и сосетъ. Въ 4 часа жертва сморщилась и слегка побуръла, паразитъ отвалился отъ нея, даю ему другую личинку и сосаніе возобновляется. Утромъ слъдующаго дня нахожу его лежащимъ рядомъ съ побуръвшею жертвой и предлагаю ему свъжую, но онъ только вдавливается въ нее головою въ разныхъ мъстахъ и не присасывается. Подъ бинокуляромъ обнаруживается, что все ротовое отверстіе паразита закрыто какою-то бурой пластинкой, составившейся, въроятно, изъ соринокъ, прилипавшихъ ко рту при многочисленныхъ перемъщеніяхъ его, то къ стеклу, то къ личинкамъ. Осторожно снимаю эту пластинку иглою, послъ чего сосаніе снова начинается. Вечеромъ полувысосаная жертва замънена новой. На слъдующее утро, 16 сентября, началось пряденіе кокона, для чего паразитъ переложенъ въ цилиндрикъ, въ которомъ къ утру другого дня былъ уже изготовленъ буроваточерный коконъ. Впослѣдствіи изъ этого кокона была вынута ку-колка самки, умершая вслѣдствіе случайности.

Ходъ развитія этой личинки былъ слѣдующій. Въ 1-й стадіи она пробыла 7 дней; слѣдующія три линьки совершались черезъ каждые два дня; послѣ 4-й линьки паразитъ отпалъ отъ гусеницы и велъ свободную жизнь еще два дня, въ теченіе которыхъ высосалъ четырехъ личинокъ эникоспила, послѣ чего, въ теченіе однѣхъ сутокъ, изготовилъ коконъ. Продолжительность всего кормленія и роста личинки опредѣляется въ настоящемъ случаѣ въ 16 дней.

Перейдемъ къ судьбѣ личинокъ, вылупившихся изъ яицъ, не отложенныхъ самками на гусеницъ, а сброшенныхъ ими на полъ и на стѣны того помѣщенія, гдѣ жили самки. Прежде, однако, долженъ замѣтить, что сбрасываніе яицъ наблюдалось у самокъ панисковъ лишь въ тѣ періоды ихъ жизни, когда онѣ лишены были возможности откладывать яйца на гусеницъ, но какъ только возможность эта появилась, онѣ перестали сбрасывать яйца. Тогда онѣ были перемѣщены изъ-подъ стакановъ въ картонно-кисейныя клѣтки, гдѣ имъ жилось лучше, чѣмъ на гладкой поверхности стекла, на которой имъ не за что было ухватиться коготками лапокъ и съ которой поэтому онѣ постоянно срывались и падали.

Счетъ сброшенныхъ яичекъ былъ точно установленъ мною, такъ же какъ и тъхъ, которыя были отложены на гусеницъ. Поэтому я могу попытаться выразить въ числахъ плодовитость самокъ панисковъ, причемъ необходимо имъть въ виду, что эти числа будутъ гораздо ниже дъйствительности, такъ какъ самки умерли у меня преждевременно, раньше, чъмъ истощились ихъ яичники, и такъ какъ онъ, еще будучи на волъ, до плъненія, уже сбрасывали и отклавали яйца, оставшіяся не учтенными. Самка зеленоглазаго паниска сбросила, какъ было раньше сказано, до прибытія въ лабораторію 21 яйцо и въ лабораторіи 26 яицъ, а всего 47 яицъ; она же отложила на гусеницъ 26 яицъ, слъдовательно, всего дала 73 яйца, послъ чего въ яйцеводахъ ея было найдено еще 5 яицъ. Первая самка темноглазаго паниска сбросила всего 49 яицъ (на гусеницъ ей не пришлось откладывать), да изъ яйцеводовъ ея было взято 17 яицъ, итого-66 яицъ; вторая самка этого же вида сбросила по пути въ лабораторію 4 яйца, отложила на гусеницъ 11 яицъ и въ яйцеводахъ ея было найдено 35 яицъ, а всего отъ нея получено 50 яицъ. Въяйцевыхъ трубочкахъ всъхъ трехъ самокъ имълись во время вскрытія яйцевые зачатки разныхъ степеней развитія.

Перехожу къ воспитанію моихъ подкидышей. При попыткахъ воспитывать ихъ на гусеницахъ я встръчаю очень серьезное препятствіе въ сопротивленіи гусеницъ, въ томъ ихъ поведеніи, благодаря которому имъ удается иногда, какъ это уже описано, избавиться даже отъ тъхъличинокъ, которыя выступаютъ изъ яицъ, прочно прикръпленныхъ къ кожъ стебельками. Могу ли я при такомъ условіи разсчитывать на успѣхъ? Едва ли, но попытаться слѣдуетъ. Прежде надо придумать, какъ замѣнить способъ прикрѣпленія яицъ къ гусеницамъ, примъняемый самками, т. е. чъмъ замънить втыканіе стебелька въ кожу. Воткнуть стебелекъ въ кожу гусеницы я не могу, но приклеить его могу, только нужно взять клей, который быстро сохнетъ. Такой клей у меня есть - синдетиконъ. Маленькая капелька этого клея взята на головку булавки, въ другой рукт игла, на смоченномъ кончикъ которой прилипла скорлупа яичка съ выдвинувшейся изъ него личинкой; изъ земли взята передъ тъмъ гусеница и положена на столикъ подъ лупой, гдъ она свернулась кольцомъ и лежитъ неподвижно-«притворяется» мертвой. Булавку съ клеемъ подношу къ углубленію между 1-мъ и 2-мъ члениками туловища, нъсколько выше боковой линіи, и капелька клея остается на кожъ, куда другою рукой тотчасъ же прикладываю стебелекъ яйца. Онъ отлично приклеивается, а пока гусеница будетъ притворяться, клей присохнетъ и личинка присосется. Такъ и вышло: черезъ полминуты или черезъминуту вижу, подъ бинокуляромъ, какъ личинка раскрываетъ челюсти и вонзаетъ ихъ въ кожу гусеницы, которая теперь только почувствовала, что надъ нею творится что-то неладное. Она моментально развернулась и быстро поползла, встряхиваясь по временамъ передней частью тъла. Пробуетъ кататься, но этимъ только укръпляетъ паразита, такъ какъ прижимаетъ глубже стебелекъ и основаніе яичка въ желобокъ съ капелькой клея. Избавиться отъ паразита она не могла: впереди онъ прочно держался челюстями, а сзади прикръплялъ его клей, достаточно подсохшій, пока гусеница притворялась и встряхивалась.

Такимъ образомъ была пристроена I августа одна изъ личинокъ зеленоглазаго паниска, сброшенная во время пути его изъ Тулы въ Петербургъ. Въ теченіе слѣдующихъ дней гусеница все продолжаетъ ползти вокругъ стѣнокъ стакана, въ который она пущена, а паразитъ держится на ней. 5 августа совершается первая линька его, причемъ челюсти первой шкурки остаются въ кожъ гусеницы. Новая личинка вытягивается впередъ и вонзаетъ челюсти въ новомъ мъстъ. Подвижность гусеницы не уменьшилась, тъмъ не менъе я перестаю опасаться за судьбу паразитной личинки, такъ какъ теперь связь ея съ жертвой сдълалась болъе прочной.

Головка личинки 2-й стадіи круглая, безцвътная, полупрозрачная, только челюсти буроватыя. Черезъ два дня, въ теченіе которыхъ гусеница оставалась большею частью спокойной, паразитъ линяетъ второй разъ и переходитъ въ третью стадію. Челюсти второй сброшенной шкурки опять остаются въ кожъ и новая личинка вонзаетъ свои въ новомъ мъстъ. Гусеница при дотрогиваніи къ ней движетъ концами тъла и корчится, но ползти уже не можетъ. Въ 9 ч. утра 9 августа началась 3-я линька паразита, совершавшаяся не совсъмъ правильно. Сначала шкурка сошла почти со всей спины, за исключеніемъ послъдней четверти, но голова освободилась только къ 12 ч. дня и присосалась на новомъ мъстъ, сбоку, на нижней сторонъ гусеницы, челюсти же сброшенной шкурки остались въ кожъ хозяина. Четвертая линька совершилась черезъ два дня, тоже въ 9 ч. утра.

Слинявъ, личинка отвалилась отъ своей жертвы и корчится на стеклъ. Задній конецъ ея слегка расширенъ, кончается отвъсно, какъ бы обрубленъ, на нижней сторонъ имъетъ у задняго края сосковидный мясистый выступъ, которымъ личинка прикрѣпляется, какъ присоской, къ стеклу и, держась на немъ, совершаетъ движение во всъ стороны. До утра слъдующаго дня она не присосалась къ покинутой гусеницъ, тогда даю ей свъжую личинку эникоспила, которую она немедленно охватываетъ полукольцомъ и начинаетъ сосать, причемъ голова ея вдавливается въ жертву, какъ въ перину, и скрывается въ складкахъ ея жирнаго мягкаго тъла. Къ вечеру жертва начала бурѣть и замѣнена новой, которую паразитъ высасываетъ, лежа съ нею рядомъ на стеклъ и приложившись къ ней отверстіемъ рта, и нисколько въ нее не вдавливается. Все тъло его вытянуто прямо, такъ что очень удобно измърить длину, доходящую до 10 мм. На другой день еще перемънена одна личинка эникоспила, высосавъ которую паразитъ отказывается отъ вновь пред-

До сихъ поръ содержимое кишечника паразитной личинки было совершенно чернымъ во всъхъ стадіяхъ, кромъ первой, а

теперь оно сдълалось краснобурымъ. Мясистый выступъ на заднемъ концъ сдълался мало замътнымъ, задній же конецъ сталъ болъе округлымъ, чъмъ плоскимъ. 15 августа личинка начала прясть коконъ и 17 числа вполнъ закоконировалась. Коконъ сначала быль бълымъ, потомъ сдълался сърымъ, но оставался прозрачнымъ, благодаря чему можно было видъть, что 23 августа личинка выпустила изверженія, 25-го слиняла въ 5-й разъ и окуклилась, послѣ чего коконъ принялъ окончательную, совершенно черную окраску (рис. 32). Въ октябръ, во время моего отсутствія, вылетъла изъ этого кокона самка, которая прожила нъсколько дней и скончалась по неизвъстной причинъ раньше моего возвращенія. Длина кокона 14 мм., ширина 5 мм.



Рис. 32. Коконъ паниска темноглавылета взрослаго насъкомаго. Увелич. въ. 4 раза.

Не многихъ личинокъ изъ числа сброшенныхъ удалось мнъ воспитать на гусеницахъ до коконированія. Большинство погибало въ началъ развитія, въ 1-мъ или во 2-мъ возрастахъ, будучи сброшено и раздавлено гусеницами. По нъскольку разъ пристраивалъ иногда одну и ту же ваго (P. ocellaris Thoms.) послъ личинку на разныхъ гусеницъ и очень часто находилъ ее на другой день сброшенной и безпомощно

шевелившейся на стеклъ. Но одинъ разъ удалось, даже безъ помощи клея, очень счастливо пристроить паразита къ притворявшейся гусеницъ, такъ что онъ сразу всадилъ свои челюсти въ тонкую растянувшуюся кожу между головой и перымъ членикомъ туловища. Эта личинка осталась невредимой до конца своего развитія, потомъ отвалилась, закоконировалась и въ октябръ превратилась въ самца. Таковы же были результаты опытовъ воспитанія на гусеницахъ и личинокъ, сброшенныхъ самками темноглазаго паниска-успъхъ въ нъсколькихъ случаяхъ.

Личинка зеленоглазаго паниска.

1-я стадія. Краткое описаніе, данное на стр. 68, можно пополнить указаніемъ слѣдующихъ особенностей. Тѣло личинки состоитъ, какъ сказано, изъ 12 члениковъ (кромъ головы)

если считать по спинной сторонъ, а снизу число ихъ кажется меньшимъ, такъ какъ границы между задними члениками на брюшной сторонъ плохо замътны. Бълое тъло личинки сверху совершенно голое, за исключениемъ задняго конца. Снизу первые шесть члениковъ устяны острыми конусовидными шипиками болъе короткими, чъмъ хвостовые и значительно ръже расположенными. Внутри личинки видны послѣ обработки ѣдкимъ кали два трахейныхъ ствола, идущіе по бокамъ тъла отъ передней пары дыхалецъ къ заднему концу и дающіе, какъ это видно въ нъкоторыхъ членикахъ, по двъ въточки: брюшную и стигмальную, слѣпо оканчивающуюся у поверхности кожи.

На нижней, безцвътной, сторонъ головы идутъ по бокамъ двѣ хитиновыя дуги (рис. 19 а, стр. 70) отъ задняго края головы до ротового отверстія, гд в прикр вплены верхнія челюсти. (Рис. 19 md). Основная часть верхней челюсти имъетъ въ длину 0,046 мм., а идущая параллельно ей, загнутая внутрь, острая вершинная часть-0,057 мм. Границы между нижней губой и нижними челюстями не замътны. По срединъ передней части нижней стороны головы утолщенная свътлобурая хитиновая полоса ограничиваетъ (рис. 19 l) плошадку, у нижняго края которой сидятъ въ рядъ 4 волоска; выше эта хитиновая полоса изгибаясь направляется кверху и сливается съ краями нижнихъ челюстей (рис. 19 та). Последнія безцветны, имеють по два волоска: въ верхнемъ наружномъ углу ниже основанія верхней челюсти и другой ниже центра, въ которомъ замѣтны очень мелкіе бугорки. Ниже верхняго края боковой продольной дуги, ограничивающей нижнюю сторону головы, сидитъ волосокъ, отъ котораго идутъ въ рядъ косо къ серединъ нижняго края еще три волоска. Передній край головы образуеть округлый выступь, прикрывающій верхнюю губу (рис. 19 cl и lbr), на которой распредълены волоски въ такомъ порядкъ: на боковыхъ мясистыхъ верхнихъ углахъ сидитъ пара мелкихъ волосковъ, впереди ихъ 4 болѣе крупныхъ образують косой рядь; у середины надъ ротовымъ отверстіемъ пара очень мелкихъ сближенныхъ волосковъ, надъ ними пара болъе раздвинутыхъ и у верхняго края третья пара волосковъ.

Отъ боковыхъ краевъ верхней губы идутъ по срединъ верхней стороны головы два почти параллельныхъ желобка, округлосходящіеся у задняго края. По этимъ желобкамъ проходять трешины во время линьки, послѣ чего средняя часть головного покрова отдъляется въ видъ продольной пластинки, сохраняющей связь съ головою при посредствъ верхней губы. Наибольшая ширина этой пластинки, не далеко отъ задняго края, 0,09 мм., а меньшая близъ передняго края—0,06 мм. Немного выше середины головы, по объ стороны продольной срединной пластинки, почти у самаго желобка, сидятъ зачаточные усики (antennae), имъющіе въ длину 0,012 мм. каждый. Одиночные короткіе волоски разсъяны на верхней сторонъ головы въ разныхъ мъстахъ. Изъ нихъ у середины продольной средней пластинки, почти у желобка, не далеко отъ зачаточнаго усика сидитъ съ каждой стороны по паръ волосковъ, одинъ за другимъ, и одна пара у передняго края пластинки. Наибольшая величина достигаемая личинкой первой стадіи—2 мм.

2-я стадія. Верхняя сторона головы значительно мен'є окрашена въ бурый цвътъ, но внъшній видъ и распредъленіе волосковъ остаются тѣ же, что у предыдущей. Длина верхней половины верхней челюсти, считая отъ наружнаго края изгиба, 0,068 мм.; длина основной половины-0,057 мм. Четыре волоска нижней губы размѣщены теперь попарно съ объихъ сторонъ, такъ какъ разстояніе между парами больше, чъмъ разстояніе между волосками въ паръ. Надъ рядомъ этихъ волосковъ, замътны зачатки нижнегубныхъ щупалецъ (palpi labiales), состоящіе изъ трехъ очень мелкихъ бугорковъ, расположенныхъ въ рядъ, одинъ подлѣ другого, и надъ ними четвертый бугорокъ. На нижней челюсти подъ волоскомъ, сидящимъ въ наружномъ верхнемъ углу, замътны два болъе мелкихъ волоска и подъ ними еще одинъ, такой же, какъ верхній. Въ этой стадіи дълаются также замътны и челюстныя щупальца (palpi maxillares), имъющія видъ группы очень мелкихъ бугорковъ или сосочковъ, сидящихъ близъ того мѣста, гдѣ былъ срединный волосокъ у 1-й стадіи.

Ръзкое отличіе 2-й стадіи отъ первой, кромъ величины, заключается въ числъ дыхательныхъ отверстій. Во второй стадіи они имъются въ числъ 7 паръ, расположенныя на предтульъ и на 6 первыхъ кольцахъ брюшка. Трахейныя трубки 8-й и 9-й паръ дыхалецъ замътны подъ кожей, но еще не открыты. Длина личинки 3 мм.

3-я стадія. Значительных в изм'єненій въ устройств'є ротовых частей и распред'єленіи волосков не зам'єтно. Челюстное щупальце состоит из четырех мелких бугорков, подъ которыми сидять волоски. Изъ бугорков представляющих волоски. Изъ бугорков представляющих волоски.

собою губное щупальце, нижній бугорокъ крупнѣе прочихъ. Число дыхалецъ увеличивается на одну пару—8-ю, но діаметръ дыхалецъ этой пары втрое меньше діаметра предыдущихъ, а именно: у 7-й пары онъ равняется 0,015 мм., у 8-й же — 0,005 мм. Шипики, покрывающіе нижнюю сторону задняго членика, сидятъ менѣе густо, чѣмъ у предыдущихъ стадій. Длина личинки 5 мм.

4-я стадія. Распредѣленіе волосковъ на нижней челюсти таково: по обѣ стороны группы бугорковъ, соотвѣтствующихъ щупальцу, сидитъ по одному волоску и одинъ ниже этой группы. Длина основной части верхней челюсти—0,113 мм., длина вершиннаго острія отъ мѣста изгиба—0,068 мм. Одиночные волоски попадаются почти на всѣхъ кольцахъ тѣла, но порядокъ ихъ расположенія не удалось замѣтить. Дыхалецъ въ этой стадіи уже полное число, 9 паръ, причемъ размѣры ихъ діаметровъ равняются, считая въ тысячныхъ доляхъ миллиметра: 1-я пара—48, 2-я—38, 7-я—33, 8-я—25 и 9-я—20. Острые конусовидные бугорки, покрывающіе нижнюю сторону личинки, проникаютъ въ этой стадіи на бока и на верхнюю сторону, но здѣсь они притуплены, особенно на переднихъ кольцахъ. Длина личинки 8 мм.

5-я стадія. (Рис. 30, стр. 103). Въ этой стадіи развитія личинка достигаетъ въ длину 11 мм., при наибольшей толщинѣ близъ середины тѣла 5 мм. Кожа прозрачная, густо усѣяна микроскопически-мелкими конусовидными бугорками, которые сообщаютъ ей матовый оттѣнокъ. Цвѣтъ ея сѣровато-бѣлый, а изъ подъ кожи просвѣчиваютъ бѣлыя зернышки жироваго тѣла и черно-бурое содержимое кишечника. Голова полушаровидная, на нижней сторонѣ слегка плоская и мягкая, по бокамъ и сверху слабо хитинизирована. На заднемъ концѣ тѣло какъ бы обрублено, почти плоское, и на нижней сторонѣ у задняго края снабжено мясистымъ выступомъ. Форма тѣла ея почти цилиндрическая, мало суживающаяся къ концамъ.

Дыхалецъ 9 паръ, но въ размѣрахъ ихъ уже нѣтъ такихъ рѣзкихъ колебаній, какія были въ предыдущей стадіи, такъ какъ величина ихъ постепенно уменьшается отъ передней пары къ задней. Выражая размѣры діаметровъ дыхалецъ въ тысячныхъ-доляхъ миллиметра мы получимъ: для 1-й пары—68, 2-й—64, 5-й—61, 7-й—61, 8-й—49 и для 9-й пары 46. Изъ этого видно, что величина дыхалецъ послъдней пары только на 1/3 меньше

первой, между тѣмъ какъ въ предыдущей стадіи діаметръ послѣдней пары былъ болѣе чѣмъ вдвое меньше діаметра первой.

На нижней сторонъ личинки, на каждомъ изъ трехъ грудныхъ члениковъ, хорошо замътна пара круглыхъ площадокъ, выдъляющихся своею гладкою кожей, благодаря тому, что въ этихъ мъстахъ кожа не покрыта микроскопическими конусовидными бугорками. Это-три пары имагинальныхъ дисковъ, въ которыхъ будутъ развиваться три пары ножекъ будущаго на вздника. По бокамъ второго и третьяго члениковъ туловища, на межтульъ и затульт, видны еще двт пары такихъ же площадокъ, каковыя представляютъ собою имагинальные диски будущихъ крыльевъ. Далъе, у нъкоторыхъ личинокъ замътна на нижней сторонъ еще пара такихъ же круглыхъ площадокъ у задняго края предпослъдняго, 11-го, членика тъла и пара суженныхъ поперечныхъ площадокъ у задняго края 10-го членика. Это имагинальные диски двухъ паръ сверлящихъ органовъ, входящихъ въ составъ сверла будущей самки (Рис. 30). По наличности и отсутствію этихъ двухъ паръ площадокъ можно опредълять, не прибъгая къ вскрытію личинокъ, полъ будущихъ на вздниковъ уже въ личинковомъ состояніи, въ послѣдней его стадіи, такъ какъ при наличности ихъ мы имъемъ дъло съ женской личинкой и при отсутствіи — съ мужской 1).

На голов'в личинки видна пара зачаточныхъ усиковъ (апtennae). Каждый изъ нихъ состоитъ изъ широкаго совершенно круглаго бугорка, на вершин'в котораго сидитъ цилиндрическій одночленистый усикъ и рядомъ съ нимъ, съ наружной стороны, прикръпленъ крошечный волосокъ. Между усиками сидитъ пара волосковъ; впереди ея, у передняго края головы, еще пара и внизъ отъ нея идутъ на каждой сторонъ по три волоска; кромъ того, разсъяны одиночные немногочисленные волоски въ разныхъ мъстахъ головнаго покрова. На переднемъ краю верхней губы (Рис. 33) отграничена узкая полоска, на которой видна между серединой и боковымъ краемъ на, объихъ сторонахъ, группа изъ трехъ волосковъ. На основной части губы, сидитъ по бокамъ по двъ пары волосковъ, одна за другой, ближе къ серединъ видна третья пара.

Подъ верхней губою лежатъ верхнія челюсти, которыя по формѣ своей ничего не имѣютъ общаго съ челюстями всѣхъ




Рис. 33. Передній край головы личинки паниска (*P. cristatus* Thoms.) сверху. Черезъ прозрачную верхнюю губу видны верхнія челюсти, гребенчато-зазубренныя на внутреннемъ краю. Увел. въ 120 разъ. Ориг.

предыдущихъ стадій. Каждая челюсть (Рис. 34) состоитъ изъ широкой основной части и узкой острой верхней половины, которая лишь слегка сгибается внутрь у вершины, по наружной же сторонъ представляетъ прямое продолженіе основной части. Самая замъчательная особенность этой челюсти заключается въ томъ, что внутренняя сторона ея узкой острой части густо усъяна длинными зубцами, дълающими ее похожей на гребень или щетку, которая немного не доходитъ до острой вершины, гдъ челюсть остается гладкой. Длина челюсти отъ вершины до нижняго наружнаго угла основной части—0,19 мм., ширина основной части—0,11 мм., длина узкой верхней половины—0,09 мм. и длина гладкаго не зазубреннаго кончика—0,02 мм.

Нижняя сторона головы (Рис. 31, стр. 105) болъе мягкая, отграничивается отъ верхней, какъ было сказано, двумя боковыми продольными хитиновыми дугами, идущими отъ основанія верхней челюсти къ заднему краю головы. По срединъ нижней стороны, на верхней ея половинъ, видна нижнегубная

¹⁾ Вълитературѣ уже имѣются указанія на существованіе внѣшнихъ половыхъ отличій у личинокъ тѣхъ насѣкомыхъ, которыя проходять полное превращеніе. П. М а р ш а л ь (28, 48) указаль что у осы (Vespa) личинки самцовъ съ самого молодого возраста отличаются раздвоеннымъ (geminée) пятномъ на спинѣ, соотвѣтствующимъ положенію зачаточнаго сѣменника, который можно видѣть черезъ прозрачную кожу. Потомъ В е р с о н ъ, (54, 496) замѣтилъ, что у взрослыхъ женскихъ гусеницъ тутоваго шелкопряда на нижней сторонѣ 11-го и 12-го сегментовъ лежатъ симметрично по обѣ стороны срединной линіи по парѣ круглыхъ дисковъ, изъ которыхъ впослѣдствіи развиваются: vagina, bursa и гесерtасиlum—изъ переднихъ, а изъ заднихъ—смазочная железа. (Справку относительно Версона привожу по Бахметьеву—4, 123).

хитиновая дуга, ограничивающая нижнюю губу снизу, по бокамъ же она загибается угломъ и конусовидно подымается вверхъ, ограничивая нижнюю губу съ боковъ, но верхній край нижней губы остается мясистымъ, перепончатымъ. Немного отступя отъ верхняго края лежитъ круглое отверстіе прядильной железы; ниже его съ объихъ сторонъ укръплено щупальце, состоящее изъ одного крупнаго бугорка и другого меньшаго, лежащаго ниже, а между ними, на внутренней сторонъ, сидитъ волосокъ. Между щупальцами, немного ниже ихъ, видна пара волосковъ и другая пара ближе къ нижнимъ угламъ нижней губы. По объ стороны нижней губы помъщаются мягкія, мясистыя нижнія челюсти, имъющія на серединъ такое же щупальце, какъ на нижней губъ, и по объ стороны его сидитъ




Рис. 34. Верхняя челюсть взрослой личинки паниска (*P. ocellaris* Thoms.). Увелич. около 250 разъ. Оригин.

по одному волоску. Нижняя челюсть ограничивается снизу нижнечелюстною хитиновой дугой, которая идеть оть нижняго угла нижней губы къ боковой продольной дугъ, но не дойдя до нея исчезаетъ; сбоку нижнюю челюсть ограничиваетъ хитиновая перемычка, идущая отъ верхнечелюстной дуги къ ниж-

нечелюстной. Близъ конца нижнечелюстной дуги сидитъ волосокъ, а выше, въ углу, образуемомъ перемычкою и боковой продольною дугою, сидитъ другой такой же. На нижней половинъ нижней стороны головы помъщаются на объихъ сторонахъ волоски въ слъдующемъ порядкъ: подъ нижнечелюстной дугою два волоска, подъ ними—три волоска въ рядъ и подъ этими еще пара волосковъ.

Искусственное разведение паразитовъ.

Отдаленную цѣль моихъ опытовъ воспитанія паразитныхъ личинокъ составляетъ размноженіе паразитовъ въ искусственныхъ условіяхъ, въ лабораторіи. Изложенные опыты, какъ можно видѣть, приближаютъ насъ къ этой цѣли, такъ какъ паниски, поселенные въ лабораторіи, жили прекрасно, кормились и раз-

множались, причемъ не только клали яйца на своихъ обычныхъ жертвъ — на гусеницъ, но, при неимѣніи таковыхъ, сбрасывали яички съ живыми личинками, способными къ дальнѣйшему развитію. Опыты воспитанія какъ тѣхъ, такъ и другихъ, увѣнчались успѣхомъ, если не во всѣхъ случаяхъ, то во многихъ. Но во всѣхъ случаяхъ я и права не имѣлъ разсчитывать на успѣхъ, такъ какъ самые пріемы воспитанія никѣмъ еще не были выработаны и даже указаны, ибо опытовъ такого рода никто, сколько я знаю, не производилъ. Необходимо сначала выработать эти пріемы, для чего надо искать ихъ и пробовать, не смущаясь повтореніемъ неудачъ. Необходимо еще установить самую технику работы, чтобы совершать ее впослѣдствіи съ наименьшей затратой времени и матеріаловъ.

Въ данномъ направленіи передъ лабораторіей открывается новое поле для изслѣдованій, совершенно свободное отъ проторенныхъ путей; поле, по которому предстоитъ еще блуждать, но на которомъ сдъланные опыты уже намъчаютъ первыя тропинки къ искомой цъли. Напомню рядъ неудачъ съ наблюденіемъ надъ кладкой яицъ первою самкой темноглазаго паниска, которая такъ и скончалась въ лабораторіи, не отложивъ ни одного яйца на гусеницъ. Послъ безплодной въ этомъ отношении смерти ея пріемъ наблюденій былъ измѣненъ и тогда вновь прибывшая самка открыла тайну, которую, какъ я опасался, унесла съ собой въ могилу первая. Укажу на сброшенныхъ личинокъ и яички на вздниковъ — гдв и у какого автора можно найти указаніе на нихъ и на возможность ихъ воспитанія? Нигдъ и ни у кого? Здъсь все ново и въ каждомъ направленіи можно впасть въ заблужденіе, но можно выйти и на вѣрный путь. А гдѣ онъ? Только опыть и разсужденія могуть вывести на него.

Воспитанныхъ въ лабораторіи паразитовъ можно послать туда, гдѣ ихъ нѣтъ или гдѣ ихъ мало, и гдѣ они встрѣтятъ въ естественныхъ условіяхъ своихъ природныхъ и обычныхъ жертвъ, т. е. тѣхъ или другихъ изъ вредныхъ для нашего хозяйства насѣкомыхъ, размноженіе которыхъ они будутъ сдерживать и предупреждать. Идея борьбы съ вредными насѣкомыми при помощи ихъ естественныхъ враговъ, въ данномъ случаѣ при помощи паразитовъ, чрезвычайно заманчива, но самая идея эта, при обдумываніи ея, кажется заключающей какъ будто бы явное противорѣчіе самой же себѣ. Въ самомъ дѣлѣ, въ состояніи ли мы, говоритъ Фабръ, населить по нашему желанію поля и сады паразитомъ

озимаго червя? Рѣшительно нѣтъ, отвѣчаетъ онъ же, потому что первое условіе, необходимое для размноженія этого паразита—размноженіе озимыхъ червей, единственной пищи его личинокъ. Дѣйствительно, если мы вспомнимъ, что задача каждаго средства борьбы съ вреднымъ насѣкомымъ — предупредить его размноженіе, то конечно назовемъ негоднымъ то средство, примѣненіе котораго обусловлено необходимостью предварительнаго размноженія того же вреднаго насѣкомаго, которое предназначено къ уничтоженію.

Съ такимъ выводомъ, однако, я никакъ не могу согласиться потому, прежде всего, что въ основъ его лежитъ невърная посылка: будто бы единственною пищей паразитной личинки можетъ быть только одна жертва, только одинъ видъ насъкомагототъ, который обычно выбирается для нея матерью. Прежніе мои опыты (которые будутъ изложены въ слѣдующихъ главахъ) воспитанія паразитовъ, къ числу которыхъ принадлежатъ паниски, показали, что личинки ихъ довольно неразборчивы относительно пищи, которую предлагаютъ имъ въ искусственныхъ условіяхъ, и выкармливаются успъшно на счетъ такихъ хозяевъ, съ которыми въ природныхъ условіяхъ имъ никогда не приходится встръчаться. Разсказанные выше опыты успъшнаго воспитанія личинокъ панисковъ на личинкахъ эникоспилавполнъ подтверждаютъ только что сказанное, но для практики не льзя остановить выборъ на личинкахъ эникоспила, такъ какъ ихъ трудно добывать. Присутствіе ихъ въ лабораторіи—явленіе случайное, какъ и присутствіе гусеницъ озимой ночницы. Поэтому главной цълью моихъ опытовъ вовсе не было воспитаніе панисковъ на гусеницахъ, которыя являются ихъ обычною жертвой въ природныхъ условіяхъ, а напротивъ — пріисканіе для нихъ иного кормильца, легче добываемаго, котораго всегда можно имъть подъ руками въ необходимомъ количествъ.

Изъ числа такого рода хозяевъ укажу наприм. на куколокъ мясныхъ и падальныхъ мухъ, которыхъ вездѣ можно имѣть въ любое время и въ любомъ количествѣ. Стоитъ выставить лѣтомъ за окно куски гніющаго мяса и къ нимъ тотчасъ же прилетятъ эти мухи и отложатъ на мясо яички, послѣ чего можно внести эти куски въ лабораторію и воспитывать въ ней личинокъ мухъ, а когда послѣднія начнутъ коконироваться ихъ можно перемѣщать на холодъ и хранить тамъ до употребленія въ дѣло.

Коконъ мухи *) очень легко вскрыть иглою и добыть изъ него ея бѣлую куколку, къ которой охотно присасываются личинки весьма разнообразныхъ наружныхъ паразитовъ и совершаютъ на ней все свое развитіе. Съ куколками собственно мясныхъ и падальныхъ мухъ я не имѣлъ дѣла, но не мало воспиталъ наружныхъ паразитовъ на куколкахъ паразитныхъ мухъ: тахинъ и саркофагъ, которыя имѣлись у меня часто въ достаточномъ количествѣ. Нѣтъ основанія думать, что куколки мясныхъ мухъ будутъ менѣе пригодны для данной цѣли, чѣмъ куколки паразитныхъ.

Во время работъ съ панисками тоже имълись у меня коконы паразитныхъ мухъ, но въ очень маломъ количествъ. Въ одномъ изъ уголковъ комнатнаго ледника я нашелъ баночку, въ которой сохранялся десятокъ крупныхъ коконовъ паразитной мухи (Echinomyia), полученныхъ въ началъ іюня изъ гусеницъ сосноваго шелкопряда, о существованіи которыхъ я было забылъ. При вскрытіи этихъ коконовъ оказалось, что въ нихъ заключались, къ сожальнію, во вськъ, кромь двухъ, мертвыя и сухія или сильно подсохшія куколки. Только изъ двухъ коконовъ я добылъ свѣжихъ сочныхъ куколокъ: одну бълую и другую вполнъ окрашенную, готовую превратиться въ муху. Объ куколки положены были на дно плоской стеклянной чашечки и къ каждой приложенъ ротикъ выдвинувшейся изъ сброшеннаго яичка личинки зеленоглазаго паниска. Личинки немедленно раскрыли челюсти и вонзили ихъ въ кожу своихъ, новыхъ для ихъ рода, жертвъ, послѣ чего началось сосаніе спокойное и ничъмъ не прерываемое, такъ какъ жертвы эти были вполнъ неподвижны. Это произошло 5 августа, а на другой день утромъ та личинка, которая сосала на окрашенной куколкъ, была найдена отпавшей отъ нея и прикладываемая вновь не могла присосаться. Должно быть, у этой куколки покровы на столько затвердъли и подсохли, что паразитная личинка не могла вонзить въ нихъ свои челюсти достаточно глубоко и прочно. Другая личинка на видъ благоденствовала, подросла и непрерывно сосала, что хорошо было видно подъ бинокуляромъ по ритмическимъ сокращеніямъ въ кишечникъ. Къ вечеру, однако, и этой начала грозить бъда, такъ какъ жертва ея побуръла на нижней сторонъ потому, въроятно, что я какъ нибудь неосто-

^{*)} Коконы мухъ, принимая во вниманіе способъ ихъ происхожденія, называють ложными коконами, но для краткости я буду называть ихъ просто коконами.

рожно повредилъ куколку при выниманіи изъ кокона. Побур'ьніе жертвы—признакъ ея смерти и начавшагося разложенія, а потому, чтобы не отравилась кормящаяся, пришлось снять ее и переложить на другого хозяина.

Я перемъстилъ ее на гусеницу, которая стянулась для окукливанія и уже потеряла способность ползать, но не потеряла способности кататься, перевертываясь со спины на брюхо и обратно. Паразитная личинка прицъпилась къ новой жертвъ и, повидимому, собиралась серьезно приняться за нее, но та сопротивлялась катаніемъ и по временамъ сбрасывала паразита. Такъ дъло шло до 12 августа, когда я ръшилъ снова перемъстить эту личинку на взятую изъ кокона личинку эникоспила, къ которой она немедленно присосалась. Здъсь такъ же, какъ на куколкъ мухи, она не встрътила никакого сопротивленія и высасываніе третьяго новаго хозяина ничъмъ не прерывалось въ теченіе пяти дней. Только 17 августа послъдовалъ первый перерывъ, во время первой линьки. Безпокойство, доставленное сопротивленіемъ одного хозяина, и новизна двухъ другихъ затянули пребываніе этой личинки въ первой стадіи до 12 дней, съ 5 по 17 августа.

Вторая линька совершилась 22 августа и во время нея я подмънилъ полувысосанную и подсохшую жертву новою свѣжей личинкой эникоспила. 25 августа состоялась третья линька паразита, во время которой онъ отпалъ отъ полувысосанной жертвы. Тогда я попробовалъ пристроить эту личинку опять на гусеницу озимой ночницы, на ту, на которой уже выкормилась одна личинка паниска и которая уже потеряла подвижность, но еще сохраняла признаки жизни. Паразитъ отлично присосался къ этой жертвъ и 28 августа утромъ слинялъ на ней 4-й разъ, а вечеромъ отпалъ отъ нея и вновь прикладываемый не присасывался. Теперь я снова даю этой личинкъ паниска личинку эникоспила и первая тотчасъ же начинаетъ сосать; въ теченіе двухъ слѣдующихъ дней высосанная личинка перемѣнялась дважды и 31 августа паразитъ началъ прясть коконъ, который 2 сентября былъ совершенно законченъ. 22 сентября вылетъла изъ этого кокона самка зеленоглазаго паниска.

Итакъ, въ описанномъ случаъ личинка паниска зеленоглазаго прошла первыя три стадіи развитія, питаясь личинками эникоспила, но въ началъ первой стадіи она успъшно высасывала сначала куколку мухи, а потомъ провела нъсколько неудачныхъ дней на гусеницъ; въ 4-й стадіи и въ началъ 5-й кормленіе ея

совершалось на счетъ гусеницы, закончилось же опять на личинкахъ эникоспила. Изъ этого ясно можно видъть, что личинка зеленотлазаго паниска довольно легко переноситъ перемѣны въ источникахъ питанія. Обычная ея жертва—растительноядная гусеница, накопившая въ себѣ питательный матеріалъ изъ растительной пищи, легко замѣщается плотоядною жертвой—личинкой паразитнаго эникоспила, соки котораго совершенно иного происхожденія, такъ какъ заимствованы изъ другого животнаго организма. Однако, я далекъ отъ того, чтобы сдѣлать общій выводъ, что личинки панисковъ совершенно одинаково способны развиваться на всякой куколкѣ или гусеницѣ, лишь бы только послѣднія не представляли имъ механическихъ препятствій, т. е. не сбрасывали ихъ и имѣли достаточно тонкую кожу, доступную челюстямъ и сосальцу паразитовъ. Основаніемъ воздержанія отъ такого общаго вывода служатъ слѣдующія наблюденія.

Въ поискахъ такого хозяина для личинки панисковъ, какого можно имъть всегда подъ рукою въ достаточномъ количествъ, я испыталъ между прочимъ гусеницъ галлеріи, т. е. вощинной моли (Galleria mellonella L.) и ея спутницы ахрэи (Achroea grisella F.). Первыя гусеницы живутъ обыкновенно въ ульяхъ пчелъ, гдъ питаются воскомъ, а вторыя, живущія тамъ же, пи таются изверженіями первыхъ. Тѣхъ и другихъ легко разводить въ лабораторіи въ банкахъ, кормя желтымъ неочищеннымъ воскомъ. Такой заводъ давно существуетъ у С. И. Метальникова, который со свойственной ему любезностью предоставиль мнъ названныхъ гусеницъ въ необходимомъ количествъ. Мои опыты съ ними не увънчались успъхомъ. Личинки панисковъ присасывались охотно къ гусеницамъ объихъ молей и сосаніе въ началъ шло успъшно, но только въ началъ. Гусеницы галлеріи обладаютъ способностью прясть паутину и этимъ спасаются отъ пристраиваемыхъ мною паразитовъ. Протянетъ гусеница 3-4 паутинки и, проползая подъ ними, освобождается отъ паразита, который остается висъть на зацъпившей его паутинной нити. Я старался брать гусеницъ изъ коконовъ, такихъ, которыя приготовилиськъ окукливанію, въ разсчетъ, что запасъ прядильнаго вещества въ ихъ железахъ уже исчерпанъ и онъ не въ состояніи будутъ прясть новую паутину, но всегда добытая гусеница оказывалась въ состояніи провести нъсколько нитей и какъ бы нарочно ползала среди нихъ до тъхъ поръ, пока оставляла на нихъ паразита. Ни одинъ опыть не удался. Гусеницъ ахрэи удавалось добыть такихъ, которыя перестали прясть и приложенныя къ нимъ личинки панисковъ сразу присасывались и могли кормиться здѣсь безпрепятственно, что онѣ и дѣлали, но изъ этого также ничего не вышло. Ни одна личинка на гусеницахъ ахрэи не перешла во вторую стадію. Каждая, примѣрно черезъ недѣлю, насосавшись и увеличившись въ ростѣ, умирала и бурѣла, не будучи въ силахъ слинять.

Необходимо замътить, что и на тъхъ личинкахъ панисковъ, которыя высасывали личинокъ эникоспила наблюдалось нъсколько разъ почти то же явленіе, чаще у личинокъ зеленоглазаго паниска. Иногда личинка паниска оставалась болье то дней въ первой стадіи, выростала до 2 мм. въ длину, раздувалась какъ пузырь, но не линяла, и при дотрогиваніи легко отпадала отъ жертвы, послъ чего я переносиль ее обыкновенно на гусеницу, гдъ она опять присасывалась и скоро линяла. Другія личинки того же паниска успъшно росли и развивались на личинкахъ эникоспила, особенно личинки темноглазаго паниска.

Непредвидънный конецъ.

Приближалась середина сентября, а съ нею приближалось и время моего отъъзда. Живыхъ самокъ панисковъ уже не было и со смертью ихъ прекратился источникъ появленія новыхъ яичекъ и личинокъ. Оставалось только докормить тъхъ, которыя были получены раньше. Изъ нихъ особый интересъ представляли личинки, полученныя путемъ своего рода цезарскаго съченія, т. е. вынутыя изъ умершей самки темноглазаго паниска. Всъ эти недоноски были пристроены мною на личинокъ эникоспила. Данныя имъ кормилицы, повидимому, вполнъ удовлетворяли ихъ, ибо многія уже слиняли и перешли во вторую стадію, а нѣкоторыя въ третью. Я былъ увѣренъ, что дѣло налажено. Необходимо было только по временамъ мѣнять высасываемыхъ личинокъ, т. е. пересаживать питомцевъ на свъжихъ кормилицъ, только-что взятыхъ изъ коконовъ. Пересаживаніе необходимо было производить во время линьки питомца, когда онъ отдълялъ свои новыя челюсти отъ тъла жертвы и искалъ новаго мъста для присасыванія. Остававшіяся въ кожъ прежнія челюсти, не представлявшія интереса, могли быть и сломаны при пересадкъ.

Необходимость пересаживанія личинокъ на новыхъ кормилицъ

обусловливалась тѣмъ, что высасываемая личинка иногда умирала и начинала бурѣть, что происходило отъ недостаточно осторожнаго выниманія ея изъ кокона, но иногда побурѣніе начиналось отъ мѣста сосанія и тогда виновникомъ его являлся паразитъ; кромѣ того, для достиженія полнаго роста паразиту необходимо было высосать нѣсколькихъ кормилецъ, такъ какъ размѣры каждой изъ нихъ были значительно меньше размѣровъ его обычнаго хозяина—гусеницы ночницы. Если я отдѣлялъ паразита отъ его жертвы во время сосанія, когда челюсти его были погружены въ ея кожу, то обыкновенно съ челюстями отдѣлялся кусочекъ послѣдней и мѣшалъ паразиту присосаться на новомъ мѣстѣ. Приходилось тогда класть личинку на стекло подъ бинокуляромъ и вынимать этотъ кусочекъ кожи иглами и тогда присасываніе къ новой кормилицѣ совершалось безпрепятственно.

Исполнение этой работы, т. е. перемъны кормилицъ, а также уходъ за окрыленными панисками, которые могутъ вылетъть изъ полученныхъ уже коконовъ, надо было поручить кому нибудь на время моего отъ взда. На помощь моего тогдашняго сотрудника по лабораторіи, В. И. Плотникова, на этотъ разъ я не могъ разсчитывать, такъ какъ онъ находился тоже въ отъъздъ и долженъ былъ возвратиться не скоро. Меня отрывали отъ лабораторныхъ занятій сосновый шелкопрядъ и монашенка, противъ которыхъ вели борьбу льтомъ 1910 года въ нъсколькихъ губерніяхъ, а В. И. Плотникова удерживала въ лъсахъ Курляндской губ. сосновая пяденица. Въ виду продолжительности предстоявшей поъздки, которая могла затянуться, самое меньшее, на мѣсяцъ, я не рѣшался выставить моихъ питомцевъ на холодъ, какъ дълалъ это при кратковременныхъ отлучкахъ, а потому пригласилъ особаго юнаго наблюдателя, которому поручилъ посъщать ежедневно лабораторію и исполнять въ ней вышеуказанныя работы по уходу за питомцами. Нъсколько дней до моего отъъзда онъ приходилъ и практиковался при мнъ, такъ что я уъхалъ, будучи спокоенъ за участь оставленныхъ паразитовъ.

По возвращеніи въ концѣ октября, увы! я не нашелъ ниодного живого паниска и ни одной живой личинки. Все погибло. Въ лежавшемъ на столѣ дневникѣ, который велся наблюдателемъ акуратно, я прочелъ такія записи: «въ челюстяхъ личинки остался кусочекъ кожи, который никакъ нельзя отдѣлить»; «личинка 4-й стадіи сморщилась, потемнѣла и положена въ спиртъ»; «самка погибла отъ неизвъстной причины» и т. д. Это все объясняло. Очевидно, что наблюдатель слишкомъ мало практиковался при мнъ и что надо было пригласить его для этого раньше, а теперь выходило, что въ неудачъ никого, кромъ себяя и не могъ винить. Но зачъмъ искать виновнаго? Въдь отъ нахожденія его обстоятельства нисколько не измънятся. Во всякомъ случаъ, надежда на возможность дальнъйшаго разведенія панисковъ въ лабораторіи, которая такъ ярко запылала, теперь совсъмъ угасла, покрайней мъръ, на ближайшее время.

Не будемъ, однако, приходить отъ этого въ уныніе. Зима, пройдетъ, лѣто снова возвратится, появятся въ лѣсахъ и на поляхъ новыя гусеницы и новые паниски, и тогда, быть можетъ, кто нибудь изъ моихъ энтомологическихъ друзей снова соберетъ ихъ и пришлетъ въ лабораторію. Ничто, надо надъяться, не помѣщаетъ тогда возобновить лабораторную культуру панисковъ, такъ катастрофически прерванную на этотъ разъ. А возможенъ и еще лучшій оборотъ дѣла: быть можеть, изъ прочитавшихъ эту работу найдутся охотники, которые пожелаютъ-тамъ, на мъстахъ, повторить и продолжить начатые въ лабораторіи опыты разведенія панисковъ. Ничего особенно труднаго, какъ видно изъ всего, что выше изложено, въ этихъ опытахъ нътъ, а заманчивость предпріятія внѣ сомнѣнія. Въ такомъ случаѣ я охотно предлагаю помощь своего опыта и совъта, если въ нихъ еще окажется надобность послъ прочтенія всего, что мною здъсь изложено.

Литературныя данныя.

Приступимъ къ подведенію итоговъ нашихъ наблюденій и сравнимъ ихъ съ тѣмъ, что было опубликовано по этой части другими наблюдателями. Это особенно важно потому, что всѣ наши наблюденія были сдѣланы при искусственныхъ условіяхъ, въ комнатѣ. О панискахъ накопилось въ литературѣ довольно много показаній весьма большого числа наблюдателей, но разобраться въ нихъ сразу нельзя по той причинѣ, что многіе смѣшивали панисковъ съ офіонами и, сообщая свои наблюденія, называли послѣднихъ, хотя въ дѣйствительности имѣли дѣло съ панисками. Такъ поступилъ и Дегееръ, о наблюденіяхъ котораго я уже говорилъ раньше. Ошибка Дегеера была указана

и разъяснена Гартигомъ (22,153) и Рацебургомъ (40,9) при выясненіи ими вопроса о томъ, кто изънаѣздниковъ откладываетъ стебельчатыя яички съ двустворчатой скорлупкой. Тогда же установлено было названными учеными, что такія яички прикрѣпляютъ къ гусеницамъ паниски и, кромѣ нихъ, подобныя же яички откладываютъ на личинокъ пилильщиковъ (Tenthredinidae) наѣздники изъ отдѣла трифоновъ (Tryphonini). Къ указанной литературной путаницѣ мы еще вернемся, когда будемъ говорить объ офіонахъ, а теперь только добавлю къ сказанному, что положенія Гартига и Рацебурга вполнѣ подтверждаются моими изслѣдованіями надъ панисками, а также полученіемъ яицъ и личинокъ і-й стадіи офіона и эникоспила, описанія которыхъ будутъ даны въ своемъ мѣстѣ. Пока я возьму изъ литературныхъ данныхъ только тѣ, которыя относятся къ настоящимъ панискамъ.

Всѣ наблюдатели согласно свидѣтельствуютъ, что паниски представляютъ собой наружныхъ паразитовъ гусеницъ бабочекъ разныхъ семействъ, преимущественно ночницъ (Noctuidae), а изъ другихъ семействъ чаще всего называютъ гусеницъ вилохвоста (Dicranura vinula—сем. Notodontidae) и пяденицъ (Geometridae). Указаны въ числѣ жертвъ панисковъ также нѣкоторые шелкопряды; наконецъ, есть нѣсколько указаній на паразитизмъ ихъ на лжегусеницахъ, т. е. на личинкахъ пилильщиковъ (Tenthredinidae), изъ отряда пленчатокрылыхъ. Точный списокъ извѣстныхъ хозяевъ панисковъ можетъ быть составленъ по вышеуказанной причинѣ лишь послѣ критическаго разсмотрѣнія всѣхъ относящихся сюда литературныхъ указаній, каковая работа должна быть сдѣлана особо, впослѣдствіи, по причинѣ ея немалыхъ размѣровъ, а теперь ограничимся приведенными общими указаніями.

Процессъ кладки яйца на гусеницу съ тъми подробностями, какъ описано въ настоящей работъ, еще никому изъ наблюдателей не удавалось прослъдить. Единственный, кто далъ описаніе кладки, докторъ Мартелли (33, 254), не видълъ однако выхода яйца и прохожденія его по наружной сторонъ яйцеклада. Изъ описанія его явствуетъ, что онъ видълъ, какъ рыжій панискъ (Paniscus testaceus Grav.) нападаль на гусеницу вилохвоста и какъ она безуспъшно защищалась отъ него ръзкими движеніями тъла и выставленіемъ своего хвостового развилка, а затъмъ онъ замътилъ уже отложенныя на гусеницу яйца. Онъ видълъ, слъдовательно, только то, что мнъ удалось замътить

въ первый вечеръ моихъ наблюденій надъкладкой. У англичанина Стентона (52,210) самки паниска (Paniscus virgatus Fourc.) жили въ неволъ и откладывали яйца на гусеницъ пяденицъ (Cheimatobia boreata, Ch. brumata, Hybernia defoliaria u Oporabia dilutata), но процесса кладки и онъ не описываетъ. Отсутствіе въ литературъ наблюденій этого рода др. Адлеръ (1,265) объясняетъ тъмъ, что паниски, какъ ночныя животныя, кладутъ яйца ночью, когда наблюдать не возможно. Мы видъли, однако, что панискъ зеленоглазый одинаково охотно клалъ яйца, какъ днемъ, такъ и ночью, и та кладка рыжаго паниска, которую наблюдалъ др. Мартелли, совершалась, повидимому, тоже днемъ. Вмъстъ съ тъмъ, принимая во вниманіе, что панискъ темноглазый клалъ у насъ только по ночамъ, мы должны раздълить виды панисковъ въ данномъ отношении на двъ группы: одни могутъ класть только по ночамъ, а другіе-и днемъ и ночью. Иначе: по ночамъ всѣ виды способны класть, а днемъ нѣкоторые.

Нападаютъ паниски для откладыванія яицъ преимущественно на взрослыхъ гусеницъ. Съ этимъ согласно больщинство наблюдателей, но указаны и исключенія. Др. Адлеръ имѣлъ молодую гусеницу ночницы (Acronycta tridens) съ яйцомъ паниска и видълъ, что при линькъ это яйцо было сброшено гусеницей вмѣстѣ со шкуркой, послѣ чего паразитная личинка, вышедшая изъ яйца, должна была, конечно, погибнуть. Стентонъ также сообщаетъ, что одна изъ бывшихъ у него гусеницъ (O. dilutata), на которую было отложено яйцо, слиняла и благополучно окуклилась, сбросивъ яйцо со своей шкуркой. Я давалъ своимъ панискамъ для кладки только взрослыхъ гусеницъ, сначала потому, что откладываемыя яички были для меня слишкомъ драгоцънны и я опасался подвергнуть ихъ той опасности, какая указана Адлеромъ и Стентономъ, а потомъ молодыхъ гусеницъ у меня уже не было, были только взрослыя. По этой причинъ я не имълъ возможности убъдиться на опытъ въ томъ, что отложенное яичко можетъ быть сброшено вмѣстѣ съ шкуркой гусеницы при ея линькѣ. Мнѣ казалось, что это невозможно, такъ какъ, разсматривая на сръзанныхъ съ гусеницы кусочкахъ кожи положение стебелька отложенаго панискомъ яйца, я находилъ всегда, что стебелекъ лежалъ не поверхностно подъ хитиномъ шкурки, не на хитинородномъ слоъ (гиподермѣ), а проникалъ черезъ него въ мускульный слой, почему и не могъ бы отдълиться отъ тъла гусеницы, какъ хитинъ сбрасываемой

шкурки. По моему мнънію, нахожденіе стебелька въ кожъ гусеницы даже должно было лишить ее возможности линять, однако, приведенныя наблюденія Адлера и Стентона говорять противъ такого мнънія. Одно наблюденіе, сообщаемое проф. Па ультономъ (39, 303 и 304), указываетъ на возможность еще иного оборота дълъ. Сбрасываемая при линькъ шкурка можетъ разорваться въ тъхъ мъстахъ, гдъ укръплены стебельки яичекъ, и около нихъ по окончаніи линьки остаются въ такомъ случа в клочки сброшенной шкурки. Такъ совершилась линька, по объясненію Паультона, одной полученной имъ гусеницы вилохвоста (Dicranura vinula), на которой прикръплено было 5 яичекъ паниска (Р. cephalotes), окруженныхъ обрывками сброшенной шкурки, но на ней же видны были около яицъ мелкіе шрамы, которые могли, по мнѣнію названнаго ученаго, остаться на мѣстѣ прикрѣпленія другихъ, сброшенныхъ при линькѣ, яичекъ. Такимъ образомъ, разсматриваемый вопросъ въ виду изложенныхъ наблюденій и высказанныхъ соображеній нуждается въ новыхъ болѣе точныхъ изслъдованіяхъ.

Помѣщеніе откладываемыхъ яицъ всегда на передней части тѣла гусеницы, между кольцами туловища и передними брюшными, подтверждается также всѣми наблюдателями, и тотъ же др. А длеръ объяснилъ это тѣмъ, что при такомъ положеніи яицъ гусеница не имѣетъ возможности сорвать и раздавить ихъ, такъ какъ не можетъ достать до нихъ своими челюстями, что легко было бы ей сдѣлать при помѣщеніи яицъ на задней половинѣ тѣла. Стентонъ, давая то же объясненіе, прибавляетъ, что срываніе яйца, слишкомъ близко положеннаго къ заднему концу тѣла, иногда случается. Наши наблюденія вполнѣ подтвердили правильность этихъ объясненій.

Число яицъ, отложенныхъ на одну гусеницу, при наблюденіяхъ въ естественныхъ условіяхъ значительно превышаєтъ найденное въ лабораторіи. По свидѣтельству Бришке (9, 221), нерѣдко ихъ можно насчитывать по нѣскольку дюжинъ на одной гусеницѣ вилохвоста, какъ на молодой, такъ и на взрослой. Др. Мартелли насчиталъ на одной гусеницѣ того же вида 33 яйца рыжаго паниска (P. testaceus Gr.), изъ которыхъ, однако, развилось до окрыленнаго состоянія только 7, личинки же, вылупившіяся изъ прочихъ яицъ, погибли. Англійскій наблюдатель Стентонъ держалъ самку паниска (P. virgatus Fourer.) нѣсколько дней въ одной коробочкѣ съ гусеницей пяденицы (Ch. boreata)

и самка отложила на нее 9 яицъ, но обыкновенно, по свидътельству названнаго наблюдателя, она кладетъ на эту мелкую гусеницу одно яйцо. Профессоръ II а у л ь т о н ъ (39, 164) тоже имѣлъ гусеницу вилохвоста (D. vinula), на которой было 14 яицъ, но развилось изъ нихътолько 7 панисковъ (P. cephalotes Holm g r.).

По объясненію названныхъ ученыхъ, причинами гибели недоразвившихся были: взаимное поъданіе личинокъ, т. е. каннибализмъ, отложение панисками безплодныхъ яицъ и, наконецъ, простое оттъснение отъ источника питанія болъе взрослыми личинками болъе молодыхъ. Первыя два объясненія подтвердились нашими наблюденіями въ лабораторіи. Любопытно, что способность высасыванія и умерщвленія себ'є подобныхъ свойственна не только молодымъ личинкамъ панисковъ, но проявляется и у взрослыхъ, какъ это слъдуетъ изъ сообщенія Бришке, который наблюдалъ, какъ одна личинка, имъвшая 15 мм. въ длину, высосала другую такую же, находившуюся съ нею въ одномъ, сдъланномъ гусеницею, коконъ. Многочисленныя яички и личинки, находимыя на одной гусеницъ, представляютъ собою потомство, не одной матери, а нъсколькихъ, клавшихъ яйца разновременно, что доказывается, по объясненію Бришке, различіями въ возрастъ находимыхъ при такихъ условіяхъ личинокъ.

Въ чемъ наши лабораторныя наблюденія ръзко разошлись съ тъмъ, что сообщаютъ другіе наблюдатели, это — въ опредъленіи срока вылупленія личинки изъ отложеннаго яйца и въ явленіи живорожденія и яйцеживорожденія. Послъднее оставалось до сихъ поръ никъмъ не замъченнымъ по двумъ, я думаю, причинамъ. Никто не дълалъ вскрытія кладущихъ яйца самокъ панисковъ и не разсматривалъ подъмикроскопомъ добытыхъ изънихъ яицъ, при чемъ нельзя было бы не убъдиться въ томъ, что въ яйцегодахъ ихъ яички, по крайней мъръ ближайшія къ выходу изъ самки, содержатъ готовыхъ къ вылупленію личинокъ. Далъе, никто не наблюдалъ подробно черезъ лупу самый процессъ кладки яицъ, каковое наблюдение осуществимо только при искусственныхъ условіяхъ, въ лабораторіи. Слъдствіемъ отсутствія указанныхъ наблюденій явилась невозможность указать точно время отложенія яицъ на найденной гусеницъ, а потому нельзя было и сказать, черезъ сколько времени послъ отложенія яйца совершается вылупленіе. Обыкновенно находили гусеницъ, на которыхъ въ моментъ находки или на другой день зам'вчали молоденькихъ личинокъ, уже выдвинувшихся изъящъ. Мартелли, наблюдавшій, какъ онъ полагаетъ, кладку, опредъляетъ срокъ вылупленія личинокъ изъ яицъ черезъ 8—10 дней послѣ отложенія, послѣ чего, по свидѣтельству его, личинка остается внутри раздвинувшихся створокъ яйда до того времени, когда хозяинъ сдѣлаетъ коконъ. По наблюденіямъ С т е н т о н а вылупленіе совершается черезъ три дня послѣ отложенія яйца, если оно положено на гусеницу не задолго до коконированія, но, когда онъ подмѣнялъ взрослыхъ гусеницъ (boreata), на которыхъ самки собирались класть яйца, недокормившимися (defoliaria) и на нихъ кладка совершалась, то вылупленіе задерживалось до 14 дней.

При изложеніи нашихъ лабораторныхъ наблюденій было показано, что въ большинствъ случаевъ личинка выдвигается изъ яйца въ моментъ кладки, и ръже вылупляется черезъ нъсколько часовъ. Самый продолжительный срокъ пребыванія личинки въ отложенномъ яйцѣ до вылупленія равнялся двумъ суткамъ, послѣ чего, если гусеница была слишкомъ подвижной, паразитная личинка снова втягивалась на нъсколько дней въ створки яйца, которыя нъсколько сближались и тогда пребываніе ея въ первой стадіи, скрытой въ скорлупъ яйца, дълалось затяжнымъ. Мнъ кажется, что если бы Мартелли и Стентонъ разсматривали наблюдаемыя ими яички подъбинокуляромъ, то расхожденіе створокъ яицъ и нахожденіе внутри ихъ личинокъ было бы замѣчено ими значительно раньше и тогда указанный ими срокъ вылупленія личинокъ значительно сократился бы. Напомню, что цвътъ головы личинки въ первой стадіи весьма похожъ на цвѣтъ прикрывающей личинку яичной скорлупы, почему открывшееся яйцо съ выдвинутой изъ него головой можетъ быть принято при бѣгломъ осмотрѣ за цѣлое яйцо, еще закрытое, какъ это случилось съ проф. Паультономъ, о чемъ онъ сообщилъ, излагая одно изъ своихъ наблюній (39, 307 и 308).

Что касается яицъ, сброшенныхъ самками панисковъ, то изъ нихъ, по моимъ наблюденіямъ, личинки всегда выдвигали свои головки непосредственно вслѣдъ за выходомъ яицъ наружу. Однако, сбрасыванія яичекъ самками панисковъ до самаго послѣдняго времени никто изъ наблюдателей, писавшихъ о нихъ, до сихъ поръ не замѣчалъ, кромѣ Стентона, работа котораго опубликована въ 1910 г. Только Бришке сообщаетъ нѣчто, приближающееся къ этому, когда говоритъ, что самка одного изъ панисковъ (*P. cephalotes*) носитъ на концѣ брюшка прикрѣплен-

ное къ нему снаружи яичко, всегда по одному, подобно тому, какъ это бываетъ у трифоновъ, у которыхъ однако число яицъ, прикрѣпленныхъ снаружи къ сверлу одной самки, доходитъ до нъсколькихъ десятковъ. Послъднее явленіе описано и изображено еще Гартигомъ, пояснившимъ тогда же, что стебелекъ яйца у трифоновъ снабженъ на концъ головкой, которая при выходъ яйца удерживается въ каналъ яйцеклада, и яйцо тогда виситъ снаружи. У панисковъ на стебелькахъ яицъ, вышедшихъ изъ самокъ, нѣтъ никакихъ головокъ, слѣдовательно, ничъмъ они не могутъ удерживаться на концъ брюшка и на яйцекладъ, а потому, я думаю, Бришке имълъ передъ собою случай сброшеннаго яичка, которое прилипло на нъкоторое время къ концу брюшка самки, какъ это было въ томъ случав, который наблюдался въ лабораторіи и который быль описанъ мною. Наконецъ, Стентонъ замътилъ, что при отсутствіи жертвы самка неспособна задерживать въ себъ яйцо, выдъляетъ его и счищаетъ съ брюшка задними ногами.

Перейдемъ къ описанію личинокъ панисковъ. Наилучшія изображеніе и описаніе ихъ были даны, какъ раньше сказано, Ньюпортомъ и Нильсеномъ. У перваго описаны только что вылупившаяся личинка и взрослая, готовящая коконъ. Онъ не различалъ отдъльныхъ стадій въ развитіи личинки, совершенно не упоминаетъ о существованіи у нея дыхалецъ, равно какъ форма челюстей и ръзкое измъненіе ихъ въ послъдней стадіи остались имъ незамъченными. Линяли паразитныя личинки на гусеницѣ, по его наблюденіямъ, три раза, послѣ чего отпадали отъ жертвы, но еще высасывали ее въ теченіе нъсколькихъ дней, имъя задній конецъ тъла свободнымъ, и приступали затъмъ къ устройству коконовъ. Наблюденія Ньюпорта были повторены Паультономъ, который въ данномъ отношении ничего къ нимъ не прибавилъ. То же приходится сказать о наблюденіяхъ Бришке, Адлера, Андрьюса (3, 163 и 239), Фитча (7, 122 и 13), Мартелли и др., которыя говорять только о двухъ формахъ личинки, молодой и взрослой. Исключеніемъ является сравнительно недавно опубликованная (1906 г.) работа датчанина Нильсена (36, 5—15), въ которой изображены и описаны три стадіи личинки паниска (Paniscus cephalotes Holmgr), но и здѣсь 1-я стадія совсѣмъ не имѣетъ дыхалецъ, у 2-й они въ числъ 8 паръ, а 3-я, являющаяся по мнънію этого автора послъдней, имъетъ 9 паръ дыхалецъ. Слъдовательно, двъ стадіи, 2-я и 4-я, совершенно ускользнули отъ вниманія Нильсена, а 3-я стадія изображена, какъ 2-я.

Наши наблюденія даютъ въ этомъ отношеніи вполнѣ точныя данныя, удостовѣряющія прохожденіе личинкой панисковъ пяти стадій, сопровождаемыхъ пятью линьками, изъ которыхъ четыре совершаются на хозяинѣ, пятая—въ коконѣ, при окукливаніи. Каждая изъ этихъ стадій характеризуется числомъ дыхалецъ и ихъ относительной величиной: 1-я стадія имѣетъ і пару дыхалецъ, 2-я—7 паръ, 3-я—8 паръ, 4-я—9 паръ, изъ которыхъ три заднія пары значительно меньше предыдущихъ и, наконецъ, 5-я стадія имѣетъ тоже 9 паръ дыхалецъ, но различіе въ величинѣ ихъ значительно меньше. Далѣе, лабораторныя же изслѣдованія показали, что у личинокъ 1-й стадіи возможны видовыя отличія для нѣкоторыхъ видовъ, выражающіяся въ различномъ расположеніи шипиковъ на заднемъ концѣ тѣла, что было указано при описаніи личинокъ зеленоглазаго и темноглазаго панисковъ.

Изследованія наши вполне совпали съ изследованіями всехъ прочихъ наблюдателей въ томъ, что личинка паниска въ теченіе всей своей жизни является только наружнымъ паразитомъ, высасывающимъ жертву снаружи, безъ причиненія ей сколько нибудь замътныхъ ранъ 1). На кожъ гусеницы образуется въ мъстахъ сосанія каждой личинки бурое или черное пятнышко, почти точка, въ предълахъ которой не видно даже подъ микроскопомъ никакого отверстія, что замѣчено было уже Паультономъ (39, 166). Однако, если выръзать кусочекъ кожи съ этимъ пятнышкомъ и превратить его въ серію поперечныхъ разръзовъ при помощи микротома, что и было сдълано въ лабораторіи, то въ центръ пятнышка обнаруживается каналъ, черезъ который паразить поглощаль кровь жертвы. Послъ каждой линьки паразитная личинка присасывается, какъ мы знаемъ, въ новомъ мъстъ и каждое изъ нихъ остается отмъченнымъ посредствомъ такого же бураго пятнышка и число ихъ соотвътствуетъ числу перемъщеній ротового отверстія каждой личинки. Оно бываетъ обыкновенно равно четыремъ пятнышкамъ,

¹⁾ Въ этомъ отношении составлялъ въ течение нѣкотораго времени исключение Бришке, который, описывая въ 1876 г., какъ высасывали снаружи гусеницу вилохвоста личинки паниска, поясняетъ, что прежде онъ думалъ, что онѣ вбуравливаются черезъ кожу внутрь гусенацы (9,221).

расположеннымъ въ рядъ на томъ мъстъ кожи гусеницы, гдъ выкормилась до 5-й стадіи одна личинка.

Перешедшая въ 5-ю стадію личинка отваливается вскоръ послѣ линьки отъ тѣла хозяина, но не приступаетъ немедленно къ постройкъ кокона, а продолжаетъ еще кормиться въ теченіе нъсколькихъ дней, послъ чего прядильныя железы ея начинаютъ выдълять содержимое, необходимое для изготовленія кокона. При наблюденіяхъ Паультона (39, 167) отвалившіяся отъ гусеницы личинки втискивали въ ея тъло свои головки съ такой силой, что причиняли вдавленія на ея кожѣ, и кормились такимъ образомъ въ теченіе нъсколькихъ дней, послъ чего отъ гусеницы оставалась только пустая сухая шкурка 1). Онъ легко могли это сдълать, такъ какъ находились вмъстъ съ жертвою въ тъсномъ пространствъ одного кокона, сдъланнаго гусеницей. У насъ докармливаніе паразитовъ послѣ отпаденія отъ жертвы продолжалось также нѣсколько дней, но совершалось на счетъ личинокъ эникоспила, а не на счетъ полувысосанной гусеницы, потому, в фроятно, что д фиствіе происходило открыто на дн ф стеклянной чашечки, а не внутри земляного кокона жертвы, который остался въ банкъ съ землей, откуда была взята гусеница. Возможно поэтому, что при нашихъ наблюденіяхъ покровы полувысосанной гусеницы настолько затвердъвали вслъдствіе ея открытаго положенія, что паразить не быль въ состояніи къ нимъ присосаться.

Вмѣстѣ съ перемѣной способа питанія совершилась и перемѣна въ формѣ верхнихъ челюстей. Въ теченіе первыхъ четырехъ стадій личинка держалась на гусеницѣ и челюсти имѣла въ формѣ крючковъ, при помощи которыхъ она прочно прикрѣпляла свою голову къ избранному мѣсту на кожѣ болѣе или менѣе подвижной гусеницы, вслѣдствіе чего отверстіе рта все время оставалось въ непосредственномъ соединеніи съ каналомъ, черезъ который поступала въ личинку кровь жертвы. Въ пятой

стадіи задній конецъ тъла личинки отпадаетъ отъ гусеницы, сдълавшейся уже совершенно неподвижной, и окончательное высасываніе послѣдней совершается безпорядочно, черезъ любое мѣсто ея кожи, перемѣняемое по мѣрѣ истощенія соковъ подъ нею. Потребность въ крючкахъ, наглухо прикръпляющихъ паразита къ мѣсту сосанія, отпадаетъ и крючки замѣняются прямыми челюстями, легко извлекаемыми изъ жертвы при каждой перемънъ мъста сосанія. Непонятна своеобразная гребенчатость этихъ челюстей, но она свойствена личинкамъ не всъхъ видовъ паниска. Я получиль отъ А. А. Сопоцько два кокона, изъ которыхъ паниски вылет ли до присылки мн коконовъ, но не были сохранены, а потому нельзя сказать, къ какому виду они принадлежали. Изъ этихъ коконовъ были извлечены мною шкурки послъдней стадіи личинокъ, во всемъ подходившія къ шкуркамъ моихъ панисковъ, за исключеніемъ верхнихъ челюстей, которыя на объихъ шкуркахъ не были гребенчатыми, но имъли по три легкихъ пережима между серединой и остріемъ вершины.

Въ послѣдней стадіи совершается перемѣна въ цвѣтѣ содержимаго кишечника личинки. У личинокъ зеленоглазаго паниска оно было чернымъ, а въ пятой стадіи превратилось въ красновато-бурое; у темноглазаго паниска оно было сначала янтарножелтымъ, потомъ сдѣлалось буро-желтымъ и въ послѣдней стадіи красновато-бурымъ; у кормившихся личинокъ панисковъ, о которыхъ сообщаютъ другіе наблюдатели, содержимое кишечника было зеленымъ или буровато-зеленымъ, но на перемѣну его въ послѣдней стадіи въ бурый цвѣтъ нѣтъ указаній, что, однако, можно считать вѣроятнымъ.

Закончимъ наше сравненіе полученныхъ въ лабораторіи данныхъ съ литературными вопросомъ о продолжительности всего развитія панисковъ и о числѣ ихъ поколѣній въ теченіе одного года. Въ этомъ отношеніи показанія всѣхъ наблюдателей разнятся съ моими наблюденіями. Въ лабораторіи паниски, начавшіе свое развитіе въ августѣ и сентябрѣ, закончили его вылетомъ взрослыхъ въ концѣ сентября и въ октябрѣ, слѣдовательно, продолжительность всего развитія опредѣлилась въ 6—10 недѣль. Я не сомнѣваюсь, что, еслибы я не былъ въ это время въ отъѣздѣ, то получилъ бы отъ вылетѣвшихъ панисковъ новое поколѣніе, которое воспитывалось бы въ теченіе зимы. При такой малой продолжительности развитія, имѣя въ виду, что паниски летаютъ на волѣ уже въ маѣ, слѣдуетъ допустить, что въ те-

¹⁾ Это наблюденіе Паультона не совсѣмъвѣрно передано Шарпомъвъ его книгѣ "Насѣкомыя", гдѣ оно такъ изложено: паразитныя личинки "погрузили свои головы внутрь мертваго тѣла и сожрали всю гусеницу, оставивъ отъ нея лишь пустую засохшую шкурку" (70, 413). Можно подумать, на основаніи приведенныхъ словъ Шарпа, что паразиты прорвали кожу гусеницы и проникли внутрь, но такое предположеніе было бы не согласно съ тѣмъ, что сообщено Паультономъ, который нѣсколько разъ указываетъ на наружный паразитизмъ личинокъ паниска и въ чемъ, конечно, онъ совершенно правъ.

ченіе года можетъ смѣниться нѣсколько ихъ поколѣній, по крайней мѣрѣ два. Однако, всѣ наблюдатели говорятъ только объ одномъ поколѣніи, которое зимуетъ въ коконахъ и вылетаетъ въ маѣ. Даже въ тепломъ климатѣ Италіи, по наблюденіямъ д-ра Мартелли, развивается только одно поколѣніе рыжаго паниска (P.testaceus), съ мая по апрѣль слѣдующаго года. Для точнаго выясненія этого очень важнаго въ практическомъ отношеніи вопроса требуются новыя изслѣдованія.

2. Эникоспилъ и офіонъ.

ский до на выдотов . А. т. Вскрытіе.

Прі-вхалъ офіонъ (Рис. 35 и 36) оттуда же и тъмъ же способомъ, что и паниски, но на этотъ разъ путешествіе сопровождалось несчастіємъ. Посланы были 4 самки и 1 самецъ, заключенныя каждая и каждый въ особыя пустыя скляночки, заткнутыя, къ несчастію, не ватой, какъ было въ первомъ случаъ, а въ нихъ были оставлены по недосмотру обыкновенныя деревянныя пробки. Заключеннымъ, которыя оставались въ склянкахъ три дня, не хватило воздуха для дыханія и по прибытіи ихъ въ лабораторію, 3 сентября, я нашелъ въ склянкахъ двухъ самокъ и самца мертвыми, а двъ самки проявляли признаки жизни, но скоро скончались: одна въ тотъ же день къ вечеру, другая на слъдующій день.

При такомъ оборотѣ дѣлъ, казалось бы, и писать о нихъ нечего, но это не совсѣмъ такъ. Хотя и мертвыя, онѣ всетаки повѣдали кое-что интересное. Кромѣ того, съ ними были присланы ихъ коконы, изъ которыхъ вывелись эти самки, да шесть коконовъ этого же вида, т. е. желтаго офіона (Ophion luteus L.), хранились у меня еще съ 1894 года, когда они были присланы изъ Владимірской губ. и дали тогда же, съ 22 по 28 мая, офіоновъ, которые были наколоты на булавки вмѣстѣ съ коконами. Теперь я извлекаю изъ каждаго кокона находящуюся въ немъ шкурку, сброшенную личинкой, которая сдѣлала коконъ, и по шкуркѣ даю описаніе взрослой личинки, но это сдѣлаю по томъ, а сначала надо использовать умершихъ самокъ, пока внутренности ихъ не разложились и не высохли.

Въ день полученія посылки я хлопочу, конечно, около живыхъ самокъ, еще проявляющихъ признаки жизни, даю имъ корму и питья и пускаю къ нимъ гусеницъ, но изъ этого, какъ сказано, ничего не вышло: онъ умерли. Тъхъ же самокъ, которыя прибыли мертвыми, кладу въ воду, чтобы онъ не высохли, и откладываю




Рис. 35. Желтый офіонъ (Ophion luteus L.): ab—большая средняя ячейка, составившаяся изъ двухъ: кубитальной—a и дискоидальной—b, между ними видно только начало раздълявшей ихъ жилки. Увел. около 3 разъ. Оригин.

вскрытіе ихъ до другого дня, когда сверхъ ожиданія пришлось вскрывать всёхъ четырехъ.

Изъ вскрытыхъ самокъ добываю яичники и нахожу ихъ у всѣхъ почти вполнѣ одинаковыми, подобными тому, что изображено на рис. 37. Здѣсь мы видимъ пучекъ, состо-

ящій изъ 7—8 яйцевыхъ трубокъ (ab), въ которыхъ ясно видны вновь развивающіяся яички (a) и выше ихъ камеры съ питательными клѣтками (b); въ нижнемъ отдѣлѣ яйцевой трубочки яйцо почти готово и содержимое находящейся надъ нимъ питательной камеры почти все имъ усвоено. Оба пучка яйцевыхъ трубокъ (лѣвый на рисункѣ не изображенъ) переходятъ внизу въ два парныхъ яйцевода (e и e), которые расширены, какъ мѣшки, и наполнены развитыми яйцами (e). Изъ одного такого яйцевода-мѣшка я вынулъ 33 яйца, послѣ чего




Рис. 36. Тотъ же офіонъ съ боку. Самка. На концѣ брюшка виденъ короткій выступившій яйцекладъ, обыкновенно скрытый. Увел. около 3 разъ. Ориг. Значеніе буквъ, какъ на предыдущемъ рисункъ.


стънки его стянулись и сморщились, принявъ такой видъ, какой имветь лввый яйцеводъ (е) на рисункъ. Парные яйцеводы соединяются внизу въ общій яйцеводъ (d), который въ конечной своей части также расширяется, образуя яйцевой карманчикъ (k-t), содержащійодно яйцо (0). Это лось однимъ кон-

цомъ наружу черезъ половое отверстіе, которымъ заканчивается общій яйцеводъ внизу при основаніи яйцеклада (n). Здѣсь же впадаютъ въ общій яйцеводъ выводные протоки смавочной железы (f) и ядовитой железы (h-g). На противоположномъ закругленномъ концѣ яйцевого карманчика, обращенномъ къ спинной сторонѣ насѣкомаго (на рисункѣ эта часть пригнута вправо), прикрѣпленъ посредствомъ стебелька (t) сѣмепріемникъ (r), окруженный питательной железою (s). Точно такого же строенія половой аппаратъ былъ найденъ мною у самокъ эникоспила (Enicospilus).

Прежде всего обращаетъ на себя вниманіе это расширеніе парныхъ яйцеводовъ, превращеніе ихъ въ мѣшки, набитые яйцами.

Рис. 37, Половой аппарать самки офіона (Ophion luteus L.): ab-яйцевая трубка яичника, аяйцевая камера, b-питательная камера: справый парный яйцеводъ, наполненный зрълыми яйцами; д-общій яйцеводъ; е-лъвый парный яйцеводъ, пустой (пучекъ яйцевыхъ трубокъ его не изображенъ); f—смазочная железа, g ядовитая железа, h-пріемникъ ядовитой железы, к-карманообразное расширеніе общаго яйцевода (д), п-яйцекладъ, o-яйцо, r-съмепріемникъ, з-его питательная железа, т-стебелекъ съмепріемника. Увел. въ 25 разъ. Оригин.

У панисковъ, какъ мы видъли, также собираются и хранятся зрѣлыя яички въ парныхъ яйцеводахъ, но тамъ яички всегда расположены въодинъ рядъ по длинъ яйцевода, одно за другимъ, и потому яйцеводы нисколько не расширены, только удлинены, въ яйцеводахъ же офіона по нъсколько яицъ лежатъ одно возлъ другого на одномъ уровнъ. Вслъдствіеэтого стънки пар-



ныхъ яйцеводовъ офіона и эникоспила обладаютъ растяжимостью и, будучи растянуты наполняющими яйцеводъ яйцами, являются

гладкими, но у пустыхъ яйцеводовъ, въ молодыхъ самкахъ, онѣ нокрыты многочисленными складками *). Другая особенность заключается въ образованіи на общемъ яйцеводъ яйцевого карманчика (напоминающаго bursa copulatrix, которой у наѣздниковъ нѣтъ). Такого образованія я не находилъ ни у кого изъ изслѣдованныхъ мною наѣздниковъ, кромѣ офіона и эникоспила, которые, слѣдовательно, являются пока единственными его обладателями. Мѣшкообразные парные яйцеводы, набитые многочисленными яичками, я находилъ также у представителей родовъ банхусъ (Banchus femoralis Thoms.) и кампоплексъ (Campoplex охуасаптава Воіе.), но яйцевого карманчика на общемъ яйцеводъ у нихъ не было.

Сначала были вскрыты тѣ самки офіона, которыя скончались въ пути и пролежали у меня послѣ того сутки въ водѣ. У обѣихъ я нашелъ то положеніе, которое изображено на рисункѣ, т. е. у каждой въ яйцевомъ карманчикѣ было по одному яйцу, и это положеніе органовъ второй самки было тогда же зафиксировано мною для препарата, а органы, извлеченные изъ первой самки, оставлены были на стеклѣ въ водѣ. Затѣмъ я вскрылъ самокъ, умершихъ въ лабораторіи, и у одной изъ нихъ нашелъ яйцевой карманчикъ пустымъ, у другой же въ немъ было яичко, которое при вскрытіи вывалилось наружу. Когда я тянулъ пинцетомъ яйцекладъ, вытягивая за нимъ изъ вскрытаго брюшка яичники и обрывая иглой задерживавшія ихъ трахейныя нити, то яйцекладъ подогнулся при основаніи такъ, что надавилъ на яйцевой карманчикъ и яичко изъ него выскользнуло въ воду черезъ половое отверстіе, но было при этомъ сдавлено и попорчено.

Теперь я могу дать описаніе яичка офіона, причемъ я долженъ почти буквально повторить выраженія, которыми описалъ около года назадъ (74, 418) яичко эникоспила (Enicospilus ramidulus Grav.). Яички ихъ такъ схожи, что я не могъ найти признаковъ отличія между ними. Яйцо совершенно бѣлое, имѣетъ форму согнутой колбаски, слабо расширенной у одного конца. Длина немного больше і мм., ширина на одномъ концѣ—о,16 мм., на другомъ—о,1 мм. Оболочка очень тонкая, нѣжная, мягкая, по

вылупленіи личинки прозрачная, безцв'єтная и открывающаяся на тонкомъ конц'є правильной крышечкой. Такія н'єжныя яйца не могутъ быть откладываемы снаружи на гусеницъ, а откладываются внутрь ихъ, ибо, оставленныя на воздух і, не въ жидкости, они быстро высыхаютъ и зародыши въ нихъ не развиваются. Узкій конецъ яичка направленъ въ яйцевол і впередъ, къ выходу, и составляєтъ головной конецъ, ибо на немъ открывается крышечка яйца, какъ мы сейчасъ увидимъ, при вылупленіи личинки.

Вскрытіе офіона очень затрудняется чрезвычайной тонкостью его брюшка, сильно сдавленнаго съ боковъ, и, требуя большой осторожности, беретъ много времени, почему для вскрытія и изслѣдованія четырехъ самокъ потребовался почти цѣлый день. Когда я вернулся къ осмотру яичниковъ первой вскрытой самки, то съ удивленіемъ увидълъ, что у нея при наружномъ концъ яйцевода прикр впляется какой-то органъ, незам вченный мною сначала, полупрозрачный, заостряющійся къ концу и представляющій собою, въроятно, новую, еще никъмъ не описанную железу, ибо, какія полагаются—смазочная и ядовитая железы имълись уже на-лицо. Желая со всъхъ сторонъ разсмотръть эту новоявленную железу, я началъ поворачивать ее иглою, при чемъ она свободно отдълилась отъ яйцевода, не будучи, какъ оказалось, ничъмъ къ нему прикрѣплена, потомъ вдругъ она изогнулась въ одну и въдругую сторону и шевелилась въ водъ, какъ живая. Тотчасъ стекла бинокуляра были перемънены для болъе сильнаго увеличенія и тогда предполагаемая железа оказалась живой личинкой. Теперь только я зам'тилъ, что въ яйцевомъ карманчик в первой самки уже нътъ бывшаго въ немъ раньше яичка, отъ котораго осталась пустая совершенно прозрачная скорлупа, почти вполнъ выдвинувшаяся изъ яйцевода наружу, а узкій передній конецъ ея открыть правильной крышечкой.

Пока я вскрывалъ остальныхъ трехъ самокъ, здѣсь совершилось вылупленіе личинки изъ яйца, которое пребывало въ тѣлѣ самки болѣе сутокъ послѣ ея смерти. Здѣсь мы имѣемъ случай посмертнаго вылупленія, имѣвшаго мѣсто, однако, не въ тѣлѣ матери, а внѣ его, такъ какъ кончикъ яйца, скрывавшагося въ яйцевомъ карманчикѣ, выставлялся наружу, въ воду. Этотъ случай показываетъ, что у насѣкомыхъ насильственная смерть матери не всегда влечетъ за собою немедленную смерть зародышей, заключенныхъ въ ея тѣлѣ, и что развитіе ихъ можетъ совершаться и даже успѣваетъ закончиться въ теченіе болѣе сутокъ

^{*)} Этой особенностью они уподобляются, описанному у Пантэля (38, 76 и 80), общему яйцеводу живородящихъ двукрылыхъ, у которыхъ онъ служитъ для храненія вступившихъ въ него изъ яйцевыхъ трубокъ яичекъ, а впослъдствіи личинокъ, наприм. у Bigonichaeta setipennis, Blepharidea vulgaris и др.

послѣ смерти, такъ какъ послѣ смерти этой самки прошло до ея вскрытія болѣе сутокъ. Нужно только, чтобы яйцеводы умершей самки не подсохли, каковое условіе и было соблюдено въ настоящемъ случаѣ. Необходимо замѣтить, что въ моемъ дневникѣ, изъ котораго я черпаю излагаемое здѣсь, имѣется такая запись: «изъ вскрытыхъ парныхъ яйцеводовъ первыхъ двухъ самокъ выступаетъ буроватая муть», слѣдовательно, въ парныхъ яйцеводахъ уже началось разложеніе, которое не помѣшало, однако, жизненнымъ процессамъ совершаться въ общемъ яйцеводѣ.

н жиндам выд мере І-я стадія.

Получивъ столь неожиданнымъ способомъ этотъ драгоцѣнный документъ, т. е. 1-ю стадію личинки офіона, я очень пожальль о томъ, что умертвилъ яички, найденныя въ яйцевыхь карманчикахъ другихъ двухъ самокъ, фиксированіемъ для препарата—у одной и неосторожнымъ обращеніемъ—у другой. Быть можетъ, изъ нихъ тоже вылупились бы личинки и тогда я имѣлъ бы трехъ представителей 1-й стадіи, а теперь у меня только одна—уникумъ, требующій въ высшей степени бережнаго обращенія. Мелькнула было слабая надежда получить личинокъ изъ яицъ, добытыхъ изъ парныхъ яцеводовъ самокъ, умершихъ въ лабораторіи, но не оправдалась, ибо, пролежавъ нѣсколько дней въ водѣ, эти яички начали разлагаться, но личинокъ не дали.

Чтобы предохранить полученную личинку отъ всякихъ случайностей я немедленно убралъ ее въ особой скляночкѣ въ спиртъ, откуда она перешла впослѣдствіи въ препаратъ и заклеена въ немъ послѣ необходимой предварительной обработки. Доподлинность этой личинки не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, такъ какъ она получена изъ яйца, добытаго изъ тѣла самки, которая послѣ вскрытія и приведенія въ порядокъ ея вскрытаго брюшка была наколота на булавку, какъ и прочія самки, и вмѣстѣ съ ними была послана для точнаго опредѣленія къ Н. Р. К о к у е в у въ Ярославль, откуда всѣ онѣ вскорѣ вернулись, снабженныя надписью: Ophion luteus L., т. е. нашъ желтый офіонъ.

Тъло этой единственной личинки при обработкъ ея и заклеиваніи въ препаратъ было нъсколько попорчено и потеряло свою форму на столько, что сдълалось къ сожальнію непригоднымъ для снятія съ него рисунка, за исключеніемъ головы и ротовыхъ

частей, т. е. главнаго. Надо замѣтить, что въ это же время у меня въ лабораторіи совершалось вылупленіе личинокъ банхуса (Banchus), относительно которыхъ въ дневникѣ записано, что общая форма ихъ тѣла въ 1-й стадіи совершенно такая же, какъ у личинокъ офіона. Поэтому на рисункѣ 38-мъ я даю изобра-

женіе сдъланное съ личинки банхуса, какъ вполнъ подходящее при данномъ увеличеніи къ 1-й стадіи личинокъ офіона.

Общая форма тъла этой личинки, очень близко подходитъ къ тому, что изображаетъ рацебурговская фиг. 12-я, воспроизведенная на нашемъ 8-мъ рисункъ (стр. 17). Длина личинки офіона вскорт послт вылупленія около 11/2 мм. Границы между члениками ея тъла незамътны, а потому и число ихъ нельзя опредълить. При маломъ увеличеніи видно только что впереди находится обособленная, округло и слабо съуживающаяся головка, а на заднемъ концѣ тѣло личинки офіона оканчивается тупо заостряющимся хвостикомъ, имѣющимъ длину менъе половины остального тъла. Послѣ обработки ѣдкимъ кали, промытая и окрашенная личинка была заклеена, какъ было сказано, въ препаратъ и на ней даже при самомъ сильномъ увеличеніи нельзя найти никакихъ признаковъ дыхательныхъ органовъ, т. е. стигматъ и трахей. Этимъ наша личинка ръзко отличается отъ изображенной на вышеуказанной рацебурговской фигуръ, которая снабжена трахейнымъ стволикомъ, идущимъ вдоль всего тела отъ головы до предпослед-

няго членика. Мнъ кажется, что несовер-



Рис. 38. Личинка 1-й стадін банхуса (Banchus femoralis Thoms). Увелич. въ 60 разъ. Ори-

шенство зрительныхъ приборовъ, которыми пользовался въ 40-хъ годахъ прошлаго столътія германскій ученый, ввело его въ заблужденіе, и онъ принялъкакую-нибудь складку за трахейный стволикъ.

Голова личинки офіона при сильномъ увеличеніи (около 400 разъ) обнаруживаетъ весьма характерныя особенности, показанныя на рис. 39-мъ. На немъ мы видимъ нижнюю губу (e) и нижнія челюсти (b) мягкія, перепончатыя и не обособленныя другъ отъ друга; за ними видна пара бурыхъ, сильно хитини-

зированныхъ, верхнихъ челюстей, имъющихъ широкія основныя части и узкія заостренныя вершины, которыя при смыканіи перекрещиваются; у верхняго края отверстія рта выдаются по бокамъ два тупыхъ роговидныхъ выступа (a), надъ которыми расположена безцвътная верхняя губа, имъющая на объихъ сторонахъ




Рис. 39. Голова личинки 1-й стадіи офіона (*Ophion* же при большомъ luteus L.): a—роговидные придатки, b—нижняя челюсть, c—нижняя губа. Увел. около 400 разъ. Оригин.

родавочекъ. Какъ сверху, такъ и снизу овертстіе рта ограничено дугами изъ утолщеннаго хитина; кромъ того, боковыя хитиновыя дуги идутъ отъ отверстія рта вверхъ и внизъ по головъ, при чемъ вверху онъ загибаются на спинную сторону и продолжаются на ней, сообщая головъ призматическую, округлочетыреугольную форму. Длина головы 0,26 мм., ширина при основаніи 0,22 мм. Остальное тъло личинки І-й стадіи не обнаруживаетъ даувеличеніи, какъ было сказано, ни-

попяти мелкихъ бо-

какихъ особенностей, кромъ наличности указанной хвостовой части.

Имаго *).

Теперь я долженъ бы дать описаніе послѣдней стадіи, т. е. взрослой личинки офіона по шкуркамъ, которыя добыты изъ

коконовъ, но предварительно считаю необходимымъ сказать нѣсколько словъ о близкомъ сходствѣ, которое замѣчается между эникоспиломъ и офіономъ, какъ въ ихъ строеніи, такъ и въ условіяхъ развитія. Сходство это бросается въ глаза уже на взрослыхъ, крылатыхъ представителяхъ двухъ названныхъ родовъ, въ особенности двухъ наиболѣе распространенныхъ у насъ видовъ: желтаго офіона (Ophion luteus L.) и грязнаго эникоспила (Enicospilus merdarius G r a v.). Оба они одинаковой величины, около 20 мм. длин., съ длинными и тонкими ногами и усиками; брюшко такъ сильно сжато съ боковъ, что кажется сверху не имѣющимъ ширины, особенно при пустомъ кишечникѣ у голодныхъ экземпляровъ; окрашены оба въ коричнево-красный или рыжій цвѣтъ, болѣе яркій у офіона, но конецъ брюшка

эникоспила черный, какъ бы загрязненный, хотя и у нѣкоторыхъ офіоновъ снизу онъ также подчерненъ.

Признаки отличія, при томъ хорошо выраженные, находятся на переднихъ крыльяхъ. На рис. 40 изображено переднее крыло




Рис. 40. Переднее крыло эникоспила (Enicospilus ramidulus G г a v.): а—бурыя пятнышки въ срединной ячейкъ. Увел. въ 5 разъ, Оригин.

эникоспила, близъ середины котораго находится свътлобурое хитиновое пятнышко (а) и недалеко отъ него два меньшихъ такихъ же пятнышка. Эти пятнышки лежатъ внутри, такъ называемой, большой кубитальной ячейки, слившейся съ 1-й дискоидальной. У офіона, какъ показано на рис. 35 и 36 (стр. 135 и 136), эти ячейки (а и в) также слились, но не вполнъ, ибо сохранилось начало раздълявшей ихъ жилки, а самое главное—здъсь нътъ и слъда какихъ бы то ни было бурыхъ пятнышекъ. Такая же срединная ячейка и тоже безъ слъда бурыхъ пятнышекъ свойственна крыльямъ панисковъ (Рис. 12, стр. 64), но здъсь мы находимъ у внъшняго края срединой ячейки добавочную треугольную маленькую ячейку (Рис. 12 с), которой энископилъ и офіонъ не имъютъ.

По окраскъ, по общей формъ тъла, по длиннымъ ногамъ и усикамъ представители всъхъ этихъ трехъ родовъ могутъ быть легко смъшиваемы, но указанная разница въ жилкованіи крыльевъ

^{*)} Такъ на языкъ ученыхъ называютъ взрослыхъ, т. е. уже окрыленныхъ, насъкомыхъ.

даетъ возможность всегда точно отличать ихъ. Что касается самокъ, то у панисковъ онѣ всегда имѣютъ на концѣ брюшка выдающееся, иногда удлиненное сверло (Рис. 12), между тѣмъ какъ у самокъ эникоспила и офіона (Рис. 36) сверло укорочено настолько, что въ покоѣ всегда скрыто, почему у послѣднихъ двухъ родовъ нельзя отличить сразу самца отъ самки.

Паразитизмъ и коконъ.

Сходство строенія сопровождается и сходствомъ въ нравахъ. Эникоспилъ и офіонъ летаютъ, подобно панискамъ, по вечерамъ и слетаются на свътъ лампы. Яички они откладываютъ, въ противоположность панискамъ, внутрь гусеницъ, преимущественно ночныхъ бабочекъ, или ночницъ (Noctuidae). Гусеница, содержащая въ себъ паразита, продолжаетъ кормиться и расти, какъ всякая здоровая гусеница, отъ которой отличить ее по внъшнимъ признакамъ невозможно, ибо такихъ признаковъ нътъ.

Когда зараженная гусеница достигла полнаго роста, перестала кормиться и собирается окукливаться—въ это время и паразитная личинка, живущая въ ней, тоже достигаетъ своего полнаго роста. Теперь ей надо выбраться изъ гусеницы наружу, чтобы внъ ея, на свобод'ь, т.-е. въ почвенномъ покров'ь, сд влать свой коконъ и въ немъ окуклиться. Она и дълаетъ это, прорывая для выхода кожу своей жертвы, отъ которой остается послѣ ухода личинки почти пустая шкурка, ибо все содержимое ея, за исключеніемъ трахейныхъ, т.-е. дыхательныхъ, трубочекъ, поглощено паразитомъ. Личинки другихъ болѣе мелкихъ наѣздниковъ, паразитирующія внутри гусеницъ, напр., личинки перилита (Реrilitus) или метеора (Meteorus), о которыхъ я еще буду говорить, оставляютъ въ покидаемыхъ ими трупахъ хозяевъ много недоъденнаго содержимаго, напримъръ жиръ, кишечникъ и проч., почему трупы ихъ жертвъ можно находить обыкновенно гдф-нибудь тутъ же, вблизи паразитныхъ коконовъ, но около эникоспила мнъ не удавалось ихъ находить. Здъсь, очевидно, умъренная величина хозяина, т.-е. гусеницъ сосновой ночницы (Panolis variegata), изъ которыхъ происходили имъвшіеся у меня коконы эникоспила, обусловливала необходимость поглощенія паразитомъ для достиженія полнаго роста всего содержимаго хозяина. Возможно, однако, что при паразитировании въ болъе крупныхъ

гусеницахъ, напр. въ гусеницахъ вилохвоста (Dicranura) или шелкопрядовъ, личинка эникоспила и офіона оставляетъ въ покинутомъ трупъ хозяина часть содержимаго недоъденнымъ.

Изготовленный паразитною личинкой коконъ, изображенный на рисункѣ 41-мъ, лежитъ обыкновенно открыто на поверхности почвы или скрытый въ почвенномъ покровѣ. У обоихъ нашихъ наѣздниковъ коконы совершенно одинаковы и отличить ихъ, пока они цѣлые, до выхода окрыленнаго наѣздника, невозможно. Длина кокона 12—15 мм. и ширина 5—6 мм., цвѣтъ его бронзово-бурый или смолисто-бурый, съ очень слабымъ отблескомъ, на срединѣ же опоясываетъ его широкая сѣроватая тусклая по-

лоса, выраженная въ разной степени на разныхъ коконахъ. Стѣнки кокона очень прочныя, состоятъ изъ множества очень тонкихъ слоевъ затвердъвшей блестящей мастики.

Насколько трудно и даже невозможно распознаваніе коконовъ офіона и эникоспила до выхода изъ нихъ натвідниковъ, настолько же легко и просто послів ихъ выхода, такъ какъ выходныя отверстія изъ коконовъ, продівлываемыя этими двумя натвідниками, совершенно различны. Коконъ эникоспила всегда бываетъ открытъ на одномъ изъ концовъ совершенно правильной



Рис. 41. Коконы: офіона (Ophion luteus L.)—нижній, безъ крышечки, и эникоспила (Enicospilus ramidulus G r a v.)—верхній, съ крышечкой Увел. 3 раза. Оригин.

крышечкой, которая большей частью отдѣляется не вполнѣ и виситъ у открытаго края кокона, кромѣ того, плоскость выходнаго отверстія у эникоспила всегда отвѣсна къ продольной оси кокона. Офіонъ дѣлаетъ выходное отверстіе тоже на концѣ кокона, но крышечки отъ него не отдѣляетъ, такъ какъ начинаетъ грызть стѣнку кокона съ середины его конца или близъ нея и постепенно, но не равномѣрно, расширяетъ отверстіе во всѣ стороны, измельчая своими челюстями стѣнку кокона на мелкіе огрызки, которые въ изобиліи падаютъ внутрь кокона и могутъ быть легко въ немъ найдены, между тѣмъ какъ въ коконахъ эникоспила огрызковъ почти нѣтъ. Поэтому края выход-

ного отверстія на коконахъ офіона всегда болѣе или менѣе зазубрены и плоскость его наклонна по отношенію къ продольной оси кокона. Имѣя въ виду ровный и гладкій край выходного отверстія эникоспила и наличность въ коконѣ ничтожнаго количества очень мелкихъ огрызковъ, можно подумать, что выходящій эникоспилъ отдѣляетъ крышечку, заранѣе подготовленную къ отдѣленію еще личинкой при постройкѣ ко-




Рис. 42. Ротовыя части взрослой личинки (5-й стадіи) офіона (Ophion luteus L.): а—зачаточные усики (аптеппае); b—нижнечелюстная хитиновая дуга; с перемычка, идущая отъ нея къ верхнечелюстной дугъ, которая не обозначена особой буквой; l—надротовой щитокъ съ верхней губою; m—верхняя челюсть; mx—нижняя челюсть, близъ середины которой сидитъ нижнечелюстное шупальце; lb—подбородокъ нижней губы; plb—нижнегубное щупальце; х—верхняя часть нижней губы съ отверстіемъ прядильной железы. Увелич. около 40 разъ. Оригин.

кона. Одинъ изъ сверхпаразитовъ, выведенныхъ мною изъ коконовъ эникоспила, о чемъ рѣчь будетъ впереди, подтвердитъ, какъ увидимъ, вѣроятность этого предположенія.

Теперь можно приступить къ описанію взрослыхъ личинокъ. Итакъ, изъ коконовъ офіона, прокипяченныхъ въ чистой водѣ, я добываю хранящіяся тамъ сухія шкурки, теперь распарившіяся, расправляю ихъ,

насколько возможно на предметномъ стеклѣ, заклеиваю въ препараты для микроскопа и даю по нимъ описаніе взрослой личинки офіона. Вмѣстѣ съ тѣмъ добываю изъ коконовъ эникоспила заключенныхъ въ нихъ живыхъ личинокъ и послѣ обработки ихъ ѣдкимъ кали, пользуюсь ими для сравненія найденныхъ признаковъ отличія и сходства съ офіонами. Кромѣ того, изъ свѣжихъ коконовъ, изъ которыхъ только что вышли

эникоспилы, я тоже добываю личинковыя шкурки, лежащія во влажной средѣ той слизи, которая составляєтъ постоянную принадлежность этихъ коконовъ, пока они свѣжи, и благодаря которой въ шкуркахъ сохраняются мягкость и растяжимость, дающія возможность при помощи струи воды изъ пипетки растянуть и расправить шкурку на стеклѣ почти идеально.

Невооруженнымъ глазомъ и при слабомъ увеличеніи нельзя найти никакихъ признаковъ отличія межлу личинками эникоспила и офіона, а потому я даю для нихъ общее описаніе, изъ котораго

выдъляю особопризнаки, отличающіе этихъ личинокъ одну оть другой, если разсматривать ихъ при большомъ увеличеніи. Бълая с или желтовато-бълая личинка, 10—16 мм. дл., состоитъ изъ 12 члениковъ, не считая головы. Она имфетъ форму невполнънаполненнаго мѣшка, верхняя часть котораго, составляющая туловище и голову, съужена. На головномъ концѣ, на самой макушкѣ личинки, помъщается




Рис. 43. Ротовыя части взрослой личинки эникоспила (*Enicospilus ramidulus* Grav.). Значеніе буквы тоже, что на предыдущемъ рисункъ.

ротовое отверстіе и ротовыя части, изображенныя на рисункахъ 42-мъ и 43-мъ. Бурыя хитиновыя дуги, входящія въ составъ ротовыхъ частей, у объихъ личинокъ одинаково хорошо выражены: b—нижнечелюстная дуга, c—перемычка идущая отъ нея къ верхнечелюстной дугъ, которая направляется отъ основанія верхней челюсти (m) къ боковому краю головы; подбородокъ нижней губы—lb сильно хитинизированъ, ръзко очерченъ и усъянъ многими свътлыми точками съ коротенькимъ безцвътнымъ волоскомъ на каждой, а въ верхней поло-

винѣ имѣетъ два свѣтлыхъ кружка, какъ окошечки, близъ середины которыхъ находится по одному нижнегубному шупальцу—р. lb.; между двумя этими кружками опять видны двѣ свѣтлыя точки, надъ которыми расположена верхняя часть нижней
губы (отмѣченная на рисункѣ не буквою, а косымъ крестикомъ),
несущая на себѣ отверстіе прядильной железы (не видное на
рисункѣ). Эта верхняя половина нижней губы ограничена по
бокамъ и съ низу утолщенной хитиновой дугой, которая у
офіона образуетъ внизу два округленныхъ прямыхъ угла, а у
личинки эникоспила она закругляется почти безъ угловъ. По
бокамъ отверстія рта укрѣплены очень маленькія, почти зачаточныя, далеко отстоящія одна отъ другой верхнія челюсти—т, которыя даютъ довольно хорошій признакъ для отличія обѣихъ





Рис. 44. Верхняя челюсть варослыхъ личинокъ: лъвая — офіона (Ophion luteus L.) и правая — эникоспила (Enicospilus ramidulus Grav.). Увелич. въ 200 разъ. Оригин.

личинокъ. У личинки эникоспила верхняя челюсть передъ вершиною явственно согнута крючкомъ, у офіона она слегка и равномѣрно согнута и тоньше заостряется (рис. 44.). Длина верхней челюсти—0,09 мм., ширина у основанія почти такая же.

Вся кожа личинки густо усѣяна очень мелкими бородавочками, сообщающими ей матовый оттѣнокъ, а подъ микроскопомъ она

напоминаетъ шагрень, среди которой однако замѣтны мѣстами гладкіе парные круги, имѣюшіе кожу безъ бородавочекъ, почти блестящую. Эти кружки гладкой кожи соотвѣствуютъ, такъ называемымъ, имагинальнымъ дискамъ, въ которыхъ развиваются три пары ногъ будущаго взрослаго насѣкомаго, и расположены они на грудной сторонѣ всѣхъ трехъ члениковъ туловища, а также двѣ пары по бокамъ межтулья и затулья, гдѣ развиваются крылья наѣздника; кромѣ того, у личинокъ самокъ имѣются двѣ пары имагинальныхъ дисковъ на брюшной сторонѣ 7-го и 8-го члениковъ брюшка, на мѣстѣ развитія двухъ паръ стилетовъ яйцеклада и ихъ общаго футляра, причемъ кружки предпослѣдняго, т. е. 8-го, членика брюшка замѣтно меньше предыдущихъ и болѣе сближены.

Стигматы, т. е. дыхальца, имѣются въ числѣ 9 паръ, расположенныхъ на предтульѣ и на 8 брюшныхъ членикахъ, начиная съ перваго. Трахейныя трубки, подходя къ дыхальцамъ, у этихъ личинокъ не расширяются воронкообразно, какъ это бываетъ у большинства личинокъ другихъ пленчатокрылыхъ насъкомыхъ, а кончаются у дыхательнаго отверстія какъ бы обрубленныя.

Скудость лабораторныхъ наблюденій.

Коконы желтаго офіона я имѣлъ только изъ двухъ мѣстъ: изъ Тулы, о которыхъ раньше говорилъ, присланные А. А. Сокоцько, и изъ Вязниковскаго удѣльнаго имѣнія Владимірской губ. 6 коконовъ, изъ которыхъ окрыленные наѣздники вышли у меня съ 24 по 28 мая 1894 г. Кромѣ того, одинъ офіонъ, но другого вида (Ophion costatus R a t z b.), вылетѣлъ у меня зимою 1909 г. изъ кокона ночницы—кукуліи (Cuculia argentea), нѣсколько десятковъ которыхъ было выписано мною изъ Германіи, и коконъ этого офіона, скрытый въ коконѣ ночницы, не былъ тогда по недостатку времени разысканъ мною, а впослѣдствіи онъ былъ забытъ и утерянъ.

Коконы двухъ видовъ эникоспила я имълъ изъ большаго числа мъстностей и въ гораздо большемъ количествъ. Во всъхъ случаяхъ они были собраны въ сосновыхъ лъсахъ послъ массоваго появленія въ нихъ сосновой ночницы, какъ и только-что упомянутые вязниковскіе коконы офіона. Одинъ видъ эникоспила (Enicospilus merdarius Grav.) быль получень изъ того же Вязниковскаго имънія и взрослые вышли изъ коконовъ въ вышеуказанномъ году съ 26 по 31 мая; въ 1901 г. въ концъ апръля мнъ дали этихъ же эникоспиловъ коконы, полученные изъ Изюмскаго л-ва Харьковской губ., а въ 1906 г. я имълъ ихъ изъ Лабонарскаго л-ва Виленской губ. Другой видъ эникоспила (Enicospilus ramidulus Grav.) вылеталъ у меня съ 31 мая по 3 іюня 1894 г. изъ коконовъ того же Вязниковскаго имънія, а въ въ декабръ того же года изъ коконовъ Суводской дачи Вятской губ. и въ 1907 г. мн дали его коконы Нейгутскаго л-ва въ Курляндской губ. Самое большое количество коконовъ послъдняго вида, сотнями и тысячами, получалъ я изъ Куртамышскаго л-ва Оренбургской губ. (Челябинскій у.). Въ началъ августа 1909 г. я былъ въ этомъ лъсничествъ для осмотра поврежденій, причиненныхъ сосновой ночницей, и нашелъ тамъ массы коконовъ этого эникоспила, лежавшіе вм'єсть съ куколками ночницы на поверхности почвы подъ моховымъ почвеннымъ покровомъ.

Весною 1910 г. былъ командированъ въ Куртамышское лъсничество В. И. Плотниковъ, чтобы организовать сборъ куколокъ ночницы и коконовъ всъхъ ея паразитовъ. Мы предположили тогда сдълать ранней весной опытъ переселенія паразитовъ сосновой ночницы изъ лѣсовъ Оренбургской губ. въ лѣса Курляндской губ., гд в ожидалось массовое появление гусеницъ сосновой пяденицы (Bupalus piniarius L.) — для этой цъли и былъ организованъ вышеуказанный сборъ. Объ этомъ опытъ, который не увънчался успъхомъ (пяденица пропала сама), я разскажу подробнъе въ другомъ мъстъ, теперь же, возвращаясь къ эникоспилу, сообщу только, что коконовъ его собрано было тогда 3.200 штукъ. Изъ нихъ небольшая часть была оставлена въ лабораторіи, а прочіе были отвезены въ Курляндію, гдѣ изъ нихъ въ теченіе весны и лѣта 1910 г. выводились въ особыхъ комнатныхъ садкахъ эникоспилы, которыхъ В. И. Плотниковъ отвозилъ въ лѣсъ и выпускалъ на волю.

Нѣкоторый ⁰/₀ коконовъ эникоспила, какъ показали наши предварительныя изслѣдованія, былъ зараженъ сверхпаразитами, которые будутъ указаны ниже, и потому необходимо было предварительно отдѣлять ихъ въ комнатѣ, по мѣрѣ вывода, отъ эникоспиловъ, чтобы не выпускать въ лѣсъ вмѣстѣ съ послѣдними ихъ враговъ, каковая предосторожность была соблюдена. Многіе изъ коконовъ не дали, однако, до конца лѣта ничего: ни сверхпаразитовъ, ни эникоспиловъ, хотя содержали личинокъ послѣднихъ живыхъ и здоровыхъ. Около тысячи такихъ коконовъ были привезены обратно съ наступленіемъ осени изъ Курляндіи въ лабораторію, гдѣ большая часть ихъ была помѣщена на холодъ, а меньшая оставлена въ комнатѣ.

Насчетъ личинокъ, вынутыхъ изъ этихъ коконовъ, и были воспитаны мною паниски, исторію которыхъ я разсказалъ въ предыдущей главѣ. Кромѣ панисковъ, удалось воспитать на этихъ же личинкахъ нѣкоторыхъ другихъ наѣздниковъ, наприм. обитателя древесины, крупнаго и красиваго эфіальта (Ephialtes manifestator L.), личинки котораго въ обычныхъ условіяхъ, т. е. будучи пристроены въ лѣсу къ своимъ жертвамъ матерью, а не испытателемъ природы въ лабораторіи, развиваются насчетъ живущихъ въ древесинѣ куколокъ и личинокъ жуковъ усачей (Cerambycidae) и златокъ (Buprestidae). Подробнѣе объ этомъ будетъ разсказано въ главѣ, посвященной эфіальту, теперь же будемъ продолжать объ эникоспилахъ.

Итакъ, личинки въ коконахъ эникоспила далеко не всѣ превращаются въ крылатыхъ нафздниковъ весною слфдующаго за коконированіемъ года. Превращеніе ихъ и вылетъ могутъ совершаться въ теченіе всего лѣта, послѣ чего все-таки нѣкоторая часть коконовъ остается не вскрытою и личинки въ нихъ вторично зимуютъ. Изъ коконовъ, которые были сдъланы личинками въ іюль 1909 г. и были собраны В. И. Плотниковымъ весной 1910 г., вылетъ эникоспиловъ продолжался и не закончился въ теченіе двухъ следующихъ летъ, 1910 и 1911 гг. Даже въ январъ 1912 г., у меня въ лабораторіи жили три самки (E. ramidulus Grav.), вылетъвшія изъ куртамышскихъ коконовъ 28 декабря 1911 г. — одна и 1 января 1912 — двъ. Въ іюлъ 1911 г. исполнилось два года со времени образованія этихъ коконовъ, прошло 6 мѣсяцевъ третьяго года и тѣмъ не менѣе въ коконахъ еще есть живыя личинки. Все лъто и осень 1910 г. эти коконы пробыли въ лъсахъ Курляндіи при обыкновенной комнатной температуръ, въ началъ ноября переъхали въ лабораторію и лежали въ ней всю зиму въ обыкновенной сухости комнатнаго воздуха, съ 13 іюня по 28 сентября 1911 г. они пребывали на холодъ, послъ того внесены въ комнату и помъщены во влажный воздухъ теплицы, которая описана въ первой главъ и которая въ эту зиму не отапливалась.

Столь продолжительное пребываніе эникоспиловъ въ личинковомъ состояніи въ коконахъ представляетъ собою случай длительной діапаузы, т. е. временной пріостановки ихъ развитія, благодаря чему вылетъ поколѣнія, развивавшагося въ теченіе одного лѣта, можетъ распредѣлиться на нѣсколько слѣдующихъ лѣтъ. Существованіе этого явленія у другихъ насѣкомыхъ, наприм. у пилильщиковъ, давно удостовѣрено, но относительно наѣздниковъ такихъ наблюденій не было опубликовано 1).

Личинка, заключенная въ коконъ, лежитъ окруженная въ нижней своей половинъ какой-то бурой слизью, изверженной ею же вслъдъ за постройкой кокона. Въ нъкоторыхъ коконахъ, слишкомъ долго подвергавшихся дъйствію сухого воздуха, слизь эта подсыхаетъ — тогда подсыхаетъ и личинка, сокращается, сморшивается и умираетъ. Если же коконы освъжать по временамъ водою, что я дълалъ изръдка, или держать ихъ во

¹⁾ Недавно проф. Экштеннъ удостовъриль то же для микрогастера. (*Microgaster*). (См. 14, 140). Добавлено при печатаніи.

влажномъ воздухъ, то слизь не сохнетъ и личинки благоденствуютъ. Передъ окукливаніемъ личинка еще разъ выпускаетъ изверженія, но на этотъ разъ болѣе густыя и они выходять не отдъльными комочками, какъ у личинокъ другихъ наѣздниковъ, а образуютъ одну сравнительно крупную и толстую колбасу желтовато-съраго цвъта, около 6 мм. дл. и 2 — 3 мм. ширины. Однажды я вынулъ изъ кокона субнимфу, т. е. переходную ступень между личинкой и куколкой, начавшую выпускать свои послъднія изверженія, и переложиль ее вмъстъ съ ними на стекло, желая пронаблюдать ихъ выходъ. Полужидкія изверженія эти облечены въ какую-то очень тонкую оболочку, выступающую вмъстъ съ ними изъ кишечника, и потому не см вшиваются съ окружающей ихъ бурой слизью. Однако, начавшійся въ кокон выходъ изверженій на стекл прекратился и субнимфа высохла, не окуклившись. Ни одна личинка эникоспила, вынутая изъ кокона и положенная на стекло, не совершала окончательнаго выдъленія изверженій и не окукливалась. Только оставаясь въ коконахъ онъ способны сдълать то и другое.

Выходившія въ лабораторіи изъ коконовъ самки эникоспила, дали очень мало интереснаго. Онѣ сбрасываютъ яички въ воду такъ какъ кисейно-картонные цилиндрическіе садки, въ которыхъ я держу ихъ, стоятъ опрокинутые надъ блюдечками съ водой, въ которую прибавлено очень небольшое количество столовой соли, чтобы помѣшать развитію въ водѣ низшихъ организмовъ. Самки эникоспила довольно крупныя, а потому и садки для нихъ взяты изъ крупноячеистой кисеи, сквозь ячейки которой яички свободно падаютъ въ воду. Изъ яичекъ, однако, ничего не выходитъ, такъ какъ развитіе зародышей въ нихъ даже не начинается, и подъ конецъ они загниваютъ.

У столь близкаго къ эникоспилу офіона въ яйцѣ, находившемся въ водѣ, развитіе зародыша, какъ мы видѣли, совершилось и личинка изъ него вылупилась подобно тому, какъ это бываетъ у банхуса и многихъ другихъ наѣздниковъ, но всѣ яйца эникоспила, какія у меня были, оказались безплодными. Одна самка сбрасываетъ въ теченіе сутокъ отъ і до 3 яицъ, но дѣлаетъ это не каждый день. Самка, прожившая всего 20 дней, съ і по 20 января 1912 г., сбросила 21 яйцо, изъ которыхъ первое она дала на 5-й день по выходѣ изъ кокона; другая, жившая 50 дней, съ 28 декабря 1911 г. по 17 февраля 1912 г., дала 39 яицъ, изъ коихъ первое было дано на другой день послъ выхода изъ кокона. Такимъ образомъ, сбрасываніе яицъ начинается у однъхъ самокъ на другой же день послъ выхода изъ кокона, у другихъ черезъ 5—10 дней и даже болье.

Вскрытіе самокъ въ день выхода ихъ изъ коконовъ показало, что у нихъ въ это время уже имъются въ парныхъ яйцеводахъ готовыя къ сбрасыванію и откладыванію яички, хотя и въ очень различномъ числъ. У одной самки было найдено і яйцо въ лъвомъ яйцеводъ и много готовыхъ къ переходу въ яйцеводъ почти зрълыхъ яицъ въ яйцевыхъ трубкахъ обоихъ яичниковъ, а въ правомъ яйцеводѣ-ничего; у другой было найдено и и 2 яйца въ яйцеводахъ и много въ яичникахъ. Съ возрастомъ самки число яицъ въ парныхъ яйцеводахъ постепенно увеличивается: у самки, прожившей 5 дней и еще не начавшей сбрасывать яйца, было въ яйцеводахъ 3 и 2 яйца, а у той, которая прожила 20 дней и сбросила 21 яйцо, было по 6 яицъ въ яйцеводахъ и одно вывалилось изъ яйцевого карманчика во время вскрытія. Наконецъ, у самки, прожившей 50 дней и давшей 39 яицъ, было найдено по смерти въ парныхъ яйцеводахъ 17 и 11 яицъ и по одному близкому къ зрълости яйцу въ яичникахъ. Стало быть, самки эникоспила выходять изъ коконовъ совершенно половозрѣлыми и нѣкоторыя способны съ первыхъ же дней своего окрыленнаго существованія класть яички въ подходящихъ гу-

Спариванія эникоспиловъ мнѣ не пришлось наблюдать по очень простой причинъ-по недостатку вниманія съ моей стороны. Въ началъ моихъ наблюденій надъ ними, въ теченіе зимъ 1909-1910 и 1910-1911 годовъ, выходили изъ коконовъ представители обоихъ половъ, но тогда все мое вниманіе было направлено на другихъ, болъе интересныхъ, наъздниковъ, почему я постоянно забывалъ объ эникоспилахъ и даже почти не дълалъ о нихъ записей въ своихъ дневникахъ. Позднъе стали выходить изъ коконовъ однъ самки и уже не представилось возможности наверстать пропущенное. Откладыванія яицъ эникоспилами въ гусеницъ мнъ также не пришлось наблюдать по недостатку живыхъ подходящихъ гусеницъ. Когда у меня были, живыя гусеницы озимой ночницы, тогда я не выводилъ изъ коконовъ самокъ эникоспила, такъ какъ берегъ гусеницъ, бывшихъ у меня въ сравнительно небольшомъ количествъ, для панисковъ и для амблитэла съ ихневмономъ, о которыхъ разскажу

въ слѣдующей главѣ. Потомъ были въ моемъ распоряжении гусеницы сосноваго шелкопряда (Gastropacha pini L.) и лжегусеницы пилильщика (Lophyrus), къ которымъ я пробовалъ пускать самокъ эникоспила, но ничего изъ этого не вышло. Гусеницы перваго указаны въ литературъ однимъ изъ наблюдателей (Дурсъ-13, 57.) въ числъ жертвъ эникоспила, почему я и надъялся, что мои самки будутъ на нихъ нападать, но онъ остались одинаково равнодушными, какъ къ молоденькимъ гусеницамъ шелкопряда, взятымъ съ зимовки, такъ и къ полувзрослымъ, подкормленнымъ въ лабораторіи. Личинки пилильщика еще никъмъ не зачислены въ число жертвъ эникоспила, но я надъялся, что мои самки ошибутся и примутъ этихъ зеленыхъ и безволосыхъ лжегусеницъ за такихъ же безволосыхъ и зеленихъ гусеницъ сосновой ночницы и будутъ нападать на нихъ и класть въ нихъ яйца. Борьба для нихъ облегчалась въ настоящемъ случать тъмъ обстоятельствомъ, что личинки пилильщиковъ были взяты изъ коконовъ, слъдовательно, утратившія способность сопротивляться и ползать, способныя только корчиться и переваливаться съ одного бока на другой. Ошибся, однако, я въ своихъ расчетахъ, а не самки эникоспила, не обратившія на личинокъ пилильщика никакого вниманія.

Молодыя личинки.

Такъ и не удалось получить въ лабораторіи потомство отъ эникоспила. Тъмъ не менъе, молодыхъ личинокъ его я могу описать, но по матеріаламъ, добытымъ инымъ путемъ. Въ іюлъ 1910 г. В. И. Плотниковъ былъ вторично командированъ въ Куртамышское лъсничество для того, чтобы осмотромъ на мъстъ убъдиться—оправдалось ли мое предсказаніе о томъ, что сосновая ночница не появится въ немъ въ сколько-нибудь замътномъ количествъ по причинъ значительной смертности ея отъ паразитовъ въ предыдущемъ году. Слъдствіемъ такого взгляда явилось распоряженіе—не предпринимать въ 1910 г. никакихъ мъръ противъ ночницы и было допущено организованное нами переселеніе ея паразитовъ въ Курляндію. Кромъ того, В. И. Плотников у поручено было набрать побольше гусеницъ ночницы и доставить ихъ живыми въ лабораторію для изслъдованія заключеныхъ въ нихъ паразитныхъ личинокъ. Къ счастью

для лѣсничества и къ несчастью для нашихъ лабораторныхъ занятій сдѣланное нами предсказаніе оправдалось, и даже въ излишней мѣрѣ. Несмотря на самыя усиленныя поиски В. И. Плотникову удалось набрать въ теченіе двухъ дней, 15 и 16 іюля, только 9 гусеницъ, которыя въ это время были уже взрослыя или близкія къ тому. Въ виду такого малаго количества перевозка ихъ живыми была признана слишкомъ рискованной, онѣ были положены въ спиртъ и къ началу августа доставлены въ лабораторію.

При вскрытіи ихъ я нашелъ, что двѣ гусеницы содержали личинокъ анамолона, въ двухъ оказались личинки эникоспила, въ остальныхъ же личинки тахинъ. Кромѣ того, въ объихъ гусеницахъ, содержавшихъ личинокъ эникоспила, найдено было у задняго конца послъднихъ, по три сброшенныя ими шкурки и по одному пустому яйцу, скорлупа котораго совершенно побуръла, но оставалась прозрачной. Въ одной изъ этихъ гусеницъ, было найдено, сверхъ того, совершенно цълое такое же точно бурое яйцо эникоспила, зародытъ въ которомъ замеръ, и въ ней же былъ еще найденъ трупикъ 1-й стадіи аномалона. Очевидно, что эта гусенипа была перегружена клавшими яйца самками и потомство позднъе клавшихъ погибло.

Теперь весьма умѣстно поставить вопросъ, который въ началѣ настоящей работы я такъ безпощадно предъявлялъ другимъ изслѣдователямъ, описывавшимъ личинокъ тѣхъ или другихъ наѣздниковъ. Съ одной стороны—самки эникоспила не дали въ лабораторіи, какъ было сказано, потомства, а потому молодыя формы ихъ личинокъ остались для меня неизвѣстными; съ другой стороны, личинки, взятыя мною изъ гусеницъ и приписанныя эникоспилу, еще не закончили своего развитія, а потому еще нельзя сказать, въ какихъ наѣздниковъ онѣ должны были бы превратиться; слѣдовательно, названія, данныя имъ мною, могутъ быть произвольными и не соотвѣтствующими дѣйствительности. Въ виду возможности такого логичнаго вывода я долженъ дать удовлетворительное объясненіе: на какомъ основаніи это названіе все-таки приложено мною къ найденнымъ личинкамъ?

Чтобы отвътить на этотъ вопросъ, я долженъ сдълать, прежде всего, поправку ко второй посылкъ вышеизложеннаго умозаключенія. Я имъю возможность указать только трехъ наъздниковъ, въ одного изъ которыхъ эти личинки должны были бы превратиться. Взрослые наъздники были предварительно выведены мною изъ

тысячь куртамышскихъ куколокъ и коконовъ и всѣ они принадлежали (несчитая сверхпаразитовъ) только къ тремъ родамъ: аномалонъ, ихневмонъ и эникоспилъ. Стало быть, сомнѣнія могутъ колебаться въ предѣлахъ только этихъ трехъ названій. Далѣе, яйцо аномалона и его личинку я уже зналъ по прежнимъ моимъ изслѣдованіямъ и впослѣдствіи они будутъ описаны мною. Это



Рис. 45. Голова личинки 1-й стадіп эникоспила (*Enicospilus rami lulus* G г а v.): а—роговидные выступы, b—нижняя челюсть, c—нижняя губа. Увел. около 400 разъ. Оригин.

яйцо и личинка въ особенности ея 1-я стадія, на столько характерны, что не узнать ихъ невозк умотеоП .онжом безъ малъйшихъколебаній отнесъ къ аномалону тѣхъ личинокъ, при которыхъ нашелъ въ гусеницахъ шкурки этой І-й стадіи. Столь же характерна и такъ же хорошо извъстна мнъ **1-я** стадія личинки ихневмона и, если бы шкурка ея нашлась въ гусеницъ при какой-нибудь изъ ли чинокъ, то это служило бы несомнъннымъ доказательствомъ принадлежности послѣдней ихневмону, но такой шкурки не было найдено. Вмъсто нея, была найдена въ двухъ

гусеницахъ новая, бывшая дотолѣ неизвѣстной, шкурка 1-й стадіи, очень похожая на вышеописанную личинку офіона. Эту шкурку и личинку, при которой она лежала, приходится

отнести только къ третьему изъ вышеназванныхъ на вздниковъ, т. е. къ эникоспилу, что я и дълаю, предпославъ это необходимое объяснение.

При сравненіи рис. 45, изображающаго голову нашей личинки въ 1-й ея стадіи съ изображеніемъ головы 1-й стадіи личинки офіона (Рис. 39, стр. 142) можно убѣдиться въ ихъ почти полномъ сходствъ. Отличіе заключается лишь въ томъ что у личинки эникоспила роговидные выступы подъ верхней губой (а) болѣе короткіе и по бокамъ губы сидитъ у нея только по одной паръ бородавокъ. Дыхалецъ на шкуркъ также не видно ни одной пары, какъ у личинки офіона; назади она оканчивается тонкимъ хвостикомъ. Общая форма тѣла и размѣры его не могли быть въ точности установлены по измятымъ шкуркамъ; размѣры головы и ея частей тѣ же, что у офіона.

Личинка 2-й стадіи, судя по найденнымъ шкуркамъ, имѣетъ роговидные выступы болѣе тонкіе и острые; верхнія челюсти ея когтевидныя, съ расширеннымъ основаніемъ, и настолько длинныя, что перекрещиваются при смыканіи. Слѣдовъ дыхательныхъ органовъ не замѣтно накакихъ.

Сброшенныя шкурки лежатъ обыкновенно у задняго конца личинки, гдѣ я и нашелъ ихъ, разсматривая вскрытую гусеницу подъ бинокуляромъ, послѣ чего шкурки были отдѣлены иглою и перенесены на предметное стекло. Здѣсь я скоро разобралъ, что добылъ только двѣ шкурки и что не достаетъ еще одной, по крайней мѣрѣ, ибо крупный размѣръ найденной личинки слишкомъ не согласовался съ малымъ размѣромъ второй шкурки, но найти недостававшую шкурку не удалось. Возможно, что она была сдернута пинцетомъ и присохла на его кончикѣ, или затерялась среди остатковъ жира и мускуловъ гусеницы.

Личинка вынутая изъ гусеницы, въроятно, 4-й стадіи, близкая къ взрослому состоянію, имъла въ длину 12 мм. Кожа ея густо усъяна очень мелкими пупырышками, какъ у взрослой личинки, но здъсь они растянуты въ поперечномъ направленіи, а у той имъютъ виды сосочковъ. Ротовыя части во всемъ за исключеніемъ двухъ подробностей соотвътствуютъ тому, что изображено на 43 рисункъ (стр. 147) и что свойственно взрослой личинкъ. У передняго края верхней губы видны съ объихъ сторонъ по паръ горизонтально сидящихъ хитиновыхъ бородавочекъ со свътлымъ центромъ и волоскомъ въ каждой; отъ нижняго края внутренней бородавочки идетъ къ боковому краю губы возвизуренней бородавочки идетъ къ боковому краю губы воз-

вышенная темная линія. Верхняя челюсть потеряла когтевидную форму, почти прямая, острая, съ расширеннымъ основаніемъ; длина всей верхней челюсти—0,15 мм., широкой ея части—0,05 мм. и острой узкой—0,1 мм.; ширина челюсти у основанія—0,08 мм. Въ этой стадіи верхнія челюсти являются уже раздвинутыми настолько, что при смыканіи не соприкасаются вершинами, между которыми остается пространство равное почти ¹/₃ длины челюсти.

Сверхпаразиты.

Итакъ, личинки эникоспила и офіона паразитируютъ внутри гусеницъ и остаются въ нихъ до достиженія полнаго роста, послъ чего выходять изъ своихъ жертвъ-хозяевъ наружу и, скрываясь въ почвенномъ покровъ, начинаютъ жить, какъ самостоятельныя существа, изготовляя себъ коконы для дальнъйшихъ превращеній. Вотъ въ этотъ періодъ жизни онъ въ свою очередь дълаются жертвами-хозяевами новыхъ паразитовъ, которые постоянно скрываются въ томъ же почвенномъ покровъ, находятъ въ немъ коконы этихъ гусеничныхъ выселенцевъ и кладутъ въ нихъ свои яички. Тогда ходъ жизни въ коконъ ръзко видоизмъняется. Жизнь не прекращается въ немъ, но мѣняетъ форму. Строитель кокона, окончивши его, долженъ совершить свой послъдній личинковый долгъ, долженъ выпустить изъ себя изверженія и затъмъ окуклиться, но не всегда ему удается это сдълать. Часто случается, что на личинку въ коконъ черезъ проколъ, сдъланный въ его стънкъ враждебнымъ яйцекладомъ какого-нибудь сверхпаразита, откладывается яйцо, а въ самую личинку при этомъ дълается уколъ и впускается ядъ, парализующій ея движенія и пріостанавливающій ея развитіе. Черезъ 1—2 дня выдвигается изъ яйца головка новой личинки, открывается ея жадный алчущій ротъ и присасывается къ той, которая еще такъ недавно, затвъ чужую жизнь, достигла, казалось, вполнъ обезпеченнаго положенія и присоединилась, какъ равноправная, къ толпъ самостоятельно живущихъ существъ, чтобы преуспъть среди нихъ до конца. Но благополучіе ея на этотъ разъ оказывается эфемернымъ, такъ какъ жизнь ея въ коконъ начинаетъ угасать вслъдствіе того, что накопленные ею жизненные соки перекачиваетъ въ себя новое существо и строитъ изъ нихъ новую, совершенно чуждую прежней, форму новаго, но такого же въ сущности, какъ и она, паразита.

Гусеница ночницы, питавшаяся листьями или хвоей, переработала свою растительную пищу въ пласты жира и крови, изъ которыхъ долженъ построиться организмъ будущей бабочкиночницы. Но этого не случилось, потому что въ гусеницу было отложено эникоспиломъ яйцо, давшее паразитную личинку, которая поглотила матеріалы, заготовленные для построенія организма бабочки, и переработала ихъ въ матеріалъ, изъ котораго можетъ быть построенъ только организмъ эникоспила. Но и этого опять не случилось, такъ какъ тотъ же строительный матеріалъ снова поглощается и заново перерабатывается третьимъ существомъ, дающимъ ему опять иной составъ, который пригоденъ для постройки организма только микрокрипта или антракса или какогонибудь другого сверхпаразита.

Вотъ списокъ сверхпаразитовъ, которые были получены мною въ разное время изъ коконовъ эникоспила:

Plectocryptus arrogans Grav.*): 20. V. 94.—Вязниковское имѣніе и 2. XI. 94.—дача бр. Казѣевыхъ (Сызранскій у. Симбирской г.).

Microcryptus basizonus Grav.—2. III. 10. Куртамышское л-во. Hemiteles castaneus Taschb.—21. V. 94. Вязниковское им. Hemiteles (Theroscopus) inaequalis Först.—27. III. 10. Куртамышское л-во.

Dibrachys bucheanus Ratzb.—Куртамышское л-во.

Anthrax morio L.—29. IV. от. Изюмское л-во и 3. V. 10. Куртамышское л-во.

Anthrax maura L.—3. VII. 94. Вязниковское им. и 25. V. 01. Изюмское л-во.

Изъ коконовъ офіона быль полученъ мною только однажды, въ 1895 г., *Plectocryptus arrogans* Grav. изъ одного кокона, доставленнаго изъ Суводской дачи Вятской губ.

Всѣ перечисленные сверхпаразиты представляютъ собой наружныхъ паразитовъ, т. е. хотя они развиваются внутри кокона, но свою жертву-личинку высасываютъ снаружи, находясь на ней, а не въ ней. Всѣ они, за исключеніемъ дибрахиса, обитали въ коконахъ по одиночкѣ и каждый, за исключеніемъ антраксовъ, прогрызалъ

^{*)} Н. Р. Кокуевъ снабдиль видовое опредъление этого плэктокрипта примъчаниемъ: " =? commutatus R a t z b.; vel species distincta?".

для выхода изъ кокона близъ конца его особую круглую или неправильной формы дырочку, значительно меньшую, чъмъ выходное отверстіе хозяина, строителя кокона (рис. 46). Послѣдній, какъ мы знаемъ, отдъляетъ при выходъ изъ кокона совершенно правильную крышечку, секретъ открыванія которой ему извъстенъ, но паразитъ его не посвященъ въ этотъ секретъ и проламываетъ




Рис. 46. Коконъ эникоспила (Епіcospilus) послъ выхода изъ него гемитела. (Hemiteles inaequalis Увелич. въ 4 раза. Оригин.

выходъ для себя гдв попало. Мелкіе, почти микроскопическіе, дибрахисы паразитирують въ коконахъ цѣлыми обществами, и изъ одного кокона можетъ выйти ихъ нѣсколько десятковъ. Выходятъ они большей частью черезъ одно отверстіе, имѣющее величину булавочнаго прокола, но случается находить два и

три такихъ отверстія на одномъ коконъ (рис. 47).

Совсъмъ иначе дъйствуетъ при выходъ антраксъ. Этотъ паразитъ принадлежитъ не къ сем. на вздниковъ, какъ всъ прочіе изъ вышеперечисленныхъ, и даже не къ отряду пленчатокрылыхъ (Hymenoptera), къ которому они относятся, а принадлежитъ онъ къ отряду двукрылыхъ или мухъ (Diptera). Изъ кокона выходитъ обыкновенно не окрыленное насъкомое, т. е. муха-антраксъ, какъ это бываетъ у наъздниковъ, а куколка ея, которой пови-

димому хорошо извъстенъ секретъ хозяйскаго выхода, т. е. секретъ открыванія крышечки. Хозяинъ при выход впрогрызаетъ своими челюстями стѣнку кокона вдоль краевъ крышечки, но у куколки нътъ ротовыхъ частей, Рис. 47. Коконъ эникоспила (Епісокоторыми она могла бы подгрызть крышечку, взамънъ того она имъетъ на головъ два острыхъ и



spilus) нослъ выхода изъ него дибрахисовъ (Dibrachys). Увелич. въ 4 раза. Оригин.

твердыхъ шипа, которые при выход в изъ кокона исполняютъ работу челюстей на вздника (рис. 48). Она умъетъ, поворачиваясь въ коконъ, упираться и надавливать этими шипами въ его стънку вдоль мъста прикръпленія къ ней крышечки, чъмъ уничтожаетъ связь послъдней съ кокономъ, послъ чего крышечка отдъляется

и куколка выдвигается до половины или болъе того изъ кокона. Тогда на головъ и на спинъ куколки образуется трещина, черезъ которую выползаетъ муха-антраксъ со свернутыми крыльями, расправляющимися уже послѣ выхода. Пустая прозрачная оболочка куколки остается торчащей изъ кокона или лежитъ около него, какъ наглядное доказательство того, что изъ кокона вышелъ не хозяинъ, а паразитъ его - антраксъ.

Возможность отдъленія крышечки отъ кокона эникоспила при выход в антракса, при отсутствіи у послівдняго челюстей, которыми это отдъленіе могло бы быть совершено, подкръпляетъ высказанное

нами раньше предположение о томъ, что крышечка на коконъ эникоспила предуготована уже личинкой эникоспила при его постройкъ и только прикреплена къ нему настолько непрочно, что работы острыхъ шиповъ куколки сверхпаразита достаточно для ея отдъленія. Спрашивается: а если бы антраксъ попалъ въ коконъ офіона,



Рис. 48. Куколка антракса (Anthrax), выдвинувшаяся изъ кокона эникоспила (Епісоspilus). Увелич. въ 3 раза. Оригин.

гдъ предуготованной крышечки согласно нашимъ разсужденіямъ не полагается, сумълъ ли бы онъ выйти оттуда? На этотъ вопросъ ничего не могу отвътить, такъ какъ получалъ антраксовъ только изъ коконовъ эникоспила. Что это были коконы эникоспила, а не офіона, я судилъ прежде всего по наличности крышечки. Но, можетъ быть, антраксъ сумълъ бы продълать такую же крышечку и въ коконъ офіона? Въ такомъ случаъ наличность ея еще не можетъ дать точнаго указанія на природу хозяина. Надо поискать болъе надежнаго доказательства. Оно есть и заключено внутри кокона.

Всъ вышеперечисленные сверхпаразиты, какъ наъздники, такъ и антраксы, оставляють въ коконахъ по выход изъ нихъ трупы или, върнъе сказать, пустыя высосанныя шкурки своихъ жертвъ, т. е. личинокъ эникоспила или офіона, смотря по тому, изъ чьихъ коконовъ они вышли. Мы уже знаемъ, что взрослую личинку офіона можно легко отличить отъ такой же личинки эникоспила

по ихъ верхнимъ челюстямъ. Стало-быть, мы можемъ въ сомнительномъ случать добыть изъ кокона остатки жертвы и, осмотрѣвъ ея верхнія челюсти, дадимъ точный отвѣтъ. Такой сомнительный случай представилъ собою одинъ коконъ изъ Вязниковскаго имънія, давшій антракса. Изъ коконовъ этого имънія у меня вышли, какъ было сказано, и офіоны и эникоспилы, между тъмъ какъ изъ коконовъ всъхъ прочихъ сборовъ выходили только эникоспилы, слъдовательно, въ первомъ случаъ были одинаковые шансы въ пользу принадлежности кокона, давшаго антракса, какъ тому, такъ и другому наъзднику, а въ остальныхъ большинство шансовъ было на сторонъ принадлежности ихъ эникоспиламъ, но все-таки не всѣ шансы, ибо случайныя исключенія могли быть и туть. Въ виду этого я кипячу сомнительные коконы въ растворъ ъдкаго кали, гдъ они растворяются вполнъ, и на размягченныхъ остаткахъ хозяйской личинки нахожу верхнія челюсти, крючковидно изогнутыя вершины которыхъ сразу доказываютъ, что здъсь жертвами были личинки эникоспила.

Этимъ же способомъ рѣшается вопросъ о хозяинъ и въ случаяхъ, когда изъ коконовъ вышли наъздники, продълавшіе для выхода особыя, неправильной формы или круглыя отверстія. Мы знаемъ, что коконы нашихъ обоихъ наъздниковъ неотличимы, пока изъ нихъ не вышли хозяева, которые своимъ способомъ выхода-правильной, отвъсной, крышечкой или наклоннымъ, съ зазубренными краями, отверствіемъ — покажутъ, вышелъ ли отсюда эникоспилъ или офіонъ. Изъ кокона, однако, вышелъ сверхпаразитный наъздникъ, черезъ особое отверстіе, а хозяинъ не вышелъ и никогда не выйдетъ, стало быть, о способъ его выхода у насъ нѣтъ и не будетъ возможности судить. Осмотръ верхнихъ челюстей на остаткахъ заключенной въ коконъ хозяйской личинки ръшаетъ вопросъ и въ этомъ случаъ. Только въ одномъ изъ бывшихъ у меня коконовъ, давшемъ плэктокрипта (изъ Вязниковскаго имфнія), я нашель на остаткахъ хозяйской личинки слабо согнутыя острыя челюсти офіона, а во всъхъ остальныхъ были найдены крючковидно согнутыя у вершинъ, притупленныя челюсти эникоспила.

Обзоръ литературы.

Въ этомъ отдълъ мнъ придется говорить только о взрослыхъ наъздникахъ, такъ какъ превращенія эникоспила и офіона, т. е. ихъ яички и личинки, никъмъ до сихъ поръ не были описаны 1). Можно найти изображенія и описанія только ихъ коконовъ и указанія хозяевъ, на счетъ которыхъ личинки развивались. но указанія эти въ большинствъ случаевъ не достовърны вслъдствіе неправильнаго наименованія, особенно старыми авторами, панисковъ офіонами и обратно. Многіе, говоря о наружныхъ паразитахъ, т. е., какъ мы теперь знаемъ, о панискахъ, называютъ ихъ офіонами, а другіе, имъя въ виду внутренностныхъ паразитовъ, т. е. офіоновъ и эникоспиловъ, называютъ панисковъ. Такъ поступилъ въ своемъ извъстномъ каталогъ пленчатокрылыхъ насъкомыхъ Далла Торре, отнеся показанія ніжоторых старых авторовь, напримітрь Реомюра, къ панискамъ (P. testaceus Grav.), между тымъ какъ Реомюръ (43, 80 и 103) имълъ дъло въ дъйствительности съ эникоспиломъ или съ офіономъ, о чемъ безошибочно можно судить по данному имъ изображенію и описанію кокона того на вздника, о которомъ онъ дълаетъ сообщение, называя его ихневмоломъ (Ichneumon), подъ именемъ котораго онъ объединяль тогда, какъ и Линней позднъе, всъхъ наъздниковъ; показанія же Дегеера (12, 169 и 358), отнесенныя Далла Торре къ офіонамъ, относятся въ дъйствительности къ панискамъ, что вполнъ подтверждается, какъ это было нами показано въ главъ о панискахъ, рисунками и текстомъ Дегеера, гдъ изображены и описаны на вздникъ, им вющій выдающееся сверло, его личинка, паразитирующая снаружи, и сброшенныя ею на гусеницу шкурки и его коконы.

Замѣчательно, что эта путаница панисковъ съ офіонами возникла въ литературѣ одновременно съ установленіемъ и описаніемъ этихъ родовъ и первыхъ ихъ видовъ и введена самими же ихъ творцами. Старѣйшій изъ трехъ разсматриваемыхъ нами родовъ, офіонъ (Ophion), былъ установленъ въ 1798 году ученикомъ Линнея—Фабриціемъ (16, 210). Къ этому роду Фабрицій отнесъ тогда видъ, уже описанный Линнеемъ подъназваніемъ желтаго наѣздника (Ichneumon luteus), и, кромѣ того, привелъ списокъ другихъ авторовъ, писавшихъ объ этомъ же, какъ полагалъ Фабрицій, видѣ. Въ числѣ этихъ авторовъ находится Гэдартъ, но если мы возьмемъ указанную имъ работу Гэдарта (19, tb. 37), опубликованную въ 1667 году,

¹⁾ Объ измышленіяхъ, опубликованныхъ по этому поводу въ нашей прикладной энтомологіи, даны мною разъясненія въ моемъ отзывѣ: "По поводу одной сельскохозяйственной монографіи" (74, 414).

то найдемъ въ ней изображение кучки коконовъ паниска на гусеницъ вилохвоста (Нагруја), а ниже изображенъ и самый наѣздникъ, имѣющій, хотя и короткій, но выдающійся яйцекладъ, свойственный не офіонамъ, а панискамъ. Далъе, Линней, описавшій впервые въ 1746 году, въ первомъ изданіи своей «Шведской Фауны» (27, 293 и 407), желтаго на вздника (Ichneumon luteus), называемаго энтомологами со временъ Фабриція Ophion luteus, также указываеть Гэдарта въ числъ авторовъ, писавщихъ объ этомъ видѣ, и по этой, вѣроятно, причинѣ во второмъ изданіи той же фауны, въ 1761 г., снабдилъ его описаніе дополненіемъ: «Habitat in larvis. Larva hujus adhaeret larvae Phalenae et conscumit», что въ переводѣ, употребляя нашу терминологію, обозначаетъ: «Живетъ въ гусеницахъ. Личинка его прикръплена къ гусеницъ бабочки и ею питается». Первая часть этой фразы, до точки, какъ намъ теперь ясно, совершенно правильна и вполнъ подходитъ къ офіонамъ-внутренностнымъ паразитамъ, но во второй части фразы говорится уже о наружныхъ паразитахъ, слъдовательно, не объ офіонахъ, а о панискахъ. Такимъ образомъ уже Линней и Фабрицій положили начало смъщенія въ одномъ видъ представителей совершенно различныхъ родовъ.

Впервые имя панисковъ, какъ родовое названіе (Paniscus), мы находимъ у Шранка въ 1802 г., въ его «Баварской Фаунъ» (49, 316 и 362), гдъ онъ указываетъ на желательность выдъленія нъкоторыхъ видовъ линнеевскаго рода ихневмонъ (Ichneumon) въ особые роды, названія которыхъ и характеристики тутъ же имъ приводятся. Въ числъ этихъ видовъ онъ называетъ и желтаго ихневмона (Ichneumon luteus), выдъляемаго имъ въ особый родъ панисковъ (Paniscus). Затъмъ, Шранкъ пытается охарактеризовать этотъ новый родъ, но даетъ весьма недостаточные признаки, ничъмъ не отличающие его отъ предложеннаго уже Фабриціемъ рода офіонъ (Ophion), для установленія котораго, какъ только что было показано, Фабирцій воспользовался тымь же линнеевскимь желтымь ихневмономь (1chneumon luteus). Потомъ Шранкъ поясняетъ, что этотъ видъ живетъ «въ гусеницахъ» и черезъ нѣсколько строкъ добавляетъ (49, 263), что «яички его черныя, а личинки живутъ снаружи на гусеницахъ, которыхъ высасываютъ. Но, можетъ быть, эти яички, говоритъ онъ далѣе, которыхъ я самъ не наблюдалъ, принадлежатъ слѣдующему виду». Слѣдующій же видъ у него—Ichneumon ramidulus, т. е. нашъ эникоспилъ.

Отсюда ясно, что при такихъ условіяхъ вновь установленный Шранкомъ родъ панисковъ явился совершенно равнозначущимъ уже установленному Фабриціемъ роду офіоновъ и что изъ предъловъ этихъ родовъ не удалось въ то время выдълить въ особый родъ тъ ихъ виды, которые, будучи личинками, паразитируютъ снаружи, а въ окрыленномъ состояніи обладають ясно выдающимся на концъ брюшка, хотя иногда очень короткимъ, сверломъ, на переднихъ же крыльяхъ имъютъ добавочную треугольную ячейку (areola). Только Гравенгорстъ выдвинулъ два последние признака, какъ харктерные для панисковъ, и морфологически совершенно правильно отдълилъ ихъ отъ тъхъ линнеевскихъ видовъ ихневмона, которыхъ Фабрицій и Шранкъ на основаніи свойственнаго этимъ видамъ серповиднаго, сильно сжатаго съ боковъ, брюшка (свойственнаго также и панискамъ) желали тоже выдълить въ одинъ новый родъ, только названный ими, какъ мы видъли, различно. Это раздѣленіе Гравенгорста вполнѣ совпало, какъ показаль потомъ впервые Гартигъ, со свойствомъ панисковъ прикрѣплять на гусеницъ стебельчатыя яички съ жесткой бурой скорлупою и съ наружнымъ паразитизмомъ ихъ личинокъ, что, какъ теперь достаточно выяснено, не свойственно внутреннимъ паразитамъ-офіону и эникоспилу, какъ не свойственны имъ добавочная ячейка на крыльяхъ и выдающійся яйцекладъ на концѣ брюшка. Однако, раздѣливъ столь ясно на основаніи признаковъ систематики взрослыя формы, тотъ же Гравенгорстъ немедленно впалъ, какъ будетъ сейчасъ показано, въ сугубое заблужденіе при разд'яленіи тъхъ же формъ по ихъ біологическимъ особенностямъ.

Итакъ, первые изслѣдователи, творцы систематики насѣкомыхъ, не довольствуясь при описаніи ихъ только морфологическими признаками, взятыми отъ наружнаго строенія, пробовали характеризовать описываемыхъ ими наѣздниковъ біологическими особенностями, т. е. признаками, заимствованными отъ особенностей образа жизни личинокъ, тѣмъ, что позднѣйшій систематикъ европейскихъ наѣздниковъ, Гравенгорстъ, назвалъ: «оесопотіа larvarum». Однако, въ данномъ случаѣ попытку эту приходится считать неудачной, какъ по отношенію къ старымъ авторамъ, такъ и относительно только что названнаго Гравен-

горста, который не только не разобрался въ создавшейся, путаницѣ, но закрѣпилъ ее своимъ авторитетомъ въ составленной имъ «Европейской Ихневмонологіи».

Въ третьемъ томъ этого монументальнаго труда, вышедшемъ въ 1829 г., онъ даетъ подробное описаніе желтаго офіона (Ophion luteus) и затъмъ прибавляетъ (21, 628, 693 и 696): «Одного я самъ воспиталъ: личинка жила въ гусеницѣ ночницы (Noctua praecocis). Послъ того, какъ гусеница приготовила себъ коконъ, собираясь окукливаться, личинка вышла изъ ея тъла наружу и сдълала внутри ея кокона собственный коконъ» 1). Это вполнъ согласно съ тъмъ, что мы знаемъ объ офіонахъ. Потомъ, однако, сравнивая описаннаго имъ раньше (21, 628), какъ новый видъ, рыжаго паниска (Paniscus testaceus Grav.) съ офіономъ, Гравенгорстъ дълаетъ слѣдующее замѣчаніе (21,696): «На основаніи описаній желтаго ихневмона (Ichneumonis lutei), данныхъ многими авторами, чрезвычайно трудно ръшить, описывали ли они нашего желтаго офіона. (Ophionem luteum) или же нашего рыжаго паниска (Paniscum testaceum)» и далье: «Я признаю настоящимъ желтымъ ихневмономъ разныхъ авторовъ или нашимъ желтымъ офіономъ тотъ видъ» «личинки котораго живутъ на внѣшней поверхности тъла гусеницы вилохвоста (а также, въроятно, и другихъ безволосыхъ или волосатыхъ гусеницъ). Поэтому ихневмоны, о которыхъ говорять Гэдартъ, Альбинъ, Дегееръ, Линней, Шранкъ, Скополи и Кристъ, должны быть, безъ сомнънія, отнесены къ желтому офіону (Ophionem luteum), такъ какъ нравы личинокъ ихъ («oeconomia larvarum») соотвѣтствуютъ этому виду. Но ихневмона, котораго описалъ Реомюръ въ своемъ VI томъ» «такъ какъ нравы личинокъ его далеко отклоняются отъ нашего желтаго офіона» «я предпочитаю отнести къ моему рыжему паниску (Paniscum testaceum). Относительно ихневмоновъ прочихъ авторовъ, отнесенныхъ мною къ желтому офіону, не всё мои сомнёнія до сихъ поръ разсёялись» 1).

Здѣсь повторяется то же, что было отмѣчено нами раньше относительно характеристики Линнея: сначала дѣло идетъ о внутренностномъ паразитѣ и его Гравенгорстъ называетъ офіономъ, а потомъ совершенно незамѣтнымъ образомъ офіоны превращаются въ паразитовъ, которые «живутъ на внѣшней поверхности тѣла гусеницы». Изъ того, что было раньше сказано о наблюденіяхъ Реомюра, Линнея, Дегеера, Альбина (2, tb. 11), который тоже имѣлъ дѣло съ наружными паразитами, и Гедарта, ясно, что Гравенгорстъ въ своемъ раздѣленіи ихневмоновъ старыхъ авторовъ впалъ въ заблужденіе, но авторитетъ Гравенгорста, превосходнаго систематика и точнаго описателя многочисленныхъ новыхъ видовъ и родовъ наѣздниковъ, былъ настолько великъ, что новѣйшій составитель каталога этихъ насѣкомыхъ, Далла Торре, принялъ безъ критики его дѣленіе и ввелъ въ свой каталогъ ту же ошибку.

Слѣдствіемъ такого положенія дѣлъ явилось отсутствіе въ литературѣ достовѣрнаго списка хозяевъ, или жертвъ, занимающихъ насъ наѣздниковъ, ибо наиболѣе полные ихъ списки, напечатанные въ каталогѣ Далла Торре, для офіона и для паниска не могутъ быть признаны по вышеуказаннымъ причинамъ за достовѣрные. Слѣдуетъ замѣтить, впрочемъ, что новѣйшіе наблюдатели, работавшіе послѣ Гартига и Рацебурга, каковы наприм. у германцевъ — Бришке, у англичанъ — Бриджменъ и

^{1) &}quot;Ipse unam educavi: larva nempe degebat in larva noctuae praecocis. Postquam haec sibi folliculum, ad mutationem subeundam, paraverat, autumno anni 1819, illa ex ejus corpore prorumpebat et in ipso praecocis folliculo sibi folliculum parabat"... "tum in pupam transmutabatur, initio Aprilis anni sequentis Ophion perfectus prodibat".

^{2) &}quot;Difficillimum est, e descriptionibus Ichneumonis lutei plurimorum auctorum eruere, num nostrum Ophionem luteum, numve nostrum Paniscum

testaceum descripserint, cum magnitudo, color et, primo adspectu, ipsa forma corporis et proportio artuum ambarum specierum conveniant. Pro vero Ichneum. luteo auct. seu nostro Ophione luteo, eam speciem agnosco, cui areola alarum deest, ungues autem subtus pectinati sunt 1), cujusque larvae in superficie externa corporis larvae Bombycis vinulae (forsan quoque aliarum Iarvarum nudarum haud pilis vestitarum) degunt. Inde sine dubio Ichneumones allegati Goedarti, Albini, Degeeri (oculatissimi, qui etiam ungues pectinatos, nostris Ophionibus peculiares, descripsit et delineavit), Linnei, Schrankii, Scopolii et Christii, ad Ophionem luteum adhibendi sunt, cum oeconomia larvarum hujus speciei respondeat. Ichneumonem Reaumurii autem in tomo VI, pag. 310, descriptum, nec non Ichn. luteum Rossii et Scharfenbergi, oeconomia larvarum longe a nostro Ophione luteo discedentis, et Ichneum. luteum Jurinei, areola alarum distincta, ad meum Paniscum testaceum adhibere malui. De Ichneumonibus reliquorum auctorum, quos ad Ophionem luteum adhibui, nondum omnia dubia sublata sunt".

¹⁾ Необходимо замѣтить, что гребенчато-зазубренными коготками обладають представители всѣхъ трехъ родовъ, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, т. е. Paniscus, Ophion и Enicospilus.

Фитчъ, у французовъ—Дурсъ и Жиро, также новъйшіе итальянцы (только не Рондани (46 и 47), компилятивные списки котораго пестрятъ ошибочными указаніями) уже не впадали или значительно ръже впадали въ эту ошибку, почему на основаніи ихъ показаній можно бы составить болье или менъе достовърные списки хозяевъ. Однако и здъсь имъется слъдующій, не всегда устранимый новый источникъ ошибокъ.

Когда у наблюдателя коконируются свътло окрашенныя собранныя имъ гусеницы, то на нихъ легко замътить темныя яички панисковъ, если таковыя на нихъ отложены, но на темно окрашенныхъ гусеницахъ, а въ особенности на волосатыхъ, эти крошечныя яички очень легко могутъ остаться незамъченными и въ такомъ случать условія для ошибочнаго заключенія готовы. Коконировалась гусеница, на которой внѣшняго паразита не было замѣчено, а изъ кокона вышелъ впослъдствіи наъздникъ, слъдовательно, личинка этого на вздника паразитировала внутри гусеницы. Стало быть, этотъ наъздникъ, хотя бы онъ быль и панискомъ, можетъ быть принятъ за внутренностнаго паразита, если наблюдатель не изслѣдуетъ содержимаго кокона, изъ котораго наѣздникъ вышелъ, при чемъ въ случав выхода паниска на трупв гусеницы въ коконъ будутъ найдены шкурки, сброшенныя его личинкой, и бурочерное яичко, а послъ выхода эникоспила или офіона въ кокон' будетъ лежать только пустая оболочка гусеницы. Но такія изслѣдованія дѣлали очень немногіе наблюдатели.

Итакъ, составленіе достовърнаго списка хозяевъ нашихъ трехъ на-вздниковъ на основаніи существующихъ литературныхъ данныхъ потребовало бы очень много времени и труда, необходимыхъ для вышеуказанной критической оцънки этихъ данныхъ, а потому эта работа, какъ работа спеціальнаго изслъдованія общирной литературы, восходящей до XVII стольтія (G ö d a r t u s), должна быть исполнена особо, впослъдствіи, чтобы не задерживать изложенія наблюденій, составляющихъ главный предметъ настоящей работы.

Сдѣлаю только общее замѣчаніе о хозяевахъ: безволосыя гусеницы ночницъ (Noctuidae), хохлатокъ (Notodontidae) и пяденицъ (Geometridae), по показаніямъ значительнаго большинства наблюдателей, преимущественно являются жертвами паниска, эникоспила и офіона, названія же волосатыхъ гусеницъ, наприм. шелкопрядовъ (Bombycidae), приводятся сравнительно немногими наблюдателями.

Основныя отличія.

Сравнимъ итоги того, что мы нашли въ разсмотрѣнной литературъ и что дали намъ собственныя наблюденія относительно трехъ занимавшихъ насъ до сихъ поръ наъздниковъ, которыхъ такъ долго и столь многіе смѣшивали другъ съ другомъ, и подчеркнемъ еще разъ намъченныя выше основныя, наиболъе яркія между ними отличія, какъ въ образъ жизни, такъ и во внъшнемъ строеніи. Присутствіе на переднихъ крыльяхъ дополнительной клѣточки – а реолы и на концѣ брюшка – выдающагося яйцеклада, иногда очень короткаго, но всегда явственно зам'тнаго, характерно для панисковъ, ибо, какъ эникоспилъ, такъ и офіонъ, этой дополнительной клѣточки не имѣютъ и яйцеклады ихъ въ спокойномъ состояніи совершенно скрыты и не замътны. Только раздраженныя самки последнихъ, при уколе или при кладкъ, выдвигаютъ свои яйцеклады наружу и дълаютъ ихъ видимыми. Далъе, по наличности двухъ бурыхъ пятнышекъ въ большой срединной клѣточкѣ передняго крыла (стр. 143 рис. 40) легко отличить эникоспила отъ офіона, у котораго въ этой клѣточкъ нътъ никакихъ пятнышекъ.

Относительно способовъ кладки яицъ и паразитизма паниски еще болѣе рѣзко отличаются отъ своихъ двухъ собратьевъ. Они яйцеживородящи, несутъ стебельчатыя, двустворчатыя яички съ прочною бурой или чернобурой скорлупой, защищающей личинку отъ опасностей и отъ высыханія, и прикрѣпляютъ ихъ снаружи на кожу гусеницы, гдѣ личинки остаются въ теченіе всей жизни, высасывая жертву снаружи черезъ кожу, на которой не причиняютъ видимыхъ простымъ глазомъ пораненій. Эникоспилъ и офіонъ несутъ бѣлыя колбасковидныя яички, съ очень тонкою, нѣжной и прозрачной скорлупой, откладываютъ ихъ во влажную среду внутренностей гусеницы и здѣсь, т. е. внутри жертвы, вылупившаяся личинка проходитъ всѣ стадіи своего развитія вплоть до 5-й, когда она выходитъ изъ тѣла жертвы, прорывая ея шкурку, и коконируется, будучи внѣ гусеницы.

Личинки панисковъ легко отличаются отъ личинокъ офіона съ эникоспиломъ, помимо данныхъ при подробномъ ихъ описаніи признаковъ, уже благодаря наружному положенію панисковъ и внутренностному вторыхъ, а въ 5-й стадіи, когда всѣ личинки

находятся внѣ жертвы, онѣ легко различаются по указаннымъ раньше общей формѣ тѣла и строенію ротовыхъ частей и органовъ дыханія. Менѣе наглядны признаки отличія личинокъ офіона отъ эникоспила, но и здѣсь они существуютъ, хотя для обнаруженія ихъ требуется микроскопъ, при помощи котораго были найдены нами и указаны въ своемъ мѣстѣ эти признаки, особенно для начальнаго и конечнаго возрастовъ этихъ личинокъ.

Коконы, изготовляемые личинками нашихъ трехъ на вздниковъ, особенно коконы паниска, при сравненіи съ коконами офіона и эникоспила, отличаются очень наглядно. У паниска конусовидно суживающійся къ концамъ коконъ состоитъ, хотя изъ прочной, но тонкой и снаружи рыхлой, жестковолокнистой ткани чернаго или буровато- или съровато-чернаго цвъта, окруженный немногочисленными отстающими волокнами тонкой пряжи. Съ внутренней стороны ткань кокона блестящая и у нъкоторыхъ видовъ распадается на 2-3 тонкихъ слоя. Неръдко случается находить въ одномъ коконъ бабочки нъсколько коконовъ паниска, которые въ такомъ случат соединяются нитями рѣдкой пряжи и, надавливая другъ на друга, принимаютъ многогранную форму. Коконы офіоновъ и эникоспиловъ встрѣчаются въ коконахъ бабочекъ только по одиночкъ и самый коконъ ихъ закругленъ на концахъ, состоитъ изъ совершенно плотной, очень прочной, не раздѣляющейся на отдѣльныя волокна, но очень многослойной ткани, снаружи матоваго, съ очень слабымъ отблескомъ, бронзово-бураго цвъта, часто съ широкимъ съроватымъ поясомъ, а внутренніе слои блестящіе, смоляно-черные и очень многочисленные и тонкіе.

Способы открыванія коконовъ тоже различны: паниски отрѣзываютъ спиральныя ленты на концахъ своихъ тонкостѣнныхъ коконовъ, эникоспилъ открываетъ ихъ отвѣсной крышечкой, а офіонъ дѣлаетъ косой проломъ на концѣ кокона, безпорядочно измельчая своими челюстями его стѣнку. Личинки офіона и эникоспила выходятъ изъ гусеницъ, повидимому, раньше, чѣмъ послѣднія приступаютъ къ постройкѣ своихъ коконовъ, а потому коконы этихъ двухъ наѣздниковъ лежатъ обыкновенно открыто въ почвенномъ покровѣ и на поверхности почвы, между тѣмъ какъ коконы панисковъ на волѣ обыкнозаключены въ коконы, построенные гусеницами, которыхъ покинули личинки панисковъ.

Вотъ главнъйшіе признаки, являющіеся необходимой опорой для названія, которое мы должны дать тому или другому изъ трехъ разсмотрънныхъ наъздниковъ при наблюденіи ихъ въ каждой стадіи развитія. Существуетъ ли какое-нибудь различіе между тремя этими наъздниками при выборъ хозяевъ, т. е. даетъ ли кто-нибудь изъ нихъ предпочтеніе гусеницамъ опредъленныхъ родовъ или семействъ бабочекъ, сравнительно съ двумя другими своими собратьями, этого пока я не имълъ возможности замътить.

3. Ихневмонъ и Амблитэлъ.

Поъздка въ чемоданъ.

Въ іюнъ 1910 года мнъ надо было переъхать изъ сосновыхъ лъсовъ Харьковской губ., куда привлекла меня борьба съ сосновымъ шелкопрядомъ, въ еловые лѣса Нижегородской губ., гдѣ было организовано истребленіе еловаго коро да. Представлялся прекрасный случай за хать по дорог въ Тулу на вновь открытую энтомологическую станцію, посфтить которую приглашалъ меня завъдывающій ею А. А. Сопоцько, объщая собрать ко времени моего прітада живыхъ натадниковъ, названія которыхъ поставлены въ началѣ настоящей главы, и предоставить ихъ въ мое полное распоряжение. Соблазнъ былъ великъ, да и поъзда располагались такъ удобно, что можно было утромъ пріфхать въ Тулу, а въ серединъ дня продолжать путь на Нижній, захвативъ съ собою желанныхъ шестиногихъ спутниковъ. Такъ и было сдълано. Къ сожаленію, наканунъ моего пріъзда А. А. Со поцько былъ вызванъ телеграммой по неотложному дѣлу въ уѣздъ и мнъ пришлось посътить энтомологическую станцію въ его отсутствіи. Предпріятію нашему это, однако, нисколько не повредило, такъ какъ на станціи были оставлены соотвътствующія распоряженія и двери ея гостепріимно открылись передо мною. Здѣсь я нашелъ 16 іюня двухъ самокъ и одного самца амблитэла (Рис. 49), заключенныхъ въ общемъ садкъ, и трехъ самокъ и одного самца ихневмона (Рис. 57 и 58), ползавшихъ по одиночкъ подъ особыми стаканчиками, гдъ находились и куколки озимой ночницы, изъ которыхъ они вывелись.

Въ противоположность тѣмъ тремъ наѣздникамъ, которые до сихъ поръ занимали насъ, этимъ свойственно широкое, постепенно суживающееся къ заднему концу, слегка сжатое сверху и снизу, брюшко, 1-й членикъ котораго, прикрѣпляющій брюшко къ туловищу, суженъ въ тонкій стебелекъ. Яйцекладъ, находя-



Puc. 49. Амблитэлъ (Amblyteles vadatorius III). Увелич. около 11/2 раза. По Snellen v. Vollenhoven.

щійся на концѣ брюшка снизу, очень короткій и при спокойномъ состояніи самки не замътенъ, но при кладкъ онъ явственно выступаетъ, отдъляясь отъ вершины брюшка (Рис. 50). Какъ въ общей формъ тъла, такъ и въ окраскъ обоихъ навздниковъ замътно значительное сходство. У самокъ нашихъ обоихъ видовъ тѣло черное, съ желтокрасными ножками и 2-мъ и 3-мъ члениками брюшка, но основныя части ногъ (соха и trochanter), а также вершины бедра и голени на заднихъ ножкахъ и, наконецъ, у амблитэла лапки заднихъ ногъ черныя. Треугольный щитокъ

на среднеспинк (scutellum) желтовато-б влый и такое же пятнышко у ихневмона при основаніи передняго крыла сбоку. Основаніе

3-го членика брюшка у обоихъ черное; задній край 6-го членика, а у амблитэла и 7-го, бѣлый. На усикахъ замѣтно грязновато-бѣлое широкое кольцо. Самцы болѣе разнятся другъ отъ друга, чѣмъ самки. У самцовъ нашего вида ихневмона задніе края 2-го, 3-го, иногда 4-го, а также 5-го и 6-го, желтые и такія же пятнышки у задняго края 1-го членика брюшка; наконецъ, основной членикъ усиковъ съ передней стороны и все лицо, за исключеніемъ середины, желтовато-красные. У самцовъ амблитэла задніе края 4-го,



Рис. 50. Брюшко самки ихневмона. На пъвомъ концъ виденъ направленный внизъ яйцекладъ.Слабо увелич. По Snellen v. Vollenhoven.

5-го, 6 го и 7-го члениковъ брюшка сверху желтые; усики желтовато-красные кругомъ, но вершины ихъ черные; на лицѣ желтая продольная полоса около глаза; заднія лапки темно-красныя. Въ остальномъ окраска самцовъ обоихъ видовъ такая же какъ у самокъ.

Самки обоихъ на вздниковъ были перемъщены мною въ цилиндрическій садокъ, сдъланный изъ тонкой проволоки, а самцы въ другой такой же, и оба уложены въ чемоданъ среди бълья, послъ чего мы тронулись въ дальнъйшій путь. Передъ вечеромъ, приступая къ объду въ Москвъ на нижегородскомъ вокзалъ, я вспомнилъ о своихъ спутникахъ, извлекъ ихъ изъ чемодана и, снявъ дно у каждаго садка, поставилъ ихъ на блюдечки съ нъсколькими каплями сахарнаго сиропа. Такимъ образомъ мы вмъстъ пообъдали: я—тъмъ, что мнъ подавалъ офиціантъ, а спутники мои—сладкимъ растворомъ, послъ чего садки были вновь закрыты и уложены въ чемоданъ.

На другой день, по прибытіи въ Нижній, я узналъ, что мнъ придется совершить потздку на лошадяхъ по двумъ лъсничествамъ не менъе какъ на три дня. Предстоящее путешествіе по тряскимъ лъснымъ дорогамъ, въ тряскомъ нерессорномъ тарантасъ заставило меня выразить опасеніе за благополучный исходъ этой поъздки для моихъ шестиногихъ спутниковъ, на что чрезвычайно гостепріимная супруга ревизора, съ которымъ я долженъ былъ фхать, М. А. Калягина, отвътила предложениемъ оставить ихъ въ Нижнемъ на ея попеченіи. Предложеніе было принято съ восторгомъ и въ тотъ же день наъздники были перевезены изъ гостиницы къ гостепріимной хозяйкъ и размъщены у нея подъ опрокинутыми стаканчиками на блюдечкахъ, причемъ я далъ наставление и показалъ, какъ нужно кормить ихъ по одному разу въ день. Въ теченіе слъдующихъ трехъ дней мы посътили еловые лѣса двухъ лѣсничествъ, гдѣ имѣли возможность полюбоваться истинно-иродовымъ избіеніемъ корофдныхъ выводковъ, которое было организовано мъстными лъсничими, и, одобривъ всъ ихъ дъйствія, вернулись въ Нижній. Наъздники были найдены вполнъ благополучными. Пришлось, однако, еще разъ покинуть ихъ въ любезно пріютившей ихъ семь для новой по вздки по тремъ сосновымъ лъсничествамъ, продолжавшейся тоже три дня. Послъ этой поъздки тульскіе гости, найденные снова вполнъ благополучными, были водворены въ ихъ садки, уложены въ чемоданъ и снова отправились со мною въ дорогу.

Дальнъйшій нашъ путь лежалъ по Волгъ до Ярославля, гдъ я сдълалъ остановку на одинъ день, чтобы представить своихъ спутниковъ Н. Р. Кокуеву и получить отъ него ихъ точныя названія. Оказалось, что привезенные мною амблитэлы уже извъстны въ наукъ и описаны подъ названіемъ Amblyteles vada-

torius III., а ихневмоны — Ichneumon sarcitorius L. Поблагодаривъ привътливо принявшаго насъ ярославскаго знатока нашихъ пленчатокрылыхъ насъкомыхъ, мы водворились вечеромъ въ послъдній разъ въ вагонъ и направилисъ прямо въ Петербургъ, въ лабораторію, куда благополучно прибыли 27 іюня.

Предстояло организовать наблюденія надъ кладкою яицъ вновь прибывшими, но для этого нужны были гусеницы, а гусеницъ-то въ лабораторіи и не было. Оба вида привезенныхъ натадниковъ вывелись, какъ было сказано, изъ куколокъ, но развитіе ихъ началось еще въ гусеницахъ, такъ какъ въ гусеницъ были отложены яички ихъ матерями. Это наблюдение было установлено другими учеными, работавшими раньше меня, и ясно выражено въ книгъ извъстнаго знатока систематики наъздниковъ отдъла ихневмоновъ (Ichneumonini) Бертумье, на котораго мнъ уже приходилось ссылаться, хотя и съ указаніемъ на ошибочность нъкоторыхъ его взглядовъ на личинокъ. Къ сожалънію, и на этотъ разъ я долженъ буду отчасти опровергнуть біологическія показанія этого знатока систематики, ибо онъ говоритъ, что ихневмоны кладутъ яички исключительно на гусеницъ (4, 255). Позднъйшія наблюденія мои, сдъланныя надъ другими видами ихневмона, даютъ мнѣ право сказать, что какъ общее положеніе, мнъніе Бертумье неправильно, ибо я могу указать и такіе виды рода ихневмонъ (Ichneumon), которые кладутъ яички въ куколокъ, а не въ гусеницъ (напр. Ichneumon nigritarius Grav., кладущій въ куколокъ сосновой пяденицы—Bupalus piniarius), но лътомъ 1910 г. это еще не было мнъ извъстно и потому я придерживался въ данномъ отношении взгляда Бертумье и употребилъ всъ усилія, чтобы раздобыть для своихъ наъздниковъ гусеницъ.

По причинамъ, о которыхъ я уже говорилъ раньше, держать въ лабораторіи гусеницъ постоянно не возможно, ибо слишкомъ трудно добывать для нихъ кормъ, но содержать ихъ въ теченіе короткаго времени вполнѣ возможно, особенно тѣхъ, которыхъ можно продовольствовать кормомъ, купленнымъ въ ближайшей зеленной лавочкѣ. Гусеницы озимой ночницы охотно ѣдятъ салатъ, запасы котораго въ лавочкѣ ежедневно возобновляются, стало быть, для нихъ источникъ питанія обезпеченъ. Надо только раздобыть гусеницъ. Въ Тулѣ не удалось получить ихъ, потому что въ то время, какъ мнѣ объяснили на мѣстѣ, онѣ всѣ превратились въ куколокъ и въ бабочекъ и послѣднія

летали по полямъ и откладывали новыя яички, давая начало новому поколѣнію. Позднѣе, когда новыя гусеницы подрастутъ, мнѣ обѣщали ихъ выслать оттуда, но теперь надо было добывать гусеницъ откуда-нибудь изъ другаго мѣста.

Я зналъ, что лѣтомъ предыдущаго 1909 года препараторша Зоологическаго Музея И. Академіи Наукъ, Э. Ө. Мирамъ, производила наблюденія на энтомологической станціи въ Смълъ (Кіевской губ.) надъ гусеницами ночницъ, опустошавшими свекловичныя плантаціи. Я вспомниль объ этомъ въ тотъ же день, какъ прівхалъ съ навздниками въ лабораторію, и обратился по телефону къ Э. Ө. Мирамъ (остававшейся на этотъ разъ въ Петербургъ съ вопросомъ: можно ли теперь найти въ мъстахъ ея прошлогоднихъ наблюденій живыхъ гусеницъ? Отвътъ былъ: да, но только взрослыхъ. А найдется ли тамъ лицо, которое могло бы собрать ихъ и выслать? Тоже да. И вы можете сегодня же написать ему объ этомъ? Конечно. Очень прошу Васъ объ этомъ, только прибавьте, чтобы онъ не гнался за количествомъ и не задерживалъ отправленія посылки, пока наберетъ много. Такъ и было написано. 13 іюля звонокъ телефона снова пригласилъ меня къ разговору съ Э. Ө. Мирамъ, которая извъщала, что въ Музей Академіи только что доставлена почтой посылка съ ожидаемыми гусеницами изъ Смѣлы. Черезъ 1/2 часа я былъ въ Музеѣ и, получивъ посылку, немедленно вернулся съ нею въ лабораторію.

Посылка была отправлена изъ Ковалихинской экономіи (близъ Смѣлы) и представляла собою небольшой деревянный ящичекъ, плотно наполненный мелкимъ черноземомъ, въ которомъ лежали куски порѣзанной свеклы, и сюда же были пущены зарывшіяся въ землю 50 гусеницъ, собранныхъ на свекловичныхъ плантаціяхъ, какъ сказано было въ письмѣ, сопровождавшемъ посылку. Въ дѣйствительности, однако, я нашелъ только 16 живыхъ гусеницъ, лежавшихъ около весьма замѣтно обглоданныхъ кусковъ свеклы, отъ прочихъ же гусеницъ остались только сухіе и полусухіе куски и обрывки.

Отправитель посылки сообщалъ въ письмъ, что, кромъ гусеницъ, онъ нашелъ въ землъ какихъ то двухъ странныхъ личинокъ и включилъ ихъ въ посылку, думая доставить ими удовольствіе получательницъ. Увы! эти личинки были найдены мною въ добромъ здоровьъ, откормленныя, лоснящіяся и едва ползавшія отъ массы накопившагося въ нихъ жира. Это были страшные хищники, личинки жука красотъла (Calosoma auropunctatum P a y k.), съъв-

шія въ теченіе нѣсколькихъ дней пребыванія въ пути 34 взрослыхъ недостававшихъ въ посылкѣ гусеницъ ночницы. Если онѣ пощадили остальныхъ, то потому только, что достигли обѣ полнаго роста и приготовлялись къ окукливанію, которое вскорѣ совершилось, а 6 августа одна изъ нихъ превратилась въ вышеназваннаго жука, другая же пала жертвою моихъ опытовъ, о которыхъ впослѣдствіи разскажу.

Охота и смерть амблитэла.

Приходилось довольствоваться шестнадцатью прибывшими благополучно гусеницами. Онъ были тотъ часъ же перемъщены въ банку съ землей и пучкомъ салата, гдъ немедленно зарылись въ землю и нъкоторыя начались готовиться къ окукливанію, устраивая себъ землянные коконы, но другія были еще вполнъ бодры и начали кормиться салатомъ, вытягивая къ нему свои головы изъ подъ земли.

Изъ наѣздниковъ меня болѣе всего интересуетъ по нѣкоторымъ причинамъ амблитэлъ—его способы нападенія и кладки яйца. Съ него и начинаю. Ихъ у меня, какъ сказано было, двѣ самки (Amblyteles vadatorius Ill.), заключенныя въ кисейно-картонномъ садкѣ. Обѣ на видъ благополучны, хотя уже почти мѣсяцъ, съ 16 іюня, какъ живутъ у меня на казенномъ иждивеніи, при чемъ кормились онѣ черезъ день, какъ было описано. Самецъ ихъ скончался и былъ наколотъ на булавку еще въ Нижнемъ, но дѣло свое относительно самокъ, я думаю, онъ исполнилъ, такъ какъ въ Тулѣ онъ былъ найденъ въ одномъ съ ними садкѣ.

Приступаю къ опыту 13 іюля. Одну изъ подвижныхъ кормяшихся гусеницъ вынимаю изъ земли, кладу на листокъ бумаги и накрываю плоскодонной стеклянной чашечкой. Пока гусеница лежитъ спокойно, притворяясь мертвой, подношу къ чашечкѣ садокъ съ амблителами, приподымаю ее на сторонъ, обращенной ко мнъ, и снимаю крышечку садка. Самки одна за другою выползаютъ изъ него на бумагу и, направляясь къ свъту, подходятъ подъ стеклянную чашечку, которую послъ того опускаю. Лупа у меня въ рукахъ, дневной свъть изъ окна падаетъ въ изобиліи и ярко освъщаетъ всъ пріемы борьбы противниковъ.

Гусеница тѣмъ временемъ развернулась и, будучи тронута усиками одной изъ самокъ, быстро поворачивается къ ней головою, а самка моментально всползаетъ на нее и садится вер-

хомъ близъ середины тъла гусеницы, охватывая ее всъми своими шестью ножками, и плотно прижимается къ ней всемъ теломъ. Гусеница бросается на спину, стараясь придавить всадницу своею тяжестью, но эта не покидаеть ее, и гусеница начинаеть быстро переворачиваться вокругъ продольной оси своего тъла, со спины на брюшко и обратно, бъетъ заднимъ и переднимъ концами, но сбросить съ себя врага, укръпившагося на серединъ, не въ силахъ. Самый кончикъ брюшка самки согнулся угломъ и остріе скрытаго въ немъ яйцеклада уперлось въ кожу, послъ чего кончикъ брюшка отсталъ отъ яйцеклада и снова выпрямился, а яйцекладъ быстро погрузился до основанія въ жертву. Тогда гусеница, переставшая уже вертъться, стала на ножки и побъжала вдоль стънки накрывавшаго ее стекляннаго сосуда, старательно прижимаясь къ нему бокомъ и отчасти спиною. Этимъ пріемомъ ей удалось оттъснить немного самку съ занятаго ею мъста, но эта лишь переползла немного впередъ и вбокъ и снова впустила сверло въ жертву, а на мъстъ перваго укола выступила капля свѣтлой прозрачной крови.

Въ этотъ моментъ проползавшая мимо гусеницы другая самка тоже всползла на нее, помъстилась немного сзади первой и, нащупавъ ртомъ каплю выступившей крови, втянула ее всю въ себя, послъ чего сползла съ гусеницы. А эта остановилась, изогнулась головою назадъ и выпустила изо рта на переднюю всадницу крупную каплю мутно-зеленой пънистой жидкости, облившей все тъло самки, и снова побъжала вдоль круга. Пънистая жидкость, должно быть, худо подъйствовала на самку (а можетъ быть и кладка уже совершилась), потому что не прошла гусеница и половины круга, какъ самка сползла съ нея и принялась очень дъятельно очищаться передними и задними ножками отъ смачивавшей ее жидкости, которая повидимому была ей очень противна. Тогда я открылъ ее и перемъстилъ въ садокъ, гдъ она долго еще чистилась со всъхъ сторонъ, а гусеницу, получившую уколы, отсадилъ въ особый стаканчикъ.

Другая самка обнаруживала все время совсѣмъ иное отношеніе къ событіямъ. Сначала она прошла мимо гусеницы совершенно равнодушно и боязливо держалась отъ обоихъ борцовъ въ сторонѣ, пока не привлекла ее капля крови, поглотивъ которую она снова удалилась отъ гусеницы. Послѣ того она была выпущена изъ подъ чашечки и водворена въ садокъ.

На другой день утромъ, горя нетерпъніемъ видъть яйцо,

отложенное въ гусеницу самкой амблитэла, и будучи увѣренъ, что оставшіяся самки будутъ дѣлать еще новыя кладки, которыми я воспользуюсь для дальнѣйшихъ изслѣдованій, я вскрылъ гусеницу, уколотую наканунѣ дважды. Зная мѣста уколовъ: на спинѣ у середины тѣла—одно, немного впередъ и немного лѣвѣе—другое, я надѣялся безъ труда найти яйцо, но не нашелъ. Раздавилъ ли его пинцетомъ или иглами при развертываніи лопастей жироваго тѣла, извлекъ ли его незамѣтно при удаленіи кишечника, или оно совсѣмъ не было отложено—Богъ его вѣдаетъ. Что оно не было отложено едва ли вѣроятно, ибо первый уколъ продолжался болѣе минуты, а второй около половины того. Вѣрнѣе, оно было отложено и я не сумѣлъ его найти.

Извлечена изъ земли новая гусеница и съ нею я направляюсь къ той самкѣ, которая вчера такъ превосходно нападала. Но увы! нахожу самку лежащей на спинѣ и умирающей. Голова и передняя пара ножекъ были совершенно неподвижны и только въ средней и задней парахъ ногъ замѣтны были слабыя судороги, которыя продолжались еще въ теченіе часа, послѣ чего передо мною былъ совершенный трупъ. Отчего она умерла? Къ несчастью, этимъ вопросомъ я не заинтересовался тогда, вслѣдствіе чего потерялъ вскорѣ такимъ же образомъ и вторую самку. Теперь мнѣ надо было, не раздумывая, вскрыть умершую, чтобы освѣдомиться о состояніи ея яичниковъ, что и было немедленно сдѣлано.

Внутренній половой аппаратъ самки амблитэла совершенно подобенъ тому, какой ниже будетъ изображенъ и описанъ для самокъ ихневмона (Рис. 6о. стр. 200). Отличія заключаются въ томъ, что каждый яичникъ амблитэла состоитъ изъ 7 яйцевыхъ трубочекъ, между тѣмъ какъ у ихневмона въ составъ его входятъ 4 трубочки; кромѣ того, ядовитая железа у ихневмона впадаетъ въ общій пріемникъ двумя отдѣльными стволами, между которыми замѣтно нѣкоторое, хотя и небольшое, разстояніе, а у самки амблитэла оба ствола при впаденіи въ пріемникъ сливаются въ одно общее основаніе. Въ одной изъ яйцевыхъ трубочекъ вскрытой самки амблитэла я нашелъ готовое къ откладыванію зрѣлое яйцо, въ остальныхъ же трубочкахъ были только зачатки яицъ. Въ парныхъ яйцеводахъ и въ общемъ яйцеводѣ яичекъ не было.

Зрѣлое яйцо амблитэла совершенно подобно такому же яйцу ихневмона, т. е. состоитъ изъ безцвѣтной тонкой и прозрачной скорлупы съ бѣлымъ содержимымъ и принадлежитъ, слѣдовательно, къ числу тѣхъ яицъ, которыя откладываются внутрь

жертвы, для чего, какъ мы видъли, нападавшая самка и погружала свой яйцекладъ до основанія въ кожу гусеницы.

Другая, остававшаяся въ живыхъ, самка продолжала въ теченіе трехъ дней оставаться совершенно равнодушной къ гусеницамъ, которыхъ я ей предлагалъ, и не только не нападала, но сама отъ нихъ убъгала. Наконецъ, 17 іюля она сдълала первое нападеніе и повторяла ихъ въ теченіе слъдующихъ трехъ дней, уколовъ послъдовательно четырехъ гусеницъ, послъ чего опыты пришлось прекратить за недостаткомъ гусеницъ. Ихъ всъхъ было у меня, какъ сказано, 16 и всъ онъ были взрослыя, готовыя къ окукливанію, почему черезъ 3—4 дня послъ прибытія онъ перестали кормиться и подълали въ землъ пещерки, въ которыхъ нашли покой, необходимый для окукливанія. Изъ этихъ то пещерокъ я извлекалъ ихъ и предлагалъ самкамъ ихневмона, о которыхъ ръчь впереди, и самкамъ амблитэла.

17 іюля были взяты гусеницы, у которыхъ способность ползанія и сопротивленія еще сохранилась. Та, на которую напала самка амблитэла, немедленно свернулась калачикомъ и непрерывно переворачивалась въ этомъ положеніи вокругъ продольной оси своего тѣла, при чемъ, такъ какъ переворачиваніе совершалось внутрь кольца, втягивалась внутрь и сидѣвшая верхомъ на гусеницѣ самка, но послѣдняя быстро перемѣщала ножки и передвигалась бокомъ въ направленіи противоположномъ верченію. Наконецъ, гусеница развернулась и побѣжала по кругу, чего только и надо было самкъ, которая немедленно подогнула кончикъ брюшка и впустила яйцекладъ въ кожу гусеницы. Я успѣлъ насчитать до 80, пока самка оставалась на бѣгущей гусеницѣ съ погруженнымъ въ нее яйцекладомъ, послѣ чего самка покинула ее и не возобновляла нападеній.

Въ слѣдующіе дни гусеницы, добытыя изъ пещерокъ, ползать уже не могли и сопротивлялись нападеніямъ самки только переворачиваніемъ, при чемъ въ одномъ случаѣ, 20 іюля, движеніе гусеницы прекратилось, какъ только яйцекладъ погрузился въ ея тѣло, и послѣ того самка оставалась на ней въ полномъ спокойствіи, пока я насчиталъ до 85.

Всѣ эти четыре гусеницы были черезъ 3-4 дня вскрыты мною и изслѣдованы, но ни въ одной я не нашелъ ни отложеннаго яйца, ни вылупившейся изъ него личинки. Во всѣхъ случаяхъ кладка не состоялась. Почему?—увидимъ ниже.

26 іюля прибыла новая партія гусеницъ, изъ Тулы. Здѣсь были полувзрослыя гусеницы, совсѣмъ взрослыя и промежуточныхъ

возрастовъ. Въ тотъ же день одна изъ вполнѣ подвижныхъ, почти взрослыхъ, гусеницъ была пущена къ самкѣ амблитэла. Послѣдняя немедленно осѣдлала ее, но гусеница, загнувъ въ бокъ и назадъ голову, дотянулась челюстями до всадницы и, схвативъ ее за ногу, быстро отбросила отъ себя. Самка, однако, не испугалась и моментально осѣдлала свою жертву снова. Теперь гусеница загнула голову также назадъ, но нѣсколько выше прежняго, и облила самку пѣнистой слизью, выпущенной изо рта въ такомъ количествъ, что мокрые усики самки слиплись на всемъ протяженіи, а крылья прилипли къ спинкъ и бокамъ брюшка. Тѣмъ не менъе самка не покинула жертвы, а наносила ей уколы сверломъ, но короткіе и въ разныхъ мѣстахъ, переползая и перемѣщая кончикъ брюшка. Наконецъ, вся мокрая она сходитъ съ гусеницы и отползаетъ въ сторону, чтобы чиститься. Пересаживаю ее въ садокъ и на другой день нахожу мертвой.

Умершую въ тотъ же день вскрываю и вижу, что во всѣхъ яйцевыхъ трубочкахъ ея были только зачатки яицъ, очень далекіе отъ сколько-нибудь зрѣлаго состоянія. Эта самка была безплодная, ей нечего было класть. Вотъ почему она сначала оставалась равнодушною къ гусеницамъ и не хотѣла на нихъ нападать. Тѣмъ не менѣе потомъ она соблазнялась ими, нападала и колола, подвергая себя смертельной опасности, и даже погибла въ одной изъ такихъ схватокъ. Теперь понятно, почему я не нашелъ яицъ ни въ одной изъ четырехъ уколотыхъ ею гусеницъ: яйца при этихъ уколахъ и не откладывались, потому что ихъ не было въ самой нападавшей.

Впослѣдствіи увидимъ, въ особенности когда будемъ говорить о пимплахъ, что это явленіе, т. е. нападеніе безплодныхъ самокъ на ихъ обычныхъ жертвъ, широко распространено среди наѣздниковъ, и безплодная самка ведетъ себя тогда точно такъ же, какъ плодущая. Инстинкты нападенія, сверленія и прокалыванія могутъ проявляться у нихъ совершенно независимо отъ инстинкта материнства и отъ способности къ послѣднему. Одинъ видъ обычной жертвы возбуждаетъ въ организмѣ самки три первыя способности, переходящія при созерцаніи готовой жертвы въ неодолимую потребность, которая властно требуетъ удовлетворенія и толкаетъ самку на совершеніе опредѣленнаго ряда дѣйствій совершенно безсмысленныхъ при данныхъ условіяхъ, т. е. при безплодности нападающей. Они безцѣльны, такъ какъ не могутъ увѣнчаться послѣднимъ актомъ—отложеніемъ яйца, составляю-

щимъ конечную цѣль всего этого ряда дѣйствій. Это—форма безъ сущности. Тѣмъ не менѣе потребность проявленія этой формы не только существуетъ, но настолько велика, что ради ея удовлетворенія самка жертвуетъ своєю жизнью. Потребности и проявленія инстинктовъ не всегда намъ ясны и понятны.

Почему умерла эта самка? По той же причинъ, какъ и первая: объ онъ умерли послъ того, какъ были облиты пънистой, мутно-зеленой жидкостью, выдъленной гусеницею изъ глотки. Это страшный ядъ, которымъ гусеницы успъшно защищаются отъ своихъ враговъ, и это давно извъстно въ энтомологіи. Я долженъ признаться, что съ моей стороны было преступной небрежностью забыть о такомъ свойствъ этого яда и допустить изливаніе его на моихъ двухъ единственныхъ самокъ амблитэла, такъ какъ была полная возможность устранить отъ нихъ эту опасность.

Дъло вотъ въ чемъ. Есть моменты въ жизни гусеницъ, когда онъ бываютъ лишены способности изливать свою защитительную жидкость, это—періодъ линьки и нъсколько времени ей предшествующаго и за нею слъдующаго. Тогда кишечникъ гусеницы очищается отъ всего содержимаго, такъ какъ передняя и задняя части его, т. е. глотка и прямая кишка, тоже подвергаются линькъ. Въ это время гусеница ничего выдълить изъ себя не можетъ. Еще хуже складываются для нея обстоятельства, когда совершается самая линька—тогда гусеница не можетъ защищаться даже челюстями и бъгствомъ, такъ какъ теряетъ временно способность произвольныхъ движеній и дълается совершенно беззащитной.

Мнѣ часто случалось наблюдать въ общемъ помѣщеніи гусеницъ озимой ночницы, какъ линяющую, неподвижную, гусеницу поѣдала другая, бодрая и подвижная. Поѣдавшая находила, повидимому, тѣло себѣ подобной не менѣе вкуснымъ и питательнымъ, чѣмъ листикъ салата. Это проявленіе каннибализма, т. е. поѣданія себѣ подобныхъ, въ періодъ ихъ беззащитнаго состоянія во время линьки, послужило причиной преждевременной гибели довольно многихъ гусеницъ въ моемъ садкѣ. Бодрыя гусеницы при встрѣчѣ также пробуютъ нападать другъ на друга, но превосходно защищаются выдѣленіемъ своей защитительной жидкости, извергая ее не только изо рта, но и изъ противоположнаго отверстія. Облитая гусеница прекращаетъ нападеніе и убѣгаетъ, стараясь тереться о встрѣчные предметы облитыми частями тѣла. Кажется, что эта жидкость и гусеницамъ причиняетъ или отвратительныя или болѣзненныя ощущенія.

Стало быть, чтобы устранить отъ амблитэла опасность этого способа защиты гусеницъ, мнѣ слѣдовало выбирать для него только тѣхъ гусеницъ, которыя готовились къ линькѣ, что вовсе не трудно было сдѣлать, ибо отличить такихъ гусеницъ было легко по малой ихъ подвижности, въ особенности при наступленіи послѣдней линьки на куколку, въ пещеркѣ. Но важность этого обстоятельства сдѣлалась для меня ясной только послѣ потери второй самки амблитэла, когда потеря ея заставила подумать о причинѣ внезапной смерти храброй, хотя и безплодной, охотницы. Опытомъ этимъ и выводомъ изъ него я воспользовался позднѣе, при наблюденіяхъ надъ ихневмонами и панисками, самки же амблитэла, какъ первые по времени предметы наблюденій, только дали этотъ опытъ и погибли, а мои надежды получить отъ нихъ яички и личинокъ на этотъ разъ рушились.

Помощь изъ Кіева.

Чего не удалось достигнуть своими силами, то было получено благодаря дружеской помощи изъ Кіева. Профессоръ В. П. Поспъловъ, завъдывающій кіевской энтомологической станціей, очень интересовался моими изслъдованіями надъпаразитами, о которыхъ я сообщаль ему отъ времени до времени, и нъкоторые изъ возбуждаемыхъ мною вопросовъ поручаль для дополнительныхъ изслъдованій своимъ ученикамъ, которые производили наблюденія на мъстахъ нахожденія гусеницъ озимой ночницы, вслъдствіе чего были поставлены въ условія, гораздо болъе благопріятныя для добыванія во всякое время необходимаго свъжаго матеріала, т. е. гусеницъ и наъздниковъ

Недавно В. П. Посп в лов в сообщиль въ печати (62,2) краткій отчеть о наблюденіяхь такого рода, сдѣланныхъ лѣтомъ 1911 г. Д. И. Лѣсовымъ въ Мошногородишенскомъ имѣніи Кіевской губерніи. 9 мая были собраны имъ на волѣ яички озимой ночницы, изъ которыхъ были выведены и воспитаны на листьяхъ вьюнка гусеницы въ неволѣ, въ садкѣ. Того же 9 мая Д. Ил Лѣсовой вывель изъ добытыхъ на волѣ куколокъ озимой ночницы нѣсколькихъ амблителовъ (Amblyteles vadatorius Illig.), которыхъ держалъ затѣмъ въ банкѣ и кормилъ сахаромъ, смоченнымъ водою. Къ 9 іюня 30 гусеницъ въ садкѣ достигли послѣдняго и частью предпослѣдняго возрастовъ, а нѣкоторые изъ

амблитэловъ къ этому времени умерли въ банкѣ, но другіе оставались живыми и бодрыми. Въ этотъ день Д. И. Лѣсовой пускалъ по 2-3 воспитанныхъ имъ гусеницы къ живымъ амблитэламъ, которые на нихъ нападали и откладывали въ нихъ свои яички. Зараженныя замѣнялись новыми и такимъ образомъ въ теченіе одного дня, 9 іюня, заражены были всѣ гусеницы.

Съ 21 іюня началось окукленіе зараженныхъ гусеницъ, а 10 и 17 іюля изъ трехъ куколокъ озимой ночницы вылетѣли наѣздники—амблитэлы. Стало быть, для прохожденія всего раавитія, отъ яйца до вылета изъ куколки, понадобилось амблитэламъ въ настоящемъ случаѣ одинъ мѣсяцъ—отъ 9 іюня до 10 іюля, и одинъ мѣсяцъ и одна недѣля—отъ 9 іюня до 17 іюля.

Небольшія партіи зараженныхъ гусеницъ и куколокъ, по 2—3 штуки, складывались послѣ 9 іюня черезъ каждые 4 дня въ спиртъ. Вотъ этимъ-то спиртовымъ матеріаломъ и подѣлился со мной В. П. Поспѣловъ въ мартѣ 1912 г., благодаря чему я имѣю возможность датъ теперь описанія молодыхъ и взрослой личинокъ амблитэла.

Другая часть спиртоваго матеріала была изслѣдована въ Кіевѣ и, по свидѣтельству В. П. Поспѣлова, въ большинствѣ гусеницъ и куколокъ были найдены личинки амблитэла, но только въ тѣхъ, которыя были заспиртованы на 12-й день послѣ зараженія и позднѣе того. Въ одномъ случаѣ были найдены двѣ личинки въ одной жертвѣ, а въ остальныхъ по одной. Въ куколкахъ, которыя были заспиртованы послѣдними—29 іюня и з іюля, находились еще личинки. Слѣдовательно, окукливаніе ихъ должно было произойти между з и 10 іюля.

Ненахожденіе паразитныхъ личинокъ въ гусеницахъ, заспиртованныхъ ранѣе 12 дней послѣ зараженія, я объясняю тѣмъ, что изслѣдованіе производилось безъ примѣненія ѣдкаго кали, благодаря чему крошечныя яички и личинки 1-й стадіи остались незамѣченными среди уплотнившихся отъ дѣйствія спирта пластовъ гусеничнаго жира, имѣющаго такой же бѣлый цвѣтъ, какъ и заключенныя въ немъ яйца и личинки.

Результаты изслъдованія присланных в мнъ гусеницъ и куколокъ были слъдующіе:

въ двухъ гусеницахъ, заспиртованныхъ 9 іюня, т. е. въ день кладки, ничего не найдено;

изъ заспиртованныхъ 13 іюня, въ одной ничего не найдено, а въ другой среди лопастей жироваго тѣла найдена личинка 1-й

стадіи въ моментъ вылупленія, вышедшая изъ яйца болье, чъмъ на половину;

изъ заспиртованныхъ 21 іюня: въ гусеницъ ничего на найдено, а въ куколкъ найдена шкурка 1-й стадіи и личинка 2-й стадіи;

въ двухъ гусеницахъ, заспиртованныхъ 25 іюня, найдены: въ одной двъ личинки 2-й стадіи и двъ шкурки 1-й стадіи, а въ другой — одна личинка 1-й стадіи;

въ двухъ куколкахъ, заспиртованныхъ 29 іюня, найдены: въ одной личинка 2-й стадіи и шкурка 1-й, а изъ другой куколки, присланной вскрытою, была уже раньше вынута и отсажена въ особый цилиндрикъ взрослая личинка, въ самой же куколкъ я нашелъ полуразрушенныя головки и остатки шкурокъ личинокъ первыхъ трехъ стадій;

наконецъ, въ куколкъ, заспиртованной з іюля и присланной тоже вскрытою, я нашелъ только одну шкурку 1-й стадіи.

Изложенные результаты изслъдованія показывають, что не всякій уколь на вздника сопровождался кладкою яйца, ибо въ четырехъ уколотыхъ гусеницахъ (заспиртованныхъ 9, 13 и 21 іюня) ничего не было найдено. Это подтверждаетъ только выводъ, сдъ ланный нами уже раньше.

Далье, въ одну гусеницу могуть быть сдъланы двъ кладки, какъ въ гусеницу, заспиртованную 25 іюня, но въроятно двумя самками, и вылупившіяся личинки амблитэловъ могутъ мирно уживаться въ ней, какъ въ 1-й, такъ и во 2-й стадіяхъ.

Вылупленіе личинки изъ яйца совершилось на 4-й день послъ кладки, на что указываетъ гусеница, заспиртованная 13 іюня.

Пребываніе личинки въ 1-й стадіи можетъ затянуться внутри гусеницы до двухъ недъль послъ кладки, какъ показываетъ изслъдованіе гусеницы, заспиртованной 25 іюня.

На 12-й день послѣ кладки, 21 іюня, мы находимъ уже 2-ю стадію, а пребываніе въ ней могло затянуться и до 20 дня послъ кладки, до 29 іюня.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ одной изъ куколокъ, заспиртованныхъ того же 29 іюня, личинка успъла въ теченіе 20 дней послъ кладки пройти почти все свое развитіе и перейти въ послѣднюю, 4-ю стадію. Стало быть, быстрота развитія личинокъ внутри хозяина при однихъ и тъхъ же условіяхъ можетъ быть различной.

Наконецъ, яички амблитэловъ откладываются не на гусеницъ, а внутрь гусеницъ и личинки ихъ вылупляются и живутъ внутри хозяевъ съ первыхъ моментовъ своего существованія вплоть до окончательнаго развитія. Яйцо амблитэла, отложенное въ гусеницу. и личинка изъ него вылупившаяся не мъщаютъ послъдней окуклиться, послъ чего совершается окукливание паразита внутри куколки хозяина, изъ которой и вылетаетъ окрыленный амблитэлъ,

Личинка амблитела.

Теперь я могу дать описаніе первыхъ и послъдней сталій развитія личинокъ амблитэла, что В. П. Посп товымъ великодушно было предоставлено на мою долю.

1-я стадія. (Рис. 51) Молочно-бѣлаго цвѣта, съ желтой, по бокамъ закругленной головкой, обособленной отъ остального тъла и покрытой со всъхъ сторонъ гладкой хитиновой крышкой. Тѣло личинки, состоящее изъ 12 члениковъ (не считая головы), къ заду постепенно съуживается и на концѣ тупо заостряется; на послѣднемъ членикъ замътна поперечная бороздка, вслъдствіе чего тъло личинки кажется 13-члениковымъ. Длина передъ переходомъ личинки во 2-ю стадію 3-4 мм., длина головы 0,6 мм. и ширина головы 0,8 мм. Дыхалецъ не видно ни одной пары.




Рис. 51. Личинка амблитэла (Amblyteles vadatorius III.) 1й стадіи. Увелич. около 20 раз. Ориг.

Наиболъе интересна у этой личинки

ея голова, снабженная крупными серповидными или когтевидными, верхними челюстями, имъющими въ длину каждая 0,35 мм. и въ ширину при основаніи 0,18 мм. Нижняя, болѣе мягкая сторона головы (Рис. 52) ограничена по бокамъ продольными боковыми дугами, которыя идуть отъ задняго края головы къ переднему и здъсь переходять въ верхнечелюстныя дуги, окружающія основанія верхнихъ челюстей. Нижняя челюсть мягкая мясистая, безцвътная въ верхней половинъ, свътлобурая и хитинизированная на нижней половинъ, несетъ четыре волоска, расположенные,

какъ показано на рисункѣ; соединена съ нижней губой и ниже лежащей частью головного покрова прозрачной безцвѣтной перепонкой. Нижняя губа въ основной половинѣ раздѣлена на двѣ свѣтлобурыя хитинизированныя части, снабженныя каждая двумя волосками у верхняго края, соединенныя другъ съ другомъ, а также съ верхней частью нижней губы и прилегающимъ по-кровомъ головы безцвѣтной прозрачной перепонкой съ извилис-




Рис. 52. Голова той же личинки снизу: al—нижняя продольная дуга, amd—верхнечелюстная дуга, cl—надротовой щитокъ, lg—язычекъ нижней губы, ll—боковыя пластинки, lmd—срединная пластинка верхней стороны головы, lm—нижнечелюстая пластинка, md—верхняя челюсть, mt—подбородковая пластинка нижней губы, mx—нижняя челюсть. Увелич. около 70 разъ. Оригин.

тыми краями; верхняя половина нижней губы (язычекъ) внизу и по бокамъ закруглена, свътлобурая и хитинизирована, у верхняго края и на срединъ безцвътная, мягкая, мясистая, несетъ двъ пары волосковъ, указанныхъ на рисункъ.

На верхней сторонъ головы (Рис. 53) идутъ къ заднему краю отъ концовъ верхнечелюстныхъ дугъ два постепенно сближающіеся желобка, сливающіеся въ одинъ немного не дойдя до края. По нимъ растрескивается черепная крышка при наступленіи линьки. Тогда заключенная между желобками продольная срединная пластинка, отдъляется отъ головы въ видъ

заостреннаго къ заднему концу язычка. Впереди эта пластинка соединена безцвътной перепонкой съ надротовымъ щиткомъ, образуемымъ двумя треугольными хитинизированными пластинками, несущими каждая по пяти волосковъ, размъщенныхъ какъ показано на рисункъ. На срединъ головы, по объ сто-




Рис. 53. Та же голова сверху: amd—верхнечелюстная дуга, at—зачаточный усикь, cl—надротовой щитокь, lmd—средняя продольная пластинка, md—верхняя челюсть. Увелич. около 70 разъ. Оригин.

роны срединной продольной пластинки, сидитъ пара зачаточныхъ усиковъ, имъющихъ видъ двухъ свътлыхъ кружечковъ.

2-я стадія. Въ общемъ очень похожа на предыдущую, но существенное отличіе отъ нея составляютъ дыхальца, которыя въ этой стадіи появляются въ полномъ числѣ 9 паръ, расположенныхъ на предтульѣ и на первыхъ 8 брюшныхъ членикахъ. Дыхальца эти воронкообразныя, всѣ равной величины и очень мелкія—0,012 мм. въ діаметрѣ. Пластинки надротоваго щитка имѣютъ по 7 волосковъ и переходятъ впереди каждая въ мягкій мясистый выступъ. Свѣтлые кружки на верхней сторонѣ головы, представляющіе собой зачаточные усики, слегка бурѣютъ, но въ центрѣ остаются свѣтлыми и по окружности ихъ намѣ-

чается бол'ье темный ободокъ; на наружной сторонъ кружка сидитъ одинъ свътлый волосокъ. На язычкъ, нижней губы на сре-




Рис. 54. Вэрослая личинка, 4-й стадій, амблитела (Amblyteles vadatorius II 1.): alt—нижняя продоль зая дуга, amd—верхнечелюстная дуга, at—зачаточный усикъ, lb—нижняя губа, md—верхняя челюсть, mx—нижняя челюсть, r—хитиновая затылочная пластинка. Увелич. около 12 разъ. ¡Оригин.

динѣ верхняго края хитинизированной его части, замѣтна заостряющаяся къ низу выемка. Длина личинки 6 мм., длина головы сверху 0,83 мм., ширина головы 1,23 мм. На нижней сторонѣ голова короче чѣмъ на верхней и имѣетъ 0,62 мм. въ длину. Длина верхней челюсти 0,47 мм., ширина ея при основаніи 0,23 мм.

3-я стадія. Личинокъ этой стадіи и ихъ шкурокъ мнѣ не удалось получить, но головки сброшенныхъ шкурокъ, отчасти распавшіяся (подъ вліяніемъ ѣдкаго кали) на составныя части, получилъ, благодаря чему имъю возможность указать на нѣкоторые ихъ признаки. Свътлобурыя сильно хитинизированныя части нижней стороны головы остаются тъми же, какъ у предыдушихъ стадій, но становятся нъсколько свътлъе. На язычкъ нижней губы выемка на срединъ верхняго края его свътлобурой части становится закругленной. Верхнія челюсти сохраняють ту же когтевидную форму; длина челюсти 0,53 мм., ширина ея у основанія 0,37 мм. Темный ободокъ, появившійся въ предыдущей стадіи во-

кругъ зачаточнаго усика на верхней сторонъ головы, настолько теперь уплотнился и обособился отъ головнаго покрова, что легко отъ него отдъляется вмъстъ съ усикомъ. За усиками, немного отступя къ боковымъ краямъ, слегка намътились еще во 2-й стадіи продольныя закругленныя на концахъ затылочныя пластинки, въ родъ погоновъ, не доходящія до задняго края головы, нъсколько темнъе окрашенныя. Эти пластинки у 3-й стадіи выражены вполнъ ясно и настолько обособились, что легко отдъляются и отпадаютъ отъ головы вмъстъ съ ободками усиковъ.




Рис. 55. Голова той же личинки снизу: e—отверстіе прядильной железы, plb—нижнегубное щупальце, pmx—нижнечелюстное щупальце. Значеніе прочихъ буквъ то же, что на предыдущемъ рисункъ. Увелич. около 70 разъ. Оригин.

4-я стадія (Рис. 54). Эта стадія послѣдняя, такъ какъ больше четырехъ шкурокъ или, вѣрнѣе сказать, одной шкурки съ головою и трехъ головокъ съ остатками шкурокъ мнѣ не удалось найти ни въ одной изъ изслѣдованныхъ мною куколокъ ночницъ, изъ которыхъ вылетѣли амблитэлы. При личинкѣ, съ которой я даю это описаніе, найдены были въ куколкѣ три головки трехъ вышеописанныхъ стадій. Длина личинки, судя по шкуркѣ, сброшенной при послѣдней линькѣ, болѣе 10 мм. Точнѣе не могу опредѣлить, такъ какъ единственная, бывшая у

меня личинка этого возраста, была превращена въ шкурку и раздълена на неправильныя части раньше измъренія. Личинка наполняетъ собою всю полость тъла куколки ночницы.

Совершенно бълая, гладкая, съ желтой головою, явственно обособленной отъ остального тъла, съ боковъ и на верхней сторонъ закругленною. Тъло состоитъ изъ 12 члениковъ (не считая головы), изъ которыхъ на предтульъ и на первыхъ 8 брюшныхъ




Рис. 56. Та же голова сверху: *albr*—верхнегубная дуга, *cl* – пластинки надротоваго щитка. Значеніе прочихъ буквъ показано на рис. 54. Увелич. около 70 разъ. Оригин.

членикахъ находится 9 паръ воронкообразныхъ дыхалецъ не равной величины: дыхальца трехъ заднихъ паръ имѣютъ въ діаметрѣ по 0,16 мм., а остальныя по 0,28 мм. Нижняя сторона головы совершенно мягкая, съ безцвѣтной прозрачною кожей. Таковы же нижнія челюсти и нижняя губа, имѣющія обычную форму, какъ показано на рисункѣ. Верхняя челюсть имѣетъ форму вытянутаго вверхъ, заостреннаго треугольника, слегка согнутаго внутрь. Будучи сомкнуты онѣ перекрещиваются вершинами; длина верхней челюсти 0,47 мм., ширина ея у основанія 0,19 мм.

У взрослой личинки нътъ и слъда тъхъ свътлобурыхъ хитинизированныхъ частей нижней губы (Рис. 55), нижнихъ челюстей и боковыхъ сторонъ нижняго головнаго покрова, раздъленныхъ свътлыми промежутками, которые были свойственны тремъ

предыдущимъ стадіямъ. Личинка освободилась отъ нихъ вмѣстѣ съ третьею шкуркой. Въ этой стадіи сильно развиты бурыя, довольно толстыя, боковыя продольныя дуги, отдѣляющія по бокамъ верхнюю сторону головы отъ нижней, и служащія ихъ продолженіемъ верхнечелюстныя дуги, охватывающія основанія верхнихъ челюстей.

Надъ верхнечелюстными дугами лежитъ на верхней сторонъ головы (Рис. 56) соединяющая ихъ верхнегубная дуга, болъе тонкая, чтмъ предыдущія дуги, но настолько прочная, что при линькъ не разламывается и остается цълою на сброшенной шкуркъ. Передъ верхнегубною дугой лежатъ двъ свътлобурыя треугольныя пластинки надротоваго щитка, сзади закругленнныя, впереди загибающіяся внутренней стороною внизъ; у передняго края каждой пластинки видно по пяти волосковъ, сидящихъ на нъкоторомъ разстояніи другъ отъ друга. Верхнегубная дуга, слабо окрашенная въ бурый цвътъ, имъетъ форму узкой пластинки, съ желобкомъ на срединъ и на объихъ сторонахъ ея сидять въ рядъ по четыре волоска. Отдёляющаяся отъ верхней стороны головы во время линьки язычковидная продольная срединная пластинка такъ же намъчена двумя сходящимися желобками, какъ у предыдущихъ стадій, у которыхъ вмѣстѣ съ этой язчыковидной пластинкой отдълялись отъ головы и пластинки надротоваго щитка, теперь же онъ отграничены отъ нея верхнегубною дугой, которая при линькъ остается цълой, и онъ остаются при этой дугъ. Ободки вокругъ зачаточныхъ усиковъ тоньше, чъмъ у у предыдущей стадіи, но также способны отдъляться отъ головнаго покрова сброшенной шкурки послъ дъйствія ъдкаго кали. Расположенныя сзади усиковъ, подобныя погонамъ, затылочныя пластинки, окрашенныя въ бол ве темный цвътъ, тоже способны отпадать вмъстъ съ ободками усиковъ при тъхъ же условіяхъ.

Охота и кладка ихневмона.

Бол'ве плодотворны были наблюденія мои надъ самками ихневмона (*Ichneumon sarcitorius L.*). (Рис. 57 и 58). Он'в такъ же превосходно нападали на предложенныхъ имъ гусеницъ и способъ нападенія былъ тотъ же самый, какъ предыдущихъ, но только ихъ нападенія сопровождались во многихъ случаяхъ отложеніемъ яицъ, изъ которыхъ потомъ вылуплялись личинки, развивавшіяся въ гусе-

ницахъ. Всего я имътъ трехъ самокъ ихневмона, которыя были оплодотворены еще 17 іюня, въ Нижнемъ, двумя имъвшимися тогда самцами. Спариваніе ихъ продолжалось немного меньше минуты. При повторявшихся попыткахъ моихъ соединять ихъ въ одномъ помъщеніи ни одна самка не сдалась вторично самцамъ, несмотря на всъ усилія и ухаживанія послъднихъ. Очевидно, этотъ видъ надо отнести къ числу однобрачныхъ—и піп и р ta е.

Къ первымъ гусеницамъ, которыхъ я пускалъ къ самкамъ



Рис. 57. Самка ихневмона (Ichneumon sarcitorius L.) Увелич. около 3 разъ. По S n e l l e n v o l e n

ежедневно съ 13 по 16 іюля, онъ, къ моему удивленію, оставались совершенно равнодушными и не дѣлали попытокъ къ нападенію. Наконецъ, 17 іюля одна изъ самокъ, у которой всѣ членики тѣла были совершенно другой конецъ одного усика былъ обломанъ, а у третьей не хвакоготковаго членика на правой

задней лапк'в), ус'влась верхомъ на гусеницу, охвативъ ее вс'вми шестью ножками, прижалась къ ней вс'вмъ т'вломъ, слегка приподняла самый кончикъ брюшка, согнула его угломъ и, приставивъ къ гусениц'в остріе сверла, выпрямила конецъ брюшка и погрузила сверло до основанія въ свою жертву, прижимаясь къ ней снова вс'вмъ т'вломъ. Гусеница сначала сопротивлялась верченіемъ вокругъ своей продольной оси, но не сбросила всадницу, все время державшую сверло погруженнымъ, потомъ она только б'вжала по кругу. Я усп'влъ насчитать до 200, когда самка вынула яйцекладъ и сошла съ гусеницы. Было ли отложено при этомъ яичко, осталось невыясненнымъ, ибо при вскрытіи гусеницы 20 іюля я нашелъ въ ней массу разнаго возраста личинокъ другого на'вздника—макроцентра (Macrocentrus), среди которыхъ найти такое же б'влое, какъ эти личинки, яйцо

было слишкомъ трудно. Такой же случай повторился 22 іюля при вскрытіи гусеницы, которую 19 іюля осѣдлали и погружали въ нее яйцеклады всѣ три самки.

Удачное нападеніе, сопровождавшееся кладкой, совершила та же ц'єлая самка 18 іюля, но никаких в подробностей объ этой кладк'є у меня въ дневник'є не записано. Сказано только, что зараженная гусеница на другой день окуклилась, 22 іюля куколка была вскрыта и

въ брюшномъ кончикъ ея найдена живая личинка 1-й стадіи, (Рис. 59) имъвшая 3 мм. въ длину.

20 іюля была предложена самкамъ гусеница, настолько приготовившаяся къ окукливанію, что уже утратила способность ползанія и могла только переворачиваться вокругь своей продольной оси. Ее осъдлали двъ самки, цълая и съ обломаннымъ усикомъ, и какътолько погрузили въ нее яйцеклады,



Pис. 58. Самецъ ихневмона (Ichneumon sarcitorius L.) По Snellen v. Vollenhoven.

верченіе гусеницы прекратилось, вѣроятно потому, что самки впустили въ нее выдѣленіе своихъ ядовитыхъ железъ (Рис. 60) и тѣмъ парализовали ея движенія. Одна самка покинула жертву, когда я насчиталъ до 40, а другая, коловшая съ другой стороны,—до 80.

На этой парализованной и неподвижной гусеницѣ гораздо легче и подробнѣе можно было разсмотрѣть процессъ кладки, чѣмъ на бѣгущихъ и сопротивляющихся гусеницахъ. Колющая самка помѣщается обыкновенно на спинѣ жертвы, большей частью близъ середины ея тѣла, а я смотрю сверху и не могу поэтому видѣть того, что происходитъ подъ самкой въ основани ея яйцеклада, но парализованную гусеницу я слегка повертываю такъ, что вижу сидящую на ней самку въ профиль.

Теперь ясно видно, какъ въ основаніи яйцеклада начинаетъ вздуваться тонкая, нѣжная пленка, подъ которой видны, какъ загибы полозьевъ, бурыя хитиновыя основныя части внутреннихъ щетинокъ сверла. Вздутіе постепенно увеличивается и чтото проскальзываетъ въ немъ изъ брюшка въ яйцекладъ, послѣ чего вздутіе быстро спадается, самка вынимаетъ сверло и сходитъ съ гусеницы.

Черезъ часъ послѣ того, какъ покинули ее самки, гусеница окуклилась. 23 іюля куколка была вскрыта и внутрь ея была направлена струя воды изъ пипетки, вынесшая изъ куколки живую личинку 1-й стадіи, 4 мм. длиною, очень подвижную, и другую личинку той же стадіи, но сильно укороченную и пораненную на спинѣ близъ хвоста. Послѣдняя была еще жива, такъ какъ смыкала и размыкала свои челюсти. Нѣтъ сомнѣнія, что передъ вскрытіемъ въ куколкѣ произошла встрѣча этихъ двухъ личинокъ и между ними загорѣлась борьба, во время которой первая поранила вторую.

Черезъ нѣсколько минутъ побѣдительница, положенная въ воду на стекло подъ бинокуляромъ, линяетъ и переходитъ во 2-ю стадію, при чемъ для выползанія изъ старой шкурки черезъ широкую трешину, появившуюся на головѣ и въ началѣ спинки, ей понадобилось не больше минуты. Сброшенная шкурка осталась лежать растянутая, почти не смятая, на поверхности воды. Въ новой, болѣе просторной, шкуркѣ личинка растягивается и черезъ часъ имѣетъ 5 мм. въ длину, а на другой день, оставаясь въ той же водѣ, она вытянулась до 7 мм. Голова личинки передъ линькой была окрашена въ свѣтлый розовато-коричневый цвѣтъ, послѣ же линьки, у 2-й стадіи, почти безцвѣтная, только концы верхнихъ челюстей розовато-бурыя. Мясистые концы нижнихъ челюстей очень сильно развиты передъ линькой и выдаются впередъ дальше передняго края головы.

Этою гусеницей окончился имъвшійся у меня запасъ кіевскихъ гусеницъ и для дальнъйшихъ кладокъ надо было ожидать прибытія тульскихъ. Онъ пріъхали, какъ сказано было, 26 іюля, и въ количествъ значительно большемъ—183 гусеницы, большей частью взрослыя, но были среди нихъ и полувзрослыя и единично болъе молодыя. Присланы онъ были по почтъ въ деревянномъ ящикъ, который былъ наполненъ свъжими листьями разныхъ огородныхъ овощей, преимущественно большими листами капусты. Они упирались довольно плотно въ стънки ящика и раздъляли

его на этажи, въ которыхъ паслись гусеницы и прятались однаотъ другой. Нъсколько десятковъ гусеницъ было найдено мертвыхъ и полуобъъденныхъ—это послъдствія каннибализма, про-

явленію котораго благопріятствовала скученность гусеницъ въ тѣсномъ помѣщеніи, гдѣ онѣ лишены были возможности изолироваться на время линьки. Вновь прибывшія перемѣщены въ нѣсколько стеклянныхъ банокъ съ землею и въ каждую положенъ кочанчикъ салата, который ежедневно замѣнялся новымъ.

Въ тотъ же день, какъ прибыли гусеницы, я снова предлагаю ихъ моимъ тремъ самкамъ. Времени упускать нельзя, ибо самки уже старушки, такъ какъ живутъ у меня около 6 недъль и неизвъсно. сколько дней имъ еще остается жить. Поэтому, если я желаю получить отъ нихъ потомство, то не долженъ терять ни одного дня. Однако, къ моему удивленію и разочарованію, къ этимъ гусеницамъ самки обнаруживаютъ полнъйшее равнодушіе. Гусеница лежитъ свернувшись калачикомъ, самки ощупываютъ и какъ бы обнюхиваютъ, переползаютъ черезъ нее и отхо-




Рис. 59. Яйцо и личинка 1-й стадіи ихневмона (Ichneumon sarcitorius L.). На дівой сторон'в личинка, только что вылупившаяся изъ яйца, прав'ве она же передъ переходомъ во 2-ю стадію. Увелич. въ 30 разъ. Оригин

дятъ въ сторону. Потомъ какая-нибудь снова натыкается на гусеницу, припадаетъ къ ней ртомъ и какъ будто лижетъ, иногда довольно долго, а потомъ снова отходитъ. Гусеница, раздражаемая этими прикосновеніями, ръзко бъетъ по временамъ концами тъла, наконецъ развертывается и ползетъ, а самки отъ нея сторонятся.

Однажды раздраженная гусеница выпустила изо рта свою спасательную жидкость, но не попала ею на самокъ, потомъ схватила одну изъ нихъ челюстями за заднюю ножку и трижды перевернулась съ нею, послѣ чего самка вырвалась и убѣжала. Такое поведеніе враговъ повторялось подрядъ четыре дня, въ теченіе которыхъ я выбиралъ для впусканія къ самкамъ гусеницъ, казавшихся мнѣ вполнѣ взрослыми и наименѣе подвижными.

Наконецъ, 30 іюля я пустилъ къ нимъ полувзрослую гусеницу. Вполнъ цълая самка тотчасъ же осъдлала ее и впустила въ нее яйцекладъ, но гусеница, лежавшая свернувшись кольцомъ, немедленно начала переворачиваться внутрь кольца вокругъ своей продольной оси, не развертываясь и втягивая въ кольцо самку, чъмъ заставила ее перемъститься. Самка произвела уколъ въ новомъ мъстъ и гусеница тогда облила ее своей пънистой жидкостью, выпущенной изъ обоихъ концовъ тъла. Самка немедленно убъжала, стала чиститься въ сторонъ и уже не пробовала нападать на гусеницу, которая ощупывала ртомъ мъста уколовъ, какъ бы зализывая раны. На другой день облитая самка умерла, а гусеница черезъ три дня была вскрыта, но ничего въ ней не найдено. Стало быть, кладка не состоялась и самка была обращена въ бъгство раньше, чъмъ отложила яйцо. Гусеница вышла изъ борьбы побъдительницей. Снова подтвердилось убійственное дъйствіе этого способа защиты гусеницъ на борющихся съ ними паразитовъ.

Но можно ли называть такихъ смѣлыхъ до безумія борцовъ, какъ наши три умершія самки, паразитами? Не думаю. Самки наѣздниковъ, открыто нападающія на бодрыхъ гусеницъ, какъ самки панисковъ, ихневмона, амбитэла и, вѣроятно, офіона съ эникоспиломъ, скорѣе могутъ быть названы смѣлыми охотницами, которыя готовы жертвовать и жертвуютъ жизнью, чтобы пристроить свое потомство къ источнику питанія. Въ молодомъ возрастѣ, въ состояніи личинокъ—да, это паразиты, безмятежно и въ полной безопасности перемѣщающіе, подобно вампирамъ, жизненные соки избранной жертвы въ собственный организмъ. Совершенно то же самое дѣлаютъ личинки осъ охотницъ, живущія въ норкахъ, изготовленныхъ ихъ матерями и снабженныхъ жуками, мухами, тлями или иною полуживою добычей, парализованной тѣми же матерями, однако, ихъ называютъ охотницами, а не паразитами. Было бы справедливо снять это позорное назва-

ніе, характерное для чего-то воровского и тайно проникающаго, съ нашихъ самокъ-на вздницъ, нападающихъ и умирающихъ, какъ рыцари—воины, въ открытой борьбъ.

Извиняясь за сдъланное мною маленькое отступленіе, за эту своего рода надгробную рачь надъ погибшей самкой, продолжаю излагать событія. Перваго августа была дана объимъ остававшимся самкамъ гусеница, взятая изъ ея земляного кокона и уже утратившая способность ползать. Одна самка тотчасъ на нее всползла и вонзила въ нее яйцекладъ, но гусеница начала переворачиваться и заставила самку перемъститься. Уколъ сверломъ былъ сдъланъ въ новомъ мъстъ, а на покинутомъ выступила капля крови, которую замътила другая самка и быстро въ себя всосала. Пока продолжался второй уколъ, я насчиталъ до 80, послъ чего самка сошла съ жертвы. Это гусеница была вскрыта 6 августа, при чемъ подъ кожицей ея оказалась уже готовая куколка, еще не сбросившая гусеничной шкурки, ръзко двигавшая брюшкомъ. Въ ней я нашелъ двухъ живыхъ личинокъ ихневмона во 2-й стадіи и двѣ сброшенныя ими шкурки і-й стадіи. Значить, самка, коловшая эту гусеницу въ двухъ мъстахъ, въ обоихъ отложила по яйцу. Продолжительность перваго укола была меньше второго, но счетомъ она не была опредълена.

Обѣ найденныя личинки были положены въ воду и одна изъ нихъ немедленно начала линять во второй разъ, переходя въ 3-ю стадію, при чемъ я снова имѣлъ возможность наблюдать подробно процессъ линьки подъ бинокуляромъ. На этотъ разъ линька сопровождалась несчастнымъ осложненіемъ. Личинка начала линять утромъ 6 августа и до наступленія ночи не въ состояніи была освободить изъ сбрасываемой шкурки голову и задній конецъ тѣла, при чемъ вся спина вышла наружу и старая шкурка натянулась между концами тѣла личинки на нижней ея сторонѣ. Въ такомъ положеніи она пробыла всю ночь въ водѣ и на другой день нѣжная кожица новой личинки треснула на спинѣ, вѣроятно, отъ чрезмѣрнаго напряженія и содержимое личинки выступило въ воду. Тогда я отдѣлилъ иглами голову изъ сбрасываемой шкурки, которая также легко снялась и на заднемъ концѣ, но освобожденная личинка была уже мертва.

Кром'в двухъ только что указанныхъ личинокъ, была найдена въ этой же куколк'в третья живая личинка, тоже 1-й стадіи, но совершенно мн'в неизв'єстная. Т'єло ея было бол'є узкое и сильнѣе назади заостренное, чѣмъ у личинокъ ихневмона, голова болѣе широкая и почти круглая, безцвѣтная, какъ и болѣе крупныя и сильнѣе изогнутыя серповидныя челюсти, которыя она смыкала и размыкала, плавая въ водѣ. Наконецъ, въ этой же куколкѣ я нашелъ еще личинку мухи-тахины, очень маленькую, менѣе имм., и очень подвижную.

Послъднія двъ личинки интересны въ слъдующемъ отношеніи. Тульскія гусеницы были собраны въ поляхъ раньше 24 іюля, когда онъ были сданы на почту, слъдовательно, послъднія двъ личинки могли происходить только изъ тъхъ яицъ, которыя попали въ гусеницу, пока она была еще въ полъ, т. е. раньше 24 іюля, такъ какъ послъ заключенія ея въ посылку и прибытія въ лабораторію никакія самки, кладущія яйца, не могли имъть доступа къ гусеницамъ, кромъ тъхъ, которыхъ я къ ней подпускалъ, т. е. самокъ ихневмона, но эти личинки не были личинками ихневмона. Стало быть, яички, изъ которыхъ онъ вылупились, попали въ гусеницу болье двухъ недъль назадъ и личинки эти представляютъ примъръ длительнаго пребыванія при обыкновенныхъ условіяхъ въ т-й стадіи, съ 24 іюля по 9 августа.

Послѣ і августа сильно похолодало и температура въ лабораторіи понизилась до 13°. В'вроятно, по этой причин'в об'в самки въ теченіе нъсколькихъ дней отказывались нападать на гусеницъ, которыхъ я предлагалъ имъ ежедневно, и 4 августа одна изъ самокъ скончалась. Оставалась живою одна, последняя, самка, потерявшая коготковые членики на всъхъ лапкахъ правой стороны. 6 августа лабораторія была протоплена и температура въ ней поднялась до 17°. Утромъ, до топки, пускалъ къ самкъ гусеницъ, но она оставалась равнодушною къ нимъ, какъ и въ предшествовавшіе дни. Послѣ топки опять пускаю къ ней двухъ гусеницъ, ползающую и потерявшую способность ползанія. Отъ первой самка убъгаетъ, на вторую скоро нападаетъ и колетъ еепока считаю до 80. Гусеница переворачивалась, но самка держалась на ней, не вынимая сверла. Черезъ нъсколько времени снова кладу къ ней эту же гусеницу. Самка ощупываетъ ее усиками и какъ бы лижетъ щупальцами, что раздражаетъ гусеницу, которая бъетъ заднимъ и переднимъ концами, потомъ вертится и сбрасываетъ самку, но эта снова начинаетъ дълать то же самое, и довольно долго, пока я не разлучилъ ихъ. Въ гусеницъ этой была найдена 13 августа личинка ихневмона 1-ой стадіи въ моментъ линьки при переходъ во 2-ю стадію.

Еще два раза нападала самка но гусеницъ, 7 и 8 августа, и колола ихъ, при чемъ въ первомъ случат прохождение яйца, благодаря неподвижности гусеницы, было ясно замътно по образованію вздутія у основанія яйцеклада. Насчиталъ до 75 съ момента погруженія яйцеклада до его извлеченія. При кладк 8 августа гусеница была очень подвижной, ползала и била переднимъ и заднимъ концами тъла, самка держалась на наиболъе спокойной части ея-на серединъ и очень долго не вынимала изъ нея сверла (насчиталъ до 400), погрузивъ его на этотъ разъ только до половины. Изъ объихъ этихъ кладокъ ничего не вышло, такъ какъ гусеницы, бывшія въроятно больными, высохли не окуклившись, и при изслъдованіи 14 августа—1-ой гусеницы и 1 сентября—2-ой въ нихъ ничего не было найдено, кром'в одной полусухой личинки тахины въ $2^{1/2}$ милл. длины. 9 августа послъдняя самка скончалась, проживъ въ неволъ два мѣсяца безъ одной недѣли.

Яичники и личинка ихневмона.

Каждую самку въ день ея смерти я вскрывалъ и въ яичникахъ ихъ было найдено по нѣсколько зрѣлыхъ, готовыхъ къ откладыванію, яичекъ, у двухъ по 3 и у одной 2. Выше этихъ яичекъ и въ другихъ яйцевыхъ трубочкахъ были яйца разной степени зрѣлости. Въ общемъ и въ парныхъ яйцеводахъ яичекъ не было ни у одной.

На рис. 60 изображенъ половой аппаратъ одной изъ этихъ самокъ. Онъ состоитъ изъ двухъ яичниковъ, въ составъ которыхъ входитъ по 4 яйцевыхъ трубочки, двухъ очень короткихъ парныхъ яйцеводовъ и тоже короткаго общаго яйцевода, у начала котораго прикръпленъ съмепріемникъ; въ устье общаго яйцевода открываются протоки двухъ железъ: смазочной и ядовитой. Въ нижнихъ камерахъ трехъ яйцевыхъ трубочекъ видно по одному зрълому, готовому къ откладыванію, яйцу, выше ихъ и въ прочихъ яйцевыхъ трубочкахъ помъщаются зачатки яицъ, разной степени спълости. Три указанныя яичка я называю зрълыми потому, что надъ ними не видно камеръ съ питательными клътками, такъ какъ послъднія уже всъ усвоены этими яичками, между тъмъ какъ надъ всъми остальными яйцевыми камерами, содержащими зачатки яицъ, ясно видны камеры съ питательными клътками.

Разсматриваемый нами теперь производящій яички аппаратъ ихневмоновъ въ одномъ отношеніи существенно отличается отъ двухъ уже знакомыхъ намъ таковыхъ же аппаратовъ паниска и офіона. Эти оба имѣютъ длинные парные яйцеводы, служащіе для храненія зрѣлыхъ яицъ, поступающихъ въ нихъ изъ яйцевыхъ трубочекъ, при чемъ у панисковъ парные яйцеводы только




Рис. 60. Яичники ихневмона (Ichneumon sarcitorius L.): a-b-яйцевыя трубочки, a-яйцевая камера съ зачаткомъ яйца, a, —яйцевая камера съ почти зрълымъ яйцомъ, b-камера съ питательными клътками, c-парный яйцеводъ, d-общій яйцеводъ, f-смазочная железа, g-ядовитая железа, h-пріемникъ ядовитой железы, n-яйцекладъ, r-съмепріемникъ, s-питательная железа съмепріемника. Увелич. около 25 разъ. Ориг.

удлинены и могутъ содержать только по одному ряду яичекъ, а у офіоновъ (Ophion, Enicospilus, Banchus и друг.) они, кромѣ

того, способны расширяться и наполняются, какъ мѣшки, многими рядами яицъ. У самокъ ихневмоновъ никакихъ приспособленій для храненія яичекъ внѣ яйцевыхъ трубочекъ не существуетъ, ибо парные яйцеводы ихъ очень коротки, короче чѣмъ зрѣлое яичко, лишь немного длиннѣе общій яйцеводъ, но и онъ все таки коротокъ. Стало быть, здѣсь готовыя къ откладыванію яички могутъ храниться только въ яйцевыхъ трубкахъ и, дѣйствительно, сколько я ни вскрывалъ самокъ ихневмоновъ разныхъ видовъ, я никогда не находилъ у нихъ яицъ ни въ общемъ, ни въ парныхъ яйцеводахъ.

Это обстоятельство особенно интересовало меня въ виду слъдующихъ соображеній. Самки панисковъ и офіоновъ способны, какъ мы видъли, сбрасывать яички, когда не имъютъ передъ собою жертвъ, на которыхъ или въ которыхъ могли бы ихъ, пристроить, и мы объяснили это, какъ необходимое слъдствіе непрерывной дъятельности яичниковъ, выпускающихъ въ яйцеводы все новыя и новыя яички, для помъщенія которыхъ самка должна очищать мъсто, выбрасывая изъ себя тъ, которыя поступили въ яйцеводы раньше. Эти самки принуждены поступать такъ, несмотря на то, что имъютъ особыя приспособленія для храненія зрѣлыхъ яичекъ. Тѣ же самыя соображенія должны быть примѣнены и къ самкамъ ихневмоновъ, яичники которыхъ такъ же непрерывно дъйствуютъ и производятъ новыя зрълыя яички, для храненія которыхъ, однако, внѣ яйцевыхъ трубочекъ здѣсь нѣтъ никакихъ приспособленій, а потому способность сбрасыванія созрѣвщихъ яицъ должна бы явиться у самокъ ихневмоновъ гораздо болъе настоятельной необходимостью, чъмъ въ первомъ случаъ. Дъйствительность, однако, свидътельствуетъ о противоположномъ: ни одна изъ жившихъ у меня самокъ ихневмоновъ (Ihneumon и Amblyteles) разныхъ видовъ не сбросила ни одного яйца, несмотря на то, что онъ были оплодотворены, хорошо кормились, мѣсяцами жили и при вскрытіи оказывались имъющими въ яйцевыхъ трубочкахъ зрълыя яички.

Что должно сдѣлаться съ яйцомъ, которое готово къ откладыванію, но не можетъ быть отложено и потому задерживается внутри самки? Оно подвергается жировому перерожденію и разсасывается—такъ говоритъ швейцарскій ученый, профессоръ Б юніонъ, на основаніи своихъ изслѣдованій надъ яичниками одного короѣда (*Phloeosinus thuyae* Perr.), самокъ котораго, взятыхъ во время кладки, онъ заключалъ предварительно на нѣсколько

дней въ металлическій коробочекъ (10 bis, 135). Я хотълъ видьть процессъ этого жирового перерожденія и вскрылъ для того много самокъ ихневмоновъ разныхъ видовъ, жившихъ у меня продолжительное время безъ откладыванія яицъ, но ни разу ничего ненормальнаго въ яичникахъ ихъ не нашелъ. Всегда въ




Рис. 61. Голова личинки 1-й стадіи ихневмона (Ichneumon sarcitorius L.) снизу: alt—нижнія (боковыя) продольныя дуги, amd—верхнечелюстныя дуги, cl—надротовой щитокъ, lg—язычекъ нижней губы, lml—боковыя пластинки нижней стороны головы, md—верхняя челюсть, mx—нижняя челюсть. Увелич. около 100 разъ. Оригин.

какой-нибудь яйцевой трубкѣ половозрѣлой самки было яйцо какъ яйцо, ничѣмъ на видъ не отличавшееся отъ яичекъ тѣхъ самокъ, кладка которыхъ совершалась безпрепятственно. Это явленіе осталось для меня загадочнымъ.

Итақъ, три самки ихневмона удачно заразили въ лабораторіи четырехъ гусеницъ, которыя потомъ были въ разное время вскрыты мною. Изслѣдованіе найденныхъ въ нихъ личинокъ и сброшенныхъ ими шкурокъ даетъ нѣкоторыя указанія на про-

должительность развитія первыхъ стадій. Двѣ личинки 1-й стадіи (рис. 59) были найдены 23 іюля въ гусеницѣ, въ которую двѣ самки отложили по яйцу 20 іюля; черезъ нѣсколько минутъ послѣ вскрытія одна изъ личинокъ слиняла въ водѣ и перешла во 2-ю стадію. Здѣсь въ теченіе трехъ сутокъ совершилось развитіе зародыша въ яйцѣ, вылупленіе изъ него личинки и одна изъ




Рис. 62. Та же голова сверху: *at*—зачаточный усикъ, *lmd*—продольная срединная пластинка. Значеніе прочихъ буквъ то же, что на предыдущемъ рисункъ. Увелич. около 100 разъ. Оригин.

нихъ успѣла пройти все развитіе 1-й стадіи. Въ другомъ случаѣ—въ гусеницѣ, зараженной 18 іюля, пребываніе въ 1-й стадіи наблюдалось еще на 4-я сутки послѣ отложенія яйца, т. е. 22 іюля. Черезъ 5 дней послѣ отложенія яицъ—въ гусеницѣ, вскрытой 6 августа, найдены были двѣ личинки, обѣ 2-й стадіи. Стало быть, мы можемъ сказать, что у ихневмона для вылупленія изъ яйца и для прохожденія всей 1-й стадіи требуется 3—4 сутокъ, но гусеница, вскрытая 13 августа и получившая яйцо 6 августа, дала тоже личинку 1-й стадіи, захваченную въ моментъ линьки. Послѣднее обстоятельство показываетъ, что пребываніе въ 1-й стадіи можетъ затянуться до 7 сутокъ. Переходъ 2-й стадіи въ 3-ю былъ замѣченъ 6 августа на одной изъ личинокъ, которыя

происходили изъ яицъ, отложенныхъ і августа, т. е. на 5-я сутки послъ кладки. Дальше 3-й стадіи развитіе личинокъ ихт невмона въ куколкахъ озимой ночницы не было прослъжено въ лабораторіи по недостатку матеріаловъ.

Теперь мнѣ слѣдовало бы дать подробныя описанія полученныхъ трехъ стадій, а также послѣдней по шкуркамъ, добытымъ изъ тѣхъ куколокъ ночницы, изъ которыхъ вылетѣли ихневмоны, но это будетъ сдѣлано мною впослѣдствіи, въ другой части настоящей работы, когда я буду излагать наблюденія надъ другими видами ихневмоновъ, полное развитіе которыхъ мнѣ удалось прослѣдить во всѣхъ стадіяхъ. Теперь же ограничусь даннымъ выше изображеніемъ 1-й стадіи личинки нашего ихневмона (Рис. 59, 61 и 62) и указаніемъ на то, что дыхалецъ у нея нѣтъ ни одной пары, хотя дыхательныя трубочки имѣются; кромѣ того, тѣло ея на заднемъ концѣ заостряется, но на нижней сторонѣ его выдаются два сосковидные выступа, которые могутъ вытягиваться, и тогда задній конецъ кажется двухраздѣльнымъ.

4. Дополнение къ живорождению панисковъ.

Когда кончался наборъ настоящей работы, мнѣ представился случай изслѣдовать относительно способности живорожденія 43 самки панисковъ, принадлежащія къ 8 видамъ и пойманныя въ разное время въ разныхъ мѣстахъ Россіи. Явилась, слѣдовательно, возможность подвергнуть серьезной опытной провѣркѣ, путемъ большого числа вскрытій, тѣ положенія, которыя были высказаны мною на страницахъ 85—93 этой книги на основаніи изслѣдованія 10 самокъ, относящихся къ 5 видамъ панисковъ. Результаты изслѣдованія этихъ 43 самокъ представлены въ прилагаемой таблицѣ¹). Въ нее введены мною и тѣ данныя, которыя получены были при вскрытіи 10 раньше изслѣдованныхъ самокъ.

Изслѣдованіе производилось обычнымъ способомъ, т. е. отламывалось брюшко при основаніи и кипятилось въ растворѣ ѣдкаго кали, послѣ чего я отдѣлялъ въ водѣ подъ бинокуляромъ иглами

Видовое на- званіе Paniscus.	Время и мѣсто лова и фамилія соби- рателя.	№- ♀ по по- рядку.	Число най- денныхъ яицъ:	
			безъ личи- нокъ.	съ ли- чинка- ми.
opaculus	15. IV. 04. Голодная степь. Н. Н. Ива-	COLUMB TO	and the state of t	
Thoms.	новъ	1-4	73	1216 -
	18. IV. 03. Тамъ же	5-9	105	SE
	95 W 07 H	10	32	
	25. V. 07. Чолгаръ, Тургайской обл. Л. М. Вольманъ	11—15 16	127 30	
	VI. 11. Кіевская губ. В. П. Поспъловъ	17	18	
	vi. 11. inebekan 1yo. D. H. 11 oo h balob b.	18	12	3-
	PROTECTION PRODUCTION OF THE PROPERTY OF THE P	19	N. B BAS	
	and the state of the section and the state of the state o	20	- 100 <u>- 1</u>	20
	9. VII. 02. Кишиневъ. К. Э. Демокидовъ.		7	_
	4. VIII. 10. Пензенская губ. В. И. II лот-	100	TI DECL	
The about 100 ac	никовъ	22	2	1
sp?	15. IV. 03. Голодная степь. Н. Н. Ива-		85	
gantause ad	новъ	23	14	
turanicus	18. IV. 03. Тамъ же	24	30	(7th -
Kok.	30. IV. 03. Тамъ же	25	44	-
ernor, actical symbol (i.e. acti symbol (i.e. actic symbol (i.e. actic symbol (i.e. actic controllerness actical). It is a	MEDIA POR CALL PARTY CARLO AND ADDRESS TO SERVICE AND ADDRESS AND	26	29	
	Birthy Mannier arma garbiil narmeddaid fafurdaid da	27	4	1
	the little to the description of the state of	28	6	1
	Bedding a fact ratiosoff of that it is at two is sectioned in our deal. It is clear former day into the	29	29	10
	。 東京 1944年2月1日 日本 1940年1月 1日	30	10	2
	manufacturistical establishments of the contraction	31	4	23
		32	8	29
		33	7	3:
	1. V. 03. Голодная степь. Н. Н. Ивановъ.	34	42	000
		35	17	
	Educa de Carlo Carlo de Ser especial estra de la completada en 1900 en	36	19 15	14
	mente accione involvina al del di solvina de fore	37 38	20	14
	26. IV. 03. Тамъ же	39	46	18
capito K o k.	20. IV. US. TAM'S Me	39	10	
testaceus	11. V. 03. К. Э. Демокидовъ	40	-	16
Grav.	9. VII. 99. Елизаветинскій заводъ, Том-	11348 78		
	ской губ. А. Г. Якобсонъ	41	2	-
	Зима 1910. Изъ Германіи. Въ Лабора-			
	торіи	42	5	2
	? Германія	43	11	24
	Тамъ же	44	7	16
gracilipes Thoms.	?? Н. Р. Кокуевъ	45	17	
semenowi	4. VI. 07. Байгакумъ Тургайской обл.	46	14	nd ii
Kok.	Л. М. Вольманъ	47	5	2
virgatus	19. VII. 99. Едизаветинскій заводъ, Том-	200 000	0	
Fourer.	ской губ. А. Г. Якобсонъ	48	20	32
cristatus	22. VII. 99. Тамъ же	49	65	32
Thoms.	30. VII. 99. Тамъ же	50	42	43
	15. ІХ. 10. Въ Лабораторіи. Изъ Тулы.	REMA	V 2027	
	А. А. Сопоцько	51	5	
ocellaris	24. VIII. 10. Тамъ же	52 53	15	2 29
Thoms.	16. ІХ. 10. Тамъ же		6	90

¹⁾ Самцы, не введенные въ таблицу, были пойманы Н. И. И вановымъвъ Голодной Степи 18. IV. 03.: *P. opaculus* Thoms.—2, *P. tura*nicus Kok.—4, *P. ocellaris* Thoms.—3 и 15. IV. 03.—3; кромъ того, Л. М. Вольманъ поймаль 25. V. 07. въ Чолгаръ, Тургайской обл., 2 самцовъ послъдняго вида и 7 самцовъ *P. semenowi* Kok.

и пинцетомъ нижнюю пластинку размягченнаго и просвътленнаго брюшка, и тогда всъ яички легко вываливались изъ брюшка въ воду. Растворъ ѣдкаго кали былъ взятъ на этотъ разъ меньшей крѣпости, чѣмъ раньше, около 30/0, благодаря чему большая часть стебельковъ на яичкахъ осталась цълой, но для растворенія прочаго содержимаго брюшка этой крѣпости было достаточно. Яички съ заключенными въ нихъ личинками ясно видны насквозь въ прокипяченномъ такимъ образомъ брюшкъ даже безъ вскрытія его, такъ какъ жиръ, мускулы, кишечникъ, яйцеводы и яичники, а также всъ зачатки яицъ, не выработавшіе еще скорлупы, т. е. все затемняющее картину, растворяется при кипяченіи. Два обработанныхъ такимъ образомъ брюшка я заклеилъ въ канадскомъ бальзамъ въ препаратъ и получился превосходный документъ, наглядно доказывающій при обозръніи его подъ микроскопомъ наличность вполнъ развитыхъ личинокъ въ брюшкъ самки. Эти два брющка я имълъ возможность ввести въ таблицу подъ № 31 и 33, такъ какъ настолько ясно видны въ нихъ яички съ личинками и безъ личинокъ, что можно пересчитать и тъхъ и другихъ.

Изъ таблицы видно, что мною изслѣдованы были 53 самки 10 видовъ, изъ которыхъ для 8 видовъ: opaculus Thoms., turanicus Kok., testaceus Grav., gracilipes Thoms., semenowi Kok., virgatus Fourer., cristatus Thoms. и ocellaris Thoms., способность живорожденія является нынѣ вполнѣ доказанной, но относительно двухъ видовъ, помѣщенныхъ въ таблицѣ подъ №№ 14 и 39, sp? и capito Kok., вопросъ этотъ остается открытымъ. Примемъ во вниманіе, что самокъ послѣднихъ двухъ видовъ я изслѣдовалъ только по одной, чего совершенно недостаточно для отрицательнаяо вывода, кромѣ того, онѣ обѣ пойманы были очень рано: 15 и 26 апрѣля, почему, надо полагать, были еще слишкомъ молоды и личинки въ нихъ не успѣли развиться.

Итакъ, высказанное нами раньше положеніе о томъ, что способность живорожденія есть родовое свойство панисковъ, а не пріурочена къ тому или другому виду, получило при новомъ изслѣдованіи весьма солидное подкрѣпленіе, не смотря на кажущееся отрицательное свидѣтельство двухъ самокъ двухъ послѣднихъ видовъ.

Обсуждая условія, при которыхъ изслѣдованіе можетъ обнаружить способность живорожденія, мы должны принимать въ соображеніе прежде всего возрастъ изслѣдуемыхъ самокъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ яичникахъ молодой самки, только что вышедшей изъ куколочнаго состоянія, мы найдемъ лишь зачатки яицъ, а въ яйцеводахъ не можемъ разсчитывать найти не только личинокъ, но и самыхъ яицъ, почему яйцеводы молодой самки должны быть пустыми. Совершенно иной результатъ получится при вскрытии этой же самки послѣ того, какъ она проживетъ нѣкоторое время по выходѣ изъ куколочнаго состоянія, имѣя достаточный кормъ. Тогда зачатки яицъ въ яйцевыхъ трубочкахъ успѣютъ превратиться въ яички, которыя перейдутъ въ яйцеводы и здѣсь въ самыхъ старшихъ—ближайшихъ къ выходу изъ яйцевода, мы найдемъ готовыхъ къ вылупленію личинокъ въ яичкахъ 1).

Но какъ опредълить возрастъ самки до ея вскрытія? Когда мы имъемъ дъло съ видомъ однолетнымъ, т. е. съ такимъ, представители котораго даютъ въ теченіе года одно поколъніе, то очевидно, что самки, пойманныя въ началъ лётнаго періода даннаго вида, будутъ молодыми, а пойманныя въ серединъ его и въ концъ будутъ пожившими и старыми. Выше показано было, что паниски считаются однолётными, даже въ тенломъ климатъ Италіи, слъдовательно, самокъ ихъ, пойманныхъ весною, мы должны считатъ молодыми, а потому и не должны брать ихъ для вскрытія при разръшеніи вопроса о томъ—живородящи онъ или нътъ, для чего требуются пожившія самки лътняго или осенняго лёта.

Обращаясь къ нашей таблицъ, мы найдемъ въ ней сначала подтверждение только-что высказаннаго положения, но далъе увидимъ яркое, однако, лишь кажущееся, ему противоръчие. Изъ первыхъ 16 самокъ (opaculus Thoms.), пойманныхъ въ апрълъ и въ маъ, только въ двухъ были найдены яички съ личинками и

⁴⁾ Само собой понятно, что эти соображенія приложимы лишь къ той группѣ насѣкомыхъ, которыя названы мною въ "Загадкѣ короѣдовъ" дробнокладущими (72, 16 и 17), такъ какъ у кучнокладущихъ, наприм. у шелкопрядовъ, яички развиваются еще въ куколкѣ и готовы бываютъ для откладыванія съ момента выхода самки изъ куколочнаго состоянія. Къ числу дробнокладущихъ должны быть отнесены между прочимъ и тѣ виды которые оказались причастными къ живорожденію. Гистолого-физіологическія основы предложеннаго мной дѣленія насѣкомыхъ на кучно и дробнокладущихъ прекрасно развиты въ работѣ профессора В. П. Поспѣлова объ имагинальной діапаузѣ (64 bis, 225—230 и др.). Разныя степени дробленія кладокъ у жуковъ въ связи съ измѣненіями въ строеніи ихъ яичниковъ указаны раньше меня въ работѣ швейцарскаго профессора Б ю н і о н а (10 bis, 136—138).

притомъ въ незначительномъ количествѣ: 1 и 3 личинки на 30 и 32 яйца безъ личинокъ; но изъ четырехъ самокъ того же вида, пойманныхъ въ іюнѣ, №№ 17—20, яички съ готовыми личинками оказались у трехъ, и въ преобладающемъ количествѣ. Это говоритъ въ пользу высказаннаго положенія, также какъ и данныя по изслѣдованію туранскаго паниска—№№ 24—38. Изъ 15 самокъ этого вида одна поймана 18 апрѣля и въ ней найдены только яйца; остальныя 14 самокъ пойманы почти на двѣ недѣли позднѣе, 30 апрѣля и л мая, и изъ нихъ только у двухъ не найдены личинки, а у 12 личинки большей частью преобладали.

Далѣе, самка № 21 перваго вида (opaculus Thoms.), пойманная въ іюлѣ и въ такой южной мѣстности, какъ Кишиневъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ возстаетъ противъ правильности вышеизложеннаго положенія, такъ какъ въ ней, несмотря на середину лѣта, были найдены только яички, но не личинки. Стало быть, она была въ столь позднее время молодою. То же мы встрѣчаемъ и со стороны самокъ за №№ 17, 41, 46 и 49, пойманныхъ въ іюнѣ и въ іюлѣ, которыя всѣ принадлежатъ къ видамъ, какъ нами доказано теперь, живородящимъ и которыя въ моментъ лова были настолько молоды, что яичекъ съ личинками въ нихъ не фказалось.

Я назвалъ это противорѣчіе кажущимся потому, что появленіе молодыхъ самокъ въ серединѣ лѣта доказываетъ, что не правы тѣ, которые относятъ панисковъ къ однолётнымъ видамъ, ибо паниски могутъ развиваться въ теченіе одного лѣта, какъ показали наши лабораторныя изслѣдованія, въ количествѣ по крайней мѣрѣ двухъ поколѣній, при какомъ условіи только и объяснима возможность похожденія въ іюлѣ молодыхъ самокъ тѣхъ видовъ, наприм. № 7 и № 41, лётъ которыхъ начинается въ апрѣлѣ. Итакъ, дополнительное наше изслѣдованіе вновь подтвердило, что 1) живорожденіе есть родовое свойство панисковъ и 2) въ теченіе года развивается у панисковъ не одно, а нѣсколько поколѣній.

Способность живорожденія является въ средѣ насѣкомыхъ, размножающихся половымъ путемъ, далеко не исключительной особенностью, свойственной однимъ только панискамъ. Какъ выше было указано, уже Реомюру были извѣстны живородящія мухи, относимыя нынѣкъ отдѣламъ тахинъ, саркофагъ, дексій и друг. Изслѣдованіями позднѣйшихъ ученыхъ та же способность была открыта у цѣлаго ряда, хотя и не многочислен-

наго, представителей другихъ отрядовъ насъкомыхъ, общій обзоръ которыхъ сдъланъ недавно стокгольмскимъ профессоромъ Гольмгреномъ (23 bis, 431) и въ новъйшее время пополненъ Н. Я. Кузнецовымъ (61 bis, 634). Послъдній сдълалъ чрезвычайно интересное и совершенно неожиданное открытіе живорожденія у нъкоторыхъ изъ самыхъ обыкновенныхъ нашихъ бабочекъ (Colias, Euchloe и др.), составлявшихъ предметъ энтомологическихъ наблюденій не менъе продолжительныхъ, чъмъ паниски.

Ссылаясь на работы двухъ названныхъ ученыхъ, я не буду останавливаться на вопросѣ о распространенности живорожденія при половомъ способѣ размноженія у насѣкомыхъ, но долженъ коснуться тѣхъ объясненій, которыя были по поводу его предложены, такъ какъ, въ случаѣ ихъ правильности, они должны быть приложимы и къ панискамъ. Добавлю, впрочемъ, что благодаря панискамъ отрядъ пленчатокрылыхъ насѣкомыхъ (Hymenoptera) пріобщается впервые къ группѣ живородящихъ, такъ какъ до сихъ поръ случаевъ живорожденія ни у одного изъ представителей этого отряда не было замѣчено.

Проф. Гольмгренъ нашелъ живорождение (23 bis, 439) у одного изъ видовъ жука листоѣда (Chrysomela hyperici Först) и вмѣстѣ съ тѣмъ удостовъряетъ, что у этого вида совсъмъ нътъ съмепріемника. Далъе, названный ученый указываетъ на тс. что живорожденіе у жуковъ семейства листоъдовъ (Chrysomelidae), именно у нъсколькихъ видовъ рода орина (Orina), давно извъстно и замъчено нъсколькими наблюдателями, изъ числа которыхъ Чэмпіонъ и Чэпмэнъ дали изображеніе яичниковъ и яйцеводовъ одного изъ живородящихъ видовъ орина, но на этомъ изображеній также нътъ съмепріемника, нътъ о немъ упоминанія и въ описаніи. Отсюда Гольмгренъ делаеть выводъ, что отсутствіе съмепріемника характерно для живородящихъ листо довъ и что у нихъ оплодотворение яицъ совершается иначе, чъмъ у видовъ, снабженныхъ съмепріемникомъ. Первая часть вывода Гольмгрена къ нашимъ панискамъ, равно какъ и къ живородящимъ бабочкамъ, которыхъ изслѣдовалъ Н. Я. К у з н ецовъ, не подходитъ, ибо у всъхъ у нихъ съмепріемники были въ наличности, на томъ мъстъ, гдъ имъ слъдуетъ быть, т. е. на общемъ яйцеводъ.

Болъе того, выводъ Гольмгрена не подходитъ и къ другимъ видамъ листоъдовъ, которые по моимъ изслъдованіямъ также живородящи. Имъя въ виду, что личинокъ у живородя-

щихъ видовъ можно найти въ тѣлѣ матери при помощи кипяченія въ растворѣ ѣдкаго кали, даже у тѣхъ самокъ, которыя сохраняются сухими въ коллекціяхъ, наколотыя на булавки, я обратился къ нашему знатоку жуковъ семейства листоѣдовъ, Г. Г. Я к обсон у, съ просьбой дать мнѣ для предположеннаго изслѣдованія по нѣсколько самокъ возможно разнообразныхъ видовъ рода листоѣдовъ (Chrysomela). Просьба моя была очень любезно удовлетворена и я получилъ представительницъ 18 видовъ названнаго рода, которыхъ имѣлъ терпѣніе всѣхъ изслѣдовать.

Напомню, что здъсь такъ же, какъ при изслъдованіи панисковъ, мы имъемъ право считать доказательными только положительные результаты изследованія, такъ какъ отрицательный результать, т. е. ненахождение личинокъ, могъ быть следствіемъ случайнаго подбора молодыхъ самокъ, хотя бы и такого вида, которому свойственно живорожденіе. Поэтому тѣ виды, у которыхъ я не нашелъ личинокъ, еще не могутъ быть отнесены на основаніи этого изслѣдованія къ числу не способныхъ къ живорожденію. Изъ 18 изслідованныхъ мною видовъ были найдены личинки въ самкахъ трехъ видовъ: Chrysomela marginata L., C. limbata Fbr. и С. gypsophilae Küst., и у всъхъ самокъ этихъ трехъ видовъ имълись съмепріемники, какъ и у тѣхъ, для которыхъ способность живорожденія не удалось описаннымъ способомъ доказать (наприм. Chr. polita L., lurida L., menthastri Sffr., goettingensis L., cerealis L. и др.). Съмепріемникъ у жуковъ этого рода сильно хитинизированъ, благодаря чему онъ не растворяется въ растворъ ъдкаго кали и положение его легко опредъляется. Онъ помъщается близъ наружнаго края общаго яйцевода и стебелекъ его впадаетъ почти въ устье послѣдняго, какъ это изображено и описано еще въ старой работъ Штейна (52 bis, 132, Tb. VП, f. 16) для Chrysomela sanguinolenta. Кром'ь того, я им'ьлъ возможность наблюдать живорожденіе у живыхъ самокъ Chrysomela varians Schall., но изслъдованія ихъ яйцеводовъ мнъ не удалось произвести вслъдствіе случайной потери этихъ самокъ.

Что касается жуковъ рода орина (Orina), для которыхъ Гольмгренъ признаетъ живорожденіе родовымъ свойствомъ, то и у нихъ, судя по одному изслѣдованному мною виду—Orina rugulosa Suffr., для которой способность живорож денія доказана Чемпіономъ и Чепмэномъ, сѣмепріемникъ имѣется, и того же образца, какъ нарисовано у Штейна.

Итакъ, на основаніи вышеизложеннаго мы должны признать, что между способностью живорожденія и отсутствіемъ или наличностью съмепріемника нътъ никакой связи.

Въ совсѣмъ иного рода освѣщеніи представляетъ намъ живорожденіе размножающихся половымъ путемъ насѣкомыхъ Н. Я. К'узнецовъ, пріурочивая его къ тѣмъ видамъ и разновидностямъ, которыя свойственны высокогорнымъ и сѣвернымъ мѣстностямъ. Я ничего не могу возразить противъ возможности обсуждать разбираемое явленіе съ указанной точки зрѣнія, но только при условіи предварительнаго разъясненія вопроса о возрастѣ изслѣдованныхъ самокъ, ибо изслѣдованіе молодыхъ, откуда бы онѣ ни происходили, дастъ всегда отрицательные результаты, даже и для завѣдомо живородящихъ видовъ, а на это именно обстоятельство, т. е. на возрастъ самокъ, и не было обращено должнаго вниманія.

Н. Я. К у з н е ц о в ъ изслѣдовалъ своихъ бабочекъ точно такъ же, какъ я изслѣдовалъ большую часть моихъ панисковъ и листоѣдовъ, т. е. пользовался коллекціоннымъ матеріаломъ, сборъ котораго совершенно случайно могъ совпадать съ началомъ или съ концомъ лёта того или другого вида. Только въ одномъ мѣстѣ своей работы Н. Я. К у з н е ц о в ъ какъ будто бы приближается къ сознанію важности выясненія вопроса о возрастѣ, но, увлекаемый заранѣе объявленной связью живорожденія съ широтой и высотой мѣстности, отходитъ отъ него безъ всякихъ послѣдствій.

Вотъ его слова: при изслѣдованіи «выработалась даже нѣкоторая возможность предсказывать нахожденіе развитой личинки внутри самки по одному лишь наружному облику и этикеткѣ послѣдней: напр., разъ экземпляръ самки Colias оказывался старымъ отрепаннымъ»... «то можно было со значительной степенью вѣроятности ожидать обнаруженія внутри его при вывариваніи развитой гусеницы» (61 bis, 641). Кажется, что авторъ вплотную подошелъ къ вопросу о значеніи въ данномъ отношеніи возраста, но нѣтъ, раньше заподозрѣнная связь съ другимъ условіемъ не допустила изслѣдователя стать твердой ногою на вѣрный путь. Въ томъ мѣстѣ приведенной и разорванной мною цитаты, гдѣ я поставилъ многоточіе, стоятъ слѣдующія слова: «происходящимъ изъ высокогорной мѣстности или съ далекаго сѣвера». Вотъ эта идея и испортила все дѣло, направивъ изслѣдованіе и выводы

изъ него на иной путь, вслъдствіе его преждевременности невърный.

Можетъ быть, связь съ широтой и высотой мъстности существуетъ, но она осталась не доказанной, такъ какъ возможно, что изслъдованныя самки умъреннаго пояса и южныя, а также самки долинъ все были молодыя, а потому, и только потому, въ нихъ нельзя было найти гусеницъ. Собиратель, попавшій на далекій съверъ и на высокія горы, беретъ все, что ему попадется, даже старые отрепанные экземпляры, безъ особаго разбора, такъ какъ въ этихъ трудно достигаемыхъ мъстахъ ръдко кому удается собирать, да и фауна ихъ настолько бъдна, что собиратель не будетъ подавленъ слишкомъ обильнымъ матеріаломъ, даже если будеть все брать. Совствить иное дтьло на югть, въ умтъренномъ пояст и въ долинахъ, гдт собиратели бываютъ чаще и въ большемъ количествъ, и гдъ фауна настолько обильна и разнообразна, что все брать невозможно, почему собиратели стараются добыть болъе свъжій матеріалъ, не отрепанный, т. е. молодыхъ, недавно вылетъвшихъ самокъ. По этой, въроятно, причинъ и удалось Н. Я. Кузнецову найти большее количество отрепанныхъ, т. е. живородящихъ, самокъ среди матеріаловъ, доставленныхъ съ далекаго съвера и съ высокихъ горъ, а не потому, что съ послъдними условіями находится въ какой-нибудь связи живорожденіе.

Итакъ, связь широты и высоты мъстности съ живорожденіемъ, являющаяся пока не доказанной для бабочекъ, не можетъ затронуть и живорожденія нашихъ панисковъ и листоъдовъ.



Книжный указатель.

1. Adler. Ueber das Eierlegen fon *Paniscus*.—Entom. Nachr. V. 1879, p. 265.

2. Albin. A natural history of English insects. London. 1720, Tb. 11.

3. Andrews.—The Entomologist. XV, 1882, pp. 163 и 239.

Bachmetjew.—Ztschr. wiss. Insectenbiol. VI, 1910, p. 123.
 Berthoumieu. Ichneumonides d'Europe. — Ann. Soc. Ent. France. Paris. LXIII, 1894, p. 257.

6. Bechstein und Scharfenberg. Vollständige Naturgeschichte. Leipzig, III, 1805, p. 964.

7. Bridgman and Fitch. Introductory Papers on Ichneumonidae.—The Entomologist. XVII, 1884, р. 122 и XVIII, 1885, р. 13.

8. Brischke. Die Hymenopteren der Provinz-Preussen.— Schrift. d. K. physik-oekon. Gesell. zu Königsberg.

9. — Ueber das Eierlegen der Ichneumoniden. — Ent. Nachr.

V, 1879, p. 221.

10. Bugnon. Recherches sur le developpement postembryonnaire, l'anatomie et les moeurs de *l'Encyrtus fuscicoltis.*—Recueil. Zool. suisse. Genève. V, 1891, p. 463.

10 bis. Bugnon. Sur la ponte du Phloeosinus thuyae. -Revue

d'Entomol. Caen. 1887, 129-138.

11. de Dalla Torre, C. Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum. Lipsiae. III, Р. 1, 1901 и Р. 2, 1902 (Ichneumonidae, Evaniidae etc.); IV, 1898 (Braconidae); V, 1898 (Chalcididae et Proctotrupidae).

12. Degeer. Mém. hist. Insect. II, 1, 1771, p. 850, tb. 29, f. 15—26, но я пользовался нъмецкимъ изданіемъ этихъ "Мемуаровъ" 1779 года—"Abhandlungen" etc. II, 1, p. 169, tb. 29, f. 19—21.

13. Dours, A. Catalogue synonymique des hyménoptères de France. Amiens. 1874.—Mém. Soc. Linn. Nord. France. III. 1873.

14. Eckstein, K. Beiträge zur Kenntniss des Kieferspinners.—Zool. Jahrbüch. Abth. f. Syst. Jena. 1911, pp. 59—164.

15. Erichson. Jahresber. über d. wiss. Leist. Entom. 1844. Berlin. 1846, p. 69 (133).

16. Fabricius. Supplement. Ent. Syst. Hafniae, 1798, pp. 210,

17. Ganin. Beiträge z. Kenntn. d. Entwickelungsgesch. bei d. Insekten.—Ztschr. f. wiss. Zoologie. Leipzig. XIX, 1869, pp. 400, 409, 435, 437.

18. Giraud. Liste des éclosions d'insectes. Recueillié et annotée par Laboulbène.—Ann. Soc. Ent. France. Paris. 1877, pp. 397—436.

19. Gödart. Metam. et hist. nat. Insect. Medioburgi. II, 1667, tb. 37.

20. Grandori, R. Contributo all'embryologiae e alla biologia dell'Apanteles glomeratus (L.) Reinh. — "Redia". Firenze. VII, 1911, pp. 364-428.

21. Gravenhorst. Ichneumonologia Europaea. Vratislaviae

III, 1829, pp. 693, 628, 696.

22. Hartig. Ueber die gestielten Eier. d. Schlupfwespen. -Arch. f. Naturg. Berlin, III, 1837, p. 156.

23. Henneguy. Les Insectes. Paris, 1904, p. 475.

23 bis. Holmgren, N. Ueber vivipare Insekten.—Zool. Jahrb.,

Abth. Syst. XIX, 1904, pp. 431-468.

24. Howard. The biology of the Hymenopterous insects of the family Chalcididae.—Proceed. Nation. Museum. Washington, XIV, 1891, № 881, p. 975.

25. — A study on Insect Parasitism. — U. S. Dep. Agr. Div.

Ent. Techn. Ser. № 5. Washington, 1897, p. 9.

- 26. Howard and Fiske. The Importation into the United States of the parasites of the Gipsy moth and the Brown-tail moth. Bull, 91. Bur. of Entom. U. S. Depart. of Agriculture. Washington. 1911.
- 27. Linnaei, C. Fauna Svecica. Stockholmiae. 1746, p. 293; 2-е изд. 1761, р. 407.

28. Marchal, P. Sur la réceptacle séminal de la Guépe. Ann. Soc. Ent. France 1894, p. 44-49.

29. — La Polyembryonie spécifique. — Arch. d. Zool. expér.

Paris, II, 1904, p. 257-335, tab. IX-XIII. 30. — Les Platygasters.—Ibidem, IV, 4-e série, 1906, pp. 546

и 619. 31.—Utilisation des insectes auxiliaires entomophages dans la lutte contre les insectes nuisibles.—Ann. Inst. Agron. Paris. sér. 2,

VI, 1907, pp. 281—354. 32. Marshall, T. Les Braconides. Beaune, 1888, p. 37.

33. Martelli, G. Contribuzioni alla conoscenza d. Dicranura vinula L. e d. alcuni suoi parassiti. — Boll. Labor. Zool. Gen. e Agr. Portici, III, 1909 p. 256.

34. Metschnicow. Embryolog. Stud. an Insect. - Ztschr. f.

wiss. Zool. Leipzig, XVI, 1866, p. 91.

- 35. Newport. The Anatomy a. Developm. of certain Chalcididae and Ichneumonidae. III. - Trans. Linn. Soc. London. XXI, 1852, pp. 85—93, IX.
- 36. Nielsen, I. Om Paniscus cephalotes Holmgr., en paa Gaffelhalen snyltende Hveps.—Entomologiske Meddelelser. Kjobenhavn. III, 1906, pp. 5—15, tab.

37. Pantel, I. Le Thrixion halidayanum Rond. Essai mono-

graphique sur une larve parasite.—La Cellule, XV, 1898.

38. — Recherches sur les Diptères a larves entomobies. — Ibidem. XXVI. 1910.

39. Poulton. Notes upon the larva of Paniscus cephalotes. — Trans. Ent. Soc. London, 1886, p. 164 и 1887, p. 303.

40. Ratzeburg. Die Ichneumonen der Forstinsecten. Berlin,

I, 1844; II, 1848 u. III, 1852.

41. - Ueber Entwickelung, Leben und Bedeutung der Ichneumonen.—Stett. Ent. Ztg. V. 1884, p. 201.

42. — Die Ichneumonen in den Winterraupen des Kiefern-

Spinners.—Forstl. Blätter. Berlin, 1865, Hft. IX, p. 147—148.

43. Reaumur. Mémoires pour servir a l'histoire des insectes. Amsterdam. VI, P. 2, 1748, pp. 80, 103, Tb. 30, f. 12 (Далла Торре, слъдуя Гравенгорсту, невърно указалъ стр. (310) и годъ изланія—1742).

44. Reinhard. Zur Entwickelungsgesch. des Tracheensystems

der Hymenopteren.—Berl. Ent. Ztschr. IX, 1865, p. 204.

45. Riley. 4-th Ann. Rep. nox. Ins. Missouri. Jefferson City.

1872, p. 108.

46. Rondani, C. Degli insetti parassiti e delle loro vittime.— Bull. Soc. Entom. Italiana Firenze. III, 1871, pp. 121-143, 217-248; IV, 1872, pp. 41 - 78, 229 - 258, 321 - 342; VIII, 1876, pp. 54 - 70, 120 - 138, 237 - 258; IX, 1877, pp. 55 - 66; X, 1878, pp. 9 - 33, 161-178.

47. — Degli insetti nocivi e dei loro parassiti. — Ibidem, IV.

1872, pp. 137—165; V, 1873, pp. 3—30, 133—165, 209—232.

48. Schmiedeknecht, O. Opuscula Ichneumonologica. Blankenburg. I. (Ichneumoninae) 1902; II. (Cryptinae) 1904 — 1906); III. (Pimplinae) 1906—1908; IV. (Ophioninae) 1908—1912.

49. Schrank. Fauna Boica. Ingolstadt. 1802, II. P. 2, 262 H

316.

50. Seurat. Contributions à l'étude des Hyménoptères ento-

mophages.—Ann. Sc. Nat. Zool. Paris, X, 1899, p. 60.

51. Silvestri. Contribuzioni alla conoscenza biologica degli Imenotteri parassiti.—Boll. Labor. Zool. Gen. e Agr. Portici, I, 1907, pp. 17—64, tb. I—V.

51 bis. Snellen van Vollenhoven. Pinacographia. 'Sgra-

venhage. 1880.

52. Stenton. On the oviposition and incubation of the Ichneumonid Paniosus virgatus Fourc.—The Entomologist. London. XLIII, 1910, pp. 210-212.

52 bis. Stein, F. Vergleichende Anatomie und Physiologie der

Insecten. Berlin. 1847.

53. Szépligeti, G. Hymenoptera fam. Ichneumonidae. Gruppe Mesochoroidae (Ophionoidae part.).—Genera Insectorum dirigés par P Wytsman. 114 fasc. Bruxelles. 1911, p. 74.

54. Verson.—Atti R. Inst. Veneto Sci. Lett. ed Art. Vol. 64,

1904—1905, P. 2, p. 496.

55. Weissenberg. Zur Biologie und Morphologie Apanteles glomeratus L.—Sitzungsber. d. Ges. Naturf. Freunde. Berlin. 1908, pp. 1-18.

56. — Zur Biologie und Morphologie endoparasitisch lebender

Hymenopterenlarven.—Ibidem, 1909, pp. 1—28.

57. Wesmael. Tent.—Nouv. mém. acad. Bruxelles. XVIII, 1844, p. 97, № 102.

58. Васильевъ, И. Боярышница (Aporia crataegi L.) и ея

паразиты. Спб. 1902.—Тр. Бюро по Энтом. III, № 8.

- 59. Вредная черепашка (Eurygaster integriceps) (0 s c h. Put.) и новые методы борьбы съ ней при помощи паразитовъ. Спб. 1904.—Тамъ же IV, № 11.
- **60.** Шелкопряды сосновый (Dendrolimus pini L.) и кедровый (Dendrolimus segregatus Butl.). Спб. 1905.—Тамъ же. V, № 7.

61. Кожевниковъ, Г. Матеріалы по естественной исторіи пчелы (Apis mellifera L.). Москва. Вып. І, 1900. Вып. ІІ, 1905. — Изв. И. Общ. Люб. Е. А. и Этн. ХСІХ.

61 bis. Кузнецовъ, Н. Я. О въроятности живорожденія у нъкоторыхъ чешуекрылыхъ семейства Danaidae (Pierididae auct.).—

Тр. Р. Энт. Общ. XXXIX, 1910, стр. 634-651.

62. Курдюмовъ, К. О роли паразитическихъ и хищныхъ насъкомыхъ въ борьбъ съ вредителями. Кіевъ, 1911. — Изв. Кіевск. Политехн. Инст.

63. — Состояніе вопроса объ утилизаціи хищныхъ и паразитныхъ насъкомыхъ въ цъляхъ борьбы съ вредителями.

63 bis. Малышевъ, С. И. Къ біологіи одинеровъ и ихъ

паразитовъ.—Тр. Р. Энт. Общ. XL, № 2, 1911, стр. 1—58.

- 64. Поспъловъ, В. Вредители полеводства въ Кіевской губ. въ 1911 г. Кіевъ. 1912. Въстникъ Сахарной Промышленности за 1912 г.
- 64 bis. Поспъловъ, В. Постъ-эмбріональное развитіе и имагинальная діапауза у чешуекрылыхъ.—Записки Кіевск. Общ. Ест. XXI, 1911, стр. 163—418.

65. Радецкій, А. О паразитарномъ методъ борьбы съ яблон-

ной плодожоркой (Carpocapsa pomonella L.). Ташкентъ. 1911.

66. Сааковъ. Объ искусственномъ размноженіи паразита яичекъ и хлъбнаго клопа. СПБ. 1903.—Тр. Бюро по Энтом. IV. № 2.

- 67. Соколовъ, Н. *Telenomus socolowi* Мауг., его описаніе, образъ жизни значеніе въ сельскомъ хозяйствъ.—Тр. Р. Энтом. Общ. СПБ. ХХХ, 1897, р. 444—456.
 - 68.—Маврскій (готтентотскій) клопъ (Eurygaster maura F.) или

черепашка. СПБ. 1901.

69.—Полосатый клопь (Aelia furcula Fieb.). — Тр. Бюро по

Энтом. СПБ. IV, № 9, 1904.

70. Шарпъ, Д. Насъкомыя. Переводъ, обработка и дополне-

нія Н. Я. Кузнецова. Спб. 1910.

71. Шевыревъ, Ив. Списокъ сверлоносныхъ перепончатокрылыхъ (*Hymenoptera terebrantia L.*), встръчающихся въ Харьковской и Полтавской губ. — Тр. Общ. Исп. Прир. при И. Харьков. Унив. XVII. 1883.

72. — Загадка коровдовъ. Изд. 3-е. Спб. 1910.

73. — Къ исторіи развитія *Theronia atalantae Poda*.—Русск. Энтом. Обозр. VII. 1907, р. 1—4.

74. — По поводу одной сельскохозяйственной монографіи.—

Русск. Энтом. Обозр. IX, 1909, рр. 414-428.

75. — Способы изученія превращеній паразитныхъ наѣздниковъ.—Сельск. Хоз. и Лѣсов. СПБ. 1911. №№ 10, 11 и 12, а также Энтом. Вѣстникъ. Кіевъ. 1912. № 1.

