

19481
515

59 0136
B. 6 2
Ю. А. Филиппенко.

Товарищу
М. Козловскому
Мур
Министру
Николаю Николаевичу
Троцкому
РАЗВИТІЕ ИЗОТОМЫ

от амебы

(ISOTOMA CINEREA Nic.—Collembola).

Съ 5 таблицами.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28.

1912.

1973 г.


1948
515
2683

Ю. А. Филиппченко.

В 62

РАЗВИТИЕ ИЗОТОМЫ

(ISOTOMA CINEREA Nic.—Collembola).



Съ 5 таблицами.

Карело-Финская База
Академии Наук СССР
БИБЛИОТЕКА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28.

1912.



СОДЕРЖАНІЕ.

	СТРАН.
Введение	1
I. Историческій обзоръ литературы по эмбриологии Apterygota.	3
II. Взрослая форма. Матеріаль и методы изслѣдованія	8
III. Первый періодъ развитія.—Дробленіе, образованіе бласто- дермы и желточныхъ клѣтокъ, появленіе полового зачатка	10
IV. Второй періодъ развитія.—Образованіе нижняго листка, спинного органа и зародышевыхъ оболочекъ	17
V. Третій періодъ развитія.—Закладка и дифференцировка за- родышевой полосы, переворачиванье зародыща.	31
VI. Четвертый періодъ развитія.—Образованіе внѣшней формы тѣла и органогенезъ.	53
VII. Общая часть.	91
1. О раннемъ обособленіи полового зачатка у насѣ- комыхъ.	91
2. Значеніе желточныхъ клѣтокъ у членистоногихъ	97
3. Зародышевые пласты насѣкомыхъ	103
4. О спинномъ органѣ и зародышевыхъ оболочкахъ насѣкомыхъ.	110
5. Apterygota и Diploroda.	117
Списокъ цитируемой литературы	122
Объясненіе рисунковъ	128

I. Историческій обзоръ литературы по эмбриологiи Apterygota.

Не смотря на малую изученность многихъ вопросовъ, касающихся эмбриональнаго развитiя низшихъ насѣкомыхъ, мы имѣемъ довольно много работъ по эмбриологiи Apterygota.

Что касается до **Collembola**, то первыя свѣдѣнiя о ихъ развитiи имѣются уже въ классической нѣкогда монографiи Nicolet, появившейся еще въ 1842 году. Онъ описываетъ внѣшнiй видъ яицъ, строенiе яйца въ яичникѣ и послѣ его отложенiя, нѣкоторыя явленiя во время развитiя яйца и строенiе уже сформированныхъ зародышей, при чемъ все это иллюстрируется таблицей рисунковъ. Данныя Nicolet лишены теперь всякаго значенiя, но для насъ интересно отмѣтить, что главнымъ объектомъ для его наблюденiй послужили яйца и зародыши той же *Isotoma cinerea*, которая изслѣдована въ этомъ отношенiи и нами: рисунки 3 — 15 на его таблицѣ 1-й относятся именно къ этой формѣ. Въ 1871 году Paskard описалъ развитiе американскаго вида того же рода, названнаго имъ *Isotoma walkerii*. Ему удалось прослѣдить образованiе зародышевой полосы, ея сегментацию и дальнѣйшую дифференцировку зародыша; точно также имъ установлено отсутствiе клѣточныхъ зародышевыхъ оболочекъ и закладка вилки въ видѣ двухъ зачатковъ. Въ развитiи *Isotoma* Paskard видитъ нѣкоторую аналогiю съ развитiемъ Phryganidae.

Почти одновременно съ работой Paskard'a вышло сперва предварительное сообщенiе, а затѣмъ и болѣе подробная работа Ульянина „Наблюденiя надъ развитiемъ подуръ“ (1875). Онъ изслѣдовалъ 4 вида: 2 вида *Entomobrya* („*Degeria*“), *Neanura muscorum* („*Achorutes tuberculatus*“) и одинъ видъ *Onychiurus*, вѣроятно, *ambulans* („*Anurophorus fimetarius*“ по терминологiи Ульянина). Ульянинымъ было впервые описано своеобразное полное дробленiе яицъ Collembola, образованiе подъ хоріономъ

двух зародышевых оболочек, закладка спинного органа, дифференцировка зародышевых слоев, развитие зародышевой полосы и конечностей, в том числе гомодинамичных имъ вилки и *tubus ventralis*. В развитии подуръ Ульянинъ видитъ наибольшее сходство съ развитиемъ низшихъ ракообразныхъ и многоножекъ, что между прочимъ выражается и въ развитии средней кишки. Вообще нельзя не отмѣтить, что эта работа отличается крайней обстоятельностью и точностью наблюдений, такъ что съ данными Ульянина приходится считаться и въ настоящее время.

Появившаяся въ 1879 году работа Barrois осталась мнѣ совершенно неизвѣстной. Четыре года спустя опубликовалъ свои наблюдения надъ развитиемъ *Anurophorus laricis* и *Sminthurus fuscus* Lemoine (1883). Наибольшій интересъ въ нихъ представляетъ подробное описание измѣненій вѣшней формы зародыша по днямъ, иллюстрированное большимъ количествомъ рисунковъ. Эти наблюдения во многомъ расходятся съ данными Ульянина: у *Sminthurus* дробленіе полное (но неравномѣрное), у *Anurophorus* же образование бластодермы происходитъ по обычному для насѣкомыхъ типу, и полное дробленіе происходитъ вторично; амниону и серозѣ высшихъ насѣкомыхъ соответствуетъ клѣточная же *membrane amniotique*; *tubus ventralis* имѣетъ происхождение, независимое отъ конечностей.

Въ 1886 году вышла небольшая замѣтка Ryder'a, посвященная развитію *Anurida maritima*, которое позже было подробно изслѣдовано Claypole'емъ и Folsom'омъ. Развитію этой же формы посвящаетъ 2—3 страницы въ своемъ обширномъ „*Contribution to insect embryology*“ Wheeler (1893). Онъ останавливается, впрочемъ, лишь на строеніи спинного органа у зародышей *Anurida*, проводя гомологию между нимъ и своеобразнымъ *indusium* у *Xiphidium*, а также отмѣчаетъ присутствіе у нихъ пары рудиментарныхъ придатковъ интеркалярнаго сегмента. Столь же отрывочный характеръ носятъ данныя о развитіи *Collembola* въ предварительномъ сообщеніи Heymons'a по эмбриологической лепизмѣ (1896 b). Онъ подтверждаетъ на основаніи наблюдений надъ *Orchesella rufescens* отсутствіе у *Collembola* клѣточныхъ зародышевыхъ оболочекъ и присутствіе спинного органа и отмѣчаетъ, что у *Tetradontophora gigas* дробленіе поверхностное.

Въ 1897 году появились два предварительныхъ сообщенія, а въ 1898 году вышло и большое изслѣдованіе Uzel'я надъ развитіемъ *Apterygota*, гдѣ наиболѣе подробно описано развитіе *Campodea*, но и изъ *Collembola* изслѣдованы *Achorutes armatus*

и 2 вида *Tomocerus* („*Macrotoma*“) — главнымъ образомъ, *T. vulgaris*. Uzel описываетъ дробленіе яицъ и дифференцировку зародышевыхъ слоев (въ общемъ, согласно съ Ульянинымъ), закладку спинного органа и зародышевой полосы, ея послѣдовательную дифференцировку на отдѣльные сегменты, а также зародышевыя оболочки и измѣненія въ общемъ положеніи зародыша.

Въ 1898 же году вышла работа Miss Claypole, посвященная овогенезу и развитію *Anurida maritima* — мелкой *Collembola*, встрѣчающейся въ большомъ количествѣ на берегахъ Атлантическаго океана. Она пользовалась уже методомъ разрѣзовъ, отчего данныя этой работы имѣютъ особенный интересъ, и намъ на нихъ придется не разъ останавливаться. Здѣсь достаточно отмѣтить, что Miss Claypole подробно изучены, главнымъ образомъ, первыя стадіи развитія: дробленіе, образованіе пластовъ, закладка спинного органа („*procephalic organ*“) и бластодермическихъ оболочекъ. Образованіе вѣшней формы зародыша описано въ этой работѣ лишь въ самыхъ общихъ чертахъ, а изъ органогенеза подробно прослѣжено лишь развитіе половыхъ органовъ. Какъ бы дополненіемъ къ этой работѣ является появившееся немного позже изслѣдованіе Folsom'a о развитіи ротовыхъ органовъ той же *Anurida maritima* (1900), для чего онъ пользовался какъ разрѣзами, такъ и препаровкой зародышей при помощи иглъ. Въ развитіи зародыша онъ различаетъ 8 стадій, по которымъ и описываетъ развитіе каждой пары ротовыхъ придатковъ, головныхъ лопастей, антеннъ и другихъ частей головы. Все это прослѣжено имъ до мельчайшихъ деталей, иллюстрируется множествомъ рисунковъ и сопровождается обширными литературными данными, относящимися, главнымъ образомъ, къ насѣкомымъ, а также и къ другимъ *Arthropoda*. Folsomъ поддерживаетъ взглядъ, высказанный до него еще Hansen'омъ (1893), что боковыя части гипофаринкса (*superlinguae*) являются подобно настоящимъ ротовымъ органамъ измѣненными конечностями и имѣютъ свой невромеръ, такъ что голова насѣкомыхъ содержитъ на одинъ протозонитъ больше противъ того числа, которое обычно принимается. Противъ этого взгляда выступилъ въ своемъ рефератѣ работы Folsom'a Heymons¹⁾. — Благодаря работамъ Miss Claypole и Folsom'a *Anurida* можетъ считаться наилучше изученной въ эмбриологическомъ отношеніи среди всѣхъ *Collembola*.

Въ 1900 году Prowazek опубликовалъ свои наблюдения надъ развитіемъ яицъ какой-то *Isotoma*, определенной имъ (вѣроятно,

¹⁾ Zool. Centrbl. 8. 1900.

неверно) по Lubbock'у, какъ *Isotoma grisea*. Какъ въ описаніи анатомическаго строенія этой формы, такъ и въ данныхъ по ея развитію бросается въ глаза недостаточная обработка изучавшагося матеріала, при чемъ развитіе изслѣдовалось, повидимому, лишь *intra vitam*. Въ силу этого эта работа вноситъ очень мало новаго въ интересующій насъ вопросъ и стоитъ въ этомъ отношеніи ниже многихъ другихъ работъ.

Недавно появилось предварительное сообщеніе о развитіи ротовыхъ органовъ у *Tomocerus plumbeus* Hoffmann'a (1911), которымъ до того были уже выпущены три въ высшей степени обстоятельныхъ работы объ анатомическомъ строеніи головы у этой же формы (1904, 1905, 1908). Для насъ его данныя приобрѣтаютъ особенный интересъ потому, что *Tomocerus* стоитъ къ *Isotoma* гораздо ближе, чѣмъ *Anurida*, относясь съ ней къ одному семейству—*Entomobryidae*. Отмѣтимъ здѣсь, что развитіе боковыхъ частей гипофаринкса (*paraglossae* по его терминологіи) Hoffmann описываетъ въ общемъ согласно съ Folsom'омъ и считаетъ неисключеннымъ взглядъ на нихъ, какъ на подобныя ротовымъ органамъ образованія, такъ какъ онѣ закладываются на довольно ранней стадіи развитія въ видѣ двухъ бугорковъ между мандибулами. Наконецъ, въ началѣ текущаго года появилось мое предварительное сообщеніе къ настоящей работѣ (1912).

Всѣми свѣдѣніями о развитіи другой группы низшихъ наѣкомыхъ—такъ называемыхъ **Thysanura**²⁾—мы обязаны работамъ Uzel'я и Heymons'a. Правда, имѣется еще небольшая замѣтка Grassi о развитіи *Japyx*, помѣщенная имъ въ его монографіи *Japyx* и *Campodea* (1886), но въ ней содержится лишь краткое описаніе нѣсколькихъ зародышей, при томъ на довольно поздней стадіи развитія.

Мы уже упоминали о предварительномъ сообщеніи къ работѣ Heymons'a по эмбриологіи лепизмы, которая появилась въ 1897 году (1897 а). Благодаря этой богатой содержаніемъ работѣ развитіе лепизмы извѣстно подробнѣе, чѣмъ какого-либо другого представителя *Apterygota*, и намъ не разъ придется на нее сослаться. Между развитіемъ *Collembola* и *Lepisma* во мно-

²⁾ Уже неоднократно указывалось на неестественность этого отряда, включающаго въ себѣ и эктогнатныя и энтогнатныя формы. Лично я считаю гораздо болѣе цѣлесообразнымъ раздѣлить его, какъ это сдѣлалъ Börner (1904), на два отряда: *Diplura* (семейства *Projapygidae*, *Campodeidae* и *Japygidae*) и *Thysanura* (семейства *Machilidae* и *Lepismatidae*).

гомъ наблюдается рѣзкое различіе: дробленіе у послѣдней поверхностное, зародышевый дискъ очень малъ и скоро погружается, искривляясь, въ желтокъ, при чемъ увлеченная при этомъ съ нимъ часть серозы, одѣвавшей яйцо, превращается въ амнионъ. Присутствіемъ этихъ клѣточныхъ зародышевыхъ оболочекъ лепизма, такимъ образомъ, рѣзко отличается отъ *Collembola* и *Campodea*. Дифференцировка зародышевой полосы и мезодермы, а также органогенезъ протекаютъ у *Lepisma* довольно сходно съ *Orthoptera genuina*. Напротивъ, средняя кишка по Heymons'у развивается здѣсь не путемъ выростанія изъ *stomo-* и *proctodaeum*, какъ онъ наблюдалъ это у *Dermaptera* и *Orthoptera*, а изъ желточныхъ клѣтокъ, т.-е. является энтодермальной. На этомъ вопросѣ Heymons останавливается еще разъ въ специальной работѣ, посвященной кишечнику низшихъ наѣкомыхъ (1897 b) и на основаніи изслѣдованія отношеній у молодыхъ личинокъ *Lepisma* и *Campodea* приходитъ къ выводу, что ихъ средняя кишка возникаетъ въ отличіе отъ всѣхъ *Pterygota* изъ желточныхъ клѣтокъ, при чемъ у *Campodea* въ образованіи среднекишечнаго эпителия участвуютъ всѣ желточные клѣтки, а у *Lepisma* часть ихъ подвергается дегенерации и распаду. Въ виду важности этого вопроса мы подробно остановимся на данныхъ Heymons'a нѣсколько дальше.

Uzel'емъ (1898) изслѣдовано, главнымъ образомъ, развитіе *Campodea*, такъ какъ все, что имъ выяснено относительно развитія *Lepisma saccharina*, не вноситъ ничего новаго сравнительно съ работой Heymons'a. Развитіе *Campodea staphylinus* въ однихъ отношеніяхъ сильно напоминаетъ развитіе *Collembola*, въ другихъ отличается отъ него. Дробленіе яйца здѣсь, какъ у *Lepisma*, типично-поверхностное, при чемъ всѣ клѣтки дробленія выходятъ при образованіи бластодермы на поверхности яйца. Образованіе пластовъ, на которомъ Uzel подробно останавливается, происходитъ на вегетативномъ полюсѣ яйца; длинная зародышевая полоса закладывается на брюшной сторонѣ: она сегментируется и приобрѣтаетъ конечности обычнымъ путемъ, при чемъ, какъ и у *Collembola*, у *Campodea* имѣются придатки на интеркалярномъ сегментѣ и спинной органъ. На органогенезѣ Uzel не останавливается, но подробно описываетъ развитіе абдоминальныхъ конечностей и ротовыхъ органовъ; послѣднее во многомъ протекаетъ сходно съ развитіемъ ротовыхъ органовъ у *Collembola*.

Намъ остается упомянуть лишь о небольшомъ предварительномъ сообщеніи супруговъ Heymons о развитіи *Machilis alternata* (1905), въ которомъ они описываютъ зародышевыя оболочки у

этой формы и особые Lateralorgane, развитые тоже только у зародышей на первом абдоминальном сегментѣ. Наибольшій интересъ представляютъ зародышевыя оболочки *Machilis*, состоящія изъ двухъ частей—proserosa и proamnion, при чемъ онѣ вполне гомологичны серозѣ и амниону Pterygota, съ которыми ихъ связываютъ зародышевыя оболочки лепизмы. Съ другой стороны, эти оболочки у *Machilis* позволяютъ связать и спинной органъ Collembola (а также и другихъ Arthropoda, которые его имѣютъ) съ оболочками Pterygota; словомъ, отъ него къ настоящему амниону и серозѣ послѣднихъ черезъ оболочки *Machilis* и *Lepisma* имѣется непрерывный филогенетическій рядъ. Намъ придется еще остановиться на этихъ соображеніяхъ, когда мы будемъ говорить о спинномъ органѣ у зародышей *Isotoma*.

II. Взрослая форма. Матеріалъ и методы изслѣдованія.

Мною изслѣдовано эмбриональное развитіе *Isotoma cinerea* Nic., вида который Börner (1906) избралъ, какъ типичный для недавно установленнаго имъ подрода *Vertagopus*, характеризующагося присутствіемъ волосковъ съ булавовиднымъ вздутіемъ (Keulenhaaren, geknöpften „Spürhaaren“) на концахъ tibiotarsi. Родъ *Isotoma* (*Desoria* прежнихъ авторовъ) относится къ подсемейству Isotominae семейства Entomobryidae, стоящаго какъ бы по срединѣ между низшими Collembola—Poduridae (куда относится, между прочимъ, *Anurida*) и болѣе высоко специализированными Sminthuridae.

Isotoma cinerea — мелкая (1 — 1½ mm.) форма сѣроватаго цвѣта съ болѣе значительнымъ скопленіемъ голубого пигмента на спинной сторонѣ, которая пользуется довольно широкимъ распространеніемъ въ Европѣ и относится къ числу тѣхъ Collembola, которыя чаще всего попадаютъ подъ корой деревьевъ.

Здѣсь не мѣсто вдаваться въ описаніе ея наружнаго и внутренняго строенія; нѣкоторое же представленіе объ этомъ можно составить по рис. 37, изображающему молодую изотому, только что покинувшую яйцо.

На головѣ помѣщаются 4-членистые усики (ant), по 8 омматидій съ каждой стороны на темномъ пятнѣ (oc) и маленький овальный постантеннальный органъ, обыкновенно почти незамѣтный. Брюшко состоитъ изъ почти одинаковыхъ 4 первыхъ сегментовъ и 2 маленькихъ заднихъ (Genital- и Analsegment); на 1-мъ помѣщается tubus ventralis (tv), на 3-мъ маленький retinaculum, на 4-мъ furca (fr).

Изъ внутреннихъ органовъ ясно выступаетъ нервная система, состоящая изъ 2 головныхъ, 3 грудныхъ и 1 длиннаго брюшнаго ганглія. Замѣтимъ, что такого рѣзкаго обособленія послѣдняго у взрослыхъ Entomobryidae не наблюдается: обыкновенно онъ болѣе тѣсно слитъ съ 3-мъ груднымъ гангліемъ въ одну общую массу. Среди взрослыхъ формъ такой же самостоятельный абдоминальный ганглій имѣется лишь у болѣе примитивныхъ *Anurophorus* по Willem'у (1900) и *Folsomia fimetaria* по моимъ наблюденіямъ. На рис. 37 хорошо виденъ также кишечникъ, состоящій изъ трехъ отдѣловъ (передней, средней и задней кишки), какъ у всѣхъ Collembola; ротовые органы и головныя железы на подобныхъ тотальныхъ препаратахъ обыкновенно не бываютъ видны. Не изображено же на нашемъ рисункѣ и сердце, тянущееся въ видѣ тонкой трубочки надъ кишкой: его передняя и задняя граница совпадаютъ приблизительно съ границами средней кишки.

Взрослая самка отличается отъ изображеннаго на нашемъ рисункѣ молодого экземпляра лишь сильно развитыми парными яичниками, лежащими въ брюшкѣ подъ кишечникомъ и заходящими даже въ грудь. Общій половой протокъ открывается на брюшной сторонѣ 5-го абдоминальнаго сегмента.

Матеріалъ по развитію *Isotoma cinerea* былъ собранъ мной, какъ уже упомянуто выше, въ Бологомѣ (Новгородской губерніи) лѣтомъ 1904 года. 24 іюня у корней нѣсколькихъ елей подъ мхомъ я нашелъ множество самокъ этого вида во время кладки ими яицъ. Послѣднихъ было такъ много, что въ теченіе трехъ недѣль, пока продолжалось ихъ развитіе, я могъ изо дня въ день ходить въ это мѣсто и приносить домой съ кусками мха и гумуса болѣе чѣмъ достаточное количество яицъ для фиксировки. Молодь вылупилась изъ яицъ, отложенныхъ 24 іюня, 13 и 14 іюля, т. е. все эмбриональное развитіе протекло въ 20 дней. Вылупившіяся изъ яицъ молодья жили у меня около 4 недѣль, но за это время величина ихъ измѣнилась очень мало. Вѣроятно, величины взрослого животнаго онѣ достигаютъ лишь къ лѣту слѣдующаго года. Вообще какъ для *Isotoma cinerea*, такъ и для многихъ другихъ Collembola, какъ я имѣлъ случай уже указать въ другомъ мѣстѣ (1905 b), характерна, повидимому, одногодная генерация.

Къ сожалѣнію, я ограничился лишь фиксировкой собраннаго мною матеріала и не произвелъ въ свое время надъ нимъ наблюденій intra vitam; послѣднія дали бы, конечно, нѣкоторые результаты, которыхъ нельзя было получить уже по спиртовому матеріалу.

Въ качествѣ фиксирующей жидкости употреблялся, большею частью, горячій растворъ іода въ іодистомъ калии (Iodiodkaliumlösung), дававшій мнѣ вообще хорошіе результаты при фиксировкѣ взрослыхъ *Collembola* и давшій ихъ и при обработкѣ имъ ихъ зародышей.

Главная трудность въ дальнѣйшей обработкѣ собраннаго матеріала заключалась какъ при приготовленіи тотальныхъ препаратовъ, такъ и при заливкѣ въ парафинъ въ необходимости удалять или разрывать мало-проницаемыя для реактивовъ оболочки зародыша. Въ виду крайней мелкости яицъ дѣлать это при помощи иглъ было и слишкомъ трудно и кропотливо; послѣ ряда неудачныхъ попытокъ мнѣ удалось, наконецъ, научиться разрывать оболочки, не повреждая зародыша, осторожнымъ надавливаніемъ иглы на покровное стекло, подъ которымъ въ каплѣ спирта помещалось одно или нѣсколько яицъ. На болѣе позднихъ стадіяхъ, уже послѣ разрыва хоріона, дѣлать это было значительно легче; первыя же стадіи съ особенно плотнымъ хоріономъ и большимъ количествомъ желтка требовали значительныхъ предосторожностей: снабженія покровнаго стекла ножками изъ воска, контроля надавливанія подъ микроскопомъ и пр. Такъ какъ количествомъ матеріала я не стѣснялся, то порча нѣсколькихъ яицъ для меня не имѣла при этомъ никакого значенія.

Зародыши окрашивались чаще всего *in toto* борнымъ карминомъ съ послѣдующимъ откисленіемъ его спиртомъ съ пикриновой кислотой, причемъ нерѣдко срѣзы еще докрашивались уже на стеклахъ пикриновой кислотой съ *Wasserblau* по *Blochmann*'у.

Заливка производилась черезъ кедровое масло въ парафинъ; ориентировка окрашенныхъ зародышей въ парафинѣ для рѣзанія не вызывала затрудненій, такъ какъ они прекрасно видны были въ его поверхностномъ слое подъ микроскопомъ.

Срѣзы первыхъ стадій дѣлались толщиной въ 5 μ , а для среднихъ и позднихъ были удобнѣе еще болѣе тонкіе срѣзы — въ 3 μ . Въ виду малой величины изслѣдовавшихся объектовъ такіе разрѣзы получались безъ всякихъ затрудненій.

III. Первый періодъ развитія. — Дробленіе, образованіе бластодермы и желточныхъ клѣтокъ, появленіе полового зачатка. (Табл. I).

Яйца нашей изотомы имѣютъ шарообразную форму и отличаются очень незначительными размѣрами: діаметръ каждаго равенъ приблизительно 0,15 mm. Каждое яйцо окружено хоріономъ,

лишеннымъ сколько-нибудь замѣтной структуры; желточной оболочки (*membrana vitellina*) здѣсь не имѣется, что особенно ясно видно во время дробленія. Если разсматривать свѣжеотложенное яйцо, еще не начавшееся дробиться, въ каплѣ спирта (рис. 1), то бросается въ глаза, что между нимъ и хоріономъ (*ch*) имѣется довольно большой промежутокъ, возникшій, вѣроятно, отъ фиксации; кромѣ того яйцо лежитъ большею частью нѣсколько эксцентрично по отношенію къ окружающему его хоріону (см. напр. рис. 2), а въ центрѣ его просвѣчиваетъ въ видѣ темнаго пятна центральное скопленіе протоплазмы (такъ называемый *Plasmainsel*—*pi*).

На разрѣзахъ черезъ эту стадію (рис. 6) мы видимъ, что главная масса образовательнаго желтка сосредоточена именно въ центрѣ въ видѣ такого круглаго или овальнаго *Plasmainsel* (*pi*) съ ядромъ, а на особенно хорошихъ препаратахъ и съ отходящими отъ него звѣздообразно отростками, которые переходятъ въ нѣжную протоплазматическую сѣточку, пронизывающую желтокъ. На препаратахъ, окрашенныхъ по Гейденгайну (съ такого именно препарата сдѣланъ нашъ рис. 6) послѣднего обычно не бываетъ видно. Поверхностный слой плазмы (такъ называемая *Keimhautblastem*), имѣющийся въ яйцахъ многихъ насѣкомыхъ и хорошо развитый, между прочимъ, у *Campodea* по *Uzel*'ю, здѣсь почти отсутствуетъ. Питательный желтокъ, заполняющій большую часть яйца, состоитъ лишь изъ круглыхъ желточныхъ шариковъ (*dk*), такъ какъ бывшія въ немъ до фиксации жировыя капли растворились въ спирту. Эти желточные шарики интенсивно окрашиваются кислыми анилиновыми красками, что говоритъ за ихъ бѣлковую природу, но красятся также и основными красками, желѣзнымъ гематоксилиномъ и пр. Величина ихъ, какъ видно на рисункѣ, неодинакова, при чемъ вокругъ центральнаго скопленія плазмы эти желточные шарики имѣютъ видъ очень мелкихъ крупинокъ и значительно меньше тѣхъ, которыя лежатъ дальше отъ *Plasmainsel*, что указываетъ на ассимилирующую дѣятельность послѣднего. Это явленіе было отмѣчено уже у яицъ насѣкомыхъ [*Friederichs* (1906)] и пауковъ [*Schimekewitsch* (1911)]. На препаратахъ, окрашенныхъ желѣзнымъ гематоксилиномъ (рис. 6), хорошо видно, что столь же мелкіе желточные шарики, какъ кругомъ центральнаго скопленія плазмы, имѣются и въ самыхъ поверхностныхъ слояхъ желтка. Это указываетъ, что и на периферіи яйца имѣется незначительный поверхностный слой плазмы, но столь слабо выраженный, что помимо этого онъ почти незамѣтенъ.

Явленій созрѣванія яйца на имѣвшемся въ моемъ распоряженіи матеріалѣ я не наблюдалъ; не попадалось мнѣ и картинъ, относящихся къ оплодотворенію яйца, слиянію мужского и женскаго ядеръ и пр. Въ виду этого я затрудняюсь сказать, представляет ли описанное мной строеніе яйца ту картину, которую оно имѣетъ до созрѣванія или послѣ него.

Дробленіе яицъ, какъ и у другихъ *Collembola*, полное, и по крайней мѣрѣ на первыхъ стадіяхъ, равномерное (см. рис. 2—5). Картины, относящіяся къ первому дѣленію яйца, попадались мнѣ довольно часто; одна изъ нихъ изображена на рис. 7. Это дѣленіе, какъ и всѣ послѣдующія, происходитъ каріокINETическимъ путемъ; хромозомъ, впрочемъ, благодаря не совсѣмъ подходящей для цитологическихъ цѣлей консервировкѣ моего матеріала на такихъ разрѣзахъ было обычно не видно. Результатомъ перваго дѣленія является раздѣленіе центрального скопленія плазмы на двѣ клѣтки, лежащія на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга въ желткѣ (рис. 8); распредѣленіе послѣдняго здѣсь такое же, какъ на одно-клеточной стадіи, т. е. его мелкія зерна окружаютъ каждую изъ этихъ клѣтскъ дробленія (fz), встрѣчаясь кромѣ того по периферіи всего яйца. Желтокъ въ это время еще не раздробленъ, но, какъ только каждая изъ этихъ клѣтокъ приступаетъ къ новому дѣленію, въ немъ появляется борозда, раздѣляющая его на двѣ половины.

Внѣшній видъ четырехклеточной стадіи изображенъ на рис. 2: какъ желтокъ, такъ и плазма подѣлены двумя бороздами (ихъ можно считать меридіональными) на четыре равныхъ части; каждая является клѣткой, построенной по тому же типу, какъ и еще не приступившее къ дробленію яйцо, т. е. внутри просвѣчиваетъ центральная масса плазмы (ра) съ ядромъ (называть ее и здѣсь клѣткой дробленія, конечно, было бы неправильно) и ее окружаетъ желтокъ. При переходѣ въ стадію 8 клѣтокъ каждый изъ этихъ бластомеровъ такимъ же образомъ дѣлится экваторіальной бороздой на верхнюю и нижнюю половину, и мы получаемъ два ряда клѣтокъ по 4 въ каждомъ (рис. 3). Разрѣзъ черезъ эту стадію изображенъ на рис. 9, при чемъ на немъ видны четыре клѣтки (верхней или нижней половины яйца) съ рѣзкими границами другъ между другомъ; каждая имѣетъ въ центрѣ скопленіе плазмы съ ядромъ (ра), остальная же часть ея заполнена желточными шариками (dk). Между этими четырьмя клѣтками имѣется небольшое свободное пространство—полость дробленія (fh), появленіе которой едва ли можно приписать вліянію реактивовъ, какъ это думалъ Ульянинъ.

До сихъ поръ дробленіе яйца шло удивительно правильно, но, начиная со стадіи 16 клѣтокъ, правильность эта, какъ видно

и безъ помощи разрѣзовъ по внѣшнему виду яйца (рис. 4) уже теряется. На разрѣзахъ черезъ эту стадію (рис. 10) мы убѣждаемся, что кромѣ периферическихъ клѣтокъ здѣсь имѣются уже и внутреннія, окруженныя со всѣхъ сторонъ тѣми, которыя остаются на поверхности яйца. Очевидно, съ переходомъ въ стадію 16 клѣтокъ направленіе дѣленія нѣкоторыхъ клѣтокъ 8-клеточной стадіи таково, что часть получающихся при этомъ бластомеровъ погружается внутрь яйца, заполняя бывшую раньше полость дробленія, и въ результатѣ получается уже плотная морула. Обычно на разрѣзахъ, прошедшихъ черезъ центръ яйца, бываетъ видна та картина, которая изображена на рис. 10, т. е. 7 периферическихъ и 1 внутренняя клѣтка. Здѣсь, такимъ образомъ, (какъ и на слѣдующей стадіи) настоящіе разрѣзы вполнѣ идентичны съ оптическими, что совершенно ясно изъ сравненія рис. 10 съ рис. 4. Разрѣзы черезъ стадію 32 клѣтокъ (рис. 11) отличаются отъ 16-клеточной стадіи лишь большимъ числомъ клѣтокъ: обычно на такихъ центральныхъ разрѣзахъ ихъ здѣсь бываетъ видно 8—9 по периферіи и 3—4 внутри. Характеръ каждой клѣтки остается тѣмъ же: центральное скопленіе плазмы съ ядромъ и окружающій ее желтокъ изъ желточныхъ шариковъ.

Въ дальнѣйшемъ счетъ клѣтокъ даже на разрѣзахъ становится очень труднымъ: напримѣръ, для стадіи, слѣдующей за 32-клеточной стадіей—внѣшній видъ ея изображенъ на рис. 5—можно только приблизительно сказать, что она состоитъ изъ числа клѣтокъ, близкаго къ 64. По своему внѣшнему виду эта стадія еще ничѣмъ не отличается отъ предыдущихъ, но на разрѣзахъ мы сталкиваемся съ новымъ явленіемъ. Клѣтки, изъ которыхъ состоитъ яйцо, отдѣлены ясными границами и содержатъ, какъ и прежде, желтокъ и плазматическое скопленіе, но послѣднее не лежитъ уже въ центрѣ желточной массы, а всегда смѣщено или къ одному изъ краевъ клѣтки у внутреннихъ клѣтокъ или же къ наружному краю у периферическихъ (рис. 12). Эти плазматическія скопленія имѣли и на предыдущихъ стадіяхъ болѣе или менѣе неровные края, здѣсь же у нихъ гораздо яснѣе наблюдаются звѣздообразные выросты, придающіе такому скопленію амебовидную форму. Очевидно, на этой стадіи полное дробленіе, распространявшееся на желтокъ, заканчивается и переходитъ въ поверхностное, для чего каждому плазматическому скопленію необходимо освободиться отъ окружающей его со всѣхъ сторонъ желточной массы и, выйдя изъ нея, превратиться въ независимую отъ желтка клѣтку дробленія. Это и достигается, повидимому, тѣмъ, что такія плазматическія скопленія активно

выбираются у периферических клѣтокъ на поверхность яйца, а у внутреннихъ къ ихъ краямъ, чтобы затѣмъ выбраться совсѣмъ изъ своего участка желтка.

Дѣйствительно, на слѣдующей стадіи (рис. 13) приходится говорить уже не о скопленіяхъ плазмы съ ядромъ внутри богатыхъ желткомъ клѣтокъ, а о самостоятельныхъ клѣткахъ дробленія (fz), частью расположенныхъ по периферіи яйца, частью лежащихъ еще въ желткѣ и независимыхъ отъ тѣхъ участковъ желтка (db), вмѣстѣ съ которыми онѣ на болѣе раннихъ стадіяхъ составляли единое цѣлое, помѣщаясь въ ихъ центрѣ. Теперь тѣ клѣтки дробленія, которыя находятся внутри яйца, лежатъ обычно между участками, на которые разбитъ желтокъ. Какъ можно видѣть на этомъ же рисункѣ, и на этой стадіи дѣленіе клѣтокъ дробленія продолжается (tf), но уже независимо отъ желтка.

Поверхность яйца покрыта теперь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бластодермой, но въ другихъ она лишена еще клѣтокъ: заполненіе такихъ промежутковъ происходитъ, очевидно, путемъ выползанія на поверхность новыхъ клѣтокъ дробленія изъ желтка. Такъ какъ у *Isotoma cinerea* дробленіе первоначально полное и поверхности яйца достигаютъ прежде всего плазматическія скопленія периферическихъ клѣтокъ (на стадіи 64 и даже 32 бластомеров), то возникновеніе бластодермы не можетъ быть приурочено къ одному какому-нибудь пункту поверхности яйца, а начинается, такъ сказать, пятнами по всему яйцу, и затѣмъ свободные промежутки между этими первыми пионерами бластодермы заполняются путемъ выползанія на поверхность новыхъ клѣтокъ дробленія изъ желтка, а, вѣроятно (въ этомъ я не могъ съ достовѣрностью убѣдиться), и путемъ дѣленія первыхъ вышедшихъ на поверхность клѣтокъ.

Заканчивается первый періодъ развитія яйца, продолжительность котораго вмѣстѣ съ Ульяниномъ я могу опредѣлить въ нѣсколько часовъ, во всякомъ случаѣ меньше сутокъ, стадій, разрѣзъ которой изображенъ на рис. 14. Все яйцо покрыто уже однимъ слоемъ клѣтокъ бластодермы (bl), которыя здѣсь носятъ тотъ же характеръ, что и клѣтки дробленія на предыдущей стадіи. Желтокъ попрежнему разбитъ на отдѣльные участки или дольки (db), но клѣтокъ въ немъ содержится уже очень немного, такъ какъ большинство клѣтокъ дробленія вышло на поверхность яйца, образовавъ бластодерму. Однѣ изъ этихъ оставшихся въ желткѣ клѣтокъ разсѣяны въ немъ по одиночкѣ на довольно большомъ разстояніи другъ отъ друга и представляютъ изъ себя желточные клѣтки или вителлофаги (dz). Кромѣ

того въ желткѣ ближе къ будущему заднему концу зародыша имѣется небольшая кучка изъ нѣсколькихъ тѣсно прилегающихъ другъ къ другу клѣтокъ (g); эти клѣтки представляютъ изъ себя половой зачатокъ, обособляющійся у нашей *Isotoma*, такимъ образомъ, очень рано: одновременно съ образованіемъ бластодермы. На описываемой стадіи между бластодермическими, желточными и клѣтками полового зачатка, какъ видно по рисунку, еще нѣтъ сколько-нибудь замѣтныхъ различій: они появляются, какъ мы увидимъ, позднѣе.

Что касается до происхожденія этого полового зачатка, то, къ сожалѣнію, я не могъ точно установить, изъ какой именно клѣтки или клѣтокъ предшествующихъ стадій онъ возникаетъ. Однако его всегда строго опредѣленное положеніе въ желткѣ какъ на этой стадіи, такъ и на послѣдующихъ (см. рисунки на слѣдующихъ таблицахъ) позволяетъ мнѣ высказать предположеніе, что, быть можетъ, этотъ половой зачатокъ возникаетъ изъ одной опредѣленной внутренней клѣтки 32-кѣлочной, а, можетъ быть, даже и 16-кѣлочной стадіи. Если это дѣйствительно такъ, то мы бы имѣли и у одной изъ *Collembola* столь же раннюю дифференцировку *Urgeschlechtszelle*, какая недавно была описана Наспергомъ (1911) у *Chironomus*. Однако и независимо отъ правильности такого предположенія мы имѣемъ у *Isotoma cinerea* крайне раннее обособленіе полового зачатка въ зародышѣ.

Желточные клѣтки возникаютъ несомнѣнно изъ тѣхъ клѣтокъ дробленія, которыя задерживаются во время образованія бластодермы въ желткѣ. Помимо этого способа происхожденія, который во всякомъ случаѣ является главнымъ, я не считаю исключеннымъ возможность, что нѣкоторыя изъ вышедшихъ уже на поверхность яйца клѣтокъ дѣлятся, и одинъ изъ продуктовъ этого дѣленія уходитъ въ желтокъ, превращаясь позже въ желточную клѣтку. Въ пользу такого допущенія говорятъ нѣкоторыя картины въ родѣ той, которую можно видѣть на рис. 13. Такъ какъ въ это время бластодерма еще не сформирована, то никакого принципиальнаго различія между тѣмъ и другимъ способомъ происхожденія желточныхъ клѣтокъ, конечно, нѣтъ. Позже, когда вся поверхность яйца уже покрыта однимъ слоемъ бластодермическихъ клѣтокъ, отдѣленія отъ послѣднихъ элементовъ, уходящихъ для пополненія желточныхъ клѣтокъ внутрь яйца, я не наблюдаю.

Изъ предыдущихъ авторовъ при помощи метода разрѣзовъ изучала дробленіе яицъ *Anurida* Miss Claypole, при чемъ почти во всѣхъ деталяхъ наши наблюденія сходятся другъ съ другомъ. Небольшія различія сводятся къ тому, что по ея наблюденіямъ яйцо кромѣ хоріона имѣетъ и желточную оболочку, присутствіе которой отмѣчалось также Nicolet, Lemoine'омъ, Wheeler'омъ и Folsom'омъ, а кромѣ того она отрицаетъ наличность полости дробленія. Мнѣ кажется, что присутствіе послѣдней на стадіи 8 клѣтокъ подтверждается и соответствующимъ рисункомъ въ работѣ Claypole (рис. 31); кромѣ того ее наблюдали Uzel и Prowazek.

Изъ данныхъ другихъ авторовъ, касающихся этого періода развитія, кромѣ старыхъ наблюденій Ульянина и Lemoine'a, изъ которыхъ послѣднія, вѣроятно, ошибочны, можно остановиться на наблюденіяхъ Uzel'я и Prowazek'a. Эти данныя въ нѣкоторыхъ частностяхъ расходятся съ моими, что вполне понятно, такъ какъ они касаются другихъ формъ, но одна подробность возбуждаетъ во мнѣ нѣкоторое сомнѣніе. Prowazek считалъ дробленіе у изслѣдованной имъ формы неравнобѣрнымъ, хотя и сильно приближающимся къ адекватному, Uzel же приписываетъ *Achorutes armatus* типичное неравнобѣрное дробленіе съ образованіемъ макро- и микромеровъ. Настоящее неравнобѣрное дробленіе, какъ напримѣръ у *Telyphonus* [Schimkewitsch (1906)], очень большая рѣдкость въ типѣ членистоногихъ животныхъ, такъ что къ такого рода даннымъ нужно относиться съ особенной осторожностью. При разсматриваньи дробящихся яицъ въ спирту я очень часто наблюдалъ, особенно на стадіи 8 клѣтокъ, картины, напоминающія рисунки Uzel'я, такъ какъ при этомъ обычно клѣтки верхней или нижней половины яйца кажутся меньше, производя впечатлѣніе „микромеровъ“. Однако путемъ осторожнаго поворачиванья яйца подъ покровнымъ стекломъ и, главное, путемъ зарисовыванья каждаго изъ бластомеровъ этой стадіи съ рисовальнымъ аппаратомъ легко убѣдиться, что они вполне одинаковы. Не являются ли и макро- и микромеры Uzel'я такими же мнимыми образованіями?

Никто изъ предыдущихъ авторовъ не наблюдалъ до сихъ поръ описаннаго мною выше полового зачатка въ желткѣ. Конечно, вполне возможно, что въ этомъ отношеніи *Isotoma cinerea* рѣзко отличается отъ другихъ изученныхъ эмбриологически Collembola, но въ работахъ моихъ предшественниковъ можно найти нѣкоторый намекъ на существованіе такого же полового зачатка и у другихъ формъ. Какъ мы дальше увидимъ, средняя кишка

развивается у нашей *Isotoma* совершенно независимо отъ какихъ-либо желточныхъ элементовъ: крайне невѣроятно, чтобы у другихъ формъ этого отряда дѣло обстояло бы въ этомъ отношеніи иначе. Между тѣмъ еще Ульянинъ описалъ у изслѣдованныхъ имъ зародышей появляющуюся довольно рано кучку клѣтокъ въ желткѣ, изъ которой по его мнѣнію развивается средняя кишка. Если сравнить его рис. 7 на табл. V хотя бы съ нашимъ рис. 20, то кажется довольно вѣроятнымъ, что рѣчь здѣсь идетъ именно о половомъ зачаткѣ. Изъ такого-же скопленія клѣтокъ въ желткѣ описываютъ происхожденіе средней кишки Uzel и Prowazek (см. вопреки тексту въ работѣ послѣдняго рис. 4 и объясненіе къ нему), очевидно, повторяя ошибку Ульянина. Miss Claypole тоже принимаетъ за энтодерму 2 или болѣе кучки клѣтокъ, остающихся въ желткѣ вмѣстѣ съ желточными, но по ея описанію онѣ лежатъ ближе къ спинному органу, такъ что здѣсь, повидимому, рѣчь идетъ уже не о половомъ зачаткѣ, а о чемъ-то другомъ. Однако какъ мы дальше увидимъ, въ пользу присутствія полового зачатка въ желткѣ и у *Anurida* говорятъ другія данныя Miss Claypole. Разумѣется, окончательно вопросъ этотъ можетъ быть рѣшенъ лишь путемъ новаго изслѣдованія.

На раннемъ обособленіи полового зачатка и морфологическомъ значеніи желточныхъ клѣтокъ я остановлюсь еще въ послѣдней главѣ этой работы, посвященной общимъ соображеніямъ.

IV. Второй періодъ развитія.—Образованіе нижняго листка, спинного органа и зародышевыхъ оболочекъ. (Табл. II).

Второй періодъ въ развитіи яйца начинается съ возникновенія нижняго зародышеваго листка (unteres Blatt). Я предпочитаю этотъ терминъ другимъ, такъ какъ понятія о „первичной“ и „вторичной“ энтодермѣ у насѣкомыхъ совершенно перепутались, а терминъ „энтодерма“ употребляется иногда для обозначенія тѣхъ случаевъ закладки мезодермы, когда она возникаетъ отъ энтодермы [см. напримѣръ новое изданіе учебника Korschelt'a и Heider'a (1910)]. Въ виду этого выраженіе „нижній листокъ“, особенно когда рѣчь идетъ о насѣкомыхъ, является наиболѣе удобнымъ.

Образованіе этого нижняго листа у изотомы не приурочено къ какому-нибудь одному пункту поверхности яйца, а происходитъ подъ всей бластодермой. На рисункѣ 15 изображена часть разрѣза

черезъ яйцо вскорѣ послѣ образованія бластодермы: мы видимъ здѣсь, что мѣстами бластодерма еще однослойна, но, большею частью, между поверхностными клѣтками и желткомъ образовался уже второй слой клѣтокъ, и эти нижнія клѣтки, совершенно еще ничѣмъ не отличающіяся отъ поверхностныхъ, и являются первыми элементами нижняго листа (ub). Происхождение ихъ тоже ясно изъ того же рисунка, такъ какъ на немъ мѣстами видны картины дѣленія бластодермической клѣтки на двѣ: верхнюю, поверхностную, и нижнюю (tf). Такимъ образомъ, нижній листъ возникаетъ у *Isotoma cinerea* сейчасъ же послѣ образованія бластодермы путемъ раздѣленія ея клѣтокъ на два слоя—верхній, который нужно считать эктдермой, и нижній, т.-е. нижній зародышевый листокъ. Весьма возможно, что помимо дѣленія бластодермическихъ клѣтокъ нѣкоторые изъ элементовъ послѣдняго возникаютъ и путемъ простого выклинивания клѣточекъ бластодермы внутрь, тѣмъ болѣе что на моихъ препаратахъ попадались иногда картины, которыя легче всего было истолковать въ такомъ смыслѣ (см. рис. 15 e). Однако такое выклиниваніе, если оно имѣетъ, дѣйствительно, мѣсто, тоже должно вызываться дѣленіемъ бластодермическихъ клѣтокъ, но уже не въ радіальномъ, а въ тангенціальномъ направленіи, такъ что мы можемъ, принимая во вниманіе и эту возможность, все же сказать, что элементы нижняго листа возникаютъ подъ всей поверхностью яйца путемъ дѣленія бластодермическихъ клѣтокъ на два слоя.

Рис. 16 изображаетъ разрѣзъ черезъ яйцо, когда этотъ процессъ уже закончился и мы имѣемъ на поверхности яйца два болѣе рѣзко выраженныхъ слоя: эктдерму (ect) и нижній листъ (ub). На этой же стадіи, какъ видно и на рисункѣ, впервые возникаетъ болѣе рѣзкое различіе между элементами обоихъ первичныхъ зародышевыхъ листовъ, съ одной стороны, и желточными клѣтками, съ другой: въ послѣднихъ (dz) протоплазма переполнена въ это время крупными вакуолями, содержащими, вѣроятно, продукты резорпціи желтка, и въ силу этого почти не окрашивается красками, такъ что рѣзко выдѣляются въ желтѣхъ лишь ядра желточныхъ клѣтокъ. Лежатъ они частью въ серединѣ, частью ближе къ краямъ тѣхъ долекъ, на которыя по прежнему разбитъ желтокъ. Клѣтки полового зачатка (g) занимаютъ въ желтѣхъ прежнее положеніе; количество ихъ нѣсколько увеличивается по сравненію со стадіей, изображенной на рис. 14, сами же клѣтки сообразно съ этимъ становятся немного меньше и по своему внѣшнему виду болѣе похожи на клѣтки зароды-

шевыхъ листовъ: хотя плазма ихъ тоже довольно сильно вакуолизирована, но окрашиваются онѣ сильнѣе, почему выдѣляются въ желтѣхъ гораздо рѣзче желточныхъ клѣтокъ. Весь зачатокъ принимаетъ болѣе правильную округлую форму и лежитъ, какъ и на всѣхъ послѣдующихъ стадіяхъ, ближе къ будущимъ брюшной сторонѣ и заднему концу зародыша.

Описанный мною способъ развитія нижняго листка у нашей изотомы рѣзко отличается отъ характернаго для большинства насѣкомыхъ, во-первыхъ, отсутствіемъ первичной борозды (которой здѣсь, конечно, и быть не можетъ), а, во-вторыхъ, тѣмъ, что его возникновеніе не приурочено къ какому-нибудь определенному пункту, а совершается подъ всей поверхностью яйца. Пользуясь общепринятой терминологіей, мы можемъ назвать этотъ способъ мультиполярнымъ образованіемъ энтодермы, а въ частности смѣшанной деляминаціей [Metschnikoff (1886)], такъ какъ нижній листокъ возникаетъ здѣсь и при помощи дѣленія и при помощи выклинивания клѣтокъ внутрь. Однако это явленіе не стоитъ совершенно особнякомъ среди аналогичныхъ ему процессовъ у другихъ насѣкомыхъ и многоножекъ: по этому же типу происходитъ образованіе нижняго листка („мезодермы“) согласно Heumons'у у *Gryllotalpa*, *Phyllodromia* (1895) и *Scolopendra* (1901), по Knowler'у (1900) у *Eutermes*, а, судя по краткому предварительному сообщенію Lignau (1911a), быть можетъ, и у *Polydesmus*. Подробнѣе на вопросѣ о зародышевыхъ листахъ я остановлюсь въ концѣ работы, здѣсь же отмѣчу лишь, что подобный способъ возникновенія нижняго листа въ группѣ Трахеата я считаю болѣе примитивнымъ (тѣмъ болѣе что и найденъ онъ лишь у довольно низко стоящихъ представителей этой группы). Гастрюляція съ образованіемъ первичной борозды, какъ мнѣ кажется, развилась у насѣкомыхъ (а, быть можетъ, и всюду въ животномъ царствѣ) изъ этого болѣе примитивнаго способа—мультиполярной иммиграціи—въ цѣляхъ сокращенія процесса развитія и по чисто механическимъ причинамъ, о чемъ уже писалъ между прочимъ Heumons (1895), ошибочно принимавшій нижній листъ за мезодерму.

Въ работахъ предшествовавшихъ авторовъ происхождение этого нижняго листка описывается неправильно. Miss Claupele считаетъ его за мезодерму и, отмѣчая вполне правильно, что этотъ внутренній листъ возникаетъ первоначально подъ всей поверхностью яйца, думаетъ однако, что оба слоя закладываются одновременно путемъ выхода клѣтокъ дробленія на поверхность. Очевидно, въ ея распоряженіи не было зародышей съ одно-

слойной бластодермой, на разрывахъ черезъ которые, какъ на нашемъ рис. 14, совершенно ясно видно, что въ желткѣ остается въ это время такъ мало клѣтокъ, что нижній листокъ можетъ вообще возникнуть только изъ бластодермы. Ульянинъ видѣлъ и правильно описалъ раздѣленіе бластодермы на два слоя, но называетъ эти два первичные зародышевые листа многослойной бластодермой, относя возникновеніе верхняго и нижняго листа къ болѣе поздней стадіи. О многослойности же бластодермы пишутъ Uzel и Prowazek, не останавливаясь на вопросѣ о возникновеніи нижняго листка (объ мнимомъ энтодермальномъ зачаткѣ въ работахъ всѣхъ этихъ авторовъ я уже упоминалъ).

Интересно отмѣтить, что у *Lepisma* по Heumons'у „мезодерма“ (т.-е. нашъ нижній листокъ) возникаетъ путемъ отщепленія отъ бластодермы въ двухъ заднихъ третяхъ небольшого зародышевого диска, повидимому, безъ образованія борозды и впививанья. Къ сожалѣнію, я не могу привести въ какую-либо связь съ моими наблюденіями (какъ и вообще съ данными о развитіи другихъ насѣкомыхъ) того довольно подробнаго описанія закладки зародышевыхъ пластовъ у *Campodea*, которое даетъ въ своей работѣ Uzel, настолько она носитъ своеобразный характеръ. Новое изслѣдованіе этихъ отношеній было бы тѣмъ болѣе интересно, что дальнѣйшіе процессы развитія, начиная съ момента закладки зародышевой полосы, необычайно сходны у *Campodea* съ нашей изотомой.

Мы остановились на томъ моментѣ въ развитіи, когда появилось два зародышевыхъ пласта и возникли различія въ характерѣ клѣтокъ этихъ пластовъ, полового зачатка и желточныхъ. На этой стадіи зародышъ имѣетъ уже не круглую, а овальную форму съ нѣсколькими заостренными однимъ полюсомъ (рис. 16). Это явленіе совсѣмъ не отмѣчалось болѣе поздними авторами кромѣ Ульянина и Nicolet, назвавшего эту статью „грушевиднымъ зародышемъ“. По словамъ Ульянина, наблюдавшаго развитіе подуръ *intra vitam*, такая форма получается „благодаря стягиванью содержимаго яйца внутри хоріона... вслѣдствіе чего содержимое яйца въ двухъ противоположныхъ точкахъ отстаетъ отъ оболочки яйца, тогда какъ въ двухъ другихъ противоположныхъ точкахъ почти соприкасается съ ней“ (стр. 4). Позже яйцо принимаетъ снова шарообразную форму.

На этой именно стадіи грушевиднаго зародыша на его нѣсколькихъ заостренномъ полюсѣ начинается образованіе изъ клѣтокъ эктодермы своеобразнаго спинного органа *Collembola*. Уже

на рис. 16 мы видимъ, что клѣтки эктодермы въ этомъ мѣстѣ нѣсколько отличаются отъ сосѣднихъ своими большими размерами въ высоту: это и есть первый зачатокъ спинного органа (aDO). Увеличеніе размеровъ эктодермальныхъ клѣтокъ этой кучки продолжается и дальше, такъ что довольно скоро этотъ зачатокъ спинного органа довольно рѣзко выдѣляется среди примыкающихъ къ нему двухъ слоевъ зародыша (рис. 17). Въ его образованіи принимаютъ участіе исключительно клѣтки эктодермы: нижній листокъ развитъ первоначально и подъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ возникаетъ спинной органъ (какъ и вообще подъ всей поверхностью яйца), но затѣмъ его клѣтки здѣсь исчезаютъ. Въ однихъ случаяхъ это исчезновеніе происходитъ очень рано—на стадіи, изображенной на рис. 16, гдѣ подъ первымъ зачаткомъ спинного органа элементовъ нижняго листа уже нѣтъ. Въ этомъ случаѣ, какъ мнѣ кажется, послѣдніе просто оттѣсняются внизъ увеличивающимися въ размерахъ клѣтками такого зачатка. Въ другихъ случаяхъ нижній листокъ сохраняется подъ этимъ мѣстомъ дольше, даже на стадіи рис. 17. На послѣднемъ видно при этомъ, что клѣтки нижняго листа подъ самымъ спиннымъ органомъ приняли нѣсколько своеобразный видъ: онѣ теряютъ здѣсь связь другъ съ другомъ, отдѣляются и отъ эктодермы и лежатъ у самаго желтка, почти внѣдряясь въ него (par). Плазма этихъ ставшихъ свободными и уходящихъ, повидимому, въ желтокъ клѣтокъ сильно вакуолизирована, ядро часто имѣетъ видъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ скопленій, интенсивно окрашивающихся борнымъ карминомъ, или же смѣщено къ краю клѣтки.

Истолковать эти картины легче всего въ томъ смыслѣ, что эти клѣтки нижняго листа становятся подъ спиннымъ органомъ болѣе ненужными и, уходя въ желтокъ, подвергаются дегенерации. Нельзя не отмѣтить при этомъ сходства ихъ съ давно извѣстными у высшихъ насѣкомыхъ образованіями, получившими отъ Heumons'a (1895) имя парациотовъ. Наиболѣе характернымъ для парациотовъ являются измѣненія въ ядерномъ веществѣ, стоящія по Friederichs'у (1906), который наиболѣе подробно занимался подобными элементами, быть можетъ, въ связи съ ихъ секреторной дѣятельностью въ желткѣ. Парациотовъ описывали у зародышей различныхъ отрядовъ насѣкомыхъ, при чемъ наблюдалось ихъ отдѣленіе отъ самыхъ различныхъ клѣтокъ (отъ бластодермы, желточныхъ, половыхъ, мезодермы и т. д.).

У зародышей изотомы эти парациоты наблюдались мною довольно рѣдко, при чемъ почти всегда дѣло шло объ отдѣленіи ихъ отъ элементовъ нижняго листка. Такой распадъ послѣднихъ

я наблюдать у зародышей и во время 2-го периода развития и на более поздних стадиях с уже образовавшейся зародышевой полосой. Прослѣдить дальнѣйшую судьбу и измѣненія этихъ клѣтокъ мнѣ не удалось, тѣмъ болѣе что крайняя мелкость всѣхъ элементовъ у *Isotoma cinerea* дѣлаетъ ее мало пригоднымъ объектомъ для цитологическихъ цѣлей. Я убѣжденъ, однако, что мы имѣемъ здѣсь дѣло просто съ явленіями дегенерации нѣкоторыхъ клѣтокъ. Въ моемъ распоряженіи было нѣсколько зародышей явно патологическаго характера какъ до закладки спинного органа, такъ и послѣ этого процесса, у которыхъ большая часть клѣтокъ нижняго листа подверглась подобному распаду и имѣла видъ паразитовъ. Что я имѣлъ въ этомъ случаѣ дѣло съ несомнѣнно патологическими случаями, видно изъ того, что на болѣе позднихъ стадіяхъ, не смотря на большое количество изслѣдованныхъ мною зародышей, я не видалъ ничего подобнаго такимъ картинамъ. Изъ этого, какъ мнѣ кажется, можно вывести заключеніе, что превращеніе большей части элементовъ нижняго листа въ паразиты свидѣлствуетъ о ненормальномъ ходѣ развитія зародыша, который скоро при этомъ и погибаетъ, въ маломъ же масштабѣ этотъ процессъ имѣетъ мѣсто для уничтоженія ненужныхъ болѣе элементовъ, на примѣръ, клѣточекъ нижняго листа подѣ формирующимся спиннымъ органомъ.

Довольно скоро послѣ перваго появленія зачатка спинного органа послѣдній принимаетъ уже вполне готовую форму. Подобный видъ онъ имѣетъ у зародыша, разрѣзъ черезъ котораго изображенъ на рис. 18. Большая часть его поверхности покрыта здѣсь, какъ и на предыдущей стадіи, клѣтками двухъ первичныхъ зародышевыхъ листковъ, а на спинномъ полюсѣ помѣщается кучка болѣе крупныхъ, удлинненныхъ клѣтокъ спинного органа, глубоко вдающихся въ желтокъ (DO). Границы между клѣтками у зародышей этой и слѣдующихъ стадій вплоть до разрыва хоріона обычно не бываютъ видны, такъ какъ въ это же время начинается выдѣленіе подѣ хоріономъ кутикулярной зародышевой оболочки, благодаря чему фиксировка этихъ стадій значительно хуже предыдущихъ и послѣдующихъ. Крайне рѣзко зато выступаютъ границы между клѣтками и вообще гистологическій характеръ всѣхъ элементовъ гораздо яснѣе у зародышей вскорѣ послѣ разрыва хоріона, такъ что со строеніемъ спинного органа лучше познакомиться по болѣе поздней стадіи.

На рис. 26 изображенъ разрѣзъ черезъ самую верхнюю часть такого болѣе поздняго зародыша (относящагося уже къ третьему періоду развитія), гдѣ отлично виденъ и спинной органъ

(DO). Мы видимъ здѣсь, что клѣтки послѣдняго во много разъ больше прилегающихъ къ нимъ клѣтокъ эктодермы, продолженіемъ которыхъ онѣ какъ бы являются. Каждая клѣтка сильно вытянута въ длину, имѣя болѣе расширенный внутренній конецъ и сильно суженный наружный, причемъ эти наружные вытянутые концы клѣтокъ спинного органа сходятся другъ съ другомъ въ серединѣ его внѣшней поверхности. Внутренніе расширенные концы клѣтокъ заключаютъ въ себѣ по одному довольно крупному ядру; плазма ихъ здѣсь сильно вакуолизирована. Напротивъ, ближе кънаружи, по мѣрѣ суженія всей клѣтки, эта вакуолизация въ плазмѣ исчезаетъ и замѣняется прекрасно выраженнымъ фибриллярнымъ строеніемъ, такъ что получается впечатлѣніе, будто клѣтки спинного органа по направленію къ периферіи сильно суживаются и переходятъ въ пучекъ тонкихъ нитей, среди которыхъ нельзя различить уже границъ отдѣльныхъ клѣтокъ. Такая картина свидѣлствуетъ, конечно, объ интенсивной секреторной (или экскреторной) дѣятельности спинного органа, придавая ему характеръ железы: фибриллярное строеніе удлинненныхъ наружныхъ концовъ клѣтокъ можно объяснить накопленіемъ въ нихъ направляющагося наружу секрета, который вырабатывается, вѣроятно, ближе къ ядру, въ ихъ расширенныхъ внутреннихъ концахъ, гдѣ плазма имѣетъ много вакуоль.

На рис. 26, къ которому относится наше описаніе, видно, что наружные концы клѣтокъ спинного органа какъ бы выходятъ изъ зародыша и выдаются надъ его поверхностью, вступая въ связь съ окружающей яйцо оболочкой. Послѣднее характерно лишь для болѣе поздней стадіи — уже послѣ разрыва хоріона, во время же второго періода развитія и въ частности вскорѣ послѣ образованія спинного органа этого еще нѣтъ, и его наружная поверхность составляетъ прямое продолженіе поверхности эктодермы, надъ которой онъ отнюдь не выдается (рис. 18). За исключеніемъ этого клѣтки спинного органа (DO) и сейчасъ же послѣ его полнаго сформированія и вообще во время всего второго періода развитія (рис. 18, 19, 21, 22) имѣютъ тотъ же характеръ, который изображенъ и описанъ нами по болѣе поздней стадіи (рис. 26), т.-е. состоятъ каждая изъ болѣе широкой внутренней части съ сильно вакуолизированной плазмой и удлинненнаго наружнаго конца съ фибриллярнымъ строеніемъ, хотя границы между этими клѣтками здѣсь болѣею частью и не видны. Никакихъ слѣдовъ клѣтокъ нижняго листа, когда-то бывшихъ и въ этомъ мѣстѣ, послѣ полнаго сформированія спинного органа подѣ нимъ уже не имѣется, клѣтки же эктодермы

подходят вплотную къ его крайнимъ клѣткамъ, такъ что, какъ видно на рис. 18 и другихъ, спинной органъ производитъ впечатлѣніе разросшагося внутрь участка эктодермы, чѣмъ онъ въ дѣйствительности и является. Что касается, наконецъ, до общей формы этого образованія, то о ней лучше всего свидѣтельствуеетъ его старое названіе— „шарообразный органъ“ (Ульянинъ), хотя эта форма иногда и замѣняется формой менѣе правильной сфероиды.

Сейчасъ же послѣ закладки спинного органа начинается выдѣленіе зародышемъ первой кутикулярной оболочки, при чемъ послѣдняя выдѣляется подъ хоріономъ всей поверхностью эктодермы. На томъ же разрѣзѣ, гдѣ спинной органъ достигъ своей окончательной величины (рис. 18) и на разрѣзѣ черезъ слѣдующую стадію (рис. 19) мы видимъ, что наружный край эктодермальныхъ клѣтокъ имѣетъ рѣзко выраженный контуръ (ah_1), при чемъ при окраскѣ по Блохманну Wasserblau интенсивно красить эту каемку, какъ она окрашивается на болѣе позднихъ стадіяхъ и кутикулярныя зародышевыя оболочки. Очевидно, здѣсь мы имѣемъ передъ собой возникновеніе такой оболочки, образующейся какъ продуктъ превращенія наружнаго слоя эктодермальныхъ клѣтокъ. При разсматриваніи такихъ зародышей въ каплѣ спирта можно добиться иногда осторожнымъ надавливаніемъ иглы на покровное стекло, снабженное восковыми ножками, отдѣленія этой кутикулярной оболочки отъ поверхности зародыша, хотя на этихъ стадіяхъ она еще очень плотно прилегаетъ къ ней.

Чтобы такое отдѣленіе могло произойти естественнымъ путемъ, поверхность его вслѣдъ за образованіемъ на зародышѣ этой кутикулы начинаетъ покрываться множествомъ складокъ и извилинъ, при чемъ первоначально за всѣми этими неровностями эктодермы слѣдуетъ и зародышевая оболочка, пока она совершенно не отдѣлится отъ поверхности зародыша.

Процессъ этотъ начинается съ появленія одной очень глубокой борозды, которая проходитъ кругомъ всего яйца по его меридіану. Какъ видно и на цѣломъ яйцѣ и на разрѣзахъ черезъ него (рис. 19), эта борозда (f) начинается на спинной сторонѣ яйца, сейчасъ же сзади спинного органа (т.-е. проходитъ съ той стороны послѣдняго, которая обращена къ половому зачатку—g) и отсюда распространяется по боковымъ сторонамъ зародыша, переходя и на его брюшную сторону, т.-е. охватываетъ яйцо кругомъ. Брюшную сторону яйца эта борозда пересекаетъ ближе къ ея переднему (удаленному отъ полового зачатка)

концу, составляя такимъ образомъ примѣрно градусовъ 45 съ главной осью яйца, если принять за послѣднюю длинную ось грушевиднаго зародыша или (на слѣдующихъ стадіяхъ, когда зародышъ сталъ снова круглымъ) прямую линію, идущую отъ спинного органа къ брюшной сторонѣ яйца параллельно половому зачатку.

Борозда эта настолько рѣзко выражена и настолько хорошо замѣтна и на этой стадіи и на слѣдующихъ (рис. 20, 21), что невольно напрашивается предположеніе, будто въ связи съ ней стоятъ какіе-нибудь процессы во внутреннемъ развитіи зародыша. Однако это предположеніе совершенно неправильно, и послѣ разрыва хоріона, когда поверхность зародыша выравнивается, отъ этой борозды, какъ и отъ болѣе мелкихъ, не остается и слѣда. Боковыя стороны борозды выстланы клѣтками и эктодермы и нижняго листка, на днѣ же ея, какъ видно и на рис. 19, обыкновенно имѣется одинъ слой эктодермальныхъ клѣтокъ, такъ какъ клѣтки нижняго листка оттѣсняются здѣсь въ стороны.

Первоначально эта глубокая меридіональная борозда не мѣняетъ положенія спинного органа, рядомъ съ которымъ она проходитъ, однако по мѣрѣ ея дальнѣйшаго углубленія она увлекаетъ съ собой и послѣдній, который мало-по-малу поворачивается на довольно значительный уголъ отъ своего прежняго положенія. Когда процессъ этотъ достигаетъ своего максимума, спинной органъ оказывается повернутымъ почти на 90° , и его внѣшняя поверхность обращена въ это время уже не наружу, а въ полость борозды (рис. 21) и по направленію къ заднему концу зародыша (сравни рис. 21 съ рис. 20, гдѣ изображены и половой зачатокъ,—оба относятся къ одному зародышу).

Въ это же время кромѣ описанной выше глубокой меридіональной борозды вся поверхность зародыша покрывается множествомъ складокъ и бороздокъ, замѣтныхъ отчасти и на разрѣзахъ (рис. 20, 21, 22). На этой стадіи зародышъ совершенно непрозраченъ, и разсматриванье его въ каплѣ спирта позволяетъ убѣдиться лишь въ существованіи этой складчатой поверхности, не давая никакого представленія о внутреннемъ строеніи. Между тѣмъ и до появленія этихъ складокъ и послѣ ихъ исчезновенія, когда хоріонъ уже лопнулъ, при этомъ можно видѣть многія подробности внутренняго строенія яйца.

Кутикулярная оболочка зародыша (h_1) слѣдуетъ за всѣми неровностями поверхности яйца, но затѣмъ благодаря появленію этихъ складокъ и бороздокъ отдѣляется отъ нея и лежитъ свободно между зародышемъ и хоріономъ (рис. 20, 21, 22). На

ней въ это время замѣтны всѣ тѣ же возвышенія и углубленія, какъ и на поверхности эктодермы; заходитъ она и въ углубленіе меридіональной борозды, при чемъ Wasserblau по прежнему интенсивно окрашиваетъ эту уже отдѣлившуюся кутикулу.

Заканчивается второй періодъ развитія яйца разрывомъ хоріона и выдѣленіемъ подъ первой зародышевой оболочкой такой же второй эмбриональной кутикулы. Къ сожалѣнію, именно для этихъ двухъ процессовъ необходимо наблюденіе развитія *intra vitam*, которое мною не было въ свое время произведено, по однимъ препаратамъ же трудно уяснить себѣ эти процессы вполне, тѣмъ болѣе что и фиксировка матеріала благодаря наличности двухъ оболочекъ (хоріона и первой зародышевой оболочки) оставляетъ желать очень многого.

На яйцахъ передъ самымъ разрывомъ хоріона (послѣднее легко установить потому, что онъ крайне легко разрывается отъ легкаго надавливанія) поверхность эктодермы столь же неровная и зародышевая кутикула (h_1) вполне отдѣлена отъ нея (рис. 23). Однако меридіональная борозда (f) здѣсь значительно менѣе глубока, а спинной органъ (DO) занимаетъ свое прежнее положеніе, будучи обращенъ вѣшними концами своихъ клѣтокъ уже не въ полость борозды, а попрежнему наружу. При этомъ бросается въ глаза, что по сравненію съ его прежнимъ положеніемъ, какъ оно изображено напримѣръ на рис. 18, теперь онъ болѣе сильно выдается надъ общей поверхностью зародыша. Такія картины, какъ мнѣ кажется, легче всего истолковать въ томъ смыслѣ, что увлеченный бороздою въ боковое положеніе спинной органъ снова выпячивается наружу, увлекая за собой отчасти и эктодерму со дна борозды, отчего и она замѣтно уменьшается въ размѣрахъ. Дать какое-нибудь другое объясненіе этому возвращенію спинного органа въ прежнее положеніе крайне трудно; съ другой стороны, я вполне убѣжденъ, что описываемая мной послѣдовательность стадій является, не смотря на отсутствіе наблюденій *intra vitam*, вполне правильной. Кромѣ самаго характера каждой стадіи (напримѣръ большого или меньшаго развитія первой зародышевой оболочки, крайней непрочности хоріона незадолго до разрыва) я руководствовался и распределеніемъ матеріала въ моихъ пробиркахъ. Стадіи развитія, изображенные на рис. 18, 19, 20—21, попадаютъ всегда вмѣстѣ и въ приблизительно равныхъ количествахъ, стадія же рис. 22 встрѣчается лишь среди матеріала, зафиксированнаго на слѣдующій день, при чемъ въ немъ преобладаютъ уже зародыши со сброшеннымъ хоріономъ, относящіеся къ третьему періоду развитія.

Въ виду этого мнѣ кажется, что выпячиванье спинного органа на поверхность даетъ толчокъ для разрыва хоріона, который въ это время становится уже слишкомъ тѣснымъ для зародыша. Подъ влияніемъ выпячиванья давленіе изнутри на хоріонъ увеличивается, онъ лопается на двѣ половинки и его мѣсто занимаетъ уже вполне образованная въ это время первая кутикулярная оболочка. Если это дѣйствительно такъ, то можно понять и назначеніе глубокой меридіональной борозды кругомъ яйца, которая была описана нами выше. Болѣе мелкія бороздки и складки на поверхности яйца стоятъ несомнѣнно въ связи съ отдѣленіемъ первой зародышевой кутикулы, меридіональная же борозда имѣетъ помимо этого и специальное назначеніе, а именно чтобы вывести спинной органъ изъ его нормальнаго положенія, отклонивъ отъ него назадъ на 90° , и тѣмъ подготовить его обратное выпячиванье на поверхность, а черезъ это и разрывъ хоріона. Въ пользу самостоятельнаго назначенія меридіональной борозды говоритъ, какъ мнѣ кажется, и ея болѣе ранняя закладка еще до появленія на поверхности яйца мелкихъ складокъ и бороздокъ.

Такое то толкованіе, которое я могу дать тѣмъ картинамъ, которыя наблюдались мной на препаратахъ, и такъ я представляю себѣ причины, вызывающія разрывъ хоріона въ концѣ второго періода развитія яйца. Долженъ еще разъ подчеркнуть, что все это основано не на прямомъ наблюденіи, а на косвенныхъ данныхъ, почему для окончательнаго рѣшенія этого вопроса и проверки моего взгляда необходимо наблюденіе *intra vitam*. Къ сожалѣнію, въ работахъ моихъ предшественниковъ, наблюдавшихъ развитіе на живомъ матеріалѣ, всѣ данныя объ этомъ періодѣ развитія очень скудны и болѣею частью ошибочны.

Интересно здѣсь же отмѣтить, что если мои соображенія правильны, то разрывъ хоріона у нашихъ зародышей происходитъ не чисто механическимъ путемъ благодаря росту зародыша и пассивному давленію на хоріонъ изнутри, а вызывается активной дѣятельностью самого зародыша, который продѣлываетъ для этого во время развитія рядъ специальныхъ процессовъ (образованіе меридіональной борозды, смѣщеніе спинного органа, его выпячиванье наружу). Это можно сопоставить съ взглядомъ Kautsch'a (1909), что переворачиванье зародыша у пауковъ (аналогичное же явленіе имѣется и у зародышей *Isotoma*) нельзя объяснить механическимъ давленіемъ, какъ это утверждалъ Montgomery (1909),—взглядъ, который Kautsch доказалъ недавно и путемъ опытовъ надъ зародышами (1910 b).

Во время выпячивания спинного органа передъ разрывомъ хоріона на поверхность, т.-е. на стадии, изображенной на рис. 22, наблюдается снова образование парацитовъ, о которыхъ мы говорили раньше. На разрывахъ черезъ такихъ зародышей эти дегенерирующія клетки обыкновенно бываютъ замѣтны въ желткѣ около самаго спинного органа и исчезающей меридіональной борозды (рис. 22 par). Вѣроятно, часть элементовъ со дна последней не выпячивается на поверхность при начинающемся выравнивании поверхности зародыша, а распадается на отдѣльныя клетки, которыя уходятъ въ желтокъ и подвергаются тамъ дегенерации. Къ этимъ клеткамъ со дна меридіональной борозды присоединяются и другія, большею частью, изъ ближайшихъ же окрестностей спинного органа, которыя испытываютъ ту же участь, т.-е. уходятъ въ желтокъ и погибаютъ тамъ. На слѣдующихъ стадіяхъ парацитовъ въ желткѣ близъ спинного органа уже не бываетъ видно.

Хоріонъ разрывается на двѣ равныя половинки, которыя, какъ это уже описано предыдущими авторами (Nicolet, Ульянинымъ, Uzel'емъ), расходятся подъ напоромъ первой зародышевой кутикулы и остаются въ концѣ концовъ на ней въ видѣ двухъ шляпокъ. Зародышевая кутикула расправляется, всѣ складки и углубленія, бывшія на ней до того исчезаютъ и между ней и зародышемъ появляется довольно большой промежутокъ. На нашемъ рис. 23 изображена первая стадія третьяго періода развитія, у которой хорошо видна и эта зародышевая оболочка (h_1) и сидящая на ней другъ противъ друга половинки хоріона (ch), имѣющія форму двухъ приплюснутыхъ шляпокъ. Последнія остаются въ такомъ видѣ на наружной зародышевой оболочкѣ во время всего третьяго и четвертаго періода развитія вплоть до вылупленія зародыша изъ яйца. Никакихъ выростовъ на наружной зародышевой кутикулѣ, подобныхъ наблюдавшимся у другихъ Collembola (Nicolet, Ульянинъ и др.), у *Isotoma cinerea* не имѣется: эта оболочка у нея совершенно гладкая и безструктурная.

Рис. 23 нарисованъ при томъ же увеличеніи, что и внѣшній видъ яйца и первыхъ стадій дробленія на рис. 1—5 (300:1); сравненіе его съ ними ясно показываетъ, что благодаря разрыву хоріона яйцо, окруженное теперь ужъ кутикулярной зародышевой оболочкой, сильно увеличивается въ размѣрахъ. Нѣкоторую долю этого увеличенія у моего матеріала нужно отнести, впрочемъ, на вліяніе фиксирующей жидкости и спирта, такъ какъ по измѣреніямъ Ульянина, сдѣланнымъ на живомъ мате-

ріалѣ, это увеличеніе немного меньше (у одной формы, напр., съ 0,2 mm. всего до 0,28 mm.). Въ виду этого я не привожу здѣсь своихъ цифръ.

Во время разрыва хоріона выдѣляется и третья оболочка зародыша—вторая зародышевая кутикула. Передъ самымъ разрывомъ хоріона (рис. 22) ея еще нѣтъ, на всѣхъ же слѣдующихъ стадіяхъ она хорошо замѣтна какъ на тотальныхъ препаратахъ (рис. 23), такъ и на разрывахъ (рис. 24, 25)— h_2 . Эта оболочка лежитъ между наружной кутикулой и зародышемъ, прилегая болѣе тѣсно къ последнему; она такая же безструктурная, значительно тоньше первой и такъ же окрашивается Wasserblau.

По наблюденіямъ Ульянина и Miss Claypole эта вторая зародышевая кутикула выдѣляется подобно первой всей поверхностью зародыша. На стадіяхъ, предшествующихъ разрыву хоріона, когда первая оболочка уже отдѣлилась (рис. 20, 21, 22), я не наблюдаю въ поверхностномъ слоеѣ эктодермальныхъ клетокъ такой же красивѣйшей Wasserblau каемки, какая была замѣтна передъ отдѣленіемъ первой кутикулы (рис. 18, 19 ah_1). Впрочемъ, въ этомъ, быть можетъ, была виновата не особенно хорошая фиксировка всѣхъ элементовъ на этихъ стадіяхъ.

Сбрасываньемъ хоріона второй періодъ развитія яйца заканчивается. Его продолжительность значительно больше продолжительности перваго періода и равна приблизительно 4 суткамъ (какъ устанавливаетъ и Lemoine для *Anurophorus laricis*). Первые стадіи третьяго періода развитія наблюдались мной черезъ 5 дней послѣ откладки яицъ.

Данныя обо всѣхъ этихъ процессахъ въ работахъ предыдущихъ авторовъ очень неполны и часто неясны. Ульянинъ правильно описываетъ образованіе кутикулярныхъ оболочекъ, складки на поверхности зародыша, которыя предшествуютъ отдѣленію первой изъ нихъ, разрывъ хоріона и слѣдующее за этимъ увеличеніе размѣровъ яйца. Однако, по его описанію, первая зародышевая оболочка выдѣляется еще до закладки спинного органа, который возникаетъ въ видѣ валика кругомъ углубленія бластодермы, подъ которымъ образуется и нижній зародышевый листокъ. Рисунокъ, иллюстрирующий это описаніе (табл. V, рис. 7), изображаетъ ту же картину, что и нашъ рис. 20, при чемъ углубленіе бластодермы есть ничто иное, какъ меридіональная борозда, а уже задолго до того образованнаго спинного органа

на немъ вообще и быть не можетъ въ силу того, что онъ виденъ лишь на разрѣзахъ, проходящихъ ближе къ серединѣ яйца (какъ на нашемъ рис. 21). Сравненіе этого рисунка въ работѣ Ульянина съ нашимъ рис. 20 интересно и въ другомъ отношеніи: изъ него можно съ несомнѣнностью убѣдиться, что Ульянинъ принималъ за лежачій, по его описанію, въ серединѣ желтка зачатокъ средней кишки просто половой зачатокъ.

Lemoine также описываетъ спинной органъ и обѣ кутикулярныя оболочки, но его описаніе почти сплошь ошибочно: такъ, по Lemoine'у первая зародышевая оболочка („membrane amniotique“) клѣточная и соответствуетъ амніону и серозѣ насѣкомыхъ; со спиннымъ органомъ она связана при помощи особаго аппарата — „aproule amniotique“, которая образуется выпячиваньемъ элементовъ гипобласта и т. д. Меридіональную борозду онъ считаетъ за бластопоръ, на днѣ котораго происходитъ образование нижняго зародышеваго листа.

Изъ болѣе позднихъ работъ данныя Wheeler'a, Uzel'я и Prowazek'a очень кратки и вносятъ мало существенно новаго, хотя оба первыхъ установили впервые плотную закладку спинного органа. Miss Claupole останавливается на всѣхъ этихъ процессахъ наиболѣе подробно. Закладка спинного органа и его строеніе описывается въ ея работѣ въ общемъ вполне согласно и съ моимъ описаніемъ, но о парацитахъ она ничего не упоминаетъ. Не упоминается совершенно и о глубокой меридіональной бороздѣ, смѣщеніи спинного органа и его обратномъ выпячиваніи на поверхность, точно также какъ не останавливается Miss Claupole и на процессѣ разрыва хоріона. Съ другой стороны, по ея описанію, еще до образованія тѣхъ двухъ кутикулярныхъ оболочекъ, которыя описаны и мною и предпослуживающими авторами („first and second crenated membrane“ по ея терминологіи), поверхностью зародыша выдѣляется еще одна оболочка — „preparatory membrane“. Впрочемъ, Folsom не подтверждаетъ существованія послѣдней у *Anurida*.

Всѣми прежними авторами эти кутикулярныя оболочки обозначались какъ бластодермическія, этотъ же терминъ употребляется и Miss Claupole, хотя она вполне правильно рассматриваетъ поверхностныя клѣтки зародыша на этихъ стадіяхъ, какъ эктодерму. Въ этомъ случаѣ подобный терминъ, конечно, непримѣнимъ, почему я имъ и не пользовался, хотя, съ другой стороны, не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что эти зародышевыя кутикулы у *Collembola* вполне соответствуютъ бластодермическимъ оболочкамъ многихъ *Arthropoda*, у которыхъ большая

часть яйца покрыта бластодермой, а зародышевыя листки развиты лишь въ одной строго опредѣленной части яйца. Къ значенію этихъ зародышевыхъ оболочекъ мы еще вернемся въ концѣ работы.

V. Третій періодъ развитія. — Закладка и дифференцировка зародышевой полосы, переворачиванье зародыша. (Табл. II, III, IV).

Третій періодъ развитія начинается сейчасъ же вслѣдъ за сбрасываньемъ хоріона закладкой и постепенной дифференцировкой зародышевой полосы; во время него закладываются всѣ конечности и происходитъ переворачиванье зародыша, мѣняющаго свое первоначальное дорзальное искривленіе на вентральное. Продолжительность этого періода, провести границу между которымъ и послѣднимъ періодомъ уже довольно трудно, болѣе или менѣе одинакова съ продолжительностью втораго періода развитія, т.-е. равна приблизительно 4 суткамъ.

Вполнѣ соглашаясь съ замѣчаніемъ Carrière'a (1897), что „die Zahl und die Leichtigkeit oder Schärfe der Abgrenzung von Entwicklungsstadien bei Embryonen steht bekanntlich im umgekehrten Verhältniss zur Menge des verfügbaren Materials“ (S. 299), я все же нахожу болѣе удобнымъ разбить и этотъ періодъ развитія и четвертый на рядъ стадій, по которымъ и вести дальнѣйшее описаніе. Хотя благодаря большому количеству имѣвшагося у меня матеріала почти между всѣми этими стадіями имѣются переходы, но подобный способъ изложенія значительно упрощаетъ дѣло, такъ какъ въ это время зародыши имѣютъ уже болѣе сложное строеніе. Стадіи я обозначаю отдѣльными буквами, внѣшній же видъ ихъ изображенъ на рис. 23 (Табл. II) и 27—36 (Табл. III).

Стадія А. Наружный видъ самой молодой изъ имѣвшихся у меня стадій этого періода изображенъ на рис. 23. Здѣсь прежде всего бросается въ глаза, что кругомъ всего яйца уже заложена зародышевая полоса, примыкающая своимъ переднимъ и заднимъ концами къ спинному органу (DO). На этой зародышевой полосѣ дифференцированы головныя лопасти (K1), лежація сейчасъ же подъ спиннымъ органомъ, и 4 первыхъ сегмента (segm), задняя же половина ея имѣетъ еще видъ не-сегментированнаго тяжа, доходящаго тоже до спинного органа. Эти первые сегменты являются сегментами ротовыхъ органовъ

и первым грудным, что можно установить путем сравнения этой стадии с последующими.

Однако не вся поверхность яйца покрыта зародышевой полосой: уже на тотальных препаратах из таких зародышей, с одного из которых сделан и наш рис. 23, хорошо видно, что она охватывает всю брюшную сторону зародыша и образует на его передней и задней сторонѣ ближе къ спинному органу расширения (для головных лопастей и хвостового конца), боковые же стороны яйца свободны от нея и кажутся поэтому свѣтлѣе. Вполнѣ ясное представление обо всѣхъ этихъ отношеніяхъ даютъ однако лишь поперечные разрѣзы черезъ зародыша въ родѣ изображенныхъ на рис. 24 и 25.

На рис. 25 представленъ разрѣзъ, прошедшій черезъ спинной органъ и половой зачатокъ (g) и пересѣкшій зародышевую полосу на брюшной сторонѣ яйца, гдѣ она еще не сегментирована, причемъ на немъ замѣтно рѣзкое различіе между клѣтками зародышевой полосы и клѣтками боковыхъ сторонъ яйца выше нея. — Въ области первой мы видимъ два слоя цилиндрическихъ клѣтокъ, отдѣленныхъ рѣзкими границами другъ отъ друга: наружный слой является эктодермой (ect), внутренний представляетъ изъ себя нижній листокъ (ub). Напротивъ, на боковыхъ сторонахъ зародыша между зародышевой полосой и спиннымъ органомъ элементовъ нижняго листа, въ отличіе отъ предыдущихъ стадій второго періода развитія, нѣтъ совершенно; эктодерма здѣсь имѣется, но представлена не цилиндрическими, а плоскими клѣтками (he), которыхъ относительно гораздо меньше, чѣмъ въ области зародышевой полосы.

Рис. 24 изображаетъ разрѣзъ черезъ переднюю часть зародыша: спинного органа здѣсь уже нѣтъ, а въ его верхней части (Kl) мы встрѣчаемъ не плоскія эктодермальные клѣтки, а снова высокія цилиндрическія и подъ ними слой подобныхъ же элементовъ нижняго листка: это попавшая въ разрѣзъ часть головныхъ лопастей. На нижней части нашего рисунка мы видимъ эти же два слоя, но съ суженіемъ по срединѣ и въ видѣ двухъ выступовъ по бокамъ отъ него (segm), такъ какъ разрѣзъ этотъ прошелъ черезъ одинъ изъ сегментовъ зародышевой полосы. Боковые расширения такого сегмента даютъ на слѣдующихъ стадіяхъ выросты для начинающихся образовываться конечностей. Небольшой промежутокъ между головными лопастями и брюшной частью зародышевой полосы покрытъ и на этомъ разрѣзѣ такими же плоскими эктодермальными клѣтками безъ подстилающихъ ихъ элементовъ нижняго листа, какъ боковые стороны зародыша на

рис. 25. На поперечныхъ разрѣзахъ черезъ самый задній конецъ зародыша, какъ легко видно по его внѣшнему виду (рис. 23), мы совсѣмъ не встрѣтимъ этихъ плоскихъ эктодермальныхъ клѣтокъ, такъ какъ тутъ все яйцо окружено двумя слоями зародышевой полосы.

Словомъ, на этой стадіи появляется рѣзкое различіе между зародышевой полосой, занимающей всю переднюю и заднюю и брюшную сторону средней части яйца, и боковыми сторонами его: первая состоитъ по прежнему изъ двухъ зародышевыхъ слоевъ, боковые же стороны покрыты лишь плоскими эктодермальными клѣтками, которыя, такимъ образомъ, на разрѣзахъ, прошедшихъ черезъ середину яйца, покрываютъ все его верхнее полушаріе (рис. 25). Въ дальнѣйшемъ я буду пользоваться для этихъ клѣтокъ терминомъ „Hüllenectoderm“, которымъ Hirschler (1909 b) обозначаетъ у *Donacia* зачатокъ серозы въ отличіе отъ Keimectoderm для зародышевой полосы и амниона, такъ какъ, какъ мы увидимъ дальше, эти плоскія клѣтки эктодермы вполнѣ соответствуютъ серозѣ насѣкомыхъ. Замѣчу, что терминъ этотъ, вполнѣ пригодный для *Collembola*, такъ какъ ихъ Hüllenectoderm дѣйствительно эктодерма, по отношенію къ *Pterygota* долженъ быть передѣланъ въ Hüllenblastoderm, потому что Hirschler, давая его, понималъ подъ эктодермой бластодерму, присоединяясь къ взгляду Neumons'a на желточные клѣтки, какъ на энтодерму: послѣдній же взглядъ, о чемъ мы подробнѣе будемъ говорить дальше, врядъ ли можетъ теперь поддерживаться.

Описанныя отношенія позволяютъ составить представление о томъ, какъ закладывается зародышевая полоса. Очевидно, она возникаетъ путемъ большаго скопленія клѣтокъ и эктодермы и нижняго листка въ той довольно значительной части поверхности яйца, которая бываетъ покрыта ею: это большее скопленіе клѣтокъ въ области зародышевой полосы достигается тѣмъ, что часть эктодермальныхъ клѣтокъ и всѣ элементы нижняго листка съ боковыхъ сторонъ зародыша мигрируютъ или на брюшную сторону или къ переднему и заднему концу яйца, въ результатъ чего его боковые стороны и оказываются покрытыми лишь тонкимъ слоемъ плоскихъ эктодермальныхъ клѣтокъ — такъ называемой Hüllenectoderm. Эту миграцію клѣтокъ нижняго листка („мезодермы“) при образованіи зародышевой полосы отмѣчаетъ въ своей работѣ и Miss Claypole. Совершенно аналогично возникаетъ зародышевая полоса по Uzel'ю и у *Campodea*, гдѣ тоже происходитъ, какъ онъ выражается, стягиванье бластодермы въ одно полушаріе яйца, гдѣ и возникаетъ зачатокъ зародышевой

полосы, скоро занимающей $\frac{2}{3}$ поверхности яйца. Подобное же стягиванье элементов уже не зародышевых листовъ, а бласто-дермы имѣетъ мѣсто и при образованіи зародышевой полосы нѣкоторыхъ *Pterygota*: это отмѣчаетъ, напримѣръ, Knower (1900) у *Eutermes*. Въ другихъ случаяхъ, однако, зародышевая полоса высшихъ насѣкомыхъ возникаетъ иначе, а именно путемъ сліянія другъ съ другомъ особыхъ *Bildungscentren*, что, повидимому, характерно для *Orthoptera* [Холодковский (1891), Wheeler (1893), Heymons (1895)].

Если мы сравнимъ описанную нами стадію А съ послѣдней стадіей второго періода, то различіе между ними является довольно большимъ. Помимо того, что вся поверхность зародыша успѣла совершенно выравняться, такъ что отъ прежнихъ складокъ и бороздъ не осталось и слѣда, и что путемъ стягиванья клѣтокъ возникла зародышевая полоса, мы находимъ на ней кромѣ головныхъ лопастей уже 4 сегмента. Очевидно, здѣсь имѣется пробѣлъ, и нашей стадіи А въ дѣйствительности предшествуетъ еще одна стадія, отсутствующая въ моемъ матеріалѣ. Въ работахъ Uzel'я и Prowazek'a имѣется совершенно определенное указаніе, что у наблюдавшихся ими зародышей имѣлась стадія съ заложенными головными лопастями и сегментомъ мандибулъ, при чемъ остальная зародышевая полоса была еще не сегментирована. Эта стадія, очевидно, и является недостающимъ звеномъ между стадіей А и концомъ второго періода развитія.

Такъ какъ характеръ спинного органа не мѣняется во время всего третьяго періода развитія, то мы можемъ описать его здѣсь же при стадіи А. Во время второго періода развитія наружная поверхность этого органа была, какъ мы уже отмѣчали, совершенно гладкая и составляла прямое продолженіе поверхности эктодермы, теперь же мы имѣемъ иную картину (рис. 26). Характеръ его клѣтокъ сохраняется прежнимъ (вакуолизированная внутренняя часть и фибриллярная наружная), но послѣ разрыва хоріона наружные концы этихъ клѣтокъ выдаются надъ поверхностью *Hüllenectoderm* и переходятъ какъ бы въ пучекъ тонкихъ нитей, который затѣмъ расширяется, принимая грибовидную форму, и вступаетъ въ связь съ одной изъ кутикулярныхъ оболочекъ зародыша. Какъ общее правило, такая связь устанавливается между спиннымъ органомъ и второй зародышевой кутикулой (h_2), какъ это видно на рис. 23 и 25. Однако, иногда попадаются зародыши, у которыхъ такое выдающееся надъ поверхностью эктодермы грибовидное продолженіе клѣтокъ спинного органа доходитъ

и до наружной зародышевой оболочки (h_1) и плотно прикрѣпляется къ ея внутренней поверхности, соединяя съ ней, такимъ образомъ, всего зародыша (рис. 26). Впрочемъ, подобное явленіе наблюдалось значительно рѣже.

Если прибавить, что какъ фибриллы въ наружныхъ концахъ клѣтокъ спинного органа, такъ особенно и этотъ грибовидный наружный выростъ его интенсивно окрашиваются *Wasserblau*, то можно считать все это явленіе результатомъ той же интенсивной секреторной или экскреторной дѣятельности спинного органа, о которой мы уже говорили. Вещество, вырабатывающееся въ его клѣткахъ, выходитъ наружу, имѣя видъ пучка, вѣроятно, клейкихъ нитей, составляющихъ какъ бы продолженіе клѣтокъ спинного органа, и приклеивается къ внутренней, а въ случаѣ очень сильнаго его выдѣленія и къ наружной оболочкѣ зародыша. Дать иное объясненіе этимъ картинамъ, какъ мнѣ кажется, довольно трудно.

Стадія В. На этой стадіи зародышевая полоса окружаетъ все яйцо, какъ и на стадіи А, и является, такимъ образомъ, еще совершенно выпуклой. Однако, какъ можно видѣть уже по виѣшнему виду зародышей этой стадіи (рис. 27), въ нихъ произошли нѣкоторыя измѣненія. Рядомъ съ нижнимъ краемъ головныхъ лопастей (Kl) имѣются зачатки антеннъ (ant), которыхъ не было на предыдущей стадіи и которые образуются здѣсь, какъ и у другихъ насѣкомыхъ, отдѣленіемъ отъ нижняго или задняго края этихъ лопастей. Сегментовъ на зародышевой полосѣ больше и они гораздо рѣзче выражены благодаря тому, что на нихъ начинаютъ выростать конечности. Обычно на этой стадіи зародышъ имѣетъ за антеннами уже 6 хорошо сформированныхъ сегментовъ, каждый изъ которыхъ снабженъ зачатками конечностей въ видѣ двухъ боковыхъ выростовъ, рѣзко выдѣляющихся на такихъ тотальныхъ препаратахъ, съ одного изъ которыхъ сдѣланъ рис. 27. Очевидно, эти придатки на нашемъ рисункѣ являются мандибулами (md), первой и второй парой максиллъ (mx_1 и mx_2) и тремя парами грудныхъ ножекъ ($th_1—th_3$). На зародышахъ, которые относятся къ началу этой стадіи, обыкновенно бываетъ видно всего лишь 5 сегментовъ, такъ какъ послѣдній грудной еще слитъ съ несегментированной задней половиной зародышевой полосы: сагитальный разрѣзъ черезъ такого именно зародыша изображенъ на рис. 38. Въ желткѣ близъ этой несегментированной части зародыша лежитъ по прежнему половой зачатокъ (g); поверхность яйца тамъ, гдѣ она не занята зародышевой полосой, какъ и на стадіи А, покрыта плоскими экто-

дермальными клетками, которые мы назвали Hüllenectoderm (рис. 39 he).

Элементы нижнего листа (ub) по прежнему имются повсюду подъ эктодермой (ect) зародышевой полосы (рис. 38), но онъ не остается вездѣ однослойнымъ, какъ на стадіи А и во время второго періода развитія, а образуетъ въ сформировавшихся уже сегментахъ сомиты. На поперечномъ разрѣзѣ черезъ зародыша, прошедшемъ черезъ одинъ изъ его сегментовъ (рис. 39), мы видимъ, что въ средней части зародышевой полосы нижній листъ по прежнему однослоенъ, въ боковыхъ же частяхъ, изъ которыхъ растутъ конечности, его клетки располагаются въ два слоя, образуя замкнутые пузырьки, т. е. сомиты (so). Такимъ образомъ, въ каждомъ сегментѣ на этой стадіи имется по парѣ сомитовъ, лежащихъ надъ вырастающими изъ него конечностями, при чемъ между сомитами одного сегмента проходитъ, связывая ихъ другъ съ другомъ, одинъ слой клетокъ нижняго листа (isb). Этотъ однослойный мостикъ между первичными сегментами, имѣющийся и у зародышей *Pterygota*, играетъ въ дальнѣйшемъ интересную роль, являясь однимъ изъ зачатковъ средней кишки.

Образованіе сомитовъ у *Isotoma cinerea* происходитъ по тому же типу, какъ у многихъ *Orthoptera* [Heymons (1895)], у *Scolopendra* [Heymons (1901)] и у нѣкоторыхъ другихъ *Arthropoda*, когда такой первичный сегментъ возникаетъ путемъ превращенія однослойной пластинки нижняго листа (или мезодермы авторовъ) въ двуслойную, чѣмъ бы эта двуслойность не достигалась (дѣленіемъ клетокъ и расхожденіемъ ихъ другъ отъ друга или загибаніемъ краевъ—что болѣе частью трудно точно установить). Этотъ способъ возникновенія сомитовъ еще до захожденія ихъ въ конечности, какъ мнѣ кажется, примитивнѣе тѣхъ отношеній, которые были описаны Heymons'омъ (1891) и Холодковскимъ (1891) у *Blattidae*, когда сомитъ, увлеченный въ ножку, еще открытъ со стороны желтка. Послѣдній способъ, вѣроятно, возникъ, какъ модификація перваго, благодаря болѣе раннему выростанію конечностей или болѣе поздней закладкѣ сомитовъ. Интересно отмѣтить, что у *Lepisma* по наблюденіямъ Heymons'a сомиты закладываются, какъ у *Blattidae*.

Стадія С характеризуется прежде всего тѣмъ, что зародышевая полоса, охватывающая по прежнему яйцо, уплощается съ брюшной стороны, что является началомъ ея выпячивания и начинающимся переворачиваніемъ зародыша. Это уплощеніе зародыша распространяется съ сегмента первыхъ максилъ по третій грудной сегментъ (рис. 28). На этомъ рисункѣ, изображающемъ цѣлаго

зародыша, мы видимъ, что усики и конечности значительно увеличились въ своихъ размѣрахъ; послѣднее особенно замѣтно, если разсматривать зародыша не съ боку, а съ брюшной стороны, осторожно вращая его подъ покровнымъ стекломъ (рис. 29). Новообразованіями здѣсь являются, во первыхъ, дифференцировка перваго брюшнаго сегмента (Abd_1) сзади третьей пары ножекъ, за которымъ до самаго спиннаго органа (DO) тянется еще не-сегментированная зародышевая полоса, и, во вторыхъ, верхняя губа (lbr). Послѣдняя возникаетъ, какъ видно на этихъ двухъ рисункахъ, подобно ея обычной закладкѣ у насекомыхъ, въ видѣ непарнаго выроста между обѣими головными лопастями (K1) у ихъ нижней или задней границы. На сагитальныхъ разрѣзахъ (рис. 40) ясно видно, что вслѣдъ за эктодермой въ образованіи labrum принимаютъ участіе и элементы нижняго листа, не участвующие въ образованіи сомитовъ. Замѣтимъ, что на этой стадіи правильнѣе было бы говорить еще не о верхней губѣ, а объ общемъ зачаткѣ clypeus и labrum, какъ это и дѣлаетъ въ своемъ предварительномъ сообщеніи Hoffmann, такъ какъ clypeus отдѣляется отъ верхней губы позже. Однако, вообще не останавливаясь въ этой работѣ особенно подробно на развитіи внѣшней формы тѣла, я не буду дѣлать здѣсь этого различія между Clypeo-Labrumanlage, какъ называетъ его Hoffmann, и просто labrum.

Рис. 29, изображающій большую часть зародышевой полосы съ брюшной стороны (какъ бы en face), интересенъ еще въ одномъ отношеніи. Изъ него видно, во-первыхъ, что антенны лежатъ на этой стадіи латеральнѣе всѣхъ другихъ конечностей и нѣсколько ниже верхней губы, т.-е. посторально. Послѣднее является правиломъ для *Pterygota*, и для *Collembola* отмѣчалось уже Folsom'омъ и Hoffmann'омъ. Интересно, однако, совершенно ясное изъ этого рисунка отсутствіе у зародышей нашей изотомы какихъ-либо придатковъ между антеннами и мандибулами, т.-е. рудиментовъ интеркалярнаго сегмента. Не видно ихъ и на слѣдующей стадіи—D, и вообще, особенно внимательно отнесясь къ этому вопросу, я убѣдился, что этихъ образованій нѣтъ ни на одной стадіи развитія у *Isotoma cinerea*. Между тѣмъ у *Anurida maritima* всѣ изслѣдовавшіе ея развитіе, начиная съ Wheeler'a, отмѣчаютъ наличность придатковъ интеркалярнаго сегмента; найдены послѣдніе и у *Tomocerus vulgaris* Hoffmann'омъ, а, быть можетъ, имѣются также у *Sminthurus fuscus* (? Lemoine: парная закладка верхней губы). Однако, Prokazez не нашелъ этихъ придатковъ у изслѣдованнаго имъ вида *Isotoma*. Въ виду рудиментарнаго характера этихъ образованій

вполнѣ понятно, впрочемъ, что они могутъ то присутствовать, то отсутствовать даже у довольно близкихъ формъ. Отмѣтимъ, что у *Campodea* придатки интеркалярнаго сегмента имѣются (Uzel), у *Lepisma* отсутствуютъ (Heymons); такъ же обстоитъ дѣло и у *Chilopoda*: у *Geophilus* они, повидимому, существуютъ [Зорафъ (1883) — Uzel], у *Scolopendra* же по Heymons'у (1901) ихъ нѣтъ.

Вмѣстѣ съ зачаткомъ верхней губы закладывается и stomodaeum, котораго до сихъ поръ у зародыша еще не имѣлось. Оно особенно хорошо замѣтно на сагитальныхъ разрѣзахъ (рис. 40 std), при чемъ мы видимъ здѣсь, что эктодермальное впячиванье для него находится сейчасъ же подъ верхней губой (lbr) и не достигаетъ до поверхности желтка; на этой стадіи между дномъ stomodaeum и желткомъ есть еще слой элементовъ нижняго листа (ub), переходящій затѣмъ въ скопленіе клѣтокъ нижняго же листа внутри labrum. Ничего особеннаго въ этой закладкѣ передней кишки по сравненію съ другими насѣкомыми здѣсь не имѣется.

На подобныхъ же сагитальныхъ разрѣзахъ, а также и на поперечныхъ (рис. 41) хорошо видно, что сомиты (so) заходятъ уже въ сильно выросшія конечности. Со стороны желтка первичные сегменты замкнуты и соединяются въ каждомъ сегментѣ однослойнымъ мостикомъ клѣтокъ нижняго листа (isb). Въ антеннахъ на этой стадіи тоже прекрасно видны заходящіе въ нихъ сомиты антеннальнаго сегмента; что касается до послѣднихъ въ лишенномъ конечностей интеркалярномъ сегментѣ, то я напелъ рудименты ихъ тамъ лишь на значительно болѣе поздней стадіи (E).

Такимъ образомъ, подобно Orthoptera и Odonata (у послѣднихъ — Heymons (1896a)) и лепизмѣ, у нашей изотомы, и, какъ видно по рисункамъ въ работѣ Folsom'a, у *Anurida*, а, вѣроятно, и у всѣхъ Collembola, сомиты заходятъ въ конечности. На примитивный характеръ этого явленія и сходство его съ отношеніями у многоножекъ и *Peripatus* указывалось уже много разъ.

Наконецъ, на стадіи же С закладывается и нервная система. На поперечныхъ разрѣзахъ зародышевой полосы (рис. 41) въ эктодермѣ между вырастающими конечностями хорошо замѣтны большія крупныя клѣтки (nbl), довольно рѣзко выдѣляющіяся среди прилегающихъ къ нимъ обыкновенныхъ эктодермальныхъ элементовъ. Такъ какъ на слѣдующей стадіи на мѣстѣ этихъ крупныхъ клѣтокъ возникаетъ уже многослойный зачатокъ нервной системы (ср. рис. 42 — 46 n), то, мнѣ кажется, ихъ слѣдуетъ считать за невробласты, столь характерные при развитіи нервной системы высшихъ насѣкомыхъ.

Ни на этой, ни на слѣдующей стадіи я не наблюдалъ на поперечныхъ разрѣзахъ нервной борозды, такъ что здѣсь нельзя говорить и о примитивныхъ валикахъ, не смотря на то, что всѣ эти образованія въ высшей степени характерны для зародышей членистоногихъ. Правда, на рис. 31, изображающемъ внѣшній видъ зародыша слѣдующей стадіи (D) en face, и видна болѣе свѣтлая линія между конечностями, но поперечные разрѣзы черезъ зародышей этой стадіи (рис. 46) убѣждаютъ насъ, что нервная система (n) здѣсь довольно сильно развита и происхожденіе этой свѣтлой линіи скорѣе можно объяснить тѣмъ, что это просто просвѣтъ между раздѣлившимися правой и лѣвой половиной нервной зачатки. Подобное раздѣленіе замѣтно на рис. 46, нервной же борозды здѣсь нѣтъ, какъ и на всѣхъ подобныхъ разрѣзахъ.

Впрочемъ, я долженъ оговориться, что нервная система была обычно зафиксирована у имѣвшихся въ моемъ распоряженіи зародышей довольно плохо, хуже другихъ органовъ, что особенно бросалось въ глаза на болѣе раннихъ стадіяхъ. Поэтому я и вообще выяснилъ изъ ея развитія лишь немного и не рѣшусь въ виду этого особенно настаивать на отсутствіи нервной борозды, допуская, что послѣднее могло быть результатомъ дурной фиксации. Въ наличности же невробластовъ сомнѣваться едва ли можно.

Отмѣтимъ, что Heymons уже напелъ послѣдніе у *Lepisma saccharina*, при чемъ у этой формы хорошо были видны и первичные валики съ бороздой между ними. Miss Claypole, говоря вскользь о развитіи нервной системы у *Anurida*, упоминаетъ, что „the brain and ventral cord both arise in the same way as that described by Wheeler for *Xiphidium*,—by the proliferation from single ectoderm cells until row of nerve cells arise“ (p. 279). Очевидно, развитіе нервной системы при помощи невробластовъ можно считать общимъ правиломъ для всѣхъ насѣкомыхъ, какъ Pterygota, такъ и Apterygota.

Стадія D. На этой стадіи начинается впячиванье средней части зародышевой полосы въ желтокъ и такъ называемое переворачиванье (Umrollung) всего зародыша, который мѣняетъ при этомъ свое прежнее дорзальное искривленіе на вентральное. Какъ хорошо видно на цѣломъ зародышѣ (рис. 30) и на сагитальныхъ разрѣзахъ (рис. 42), впячивается именно та часть зародышевой полосы, которая на предыдущей стадіи стала болѣе плоской, т.-е. съ перваго максиллярнаго по послѣдній грудной сегментъ; мандибулярный и первый брюшной сегментъ остаются

еще цѣликомъ на выпуклой поверхности яйца. Мѣсто перегиба зародышевой полосы совпадаетъ въ это время, какъ видно на рисункахъ, съ первымъ груднымъ сегментомъ. Въ общемъ, эту стадію можно назвать стадіей неполнаго переворачиванья зародыша, такъ какъ впячиванье зародышевой полосы достигаетъ своего максимума лишь на слѣдующей стадіи (E). Между стадіей уплощенной зародышевой полосы (C), стадіей неполнаго (D) и полнаго (E) переворачиванья зародыша у меня имѣлся рядъ переходовъ, какъ, впрочемъ, почти между всѣми стадіями.

Первоначальное дорзальное искривленіе зародышевой полосы и затѣмъ переходъ его въ вентральное — явленіе, общее для всѣхъ Collembola, развитіе которыхъ кѣмъ-либо наблюдалось. Совершенно такое же переворачиванье зародыша имѣется у *Campodea* по наблюденіямъ Uzel'я, тогда какъ у *Lepisma*, вѣроятно, чисто вторично, зародышевая полоса имѣетъ сразу брюшное искривленіе. У многихъ Pterygota мы имѣемъ также первоначально дорзально искривленную поверхностную зародышевую полосу, а остаткомъ переворачиванья ея на брюшную сторону здѣсь является такъ называемое хвостовое искривленіе (Caudalkrümmung) у нѣкоторыхъ формъ (*Forficula*, *Grylotalpa*, *Donacia* и др.). Наконецъ, такое же полное переворачиванье зародыша, какъ у Collembola, имѣетъ мѣсто у зародышей Chilopoda и пауковъ.

Спрашивается, чѣмъ вызывается это явленіе и какой оно имѣетъ смыслъ? — Мы уже упоминали выше, что Montgomery (1909) пытался объяснить переворачиванье у пауковъ чисто механически — благодаря удлинению ножекъ и давленію, оказываемому ими на боковыя стѣнки зародыша. Противъ подобнаго чисто механическаго объясненія высказался Kautsch (1909) и позже имъ же была показана неправильность точки зрѣнія Montgomery путемъ опытовъ съ удаленіемъ желтка (1910 b). Я вполне присоединяюсь къ взгляду Kautsch'a и считаю, что весь этотъ процессъ объяснимъ лишь чисто активной дѣятельностью самого зародыша. Желтка, въ частности, въ яйцахъ Collembola не особенно много, а ножки у зародышей на стадіи D (см. рис. 30, 31, 46) не такъ ужъ велики, между тѣмъ переворачиванье уже началось и достигло приблизительно своей половины. Что касается до смысла этого явленія, то Wheeler (1893) объяснял искривленія зародыша („бластокинезъ“) необходимостью для него пользоваться свѣжими порціями желтка, Neumons же (1896 a) связывалъ этотъ переходъ спинного искривленія въ брюшное съ образованіемъ спины. Весьма вѣроятно, что и то и другое имѣетъ въ данномъ случаѣ извѣстное значеніе.

Поверхностная зародышевая полоса насѣкомыхъ долго считалась явленіемъ вторичнымъ и произошедшей изъ впяченной, какъ у Libellulidae, Rhynchota, Diplopoda [Will (1888), Korschelt u. Heider 1-te Aufl. (1892)]. Опроверженіемъ этого взгляда въ цѣломъ рядѣ его прекрасныхъ работъ мы обязаны Neumons'у (1895, 1896 a и особенно 1901), который установилъ, что дорзально-искривленная зародышевая полоса безъ амниона (какъ у пауковъ, Chilopoda и большинства Apterygota) представляетъ изъ себя первичный случай, а изъ нея уже произошли всѣ другіе способы искривленія зародышей. Въ болѣе недавнее время старый взглядъ поддерживали Willey (1899) и Hirschler (1909 b), при чемъ оба они напирали при этомъ на сходство вентрального искривленія у *Lepisma* и Diplopoda. Однако, мнѣ кажется, послѣднія наблюденія супруговъ Neumons (1905) надъ *Machilis* съ полной несомнѣнностью подтверждаютъ его теорію и показываютъ не только, какъ возникъ амнионъ, а и происхожденіе брюшного искривленія у *Lepisma* путемъ утери когда-то бывшаго спинного, которое еще сохранилось до нѣкоторой степени у *Machilis*. Помимо того сходство всѣхъ этихъ отношеній у пауковъ, Chilopoda и Apterygota говоритъ за примитивность дорзально искривленной зародышевой полосы съ послѣдующимъ переворачиваньемъ. Въ виду всего этого я вполне присоединяюсь къ взглядамъ Neumons'a на искривленіе зародышей у членистоногихъ.

Возвращаясь къ нашимъ зародышамъ стадіи D, остановимся сначала на ихъ наружномъ строеніи (рис. 30, 31). Въ спинномъ органѣ (DO), головныхъ лопастяхъ (Kl) и верхней губѣ не произошло сколько-нибудь замѣтныхъ измѣненій. Усики (ant) и грудныя ножки ($th_{1, 2, 3}$) замѣтно увеличились въ длину и на нихъ, довольно слабо еще, замѣтна уже членистость. Антенны состоятъ на этой стадіи изъ 3 болѣе или менѣе одинаковой величины члениковъ: какъ это наблюдалъ и Hoffmann у зародышей *Tomocerus*, первый — проксимальный — изъ этихъ члениковъ отдѣляется немного раньше, чѣмъ появляется граница между вторымъ и третьимъ — среднимъ и дистальнымъ. Каждая грудная ножка состоитъ изъ двухъ рѣзко отграниченныхъ члениковъ, при чемъ проксимальный короче дистальнаго.

Изъ будущихъ ротовыхъ органовъ зачатки мандибулъ (рис. 31 md) помимо увеличенія въ размѣрахъ мало измѣнились; въ это же время между ними появляются зачатки парныхъ частей гипофаринкса, такъ называемыя paraglossae (prgl), но на нихъ мы подробнѣе остановимся немного дальше. Въ максиллахъ

первой и второй пары произошло болѣе существенное измѣненіе, касающееся не только ихъ длины, но и всей формы, какъ можно видѣть по первымъ и вторымъ максилламъ (mx_1 и mx_2), изображеннымъ на томъ же рис. 31. Концевая (дистальная) часть каждаго такого придатка замѣтно расширяется и вытягивается въ длину въ боковомъ направленіи, такъ что весь зачатокъ максиллы получаетъ сходство съ формой сапога, особенно если его разсматривать не снизу, какъ онъ изображенъ на рис. 31, а спереди или на поперечномъ разрѣзѣ (рис. 51, 52). Этотъ боковой выростъ (plr) или „конусъ“, какъ называетъ его Hoffmann, является зачаткомъ максиллярнаго или лабіального palpus, а остальная часть основной частью максиллы, къ которой такой palpus прикрѣпляется. Я не особенно останавливаюсь здѣсь на этомъ, такъ какъ по развитію ротовыхъ органовъ у *Collembola* мы имѣемъ уже подробныя работы Folsom'a и Hoffmann'a.

На первомъ брюшномъ сегментѣ зародыши стадіи D имѣютъ уже пару придатковъ (рис. 30, 31, 42 abd_1), превращающихся позже въ *tubus ventralis*: эти придатки значительно уступаютъ въ длинѣ ножкамъ и не имѣютъ пока членистости. Въ нихъ, какъ и во всѣ конечности, заходятъ сомиты (рис. 42). Бывшая до сихъ поръ нерасчлененной задняя часть зародышевой полосы за первымъ брюшнымъ сегментомъ распадается теперь, какъ видно на томъ же рисункѣ, на сегменты. Въ это время за зачатками *tubus ventralis* можно обычно насчитать 3 такихъ сегмента (Abd_2 , Abd_3 , Abd_4), являющихся вторымъ, третьимъ и четвертымъ брюшными. Конечностей на нихъ на этой стадіи еще нѣтъ, но элементы нижняго листа начинаютъ складываться уже въ сомиты (so). Снаружи возникающая сегментация брюшка обычно бываетъ менѣе замѣтна и въ ея существованіи легче всего убѣдиться по такимъ сагитальнымъ разрѣзамъ, какъ тотъ, съ котораго сдѣланъ рис. 42. За формирующимся 4-мъ брюшнымъ сегментомъ небольшой участокъ зародышевой полосы еще не дифференцированъ на послѣдніе два сегмента.

Именно въ этомъ концевомъ отдѣлѣ зародышевой полосы закладывается на стадіи D *proctodaeum*, а позже анальное отверстие бываетъ приурочено къ послѣднему (шестому) брюшному сегменту (такъ называемый анальный сегментъ взрослых *Collembola*). Впячиванье эктодермы для задней кишки особенно хорошо видно на сагитальныхъ разрѣзахъ (рис. 43 *prd*): въ это время оно не доходитъ до желтка и между послѣднимъ и дномъ этого впячивания имѣются элементы нижняго листа (ub). Словомъ, стень развития *proctodaeum* на стадіи D вполне соответствуетъ тѣмъ отношеніямъ,

которыя наблюдаются у *stomodaeum* на предыдущей стадіи (C). Первая закладка задней кишки происходитъ, такимъ образомъ, по обычному для всѣхъ наѣкомыхъ типу.

Что касается до зачатка передней кишки (рис. 44 *std*), то по сравненію со стадіей C онъ замѣтно увеличился въ размѣрахъ, главнымъ образомъ въ длину, и достигаетъ теперь до самаго желтка, упираясь въ него своей слѣпымъ концомъ. Между послѣднимъ и желткомъ элементовъ нижняго листа уже болѣе не имѣется, но они окружаютъ *stomodaeum* спереди, сзади и съ боковъ. Какъ видно на рис. 44, къ клѣткамъ передней кишки прилежитъ спереди скопленіе нижняго листа внутри *labrum* (*lbr*), а сзади другое такое же скопленіе, не участвующее также въ образованіи сомитовъ. Какъ мы дальше увидимъ, именно насчетъ послѣдняго образуется передній зачатокъ средней кишки.

На этихъ же двухъ рисункахъ кромѣ элементовъ зародышевой полосы изображены и болѣе плоскія клѣтки *Hüllenectoderm* (he): какъ и на всѣхъ предыдущихъ стадіяхъ, они покрываютъ здѣсь спинную и боковыя стороны зародыша. Эти же клѣтки хорошо замѣтны на тотальныхъ препаратахъ, напримѣръ, на нашемъ рис. 30.

Особыхъ измѣненій въ нижнемъ листѣ по сравненію съ предыдущей стадіей не произошло. Однако благодаря удлиненію конечностей увеличиваются замѣтно въ длину и заходящіе въ нихъ сомиты, что хорошо видно на рис. 45 и 46, изъ которыхъ первый изображаетъ поперечный разрѣзъ черезъ сегментъ мандибуль, а второй такой же разрѣзъ черезъ одинъ изъ грудныхъ сегментовъ. Сомиты каждаго сегмента, какъ и прежде, остаются связанными другъ съ другомъ однимъ слоемъ клѣтокъ нижняго листа (*isb*) надъ нервной системой. Объ увеличеніи числа сомитовъ путемъ образованія новыхъ въ возникающихъ брюшныхъ сегментахъ мы уже упоминали.

Развитіе нервной системы (n), какъ видно на рис. 42—46, сдѣлало значительный шагъ впередъ. Въмѣсто одного слоя невробластовъ въ эктодермѣ брюшной стороны между конечностями, имѣвшагося на стадіи C, здѣсь находится теперь уже многослойный нервный зачатокъ. Я упоминалъ выше, что благодаря неудачной фиксировкѣ именно нервной системы на этихъ стадіяхъ ея развитіе нельзя было прослѣдить болѣе детально. Однако на нѣкоторыхъ разрѣзахъ расположеніе клѣтокъ въ этомъ нервномъ зачаткѣ было довольно похоже на то столбчатое или рядовое расположеніе ихъ, которое такъ характерно при отдѣленіи гангліозныхъ клѣтокъ отъ невробластовъ (см. ри

сунки). Можно думать, что этот процесс протекает у *Collembola*, какъ у всѣхъ насѣкомыхъ.

Первый зачатокъ не только становится многослойнымъ, но въ немъ замѣчается и дальнѣйшая дифференцировка. Теперь уже ясно замѣтно на поперечныхъ разрѣзахъ, что онъ состоитъ изъ двухъ продольныхъ половинъ (рис. 46), слѣдствіемъ чего и является та продольная свѣтлая линія на брюшной сторонѣ зародышей, если ихъ разсматривать *en face* (рис. 31), о которой мы уже упоминали. Полнаго раздѣленія этого зачатка на отдѣльные ганглии еще нѣтъ, хотя въ головномъ и грудномъ отдѣлѣ они уже начинаютъ намѣчаться, состоя каждый изъ двухъ половинъ (рис. 46), но это становится еще болѣе яснымъ лишь на слѣдующей стадіи (E). При слѣдующей же стадіи мы подробно опишемъ образованіе мозга въ области темянныхъ лопасти и подъ ними, хотя начало этого процесса относится также къ стадіи D.

Мы должны теперь остановиться только на параклоссахъ. Ихъ первый зачатокъ между мандибулами появляется именно на этой стадіи, при чемъ онъ выступаетъ довольно ясно и на тотальныхъ препаратахъ (рис. 31), но здѣсь все же лучше пользоваться поперечными разрѣзами. Такой поперечный разрѣзъ черезъ мандибулярный сегментъ изображенъ на рис. 45, и на немъ прекрасно виденъ парный зачатокъ этихъ параклоссъ (*prgl*) въ видѣ двухъ бугорковъ между мандибулами (*md*). Подобная парная закладка параклоссъ уже описана Folsom'омъ и Hoffmann'омъ, но оба этихъ автора не обратили вниманія при этомъ на одну въ высшей степени существенную подробность. На томъ же разрѣзѣ внутри первыхъ бугорковъ для параклоссъ замѣтно скопленіе гангліозныхъ клѣтокъ (*n*), т.-е. здѣсь лежитъ зачатокъ ганглія мандибулы. Совершенно ту же картину можно наблюдать и на разрѣзахъ черезъ мандибулярный сегментъ слѣдующей стадіи (E), гдѣ зачатокъ этого ганглія ужъ болѣе сформированъ, и вообще изслѣдованіе зародышей послѣдующихъ стадій съ несомнѣнностью показываетъ, что мандибулярный гангліи развивается именно изъ той части нервнаго зачатка, которая лежитъ внутри параклоссъ. Никакого самостоятельнаго ганглія параклоссъ, описаннаго Folsom'омъ, здѣсь не имѣется: если же считать лежащій въ нихъ гангліи за таковой, то тогда приходится признать сегментъ мандибулы лишеннымъ ганглія, что, конечно, не болѣе, какъ *deductio ad absurdum*. Folsomъ изображаетъ на разрѣзѣ болѣе поздней стадіи, соответствующей нашей стадіи E или F (рис. 28 въ его работѣ), самостоятельный гангліи сегмента параклоссъ (*superlingae*) между мандибулярнымъ и пер-

вымъ максиллярнымъ гангліемъ, но я самымъ категорическимъ образомъ отрицаю его существованіе и вообще склоненъ смотрѣть на упомянутый рисунокъ въ этой въ высшей степени обстоятельной работѣ, какъ на *lapsus calami*.

Благодаря установленію того факта, что мандибулярный гангліи закладывается внутри параклоссъ, можно считать окончательно доказаннымъ взглядъ на нихъ, какъ на раздѣлившійся на двѣ части стернитъ мандибулярнаго сегмента. Противоположная точка зрѣнія, что имѣется самостоятельный сегментъ параклоссъ, защищавшаяся Hansen'омъ (1893) и Folsom'омъ и допускаемая также Hoffmann'омъ, какъ мнѣ кажется, является совершенно исключенной, такъ какъ одна парная закладка этихъ образований при отсутствіи самостоятельныхъ сомитовъ и ганглія не можетъ считаться мало-мальски доказательной. Слѣдовательно, и у *Collembola* части гипофаринкса совершенно не гомодинамичны конечностямъ, что для *Pterygota* и *Chilopoda* давно установлено Heymons'омъ.

Отмѣтимъ, что параклоссы *Collembola* вполне соответствуютъ всему гипофаринксу *Chilopoda*, который, какъ установлено Heymons'омъ (1901), возникаетъ лишь изъ стернита сегмента мандибулы. Полная гомологія этихъ образований другъ другу особенно ясна изъ сравненія рис. 24 и XIX въ упомянутой монографіи Heymons'a съ нашими рис. 31 и 45. Glossa же *Collembola*, т.-е. непарная часть ихъ гипофаринкса, возникающая позже параклоссъ изъ стернита перваго максиллярнаго сегмента, отсутствуетъ у *Chilopoda* и является образованіемъ, присущимъ лишь насѣкомымъ, у которыхъ гипофаринксъ развивается обычно изъ стернитовъ сегмента мандибулы и первыхъ максиллъ.

Стадія E, какъ уже было упомянуто, является стадіей полнаго переворачиванія зародыша (рис. 32). Погруженіе зародышевой полосы достигаетъ въ это время своего максимума, при чемъ ея грудная часть, какъ видно на нашемъ рисункѣ, лежитъ въ центральной части яйца, а передняя и задняя часть зародыша расположены параллельно другъ другу. Теперь сегментъ мандибулы и брюшные сегменты увлекаются вслѣдъ за максиллярными и грудными, и это приводитъ къ тому, что анальное отверстіе (*a*) смѣщается сильно внизъ и между заднимъ концомъ зародышевой полосы и спиннымъ органомъ (*DO*) получается довольно большое пространство, покрытое лишь клѣтками *Hüllentoderm* (*he*). На выпуклой поверхности яйца изъ придатковъ зародыша остаются теперь лишь антенны (*ant*) и образовавшіеся къ этому времени зачатки вилки (*abd.*). Мѣстомъ перегиба зародышевой полосы на

этой стадіи является уже не первый, какъ на стадіи D, а второй грудной сегментъ.

Такое изогнутое положеніе зародышъ сохраняетъ, начиная со стадіи E до самаго вылупленія, т.-е. во время всего четвертаго періода развитія (см. рис. 34—36). Въ силу этого теперь нельзя уже получить серіи однихъ поперечныхъ или однихъ фронтальныхъ разрѣзовъ черезъ зародыша, такъ какъ на каждой серіи (кромѣ, конечно, чисто сагитальныхъ) будутъ попадаться и тѣ и другіе. Если голова и брюшко надрѣзаны фронтально, изъ грудного отдѣла мы получимъ поперечные разрѣзы и, наоборотъ, если передній и задній конецъ зародыша надрѣзаны поперечно, грудной отдѣлъ будетъ представленъ фронтальными разрѣзами. Это замѣчаніе нужно имѣть въ виду во время дальнѣйшаго изложенія: термины „фронтальный“, „поперечный“ будутъ всегда относиться въ немъ не ко всей серіи, а къ одному или нѣсколькимъ опредѣленнымъ разрѣзамъ.

Изъ придатковъ зародышевой полосы будущіе ротовые органы—мандибулы съ параклоссами, первыя и вторыя максиллы—сохраняютъ тотъ же характеръ, какой они имѣли на предыдущей стадіи. Кромѣ того теперь, какъ видно лучше всего на поперечныхъ разрѣзахъ черезъ голову, надъ ротовыми органами появляется съ каждой стороны, возвышеніе эктодермы въ видѣ небольшого валика или складки (рис. 51 mf); послѣдняя начинается около мѣста прикрѣпленія антенны (нѣсколько медиальнѣе его) и проходитъ надъ мандибулой и максиллой первой пары, не распространяясь еще на второй максиллярный сегментъ. Этотъ валикъ или ротовая складка, какъ мы будемъ ее дальше называть, обростаетъ на слѣдующихъ стадіяхъ ротовые органы съ боковъ, превращая ихъ въ энтогнатные, а сама дѣлается такъ называемой щекой готоваго зародыша и взрослой формы. Эта ротовая складка описана ужъ Uzel'емъ (развитіе ротовыхъ органовъ *Campodea* очень похоже на ихъ развитіе у *Collembola*), Miss Claypole и особенно подробно Folsom'омъ.

Членистость усиковъ (рис. 32 ant) и ножекъ ($th_{1, 2, 3}$) видѣляется теперь у зародышей гораздо рѣзче, чѣмъ на стадіи D; размѣры ихъ тоже замѣтно увеличиваются. Въ антеннахъ имѣется обычно, какъ и раньше, 3 членника (см. рис. 32), но въ концѣ этой стадіи и съ переходомъ ея въ слѣдующую прибавляется и четвертый членникъ, для чего первый или проксимальный изъ этихъ трехъ членниковъ дѣлится на два. Въ этомъ отношеніи я могу вполне подтвердить данныя Hoffmann'a о порядкѣ появленія отдѣльныхъ членниковъ на антеннахъ (см. рис. 2 въ его

предварительномъ сообщеніи). Зародыши, относящіеся къ четвертому періоду развитія, имѣютъ уже полное число членниковъ на усикахъ (4), какъ у взрослой формы.

Число членниковъ на ножкахъ на стадіи E равно 4, рѣже (въ началѣ ея) ихъ бываетъ только 3. Изъ этихъ 4 членниковъ (см. рис. 32) проксимальный или первый членникъ отвѣчаетъ проксимальному же членнику предыдущей стадіи, который съ переходомъ въ стадію E не дѣлится, 3 же слѣдующихъ за нимъ (два среднихъ и дистальный) образуются путемъ раздѣленія на 3 части дистальнаго членника стадіи D, на ножкахъ которой ихъ было всего два. Такимъ образомъ, ножки у зародышей на стадіи E не вполне еще сформированы, такъ какъ къ 4 членкамъ во время послѣдняго періода развитія прибавляется еще пятый. Мы еще вернемся къ этому вопросу нѣсколько дальше.

Брюшко зародыша съ окончаніемъ его переворачиванья раздѣляется на тѣ шесть сегментовъ, которые характерны и для взрослой формы, такъ что сегментация зародышевой полосы къ концу третьяго періода вполне заканчивается. Къ четыремъ брюшнымъ сегментамъ стадіи D теперь прибавляются пятый и шестой (Abd_5, Abd_6), лежащіе еще на выпуклой сторонѣ яйца (рис. 33).—Послѣдній брюшной сегментъ характеризуется, какъ у взрослой формы, присутствіемъ анальнаго отверстія (a) и proctodaeum (prd), почему систематики называютъ его анальнымъ сегментомъ. Этотъ терминъ однако едва ли можно понимать въ эмбриологическомъ смыслѣ, т.-е. въ смыслѣ тельсона. Правда, этотъ сегментъ не имѣетъ ни сомитовъ, ни конечностей, ни ганглія (въ пятomъ изъ нихъ имѣются лишь сомиты), но, мнѣ кажется, его все же неправильно считать за тельсонъ, такъ какъ онъ имѣетъ видъ самостоятельнаго сегмента и у взрослой формы. Neumons наблюдалъ у зародышей лепизмы, что на ихъ брюшкѣ дифференцируется сначала 6 сегментовъ и лишь затѣмъ остальные: эту стадію съ 6 брюшными сегментами можно считать (не придавая этому прямого филогенетическаго значенія) соотвѣтствующей *Collembola*, которыя совершенно утѣрили всѣ задніе брюшные сегменты. Что касается до telson, то у изотомы онъ имѣется въ томъ же редуцированномъ состояніи, какъ у *Lepisma* и *Campodea*, въ видѣ 3 бугорковъ, совершенно слитыхъ съ шестымъ сегментомъ, около anus, т.-е. въ видѣ такъ называемой lamina supraanalis и 2 laminae subanales (l. sub.). Послѣднія хорошо видны около анальнаго отверстія на рис. 33, изображающемъ задній конецъ зародыша en face.—Эти три бугорка описаны уже Uzel'емъ у *Tomocerus (Macrotoma) vulgaris*.

Въ это же время брюшные сегменты имѣютъ зачатки всѣхъ тѣхъ придатковъ, которые свойственны и взрослой формѣ. Парные зачатки *tubus ventralis* появились еще до этой стадіи; на ней они сидятъ еще далеко другъ отъ друга (какъ грудныя ножки), увеличились по сравненію со стадіей D въ размѣрахъ и слабо раздѣлены на два членика (рис. 47 abd₁). Въ отличіе отъ антеннъ и грудныхъ ножекъ, у которыхъ во время ихъ раздѣленія на 2 членика проксимальный меньше дистальнаго, у этихъ придатковъ, наоборотъ, дистальный членикъ гораздо меньше. Нельзя не отмѣтить ихъ сходства съ подобными же образованиями на соответствующемъ сегментѣ зародышей лепизмы (см. рис. 3 въ работѣ Neumons'a) и съ придатками на первомъ брюшномъ сегментѣ у взрослой *Campodea*.

На второмъ брюшномъ членикѣ парныхъ придатковъ, какъ ясно видно на поперечныхъ разрѣзахъ черезъ заднюю часть зародыша, нѣтъ: въ этомъ отношеніи *Isotoma* ближе къ *Tomocerus*, у котораго Uzel также ихъ не наблюдалъ, тогда какъ по Miss Claupe у *Anurida* они имѣются. На третьемъ сегментѣ имѣется пара небольшихъ выростовъ, представляющихъ зачатокъ зацѣпки (*retinaculum s. hamulus*), на четвертомъ пара нѣсколько большихъ для вилки (см. рис. 47 abd₃, abd₄). Слѣдовъ членистости, какъ на заложившихся раньше конечностяхъ, на нихъ еще незамѣтно. Въ общемъ же, зародышъ имѣетъ теперь и всѣ сегменты и всѣ конечности.

Большая часть поверхности яйца, не занятая зародышевой полосой, покрыта на стадіи E, какъ и раньше, плоскими клѣтками *Hüllenectoderm* (рис. 32, 47, 48, 49, 50—he). Однако на такихъ тотальныхъ препаратахъ, съ одного изъ которыхъ сдѣланъ напр. рис. 32, бросается въ глаза, что на боковыхъ сторонахъ зародыша ближе къ зародышевой полосѣ въ грудномъ и передней половинѣ брюшного отдѣла среди блѣдной *Hüllenectoderm* рѣзко выдѣляется нѣсколько болѣе темноокрашенныхъ пятенъ, какъ бы растущихъ отъ зародышевой полосы вверхъ (owe). Исслѣдованіе разрѣзовъ показываетъ, что мы дѣйствительно имѣемъ здѣсь дѣло съ разрастающейся навѣрхъ эктодермой зародышевой полосы, за которой слѣдуютъ затѣмъ и элементы нижняго листка, т.-е. сомитовъ. Такъ какъ разрастаніе это начинается въ каждомъ сегментѣ отдѣльно, то такая разрастающаяся навѣрхъ эктодерма и имѣетъ на бокахъ видъ отдѣльныхъ пятенъ или островковъ. Благодаря этому процессу элементы *Hüllenectoderm* вытѣсняются и постепенно замѣщаются эктодермой зародышевой полосы, которая даетъ бока и спину готоваго зародыша и взрос-

лой формы, какъ это бываетъ, напримѣръ, при вытѣсненіи амніона у высшихъ насѣкомыхъ. Такъ какъ этотъ процессъ приуроченъ главнымъ образомъ къ четвертому періоду развитія, то подробнѣе мы будемъ говорить объ немъ дальше.

Что касается до внутренняго строенія зародыша, то *stomodaeum* и *proctodaeum* не измѣняются по сравненію со стадіей D. *Proctodaeum*, какъ мы уже отмѣчали, сильно смѣщается внизъ (рис. 32, 47 prd), но его видъ остается прежнимъ и между дномъ этого эктодермальнаго впячиванья и желткомъ, какъ видно и на рис. 47, попрежнему имѣются элементы нижняго листка, окружающіе кромѣ того его со всѣхъ сторонъ.

На стадіи E зародышъ обладаетъ уже полнымъ числомъ не только сегментовъ и конечностей, но и сомитовъ. Ихъ первой парой являются сомиты антеннальнаго сегмента (рис. 49 so), заходящіе въ антенны (*ant*) и связанные надъ *deutocerebrum* (Dc) однослойнымъ мостикомъ изъ элементовъ нижняго листа, про который мы не разъ уже упоминали выше. Передъ антеннальными сомитами имѣется, какъ и на двухъ предыдущихъ стадіяхъ, скопленіе элементовъ нижняго листа внутри *labrum* (рис. 48 ub) и сзади *stomodaeum*, но въ образованіи сомитовъ эти скопленія не участвуютъ. Между парой сомитовъ въ сегментѣ антеннъ и такой же парой въ мандибулярномъ сегментѣ на уровнѣ *tritocerebrum* (Trc) имѣется пара тоже связанныхъ другъ съ другомъ посрединѣ и очень мало развитыхъ первичныхъ сегментовъ (рис. 50 so.ics): это сомиты интеркалярнаго или предчелюстнаго сегмента, которые имѣются и у *Pterygota*. Какъ видно и на этомъ рисункѣ, никакого намека на соответствующія конечности у нашей изотомы здѣсь нѣтъ.

Въ трехъ челюстныхъ сегментахъ ихъ сомиты (*so*) попрежнему сильно развиты и заходятъ въ зачатки ротовыхъ органовъ, а въ максиллахъ проникаютъ и въ *palpus* (рис. 51, 52 mx₁, mx₂ и plp). Однако въ этихъ сегментахъ связи между сомитомъ правой и лѣвой стороны, какъ видно на этихъ рисункахъ, уже не имѣется благодаря болѣе сильному развитію нервной системы: ганглій (*ggl*) доходитъ здѣсь до желтка и однослойный мостикъ изъ элементовъ нижняго листка распадается на отдѣльныя клѣтки и исчезаетъ. О судьбѣ этихъ клѣтокъ мы еще будемъ говорить дальше. Въ трехъ парахъ грудныхъ сегментовъ эта связь, какъ и на предыдущей стадіи (рис. 46), еще сохраняется, но на слѣдующей стадіи (F) въ свою очередь исчезаетъ. Развить этотъ однослойный мостикъ еще и между абдоминальными сомитами.

Послѣднихъ имѣется 5 паръ: съ перваго брюшнаго сегмента

по пятый; тамъ, гдѣ развиты соотвѣтствующія конечности, т.-е. въ первомъ, третьемъ, четвертомъ сегментѣ, какъ видно на рис. 47, сомиты заходятъ и въ нихъ. Въ шестомъ брюшномъ сегментѣ сомитовъ, повидимому, не имѣется: по крайней мѣрѣ, я не могъ констатировать тамъ ихъ присутствія. Зато въ этомъ именно сегментѣ лежитъ теперь то скопленіе элементовъ нижняго листка (ub), которое окружаетъ proctodaeum (рис. 47) и, подобно переднему у stomodaeum, не участвуетъ въ образованіи сомитовъ. Послѣднихъ же у *Isotoma cinerea* имѣется, такимъ образомъ, $2 + 3 + 3 + 5$, всего 13 паръ.

Таково же въ это время и число паръ ганглиевъ. — Наименѣе развиты изъ нихъ ганглии брюшка, какъ и слѣдуетъ этого ожидать благодаря болѣе поздней закладкѣ абдоминальныхъ сегментовъ, при чемъ ганглии перваго брюшнаго сегмента, появляющагося раньше другихъ, по своему развитію приближаются уже къ груднымъ. Съ несомнѣнностью я могъ установить присутствіе нервнаго зачатка лишь въ первыхъ четырехъ сегментахъ, гдѣ изъ него возникаютъ ганглии, замѣтные и на болѣе позднихъ стадіяхъ развитія. Въ пятомъ абдоминальномъ сегментѣ невробласты, быть можетъ, и имѣются, но до развитія изъ нихъ многослойнаго зачатка дѣло не доходитъ: они исчезаютъ, и на слѣдующей стадіи нервная система заканчивается въ четвертомъ брюшномъ сегментѣ. Шестой, т.-е. послѣдній, сегментъ брюшка лишенъ совершенно нервныхъ элементовъ.

Грудные и особенно ганглии челюстныхъ сегментовъ развиты теперь уже сильнѣе, чѣмъ на предыдущей стадіи: разрѣзъ черезъ ганглии первыхъ максилъ изображенъ на рис. 51, черезъ часть ганглия втораго максиллярнаго сегмента на рис. 52 (ggl), гдѣ въ нихъ замѣтно еще и рядовое расположеніе нервныхъ клѣтокъ, произошедшихъ изъ невробластовъ. Такъ называемой Punktsubstanz въ ганглияхъ на этой стадіи еще не имѣется.

Мы уже упоминали, что на стадіи D въ области головныхъ лопасти и подъ ними начинается образованіе надглоточнаго ганглия или мозга. На стадіи E всѣ три отдѣла его вполне сформированы и лучше всего видны на фронтальныхъ разрѣзахъ черезъ переднюю часть зародыша (см. рис. 48—50, едѣланные съ одной серіи разрѣзовъ). — По бокамъ верхней губы (рис. 48 lbr) лежатъ половины передняго отдѣла мозга, protocerebrum (Prc) [или syncerebrum по новой терминологіи Heymons'a (1901)]: каждая изъ нихъ занимаетъ почти всю ширину бывшей головной лопасти и состоитъ сама изъ 3 ясныхъ отдѣловъ или лопасти. Эта картина крайне напоминаетъ отношенія, описанныя Vial-

lanes (1891) и Wheeler'омъ (1893) у Orthoptera и особенно Heymons'омъ (1895) у *Forficula*, передніе ганглии мозга которыхъ также состоятъ изъ трехъ подобныхъ лопасти (lobi I—III). Черезъ нѣсколько разрѣзовъ, почти на уровнѣ ротового отверстия и мѣста причлененія антеннъ, protocerebrum заканчивается, и мы видимъ средній отдѣлъ мозга — deutocerebrum (рис. 49 Dc) [mesocerebrum Heymons'a], половины котораго почти соприкасаются уже другъ съ другомъ по срединной линіи и значительно меньше половины передняго отдѣла. Наконецъ, за deutocerebrum слѣдуетъ задній отдѣлъ мозга — tritocerebrum (рис. 50 Trc) [metacerebrum Heymons'a]: его ганглии еще меньше среднихъ ганглиевъ, тѣсно соединены другъ съ другомъ и лежатъ уже совсѣмъ посторанно. — Всѣ описанныя отношенія совершенно идентичны съ отношеніями, извѣстными для низшихъ Pterygota—Orthoptera и Dermaptera, и очень похожи и на развитіе мозга у *Scolopendra*. Гомологія частей мозга послѣдней и насѣкомыхъ проведена уже Heymons'омъ (1901).

Развиваются всѣ эти мозговые ганглии, какъ и брюшная нервная цѣпочка, изъ невробластовъ. Ганглии tritocerebrum прилегаютъ къ первымъ ганглиямъ послѣдней въ мандибулярномъ сегментѣ (въ параглоссахъ). — Такія же отношенія имѣютъ мѣсто и у высшихъ насѣкомыхъ.

Составъ мозга *Anurida* изъ proto-, deuto- и tritocerebrum вскользь отмѣченъ и Miss Claypole, которая болѣе подробно не останавливалась на этомъ вопросѣ. Она же упоминаетъ, что въ брюшкѣ имѣется 6 паръ ганглиевъ, сливающихся позже въ общую массу, съ чѣмъ я рѣшительно не могу согласиться, такъ какъ въ пятомъ сегментѣ имѣются лишь слабые намеки на нервную систему, а въ шестомъ ея совершенно нѣтъ. Мнѣ кажется мало вѣроятнымъ, чтобы у *Anurida* дѣло обстояло иначе, чѣмъ у *Isotoma*.

Половой зачатокъ сохраняетъ и на этой стадіи свое прежнее положеніе въ желткѣ близъ задняго конца зародыша (рис. 47 g); количество его клѣтокъ становится однако нѣсколько большимъ. — Спинной органъ въ концѣ третьяго періода развитія (см. рис. 49, 50 DO) имѣетъ тотъ же характеръ, что мы описали значительно выше.

Стадией E нашъ третій періодъ развитія заканчивается.

Что касается до литературныхъ данныхъ относительно третьяго періода развитія, то наиболѣе интересныя изъ нихъ отмѣчались нами уже попутно при описаніи отдѣльныхъ стадій. Остальныя

данный предыдущих авторов касаются почти исключительно изменений внешней формы зародыша, и многія изъ нихъ въ болѣе старыхъ работахъ ошибочны. Укажу, напримѣръ, на отрицаніе Raskard'омъ наличности у *Collembola* второй пары максиллъ, взглядъ Lemoine'a на абдоминальные придатки, какъ на образованія *sui generis*, не гомодинамичныя конечностямъ и т. д. Крайне мало вѣроятнымъ мнѣ кажется и наблюденіе Ульянина, будто переворачиванье зародыша вызывается появленіемъ особой складки сзади спинного органа, которая вросается внутрь желтка. Остановливаясь болѣе подробно на всѣхъ этихъ ошибочныхъ данныхъ теперь, мнѣ думается, едва ли нужно.

Въ заключеніе, мнѣ кажется не лишнимъ установить здѣсь соотвѣтствіе между различаемыми мной стадіями развитія у *Isotoma cinerea* и подобными же стадіями у *Anurida maritima*, которыя установлены Folsom'омъ и изображены имъ на рис. 1—7 въ его работѣ о развитіи ротовыхъ органовъ.

Стадія 1 зародышей *Anurida* приближается къ нашей стадіи В, хотя нѣсколько старше ея; стадія 2 такимъ же образомъ не вполне совпадаетъ съ нашей стадіей С, такъ какъ дифференцировка зародышевой полосы ушла здѣсь уже дальше, но зародышъ еще совершенно круглый. Стадія 3 стоитъ между нашими стадіями С и D, стадія 4 между D и E. Такимъ образомъ, эти четыре первыхъ стадіи могутъ быть лишь приблизительно сведены къ стадіямъ развитія у изотомы. Въ дальнѣйшемъ же наблюдается ужъ большее соотвѣтствіе другъ другу: то, что Folsomъ называетъ пятой стадіей развитія, вполне совпадаетъ со стадіей E, которой нашъ третій періодъ развитія заканчивается. Чтобы не возвращаться дальше къ этому вопросу, отмѣтимъ здѣсь же, что такое же соотвѣтствіе имѣется и между болѣе поздними стадіями развитія *Anurida* и нашими стадіями F, G, H, которыя будутъ описаны при четвертомъ періодѣ развитія. F вполне совпадаетъ съ № 6 Folsom'a, G съ № 7 и, наконецъ, H (и отчасти наша стадія J) съ послѣдней—восьмой—стадіей развитія *Anurida*. Въ общемъ, за исключеніемъ незначительныхъ особенностей измененія внешней формы у зародышей *Anurida*, точно также какъ и у другихъ *Collembola*, совершаются сходно съ тѣмъ описаніемъ, которое мы дали для *Isotoma cinerea*. Вѣроятно, этому внешнему сходству зародышей отвѣчаютъ и происходящіе внутри нихъ процессы органогенеза.

VI. Четвертый періодъ развитія. — Образованіе внешней формы тѣла и органогенезъ. (Табл. III и V).

Четвертый и послѣдній періодъ эмбриональнаго развитія, во время котораго происходитъ образованіе внешней формы тѣла изотомы и окончательно сформировываются всѣ ея внутренніе органы, отличается по сравненію съ предыдущими особенной продолжительностью. Въ среднемъ она равна 10 днямъ, т.-е. этотъ періодъ длится столько же времени, сколько три первыхъ, взятые вмѣстѣ. — Мы остановимся сперва на развитіи внешней формы тѣла и лишь затѣмъ перейдемъ къ отдѣльнымъ органамъ.

Образованіе внешней формы тѣла. Первая стадія четвертаго періода, которую мы обозначимъ буквой F, по своему внешнему виду очень мало отличается отъ предшествовавшей ей стадіи E, почему я и не даю для нея спеціальнаго рисунка. Различіе между E и F заключается въ ихъ внутреннемъ строеніи, о которомъ по отношенію къ послѣдней стадіи мы будемъ говорить дальше. Снаружи же можно лишь подмѣтить, что пятна растущей изъ зародышевой полосы наверхъ эктодермы (рис. 32 owe) стали теперь больше и замѣтнѣе (въ это время хорошо развиты 2 пары такихъ пятенъ въ груди и 4 пары въ брюшкѣ) и анальное отверстіе занимаетъ свое окончательное положеніе на заднемъ концѣ брюшка. Различіе въ положеніи послѣдняго хорошо видно изъ сравненія рис. 55 (F) и 47 (E), изображающихъ сагитальные разрѣзы черезъ задній конецъ брюшка и proctodaeum (prd).

О томъ, что усики съ переходомъ въ эту стадію становятся, наконецъ, четырехчленистыми, мы уже упоминали; остальные придатки зародышевой полосы сохраняютъ прежній характеръ за исключеніемъ вилки. На стадіи F оба зачатка послѣдней становятся уже двучленистыми, раздѣляясь каждый на проксимальный и дистальный отдѣлы, при чемъ послѣдній значительно меньше по длинѣ, чѣмъ первый. Въ этомъ отношеніи сегментация придатковъ четвертаго брюшнаго сегмента вполне сходна съ сегментацией зачатковъ *tubus ventralis*, о которой мы говорили выше, и отличается отъ подобной же у усиковъ и ножекъ, гдѣ проксимальный отдѣлъ двучленистой стадіи, напротивъ, значительно меньше дистальнаго.

За стадіей F слѣдуетъ стадія G, внешний видъ которой изображенъ на рис. 34. Ее легко отличить отъ другихъ по присутствію глазковъ (oc), которые имѣютъ на этой стадіи видъ

отдельных черных пятен, позже же благодаря развитию пигмента и между ними как бы сливаются в одно общее черное пятно. У зародышей, относящихся к началу этой стадии, имеется с каждой стороны сначала два, а затем три глазка, образующих позже как бы нижний (несколько изогнутый) ряд; затем у более поздних зародышей к этим трем парам присоединяются еще два, лежащие немного выше и ближе к спинной стороне (см. рис. 34). Как видно на этом же рисунке, под глазами ясно просвечивает мозг, и вообще вся голова гораздо больше сформирована, чем на предыдущих стадиях.

Что касается до ротовых органов, то в виду появления работы Hoffmann'a, подробно исследовавшего их постепенное развитие у близкой к нашей изотомы формы, я не останавливался на деталях их развития на более поздних стадиях, так как это потребовало бы применения некоторых специальных методов исследования в род реконструкции, препарировки при помощи иглы и пр., не общая в то же время дать чего-либо существенно нового. Поэтому и здесь я коснусь их лишь постольку, поскольку это необходимо для понимания других процессов развития.

На стадии G в ротовых органах происходят важные изменения, отражающиеся и на всем строении головы. Эти изменения выражаются, во-первых, в удлинении мандибул и первых максилл при редукции их второй пары [о подробностях этих процессов я отсылаю к работам Folsom'a и особенно Hoffmann'a] и, во-вторых, в полном обрастании их ротовой складкой. Некоторое представление об этих процессах могут дать наши рис. 57 и 58. Первый изображает косою (в плоскости между фронтальным и поперечным направлением) разрез через переднюю часть головы зародыша на стадии G: на нем мы видим сильно удлинённые мандибулы (md), прикрытые сбоку до половины сильно разросшейся ротовой складкой (mf). Между мандибулами видны попрежнему в виде двух только сильно развитых бугорков *paraglossae* (prgl), но мандибулярный ганглий (входящий теперь в состав подглоточного—usg) лежит уже значительно выше, чем на предыдущих стадиях. Подобным же образом ротовая складка проходит сбоку каждой максиллы первой пары; а между последними в это время уже развита в виде непарного выступа *glossa*, т.-е. непарная часть гипофаринкса, представляющая, таким образом, разросшийся стернит первого максиллярного сегмента.

Обогнув сбоку мандибулы и первые максиллы ротовые

складки достигают вторых максилл и начинают срастаться с ними—вверх обростать их снизу, при чем, как выяснил Hoffmann, обрастаемая ротовой складкой большая часть каждой второй максиллы исчезает. Наш рис. 58 изображает поперечный разрез через заднюю часть головы (на уровне окологлоточной комиссуры) зародыша в конце стадии G. На нем хорошо видны основные части мандибул (md) и первых максилл (mx₁), прикрытые сбоку ротовой складкой (mf), которая справа подходит ко второй максилле (mx₂), а слева уже слилась с ней. Таким образом, как установил еще Folsom, ротовые органы не втягиваются внутрь головы, а обрастаются с боков ротовыми складками, превращающимися в щеки (*genaе*) взрослой формы. Эти же ротовые складки, срастаясь с максиллами второй пары (от которых остается лишь небольшая часть их прежних зачатков—см. Hoffmann), участвуют и в образовании нижней стороны головы. В результате этого процесса обрастания сильно удлинившиеся мандибулы и максиллы оказываются лежащими в ротовой полости и, таким образом, начиная уже с конца нашей стадии G, зародыш становится энтотрофной формой, как взрослые *Collembola*.

В это же время возникает окончательное число члеников и на грудных ножках, бывших до того четырехчленистыми. Для этого их проксимальный членик стадий E и D, ни разу еще не раздвигавшийся со времени своего обособления от дистального, который уже на стадии E распался на 3 членика, делится на два. Таким образом, на стадии G грудные ножки бывают уже пятичленистыми, как у взрослой формы (см. рис. 34 th).

В брюшных придатках также происходят заметные изменения. Отстоявшие до того времени довольно далеко друг от друга придатки первого брюшного сегмента начинают сближаться друг с другом, их основные части при этом сливаются и лишь дистальные концы выдаются отдельно наружу, как это видно на рис. 59, изображающем поперечный разрез через первый брюшной сегмент (tv). Граница между проксимальным и дистальным члеником, на которые перед тем разделился каждый из зачатков *tubus ventralis* (см. рис. 47), на стадии G и последующих исчезает, и позднейшее разделение этого органа на его definitive отделы (цилиндр, *valvulae* и пузырьки) возникает независимо от его первичного состава из двух члеников. Можно лишь сказать, что прежние маленькие дистальные членики дают, главным образом, материал для выпячивающихся мшечков, а большие по величине прокси-

мальные для двух других частей. Какъ это хорошо видно при разсматриваньи зародышей сбоку или на сагитальныхъ разрѣзахъ, еще не слившіеся другъ съ другомъ свободные концы *tubus ventralis* сильно расширены, отчего весь зачатокъ принимаетъ грибовидную форму. Последнее хорошо замѣтно на рисункѣ слѣдующей стадіи—Н (рис. 35 tv), а на рис. 34, относящемся къ стадіи G, *tubus ventralis* изображеннаго на немъ зародыша прикрытъ грудными ножками. Въ общемъ, можно сказать, что на стадіи G зачатокъ *tubus ventralis*, состоящій изъ короткаго основного отдѣла и двухъ еще не слившихся другъ съ другомъ концевыхъ возвышеній (рис. 59), имѣетъ приблизительно то же строение, которое свойственно низшему семейству *Collembola*—*Poduridae*. Последнія, какъ извѣстно, въ отличие отъ *Entomobryidae*, куда относится и *Isotoma cinerea*, имѣютъ этотъ органъ изъ двухъ раздѣленныхъ углубленіемъ половинъ съ короткимъ основнымъ отдѣломъ и безъ *valvulae*. Взглядъ на подобные отношенія, какъ на болѣе примитивныя, находить, такимъ образомъ, себѣ полное подтвержденіе и въ эмбриологii.

Придатки третьяго брюшнаго сегмента также сближаются другъ съ другомъ и, сливаясь своими основными частями, даютъ на стадіи G вполне сформированный *retinaculum* (рис. 60 ret.), который въ это время относительно лишь немного больше, чѣмъ у взрослой формы. Въ это время, какъ и на слѣдующихъ стадіяхъ, въ немъ совершенно незамѣтно раздѣленія на отдѣлы, но на стадіи F иногда и въ его зачаткахъ я замѣчалъ слабый намекъ на такой же составъ изъ двухъ члениковъ (большаго проксимальнаго и меньшаго дистальнаго), который на этой стадіи хорошо выраженъ у придатковъ перваго и четвертаго брюшнаго сегмента.

Съ переходомъ зародыша изъ стадіи F въ стадію G зачатки вилки становятся изъ двухчленистыхъ трехчленистыми, для чего болѣе проксимальный членикъ дѣлится на два (рис. 34 и 63 frs). Такимъ образомъ, теперь намѣчены тѣ три отдѣла вилки, которые характерны и для взрослой формы (*manubrium*, *dentes*, *micrones*), но въ отличие отъ последней всѣ они еще приблизительно одинаковой величины. Въ это же время происходитъ быстрое сближеніе обоихъ зачатковъ вилки, и мало-по-малу ихъ основные членики начинаютъ сливаться другъ съ другомъ, образуя непарный *manubrium*, *dentes* же и *micrones*, какъ и у взрослой формы, остаются свободными. Развитие вилки въ общемъ несомнѣнно свидѣтельствуетъ, что ея редукція у многихъ *Collembola* есть явленіе вторичное.

Что касается до боковыхъ и спинной стороны зародыша, то и здѣсь на стадіи G происходятъ нѣкоторыя измѣненія. На двухъ предыдущихъ стадіяхъ разрастающаяся изъ зародышевой полосы навѣрхъ эктодерма имѣла видъ отдѣльныхъ пятенъ по бокамъ зародыша (рис. 32 owe). Теперь эти пятна, росшія отдѣльно изъ каждаго сегмента, настолько увеличились, что сливаются въ сплошную полосу, покрывающую каждую изъ боковыхъ сторонъ зародыша (рис. 34 owe), и лишь на его спинной сторонѣ, какъ видно на этомъ же рисункѣ и на нѣкоторыхъ другихъ, изображающихъ разрѣзы черезъ зародыша (рис. 57, 59, 60, 62, 63), сохранились плоскія клѣтки *Hüllenectoderm* (he).— Поперечные разрѣзы черезъ зародыша (рис. 59, 60), если ихъ сравнить съ поперечными разрѣзами предыдущихъ стадій, изображенными на таблицѣ IV, ясно показываютъ, насколько эктодерма зародышевой полосы распространилась вѣрхъ, занявъ мѣсто *Hüllenectoderm*. Изъ просмотра подобныхъ же разрѣзовъ легко убѣдиться, что элементы последней отнюдь не оттѣсняются дефинитивной эктодермой навѣрхъ (иначе число ихъ на поперечныхъ разрѣзахъ вѣрху было бы больше, чѣмъ прежде, чего совершенно не наблюдается), а, очевидно, по мѣрѣ роста послѣдней они постепенно отмираютъ и исчезаютъ, не принимая участія въ образованіи боковъ и спины взрослой формы. Словомъ, весь этотъ процессъ крайне напоминаетъ вытѣсненіе дефинитивной эктодермой амніона у многихъ высшихъ насѣкомыхъ.

Спинной органъ (DO), какъ хорошо видно и на тотальныхъ препаратахъ (рис. 34) и на разрѣзахъ (рис. 62), сохраняетъ и на стадіи G тотъ же характеръ, какъ и во время третьяго періода развитія.

Слѣдующая за G стадія H по общей конфигураціи тѣла и его придатковъ уже болѣе напоминаетъ взрослую форму (рис. 35). Съ переходомъ въ нее зародыша число его глазковъ съ каждой стороны увеличивается до 8 (числа вообще характернаго для *Isotoma cinerea*): при этомъ къ 5 глазкамъ, имѣвшимся у стадіи G, прибавляется еще 3 нѣсколько выше ихъ. Однако въ это же время между ними развивается пигментъ, почему на тотальныхъ препаратахъ отдѣльные омматидіи уже неразличимы, и видно лишь, какъ и у взрослой формы, общее черное глазное пятно (рис. 35 oc).—Какъ видно на томъ же рисункѣ, голова и ротовые органы уже очень напоминаютъ ихъ строеніе у взрослой формы; ножки (на рис. 35 изображены лишь ихъ основные членики) также мало-по-малу приобрѣтаютъ окончательную форму.

Брюшные придатки по своему строенію теперь гораздо ближе

къ брюшнымъ придаткамъ вылупившейся изъ яйца изотомы. О грибовидной формѣ *tubus ventralis* (рис. 35 tv) мы уже упоминали при описаніи предыдущей стадіи. На поперечныхъ разрѣзахъ черезъ первый брюшной сегментъ зародышей этой стадіи (рис. 69) можно убѣдиться, что слияніе половинъ этого органа вполне закончилось, и онъ превратился въ такое же непарное образованіе, какъ у взрослой изотомы (tv). Внутри него начинаютъ развиваться въ это время мускулы, а на его дистальномъ концѣ тѣ крупныя клѣтки, которыя привлекали уже вниманіе многихъ изслѣдователей и ошибочно считались за железистыя, пока Willem (1901) не установилъ, что это просто большія гиподермалныя клѣтки, не имѣющія никакой специально железистой функціи. Эти крупныя гиподермалныя клѣтки въ терминальномъ отдѣлѣ *tubus ventralis* хорошо замѣтны какъ на рис. 69, такъ и на рис. 73, относящемся къ послѣдней стадіи четвертаго періода (J), гдѣ разрѣзъ черезъ *tubus ventralis* (tv) прошелъ уже сагитально, а не поперечно. На развитіи дальнѣйшихъ деталей какъ внутренняго, такъ и внѣшняго строенія этого органа я не останавливался.

Retinaculum на стадіи H не представляетъ ничего новаго; вилка попрежнему состоитъ изъ трехъ отдѣловъ, при чемъ *manubrium* ея уже непарный. На стадіи G всѣ три отдѣла зачатковъ вилки, какъ мы уже отмѣчали, были приблизительно равной величины; съ переходомъ въ стадію H концевые членики (*micropores*) становятся значительно меньше другихъ, средніе же отдѣлы (*dentes*) перегоняютъ въ своемъ ростѣ какъ ихъ, такъ и *manubrium*, что замѣтно и на рис. 35 (frc). Такимъ образомъ, и вилка приобретаетъ теперь типичную для взрослой изотомы конфигурацію.

Процессъ замыканія спины растущей наверхъ съ боковъ эктодермой на стадіи H заканчивается. На рис. 35 мы совсѣмъ не видимъ уже плоскихъ клѣтокъ *Hüllenectoderm*, и весь зародышъ въ это время покрытъ какъ съ боковъ, такъ и со спины эктодермой. Если даже въ томъ или другомъ мѣстѣ зародыша эктодерма правой и лѣвой половины еще не срослась другъ съ другомъ, какъ на рис. 65 ниже спинного органа или на рис. 68 надъ желткомъ, то, все равно, клѣтокъ *Hüllenectoderm* въ такихъ мѣстахъ не бываетъ замѣтно, такъ какъ къ этому времени онѣ вполне редуцировались. Все это, конечно, лишь доказываетъ, что послѣднія вообще не принимаютъ участія въ образованіи покрова взрослой формы.

Въ связи съ замыканіемъ спины сегментація зародыша не ограничивается теперь лишь брюшной стороной, а переходитъ

сперва на боковыя стороны и, наконецъ, на спину. Первыми обособляются послѣдніе брюшные сегменты: напимѣръ, у зародыша, изображеннаго на рис. 35, уже обособлены и со спины три заднихъ абдоминальныхъ сегмента (*Abd₆*, *Abd₅*, *Abd₄*). Затѣмъ обособляются передніе брюшные сегменты, а послѣ нихъ грудные, т.-е. этотъ процессъ идетъ сзади напередъ, по направленію къ головѣ.

Что касается до спинного органа, то онъ имѣется все время и въ теченіе этой стадіи. У зародышей, относящихся къ ея началу или къ серединѣ, онъ попрежнему рѣзко выдѣляется и на тотальныхъ препаратахъ (рис. 35 DO), у болѣе позднихъ же, у которыхъ вся спина покрыта эктодермой, чтобы убѣдиться въ присутствіи этого органа *in toto*, необходимо легкое надавливанье на такого зародыша покровнаго стекла. Изслѣдованіе разрѣзовъ, особенно сагитальныхъ въ родѣ изображеннаго на рис. 65, убѣждаетъ насъ, что гистологическій характеръ спинного органа (DO) и число его клѣтокъ совершенно тѣ же, что и раньше. Однако теперь мы находимъ все же въ его положеніи нѣкоторое измѣненіе: какъ видно на упомянутомъ рисункѣ, спинной органъ прилегаетъ къ наружной поверхности лишь небольшой своей частью и болѣе глубоко погруженъ въ желтокъ. Происходитъ это благодаря разрастанію дефинитивной эктодермы (*ect*) и надъ нимъ, такъ что къ самому концу стадіи H спинной органъ теряетъ, наконецъ, связь со второй кутикулярной зародышевой оболочкой и опускается подъ эктодерму въ желтокъ. Ни малѣйшей дегенерации въ немъ самомъ, ни разрушенія его лейкоцитами до конца стадіи H незамѣтно.

Послѣдняя стадія четвертаго періода развитія непосредственно передъ вылупленіемъ изъ яйца, или стадія J, изображена на рис. 36. Какъ видно изъ него, зародышъ теперь вполне сформированъ, тѣло его вполне сегментировано и всѣ придатки носятъ тотъ же характеръ, какъ у покинувшей яйцо изотомы (рис. 37), отъ которой онъ отличается лишь своимъ изогнутымъ положеніемъ. Въ кожѣ въ это время уже развитъ тотъ голубой пигментъ, который свойственъ взрослой формѣ, и этой голубой окраской зародыша на стадіи J рѣзко отличаются отъ всѣхъ предыдущихъ стадій. Нашъ рис. 36 сдѣланъ съ зародыша, заключеннаго въ канадскій бальзамъ безъ окраски.

Давать болѣе подробное описаніе этой стадіи я считаю излишнимъ, но долженъ остановиться на судьбѣ одного образованія, которое совершенно отсутствуетъ у нея, а именно на спинномъ органѣ. Въ отличіе отъ всѣхъ предыдущихъ стадій

онъ совершенно незамѣтенъ теперь ни на тотальныхъ препаратахъ (рис. 36), ни на разрывахъ (рис. 73). Это неожиданное исчезновение спинного органа, который былъ еще такъ хорошо развитъ на предыдущей стадіи (рис. 65 DO), казалось мнѣ самому загадкой, пока я не нашелъ его остатковъ у зародышей, относящихся къ самому началу стадіи J. — Въ серединѣ и въ концѣ послѣдней зародыши имѣютъ среднюю кишку совершенно свободной отъ желтка (рис. 73 D), въ началѣ же стадіи J она, какъ и раньше, еще переполнена имъ (рис. 71 D). И вотъ именно у такихъ зародышей уже внутри средней кишки, среди желтка, можно найти остатокъ спинного органа (рис. 72 DO), который, очевидно, отделившись отъ эктодермы, окружается вмѣстѣ съ желткомъ кишечнымъ эпителиемъ (см. рис. 68) и вмѣстѣ же съ желткомъ переваривается въ кишечникѣ, исчезая у болѣе позднихъ зародышей безъ остатка.

Такимъ образомъ, спинной органъ у *Collembola* не подвергается медленной дегенерации или разрушенію при помощи лейкоцитовъ, какъ многіе зародышевые органы, а испытываетъ ту же судьбу, какъ и зародышевые оболочки нѣкоторыхъ насѣкомыхъ, напримѣръ *Hydrophilus*, которыя попадаютъ, наконецъ, въ желтокъ и вмѣстѣ съ нимъ перевариваются въ кишечникѣ. Подобную же судьбу испытываетъ, какъ извѣстно, спинной органъ у многихъ *Amphipoda*. — Prowazek описываетъ у изслѣдованнаго имъ вида *Isotoma* резорпцію спинного органа при помощи мезодермальныхъ клѣтокъ, однако я совершенно не могу подтвердить этого наблюденія и думаю, что оно основано на ошибкахъ.

Процесса вылупленія зародыша изъ яйца я не наблюдалъ; точно также отсутствуютъ у меня наблюденія и о времени наступленія первой линьки молодой изотомы. Отмѣтимъ, что по изслѣдованіямъ Uzel'я какъ *Camprodea*, такъ и *Tomocerus* (*Macroto*) покидаютъ яйцо одѣтыя эмбриональной кутикулой (т.-е., очевидно, второй кутикулярной зародышевой оболочкой), но скоро ее сбрасываютъ. Prowazek указываетъ, что у его изотомы первая линька наступила на 7-й день, что имѣетъ мѣсто и у лепизмы по Heumons'у.

Къ вопросу о спинномъ органѣ и процессѣ образованія спины мы еще вернемся дальше, здѣсь же, чтобы покончить съ развитіемъ внѣшней формы тѣла у *Isotoma cinerea*, остановимся немного на тѣхъ данныхъ, которыя изложены нами выше и касаются сегментации различныхъ придатковъ тѣла, т.-е. конечностей. При этомъ бросаются въ глаза нѣкоторыя особенности, представляющія извѣстный интересъ.

Сегментация усиковъ была прослѣжена уже Hoffmann'омъ у *Tomocerus plumbeus*, и его данныя, какъ мы видѣли выше, вполне справедливы и для нашей формы. У обѣихъ нерасчлененный еще зачатокъ антенны дѣлится первоначально на болѣе дистальный и меньшій проксимальный членикъ; затѣмъ раздѣляется первый изъ нихъ, образуя два концевыхъ членика вполне сформированнаго усика (III и IV), и, наконецъ, дѣлится и проксимальный первичный членикъ, при чемъ половины его даютъ I и II членики готовой антенны. Процессъ этотъ лучше всего выразить слѣдующимъ уравненіемъ:

$$\begin{array}{c} P < D \\ ant(I+II+III+IV)=(I+II)+(III+IV)=(I+II)+III+IV=I+II+III+IV \end{array}$$

Сегментация ножекъ описана нами выше и протекаетъ по тому же плану. Такъ же, какъ и у усиковъ, нерасчлененный зачатокъ ножки дѣлится на два членика; изъ которыхъ дистальный болѣе и включаетъ въ себя femur (III), tibia (IV) и tarsus (V), а проксимальный—coxa (I) и trochanter (II), при чемъ онъ меньше ¹⁾. Въ дальнѣйшемъ сперва сегментируется первичный дистальный членикъ, при чемъ tarsus обособляется раньше всего, а ужъ за нимъ раздѣляются femur и tibia. Расчлененіе первичнаго проксимальнаго членика наступаетъ значительно позже, лишь на стадіи G, тогда какъ уже на стадіи E дистальный вполне раздѣленъ на свои три отдѣла. Уравненіе для сегментации ножекъ будетъ, очевидно, слѣдующее:

$$\begin{array}{c} P < D \\ th(I+II+III+IV+V)=(I+II)+(III+IV+V)=(I+II)+(III+IV)+V= \\ = (I+II)+III+IV+V=I+II+III+IV+V \end{array}$$

femur tibia coxa trochanter tarsus

Такимъ образомъ, изъ сравненія этихъ двухъ уравненій съ несомнѣнностью вытекаетъ, что сегментация ножекъ и усиковъ происходитъ по одному типу, для котораго характерно, во-первыхъ, первоначальное раздѣленіе ихъ зачатковъ на два первичныхъ членика—болѣе дистальный и меньшій проксимальный, и во-вторыхъ, послѣдовательное обособленіе дефинитивныхъ члениковъ отъ дистальнаго конца къ проксимальному, т.-е., если

¹⁾ Я совершенно не могу подтвердить данныхъ Willem'a (1900), будто у *Collembola* ножки имѣютъ не 5, какъ это типично для насѣкомыхъ, а 7 члениковъ.

редуцированную брюшную ножку, но, быть может, какъ это думаетъ Neumons (1897a), styli являются лишь придатками совершенно исчезнувшихъ брюшныхъ ногъ.

Такъ какъ у *Collembola* всѣ брюшные придатки проходятъ стадію, во время которой они состоятъ изъ двухъ члениковъ — большаго проксимальнаго и меньшаго дистальнаго, то это говорить за то, что ихъ предки имѣли на брюшкѣ полуредуцированные ножки въ родѣ тѣхъ, какія имѣются теперь на одномъ сегментѣ у *Campodea* и *Acerentomidae* и на трехъ у *Eosentomon*. Изъ подобныхъ двучленистыхъ ножекъ развились, вѣроятно, *tubus ventralis*, *retinaculum* и *furca* *Collembola*, а отсюда понятно, почему при развитіи этихъ образований ихъ дистальный членикъ меньше проксимальнаго. Гомологизировать проксимальные членики брюшныхъ придатковъ первичнымъ проксимальнымъ членикамъ ножекъ и усиковъ (и дистальные первичнымъ дистальнымъ) довольно рискованно, разъ мы не знаемъ, рудиментомъ сколькихъ члениковъ является маленький членикъ на брюшныхъ ножкахъ *Campodea* и *Protura*, и отъ подобной попытки лучше воздержаться. Напомнимъ, что, какъ мы отмѣчали выше, по Neumons'у у зародышей *Lepisma* придатки 1-го брюшного сегмента расчленены, какъ брюшные придатки зародышей изотомы, что подтверждаетъ нашъ взглядъ о присутствіи двучленистыхъ брюшныхъ ножекъ у предковъ современныхъ *Apterygota*.

Что касается до вопроса о соответствіи частей *tubus ventralis*, *retinaculum* и вилки членикамъ ножекъ, то подобныя попытки дѣлались уже не разъ. Укажу въ видѣ примѣра, что Willem въ своей монографіи *Collembola* и *Thysanura* (1900) считаетъ основную часть *retinaculum* слившимися *coxae*, а его *rami* гомологами *tibiae*; онъ же приравниваетъ *manubrium* вилки слившимся другъ съ другомъ *coxae*, *trochanteres* и *femura*, *rami s. dentes* считаетъ гомологами *tibiae*, а *mucrones* — *tarsus*.

Однако эмбриологія говоритъ какъ противъ этой, такъ и противъ всякой подобной попытки свести отдѣлы брюшныхъ придатковъ къ членикамъ ножекъ, такъ какъ первичная сегментация у первыхъ носитъ, какъ мы видѣли, иной характеръ, чѣмъ у вторыхъ, и говоритъ лишь, что у предковъ современныхъ *Collembola* брюшные придатки имѣли тотъ же характеръ, какъ пара брюшныхъ ногъ *Campodea* въ настоящее время. Отсюда приходится сдѣлать выводъ, что какъ отдѣлы *tubus ventralis* (цилиндръ, *valvulae*, пузырьки), такъ и отдѣлы вилки (*manubrium*, *dentes*, *mucrones*) возникли уже въ предѣлахъ отряда *Collembola*, а слѣдовательно ихъ нельзя сводить къ тому или иному членику ножекъ.

Помимо эмбриологическихъ данныхъ въ пользу послѣдняго говорить и примитивное строеніе *tubus ventralis* въ семействѣ *Poduridae*, о которомъ мы уже упоминали, а также тотъ фактъ, что у представителей одного изъ семействъ *Collembola* — *Neelidae* вилка состоитъ не изъ 3, а изъ 4 члениковъ, такъ какъ между *manubrium* и *mucrones* расположено 2 двучленистыхъ *dentes*.

Отрицая возможность проводить гомологію между члениками ножекъ и брюшныхъ придатковъ, мы отнюдь не склонны отрицать характеръ послѣднихъ, какъ измѣненныхъ конечностей. Напротивъ, все сказанное выше съ несомнѣнностью говоритъ, что всѣ брюшные придатки *Collembola* являются модификаціей когда-то развитыхъ на брюшкѣ (у болѣе отдаленныхъ предковъ, быть можетъ, 5-членистыхъ, затѣмъ 2-членистыхъ) ножекъ. Старое воззрѣніе Haase (1889), будто *tubus ventralis* образовался лишь сляніемъ двухъ брюшныхъ мѣшечковъ, а *furca* представляетъ изъ себя модификацію двухъ *styli*, которые Haase считаетъ просто за гиподермальные образования — этотъ взглядъ является, конечно, совершенно неправильнымъ, хотя въ работѣ Börner'a (1901) *retinaculum* и *furca* и фигурируютъ еще, какъ измѣненные *styli*.

Выпячивающіеся мѣшечки въ концевой части *tubus ventralis* совершенно гомологичны брюшнымъ мѣшечкамъ *Scolopendrella*, *Diplura* и *Machilis*, и эта гомологія никогда не вызывала особенныхъ сомнѣній. Она дѣлается особенно ясной послѣ открытія *Protura*, имѣющихъ, какъ уже мы отмѣчали, на концѣ второго членика брюшныхъ ножекъ по такому же выпячивающемуся мѣшечку. Вѣроятно, подобные же присоски на концѣ ножекъ по крайней мѣрѣ перваго брюшного сегмента были свойственны предкамъ всѣхъ насѣкомыхъ, такъ какъ и у представителей самыхъ различныхъ отрядовъ *Pterygota* въ зародышевомъ состояніи на этомъ сегментѣ встрѣчаются своеобразные „плевроподіи“. Еще Холодковскимъ (1891) въ свое время было отмѣчено, что, вѣроятно, первая пара абдоминальныхъ придатковъ служила первоначально для хожденія, а затѣмъ получила вторичную роль присосковъ. Точно также Hirschler (1906), описавъ железистыя образования на этомъ сегментѣ у зародышей *Catocala nupta*, указываетъ, что они, вѣроятно, гомологичны брюшнымъ мѣшечкамъ *Thysanura* и *Myriopoda*.

Въ упоминавшейся выше прекрасной систематической работѣ Börner'a (1901) можно встрѣтить указаніе, что вообще *cerci* у *Collembola* неразвиты, но ихъ послѣдніе остатки встрѣчаются у рода *Tomocerus*. Мы уже, говоря выше о развитіи задняго

конца зародыша нашей изотомы, сравнивали наши наблюдения съ данными Uzel'я, относящимися къ *Tomocerus*, и изъ всего этого совершенно ясно, что, хотя тельсонъ у *Collembola* имѣется, но сегіи совершенно отсутствуютъ. Послѣднихъ не можетъ быть уже по одному тому, что *Collembola* повидимому утратили довольно значительное число заднихъ брюшныхъ сегментовъ (вѣроятно, пять).

Итакъ, резюмируя все относящееся къ развитію придатковъ гѣла, мы должны сказать, что сегментация брюшныхъ конечностей протекаетъ иначе, что у грудныхъ и головныхъ. Для усиковъ, максиллъ и грудныхъ ножекъ характерно первоначальное раздѣленіе изъ зачатковъ на два первичныхъ членика—большій дистальный и меньшій проксимальный—и затѣмъ послѣдовательное обособленіе дефинитивныхъ члениковъ въ центростремительномъ направленіи. Въ силу этого получается полная возможность проводить параллель между отдѣлами ножекъ и, напримѣръ, максиллъ. Брюшные придатки, напротивъ, дѣлятся первоначально на большій проксимальный и меньшій дистальный членики, проходя въ это время стадію, отвѣчающую полуредуцированнымъ двучленистымъ ножкамъ на брюшкѣ *Campodea* и *Protura*. Въ силу этого и ихъ позднѣйшее раздѣленіе на дефинитивные отдѣлы, возникшее, вѣроятно, уже въ предѣлахъ группы *Collembola*, несравнимо съ дефинитивной сегментацией головныхъ и грудныхъ конечностей. Было бы довольно интересно прослѣдить эти же отношенія у зародышей *Pterygota*, данныя о чемъ, насколько мнѣ извѣстно, отсутствуютъ.

Развитіе кишечника. Во время третьяго періода развитія мы имѣли дѣло лишь съ эктодермальными зачатками передней и задней кишки; никакихъ зачатковъ средней кишки еще не было въ это время замѣтно. На стадіи F впервые можно говорить о послѣднихъ, и подобныхъ зачатковъ средней кишки появляется въ это время три: передній, задній и средній или диффузный. Лучше всего видны эти зачатки на тавихъ сагитальныхъ разрѣзахъ, какъ тѣ три послѣдовательные разрѣза черезъ одного и того же зародыша, которые изображены на нашихъ рис. 53—55.

На рис. 53 мы видимъ stomodaeum (std), попрежнему упирающийся своимъ концомъ въ желтокъ и лишенный на этомъ концѣ элементовъ нижняго листка. Послѣдніе прилегаютъ къ нему лишь сверху и снизу: выше stomodaeum лежитъ скопленіе этихъ элементовъ внутри верхней губы (lbr), при чемъ задняя часть этого скопленія, прилегающая плотно къ верхней стѣнкѣ stomodaeum (mm), превращается позже въ мускульный слой передней

кишки, такъ что ее нужно считать зачаткомъ muscularis передней кишки. Ниже stomodaeum, у его нижней стѣнки (между ней и нервной системой—n), лежитъ другое скопленіе элементовъ нижняго листка (vDa): оно-то и является переднимъ зачаткомъ средней кишки. — Замѣтимъ, что изъ этого же зачатка развивается не только среднекишечный эпителий, но часть его даетъ позже muscularis нижней стѣнки stomodaeum (см. рис. 62 mm); однако на стадіи F совершенно невозможно подмѣтить какое-либо различіе между элементами, которые дадутъ впоследствии muscularis, и элементами, превращающимися въ среднекишечный эпителий. Такимъ образомъ, на стадіи F передній зачатокъ средней кишки не является еще чистымъ или простымъ, а къ нему подмѣшаны и посторонніе элементы въ лицѣ будущихъ мускульныхъ клѣтокъ передней кишки, такъ что этотъ зачатокъ нужно считать комбинированнымъ первичнымъ зачаткомъ (zusammengesetzte Primitivanlage) въ духѣ Meisenheimer'a (1900, 1908). Конечно, терминъ „передній зачатокъ средней кишки“ не совсѣмъ правиленъ въ примѣненіи къ стадіи F, но я пользуюсь имъ, чтобы избѣжать введенія новыхъ терминовъ.

Такимъ же комбинированнымъ первичнымъ зачаткомъ на стадіи F является и задній зачатокъ средней кишки, такъ какъ и къ нему въ это время несомнѣнно еще примѣшаны элементы будущаго muscularis proctodaeum. Послѣднее (prd) изображено на рис. 55: какъ и раньше, въ отличіе отъ stomodaeum оно не упирается своимъ тупымъ концомъ прямо въ желтокъ, а отдѣлено отъ него скопленіемъ элементовъ нижняго листка (hDa), которое и является заднимъ зачаткомъ средней кишки. Кромѣ этого скопленія, прилегающаго къ концу proctodaeum, элементы нижняго листка окружаютъ его со всѣхъ сторонъ (рис. 55, 56 mm), и изъ нихъ получается позже мускульный слой задней кишки. Какъ видно на этихъ рисункахъ, между заднимъ зачаткомъ средней кишки и зачаткомъ muscularis proctodaeum нельзя въ это время провести никакой границы, почему правильнѣе говорить и здѣсь объ одномъ комбинированномъ первичномъ зачаткѣ.

И передній и задній зачатокъ средней кишки (перемѣшанные еще въ это время съ зачатками muscularis эктодермальныхъ отдѣловъ кишечника въ общіе комбинированные первичные зачатки) возникаютъ, слѣдовательно, изъ передняго и задняго скопленія нижняго листка, не вошедшихъ въ составъ сомитовъ. Кромѣ того не участвовало въ образованіи послѣднихъ еще небольшое количество элементовъ нижняго листка въ видѣ перемычки или мос-

тика между сомитами правой и левой стороны, который был описан нами уже выше (см. рис. 39, 41, 45, 46 isb). Насчетъ этого межсомитнаго тяжа нижняго листка и возникаетъ третій зачатокъ средней кишки—ея средній или диффузный зачатокъ.

При описаніи стадій Е (последней стадіи третьяго періода развитія) мы уже отмѣчали, что благодаря сильному разрастанію вверхъ нервной системы связь между сомитами челюстныхъ сегментовъ теряется и мостикъ между ними исчезаетъ. На стадіи F этотъ процессъ распространяется изъ головныхъ сегментовъ въ грудные и, наконецъ, въ брюшные: нервная система растетъ быстро вверхъ, и мостикъ между сомитами правой и левой стороны редуцируется. Въ результатъ на стадіи F мы имѣемъ вмѣсто тяжа нижняго листка по средней линіи брюшной стороны между сомитами рядъ отдѣльныхъ клѣтокъ, на которыя онъ распался, и нѣкоторыя изъ этихъ клѣтокъ видѣются поверхностно въ желтокъ и въ видѣ изолированныхъ клѣтокъ остаются на его нижней поверхности (рис. 54 dDa). Эти клѣтки и являются среднимъ или диффузнымъ зачаткомъ средней кишки: на стадіи F онъ хорошо замѣтенъ какъ на сагитальныхъ, такъ и на поперечныхъ разрѣзахъ, позже же смѣшиваются съ выростами изъ передняго и задняго зачатка средней кишки (къ ихъ описанію мы перейдемъ немного дальше) и вмѣстѣ съ ними сливаются въ эпителиальную стѣнку mesenteron.

Описанный нами межсомитный тяжъ нижняго листка, дающій позже диффузный зачатокъ средней кишки, извѣстенъ у многихъ Pterygota. Впервые его описалъ Nusbaum (1891) у *Meloe* подъ именемъ „Chordastrang“, а затѣмъ Heymons у *Forficula* и *Orthoptera* (1895), выяснивъ, что именно изъ него происходятъ кровяныя клѣтки, что было затѣмъ подтверждено и другими исследователями. Nusbaum и Fulinski (1906) позже установили, что помимо кровяныхъ клѣтокъ изъ этого „mittlere Strang“ возникаютъ элементы, участвующіе въ образованіи средней кишки; данныя эти были вполне подтверждены затѣмъ Hirschler'омъ (1906, 1909 а и b) у различныхъ Lepidoptera и Coleoptera и Hammerschmidt'омъ (1910) у Phasmatidae (терминологию послѣдняго—„вторичная энтодерма мезодермальнаго происхожденія“ и пр.—я оставляю въ сторонѣ).

Такимъ образомъ, „mittlere Strang“ многихъ Pterygota даетъ матеріалъ не только для средней кишки, но и для кровяныхъ клѣтокъ. Прослѣдить развитіе послѣднихъ у *Isotoma cinerea*, къ сожалѣнію, совсѣмъ не удалось, но по аналогіи съ Pterygota мнѣ кажется наиболѣе вѣроятнымъ предположеніе, что и здѣсь

онѣ развиваются изъ элементовъ межсомитнаго тяжа. Если это дѣйствительно такъ, то и третій зачатокъ средней кишки (ея диффузный зачатокъ) подобно переднему и заднему до своего полного обособленія входитъ въ составъ комбинированнаго первичнаго зачатка, въ которомъ кромѣ него содержатся и совершенно посторонніе элементы, а именно матеріалъ для будущихъ кровяныхъ клѣтокъ. Для Pterygota последнее несомнѣнно справедливо.—Къ этимъ крайне важнымъ отношеніямъ мы вернемся еще въ общей части этой работы.

На двухъ слѣдующихъ стадіяхъ—G и H—во всѣхъ трехъ отдѣлахъ кишечника наступаютъ замѣтныя измѣненія. Stomodaeum, бывшій до сихъ поръ болѣе или менѣе прямымъ, въ силу роста принимаетъ колѣнчатую форму, такъ какъ его задняя половина отклоняется градусовъ на 45 отъ прежняго направленія, которое сохраняется лишь въ началѣ stomodaeum (см. рис. 62). Такъ какъ передній зачатокъ средней кишки въ это время уже вполне обособляется, то теперь на сагитальныхъ разрѣзахъ мы видимъ, что стѣнки передней кишки покрыты не только сверху, но и снизу однимъ слоемъ клѣтокъ нижняго листа (рис. 62 mm), дающихъ позже ея muscularis.

Такой же однослойный зачатокъ будущаго мускульнаго слоя окружаетъ на стадіяхъ G и H со всѣхъ сторонъ и proctodaeum (рис. 63 и 67 mm), задній же зачатокъ средней кишки, какъ и передній, въ это время уже совсѣмъ обособленъ. Въ отличіе отъ передней кишки задняя остается, какъ видно на этихъ двухъ рисункахъ, попрежнему прямой, но внутренній конецъ ея прилегаетъ уже непосредственно къ желтку, такъ какъ задній зачатокъ средней кишки, какъ мы дальше увидимъ, занимаетъ иное положеніе и принимаетъ новую форму. Полость proctodaeum отдѣляется теперь отъ желтка тонкимъ слоемъ клѣтокъ, образующихъ ея дно, т.-е. здѣсь образуется характерная для развитія задней кишки и Pterygota такъ называемая hintere Grenzlamelle (рис. 63, 67 hgl). Подобная же vordere Grenzlamelle на днѣ stomodaeum образуется значительно позже.

Внутренній конецъ proctodaeum передъ его Grenzlamelle въ это время, какъ хорошо видно на нашихъ рисункахъ, нѣсколько расширенъ. Подобное же расширеніе въ этомъ мѣстѣ свойственно и зародышамъ Pterygota, при чемъ у нихъ изъ него возникаютъ позже мальпигіевы сосуды. У нашей изотомы, какъ у всѣхъ Collembola, это расширеніе остается въ дальнѣйшемъ безъ какихъ-либо измѣненій (см., напримѣръ, рис. 73 prd, относящійся къ готовому вылупиться зародышу), и мальпигіевыхъ со-

судовъ совсѣмъ не образуется. Подобное расширеніе имѣется во взросломъ состояніи не только у *Isotoma cinerea*, но и у многихъ другихъ Collembola, на что обратилъ вниманіе уже Neumons (1897 b), совершенно правильно приравнявшій его мальпигиевымъ сосудамъ, имѣющимъ у *Campodea* видъ маленькихъ дивертикуловъ. Такимъ образомъ, предки Collembola, вѣроятно, имѣли настоящіе мальпигиевы сосуды, какъ имѣютъ ихъ теперь *Thysanura s. str.*

Переходя теперь къ зачаткамъ средней кишки, мы будемъ говорить лишь о переднемъ и заднемъ, такъ какъ о судьбѣ диффузнаго было уже сказано выше, и въ это время благодаря разрастанію двухъ первыхъ его клѣтки смѣшиваются съ ними и, наконецъ, становятся совершенно неразличимыми. Какъ передній, такъ и задній зачатки, начиная со стадіи G, обособляются отъ зачатковъ muscularis эктодермальныхъ отдѣловъ кишечника, съ которыми они раньше были соединены въ комбинированные первичные зачатки, и начинаютъ быстро увеличиваться въ размѣрахъ, принимая своеобразную форму. Последняя совершенно та же, что и у *Pterygota*, и имѣетъ сперва видъ часового стекла, а затѣмъ подковы, вершина которой прилегаетъ къ внутреннему концу stomodaeum или proctodaeum, смотря по тому, имѣемъ ли мы дѣло съ переднимъ или съ заднимъ зачаткомъ.

Яснѣе всего видны эти зачатки на фронтальныхъ разрѣзахъ черезъ переднюю или заднюю часть зародыша, при чемъ два такихъ разрѣза изображены на рис. 66 и 67. Первый изъ нихъ представляетъ часть фронтальнаго разрѣза черезъ головной конецъ: мы видимъ на немъ stomodaeum (std), упирающійся и даже немного вдающійся своимъ концомъ въ желтокъ, а по бокамъ отъ него на поверхности желтка лежитъ съ каждой стороны по тонкой эпителиальной пластинкѣ (vDa), при чемъ на разрѣзахъ, прошедшихъ нѣсколько ближе къ брюшной сторонѣ, на которыхъ не видно уже stomodaeum, обѣ пластинки сливаются другъ съ другомъ въ общій подковообразный зачатокъ кругомъ передняго конца желтка. Эта подковообразная эпителиальная пластинка обязана своимъ происхожденіемъ тому скопленію элементовъ нижняго листка у задней стѣнки stomodaeum на стадіи F, о которомъ мы говорили уже выше (рис. 53 vDa), и подобно этому скопленію является переднимъ зачаткомъ средней кишки, но въ отличіе отъ него уже безъ примѣси какихъ-либо постороннихъ элементовъ. Нашъ рис. 66 относится къ зародышу на стадіи H, у котораго передній зачатокъ средней кишки довольно сильно отличается отъ той кучки клѣтокъ, которую мы видѣли на стадіи F: однако

изслѣдованіе разрѣзовъ черезъ зародышей на стадіи G, являющейся промежуточной между F и H, показываетъ, что такая подковообразная пластинка, дѣйствительно, образуется изъ скопленія нижняго листка подъ stomodaeum, при чемъ послѣднее принимаетъ сперва форму, болѣе похожую на часовое стекло, и лишь затѣмъ видъ подковы.

Рис. 67 изображаетъ фронтальный разрѣзъ черезъ задній конецъ того же зародыша, и на немъ мы видимъ то же самое. Точно такъ же отъ дна proctodaeum (prd) отходятъ вдоль поверхности желтка двѣ эпителиальныхъ пластинки (hDa), сливающихся на другихъ разрѣзахъ въ общій подковообразный зачатокъ, который беретъ начало отъ описаннаго нами выше скопленія элементовъ нижняго листка у конца proctodaeum на стадіи F (рис. 55 hDa). И здѣсь это скопленіе сперва имѣетъ видъ часового стекла, лишь затѣмъ вытягиваясь въ подкову съ болѣе длинными колѣнами: словомъ, всѣ отношенія при развитіи задняго зачатка средней кишки тѣ же, какъ и у ея передняго зачатка.

Благодаря изогнутому положенію зародыша на одной и той же серіи мы имѣемъ обычно фронтальные разрѣзы черезъ его передній и задній конецъ и поперечные черезъ среднюю часть тѣла. Поэтому очень легко прослѣдить весь ходъ обоихъ подковообразныхъ зачатковъ средней кишки и ихъ постепенное разрастаніе и сліяніе другъ съ другомъ. На стадіи G эти зачатки еще довольно коротки, и ихъ концы прилегаютъ къ желтку въ его нижней половинѣ лишь съ боковъ; срединная же часть брюшной поверхности желтка, лежащая надъ нервной системой, точно также какъ спинная и боковыя поверхности пока лишены этого эпителиальнаго покрова. Такую именно картину мы видимъ на рис. 60, изображающемъ поперечный разрѣзъ черезъ третій брюшной сегментъ зародыша на стадіи G, гдѣ ясно выступаютъ концы задняго зачатка средней кишки (hDa). Такъ какъ передняя и задняя подкова на этой стадіи еще не доходятъ другъ до друга, то въ срединѣ туловища, напримѣръ, на разрѣзахъ черезъ первый брюшной сегментъ (рис. 59), мы не найдемъ подъ желткомъ этихъ эпителиальныхъ пластинокъ, и здѣсь будутъ попадаться на его брюшной поверхности лишь разбѣянные по одиночкѣ клѣтки диффузнаго зачатка (dDa).

На стадіи H концы передней и задней подковы уже встречаются и сливаются другъ съ другомъ, такъ что эти эпителиальные пластинки развиты подъ желткомъ во всѣхъ сегментахъ тѣла, въ томъ числѣ и въ первомъ брюшномъ (рис. 69 hDa), и желтокъ

имѣть теперь на брюшной поверхности два непрерывныхъ тяжа будущаго кишечнаго эпителия. Кѣтки диффузнаго зачатка входятъ въ это время въ составъ этихъ двухъ тяжей и болѣе уже неразличимы. Затѣмъ ростъ эпителиальныхъ пластинокъ въ длину замѣняется столь же энергичнымъ ростомъ въ высоту, и онѣ начинаютъ быстро обрастать желткомъ съ боковъ (рис. 68 vDa), и, наконецъ, происходитъ слияніе пластинки правой и лѣвой стороны первоначально на брюшной сторонѣ, а послѣ этого и на спинной. Въ результатъ этого процесса желтокъ оказывается окруженнымъ со всѣхъ сторонъ кишечнымъ эпителиемъ, и получается замкнутая со всѣхъ сторонъ средняя кишка, покуда еще наполненная желткомъ (рис. 71 D). Словомъ, всѣ детали этого процесса носятъ совершенно тотъ же характеръ, что и у *Pterygota*, гдѣ онѣ описывались уже много разъ, почему мы можемъ на этомъ болѣе подробно не останавливаться.

Съ переходомъ въ послѣднюю стадію — J — на концѣ *stomodaem* появляется тонкая кѣточная пластинка, отдѣляющая его полость отъ желтка и хорошо замѣтная на сагитальныхъ разрѣзахъ (рис. 72 vgl). Мы имѣемъ здѣсь дѣло, конечно, съ *vordere Grenzlamelle*, которая возникаетъ, такимъ образомъ, значительно позже *hintere Grenzlamelle* у *proctodaeum*, о которой мы уже говорили выше. Въ началѣ этой стадіи средняя кишка еще переполнена желткомъ (см. рис. 71), но затѣмъ онъ быстро исчезаетъ, очевидно, перевариваясь, и вмѣстѣ съ нимъ исчезаютъ заключенные въ немъ спинной органъ (рис. 71 DO) и ядра желточныхъ кѣтокъ (dk на многихъ рисункахъ табл. V), такъ что передъ вылупленіемъ зародышъ имѣетъ среднюю кишку, полость которой совершенно ничѣмъ не заполнена (рис. 73 D). Въ это же время на средней кишкѣ становится замѣтнымъ ея *muscularis* (не изображенный на этомъ рисункѣ). Онъ развивается, какъ и вообще у всѣхъ насѣкомыхъ, изъ спланхической стѣнки сомитовъ.

Еще до исчезновенія желтка въ кишечникѣ *hintere Grenzlamelle* у *proctodaeum* резорбируется, и между полостями средней и задней кишки устанавливается сообщеніе. *Vordere Grenzlamelle*, которая въ это время только что возникла, исчезаетъ позже, когда желтокъ уже цѣликомъ потребленъ. — Интересно отмѣтить еще одну особенность, касающуюся передней и задней кишки готоваго къ вылупленію зародыша. Мы упоминали уже, что у зародышей на стадіи J развивается голубой пигментъ, свойственный и взрослой формѣ. Онъ отлагается однако не только въ гиподермѣ (рис. 71, 73 hyp), но и въ стѣнкахъ *stomo-* и *proctodaeum* (рис. 73 std,

prd), рѣзко отличая этимъ переднюю и заднюю кишку отъ средней и свидѣтельствуя объ эктодермальномъ происхожденіи двухъ первыхъ. Эта особенность сохраняется и у взрослыхъ экземпляровъ нашего вида: пигментъ не исчезаетъ изъ эктодермальныхъ отдѣловъ кишечника во время линьки, а сохраняется, вѣроятно, до самой смерти животного, такъ какъ я наблюдалъ его и у самокъ, занятыхъ откладкой яицъ. То же самое явленіе наблюдалъ и *Heymons* (1897 b) у взрослыхъ экземпляровъ *Isotoma saltans* (*Desoria glacialis*), у которыхъ кѣтки передней и задней кишки также подобно гиподермальнымъ наполнены были пигментомъ. Я затрудняюсь приписать этому явленію какое-либо біологическое значеніе.

Данныя о развитіи средней кишки *Collembola* и вообще *Apterygota* отличались до настоящаго времени крайней неполнотой. Ульянинъ производилъ среднюю кишку изъ кучки кѣтокъ нижняго листа, врастающихъ внутрь желтка, но мы уже показали выше, что онъ принялъ за зачатокъ *mesenteron*, вѣроятно, половой зачатокъ. Однако *Uzel* и *Miss Claypole* подтверждаютъ данныя Ульянина, описывая происхожденіе средней кишки въ видѣ плотнаго зачатка среди желтка (какъ у *Diplopoda*), при чемъ источникомъ его происхожденія являются кучки особыхъ эктодермальныхъ кѣтокъ въ желткѣ. *Heymons* на основаніи изслѣдованія развитія *Campodea* и *Lepisma* приходитъ къ заключенію, что ихъ средняя кишка (какъ, вѣроятно, и всѣхъ *Apterygota* въ отличіе отъ *Pterygota*) возникаетъ просто изъ желточныхъ кѣтокъ, теряющихъ передъ этимъ свой желтокъ. *Prowazek* подтвердилъ эти данныя *Heymons*'а по отношенію къ изслѣдованному имъ виду *Isotoma*.

Наблюденія, изложенныя нами выше, стоятъ въ полномъ противорѣчій со всѣми этими данными. Никакихъ скопленій кѣтокъ въ желткѣ, которыя можно было бы считать за эктодерму, у *Isotoma cinerea* не имѣется, и желтокъ у нея заключаетъ въ себѣ лишь желточные кѣтки и половой зачатокъ. Происхожденіе эпителия средней кишки изъ желточныхъ кѣтокъ совершенно не подтверждается, и послѣднія до ихъ полного исчезновенія вмѣстѣ съ желткомъ сохраняютъ свой прежній характеръ, будучи разсѣяны по одиночкѣ въ желткѣ и играя, вѣроятно, важную роль въ процессѣ его усвоенія. Во время второго періода развитія въ каждой желточной кѣткѣ ясно видно ядро и сильно вакуолизированная протоплазма (см. dz на рис. табл. II); во время двухъ послѣднихъ періодовъ плазма ихъ становится почти незамѣтной и среди желтка ясно выдѣляются лишь ядра этихъ кѣ-

токъ (см. dk на рис. табл. IV и V). Сравненіе при большихъ увеличеніяхъ этихъ желточныхъ ядеръ съ элементами, изъ которыхъ возникаетъ среднекишечный эпителий, не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что желточные клѣтки не принимаютъ въ этомъ процессѣ ни малѣйшаго участія. — Такимъ образомъ, вопреки всѣмъ прежнимъ наблюденіямъ мы должны признать, что у *Collembola*, а вѣроятно, и у всѣхъ *Apterygota* средняя кишка образуется изъ элементовъ нижняго листа въ видѣ 3 зачатковъ: передняго, задняго и диффузнаго.

Эти данныя, какъ мы сейчасъ увидимъ, вполне гармонируютъ съ данными, касающимися не только *Pterygota*, но и другихъ *Arthropoda*, почему совсѣмъ мало вѣроятно, чтобы въ предѣлахъ группы *Apterygota* были бы еще какіе-нибудь другіе способы происхожденія *mesenteron*. Въ силу этого я склоненъ признать всѣ предыдущія наблюденія, касающіяся развитія средней кишки, просто ошибочными. — Miss Claypole и Uzel впали, вѣроятно, въ ошибку подобно Ульянину, принявъ за энтодерму или половой зачатокъ или кучки желточныхъ клѣтокъ. Что касается до данныхъ Heumons'a, то помимо того, что онъ и раньше готовъ былъ признать за настоящую энтодерму у насекомыхъ именно желточные клѣтки, его наблюденія надъ образованіемъ средней кишки у *Lepisma* и *Campodea* (для первой главнымъ образомъ, для второй исключительно) сдѣланы путемъ изслѣдованія уже вылупившихся изъ яйца личинокъ. Какъ бы ни запаздывалъ процессъ органогенеза, все же ключемъ къ его пониманію являются процессы, совершающіеся только въ яйцѣ, и одно изслѣдованіе молодыхъ личинокъ не можетъ разъяснить столь труднаго и сложнаго вопроса. Правда, у лепизмы Heumons изслѣдовалъ и эмбриональное развитіе, но и здѣсь вопросъ о происхожденіи мелкихъ „Darmbildungszellen“, какъ онъ ихъ называетъ, остался все же не вполне рѣшеннымъ. Въ первой работѣ (1897 а) онъ предполагалъ, что онѣ возникаютъ путемъ митоза изъ крупныхъ желточныхъ клѣтокъ, во второй (1897 б) склоняется къ тому, что такая крупная желточная клѣтка прямо превращается въ мелкую *Darmbildungszelle* путемъ утери желтка, такъ какъ послѣднія „unzweifelhaft Abkömmlinge der grossen dotterhaltigen Elemente sind“. Словомъ, и данныя этого выдающагося изслѣдователя даже просто при чтеніи этихъ двухъ работъ возбуждаютъ большія сомнѣнія и невольно кажутся мало обоснованными, такъ что крайне желательно переизслѣдованіе всѣхъ этихъ отношеній и у *Lepisma* и у *Campodea*. Въ виду полного совпаденія того способа развитія средней кишки, который

имѣетъ мѣсто у нашей изотомы, со способомъ развитія ея у многихъ другихъ *Arthropoda*, я считаю въ высокой степени вѣроятнымъ, что и въ группахъ *Diplura* и *Thysanura s. str.* при болѣе внимательномъ изслѣдованіи окажется то же самое.

Вопросъ о развитіи средней кишки высшихъ насекомыхъ — *Pterygota* — долгое время оставался очень спорнымъ. Въ концѣ 80-ыхъ и началѣ 90-ыхъ годовъ старая теорія ея происхожденія изъ желточныхъ клѣтокъ, защищавшаяся рядомъ старыхъ изслѣдователей и принятая между прочимъ и братьями Hertwig въ ихъ „Coelomtheorie“ (1881), казалось, была оставлена и уступила мѣсто взглядамъ, развитымъ впервые Grassi (1884) и Ковалевскимъ (1886), согласно которымъ средняя кишка является дериватомъ нижняго листка или энтомеэодермы. Эта теорія нашла себѣ полное подтвержденіе въ работахъ такихъ изслѣдователей, какъ Heider (1889), Wheeler (1889, 1893), Холодковский (1891), Carrière (1897) и многіе другіе. — Однако Heumons'омъ въ рядѣ его работъ (1895 и др.) была выдвинута новая точка зрѣнія, что у *Pterygota* средняя кишка образуется изъ выростовъ *stomo-* и *proctodaeum*, т.-е. весь кишечникъ является сплошь энтодермальнымъ, а энтодермой являются желточные клѣтки, не принимающія у высшихъ насекомыхъ ¹⁾ въ построеніи кишки никакого участія. Въ пользу этого взгляда высказывались до сравнительно недавняго времени и многіе другіе изслѣдователи: Rabito (1898), Lécaillon (1898), Schwarze (1899), Deegener (1900), Toyama (1902), Czerski (1904) и Friederichs (1906). Кромѣ теоріи Heumons'a, которую можно считать лишь извѣстной модификаціей прежнихъ взглядовъ на желточные клѣтки, какъ на энтодерму, было сдѣлано двѣ попытки доказать, что желточные клѣтки вообще принимаютъ участіе въ образованіи среднекишечнаго эпителия у *Pterygota*: эти попытки принадлежатъ Dickel'ю (1904) и Schwangart'у (1904, 1905).

Однако, несмотря на обиліе работъ особенно въ первомъ направленіи, въ настоящее время и та и другая точка зрѣнія можетъ считаться уже ликвидированной, и новыя произведенныя съ особенной тщательностью изслѣдованія заставляютъ насъ вернуться къ старымъ взглядамъ Grassi, Ковалевскаго и другихъ. Эти новыя изслѣдованія принадлежатъ Escherich'у (1900), Noack'у (1901), Schwangart'у (1904), а главнымъ образомъ Nüsbaum u. Fulinski (1906, 1909) и Hirschler'у (1906, 1909 а и б).

¹⁾ За исключеніемъ стрекозъ: Heumons (1896 а), Tschuproff (1903).

Какъ показали Nusbaum и Fulinski, Heymons впасть въ ошибку, приписывая средней кишкѣ происхожденіе изъ дна stomodaeum и proctodaeum, такъ какъ онѣ проглядѣлъ передній и задній зачатокъ ея, которые у нѣкоторыхъ формъ дѣйствительно тѣсно слиты съ концомъ передней и задней кишки, между тѣмъ источникомъ происхожденія mesenteron являются всегда эти два зачатка плюсъ „mittlere Strang“, отвѣчающій нашему диффузному зачатку. То же самое напелъ и Hirschler у Coleoptera и Lepidoptera, при чемъ онѣ на основаніи своихъ наблюденій самымъ рѣшительнымъ образомъ отвергаетъ (какъ и Nusbaum и Fulinski) возможность участія въ построении средикишечнаго эпителия желточныхъ клѣтокъ, что допускали Dickel и Schwangart. Сопоставляя наши наблюденія надъ *Isotoma cinerea* съ данными трехъ вышеупомянутыхъ авторовъ, приходится признать, что развитіе средней кишки на счетъ элементовъ нижняго листа является правиломъ для всѣхъ насѣкомыхъ—какъ Pterygota, такъ и Apterygota; въ типичныхъ случаяхъ она образуется изъ трехъ зачатковъ, но иногда „mittlere Strang“ или диффузный зачатокъ бываетъ слабо развитъ и даетъ лишь кровяныя клѣтки, не участвуя въ образованіи средней кишки (*Gryllotalpa*).—Словомъ, мы возвращаемся снова къ взглядамъ Grassi, Ковалевскаго и другихъ, дополняя лишь два только и извѣстныхъ имъ зачатка третьимъ или диффузнымъ, образующимъ въ то же время и кровяныя клѣтки.

Нельзя не отмѣтить здѣсь же, что подобный же способъ развитія средней кишки присущъ и многимъ другимъ Arthropoda. Что касается до многоножекъ, то, оставляя въ сторонѣ старыя работы, отмѣтимъ, что у Diplopoda развитіе mesenteron изъ элементовъ нижняго листа въ видѣ двухъ зачатковъ было давно уже установлено Холодковскимъ (1895), а новыя наблюденія Lignau (1911 а) надъ *Polydesmus abchasius*, какъ отмѣчаетъ и самъ авторъ, стоятъ въ полномъ согласіи со схемой, выработанной для насѣкомыхъ Nusbaum и Fulinski и Hirschler'омъ, отличаясь отъ нея лишь нѣкоторыми специальными частностями. У *Scolopendra*, по наблюденіямъ Heymons'a (1901), средняя кишка образуется изъ отдѣльныхъ энтодермальныхъ клѣтокъ, такъ что здѣсь можно было бы говорить лишь о диффузномъ зачаткѣ; однако самъ авторъ кромѣ того описываетъ и изображаетъ (рис. 49 въ его работѣ) у конца proctodaeum особую „entodermale Scheibe“ изъ кубическихъ клѣтокъ, которую, какъ мнѣ кажется, вполне можно сравнивать съ заднимъ зачаткомъ средней кишки насѣкомыхъ.

Общая схема для развитія средней кишки паукообразныхъ была дана впервые Шимкевичемъ въ его русской работѣ о развитіи ихъ кишечника (1898), а затѣмъ въ работѣ о развитіи телифона (1906): mesenteron возникаетъ у нихъ изъ мезо-энтодермы въ видѣ двухъ зачатковъ—задняго и диффузнаго, при чемъ въ нѣкоторыхъ группахъ одинъ изъ нихъ можетъ быть развитъ очень слабо и даже совсѣмъ отсутствовать. Эта схема нашла себѣ полное подтвержденіе въ работахъ Montgomery (1909), Hamburger (1910) и въ послѣднемъ изслѣдованіи супруговъ Шимкевичъ по эмбриології Tetraneurones (1911) и можетъ считаться прочно установленной, несмотря на противорѣчающія ей наблюденія Kautsch'a (1909, 1910 а).

Что касается до Onychophora, то данныя о развитіи ихъ средней кишки пока совершенно не подходятъ подъ ту схему, которая имѣетъ мѣсто у Insecta, Myriopoda и Arachnoidea. Впрочемъ, эмбриологію этой группы, несмотря на рядъ имѣющихся уже работъ, далеко еще нельзя считать достаточно изученной. Такъ же обстоитъ дѣло и у Crustacea, что, быть можетъ, объясняется отчасти тѣмъ, что въ послѣднее время появлялись работы, касавшіяся преимущественно формъ, у которыхъ имѣетъ мѣсто детерминативный типъ дробленія яицъ, а по эмбриології другихъ ракообразныхъ мы имѣемъ, болѣею частью, болѣе старыя работы. Нельзя все же не отмѣтить здѣсь наблюденій Ю. Вагнера надъ *Neomysis* (1896) и Педашенко надъ *Lernaea* (1899), согласно которымъ средняя кишка этихъ формъ возникаетъ изъ двухъ энтодермальныхъ зачатковъ: одного въ области stomodaeum, другого въ области proctodaeum, что очень напоминаетъ отношенія, имѣющія мѣсто у насѣкомыхъ.

Какъ бы то ни было, на основаніи имѣющихся у насъ теперь данныхъ можно признать, что развитіе средней кишки изъ элементовъ нижняго листа является, вѣроятно, правиломъ для всѣхъ Arthropoda. Для трехъ классовъ воздуходышащихъ членистоногихъ такимъ же правиломъ является возникновеніе mesenteron изъ трехъ зачатковъ: передняго, задняго и диффузнаго, при чемъ одинъ (иногда даже два) изъ нихъ у нѣкоторыхъ формъ можетъ быть очень слабо развитъ и даже совсѣмъ отсутствовать: напри- мѣръ, передній у паукообразныхъ, диффузный у нѣкоторыхъ насѣкомыхъ.—Развитіе средней кишки нашей изотомы прекрасно согласуется съ этой схемой.

Развитіе нервной системы. Въ виду ранней закладки и быстрого развитія нервной системы она достигаетъ, какъ мы видѣли выше, въ концѣ третьяго періода развитія довольно вы-

сокой дифференцировки. Первая стадия четвертого периода — F (см. рис. 53—55 osg, n) по степени развития нервной системы зародыша ничем не отличается от стадии E, которая была уже описана нами раньше. На следующей стадии — G — и в нервной системе наступает ряд заметных изменений.

Прежде всего на разрывах зародышей этой стадии бросается в глаза появление фибриллярного вещества мозга или так называемой *Punksubstanz* (см. рис. 58, 59, 64, 65 pst — также и на других). Оно закладывается первоначально, как и у *Pterygota*, в дорзальной части каждого ганглия, но затем быстро окружается со всех сторон ганглиозными клетками. По наблюдениям *Neumons'a* (1897 a) у *Lepisma* ганглиозные клетки и после образования фибриллярного вещества остаются в брюшной части ганглия, так что это белое вещество покрыто здесь с дорзальной стороны лишь тонкой неврилеммой, что отличает лепизму от *Pterygota*. Как видно на наших рисунках, у *Isotoma cinerea* расположение фибриллярного вещества и ганглиозных клеток в нервной системе то же, что и у высших насекомых, так что *Collembola* в этом отношении стоят ближе к *Pterygota*, чем к *Lepisma*.

Затем на стадии G окончательно сформировывается из своих трех отделов надглоточный ганглий (рис. 57, 58, 62 osg) и происходит слияние челюстных ганглиев (мандибулярного, первого и второго максиллярного) в общий подглоточный ганглий (рис. 57, 58, 62 usg). В это же время дифференцируется, как у высших насекомых, между надглоточным и подглоточным ганглием окологлоточная комиссура (рис. 58 sks). Таким образом, нервная система в головѣ в концѣ стадии G принимает уже более или менее тот вид, который свойствен взрослому насекомому. *Miss Claupole* упоминает о зачаткѣ симпатической нервной системы у *Anurida maritima*, который однако скоро исчезает: подобного зачатка у изотомы я не наблюдал.

Грудные и брюшные ганглии на стадии G помимо присутствия фибриллярного вещества не представляют ничего особенного (рис. 64 ggl. th; рис. 59, 60 ggl. abd); не изменяется их строение и на следующей стадии H (рис. 65, 68, 70 ggl. th, 69 ggl. abd), так как на этих стадиях они имеют в общем уже тот вид, который свойствен взрослому животному. Начиная со стадии H, становится заметным слияние брюшных ганглиев в одну общую массу, задний конец которой постепенно смещается вперед. В результате этого процесса на стадии J (рис. 73 ggl. abd) и у

только что вылупившейся из яйца изотомы (рис. 37, на котором это особенно хорошо видно) мы находим всего один абдоминальный ганглий, помещающийся в двух первых сегментах брюшка. Как мы уже отмечали выше, подобное резкое обособление этого брюшного ганглия от заднего грудного и его сравнительно большая длина не характерны для большинства *Collembola* и сохраняются лишь у немногих форм.

В общем, нельзя не признать, что развитие нервной системы у *Isotoma cinerea* изучено нами лишь в самых общих и грубых чертах, и многие детали его (например, происхождение различных комиссур, закладка и дифференцировка *Mittelstrang*) остались совершенно невыясненными. Отчасти виновато в этом то обстоятельство, которое уже отмечено выше, а именно что на стадиях, относящихся к третьему периоду развития, нервная система была зафиксирована хуже всех других тканей зародыша, неполнота же данных, относящихся к началу ее развития, мешала детально разобраться и в более поздних стадиях. Во всяком случае все то, что нами установлено в этом направлении, показывает, что развитие нервной системы у *Collembola* происходит совершенно по тому же типу, что и у *Pterygota*, и помимо, быть может, каких-нибудь менее важных деталей не представляет ничего существенно особенного.

Развитие глаз, о первом появлении которых было упомянуто уже выше, я оставил совершенно в стороне, так как мой материал по своей малой величинѣ был мало пригоден для подобного исследования. Не выяснил я ничего и о развитии *tentorium* и постантеннального органа изотомы.

Производные сомитов. О закладкѣ сомитов и их числѣ у зародыша мы уже говорили при описании третьего периода развития. Дифференцировка их начинается значительно позже, лишь на стадии G, при чем и здесь, как и при развитии нервной системы, почти не наблюдается особенностей, отличающих *Collembola* от *Pterygota*, так что, повидимому, этот процесс протекает сходно у всех насекомых.

На стадии F, с которой начинается четвертый период развития, сомиты имеют еще прежний характер и, как видно на рис. 56 (so), попрежнему заходят в конечности (abd₁, 3, 4). Позже часть сомита, заходящая в конечности, теряет связь с его туловищным отделом и дает мускулатуру ножек.

На стадии G начинается дифференцировка сомита на тѣ отдели, которые впервые были точно установлены *Neumons'ом* (1895); однако в это время благодаря крайней мелкости всех

элементовъ, а отчасти и недостаточно хорошей ихъ фиксировкѣ крайне трудно разобраться во всѣхъ деталяхъ этого процесса. При этомъ бросается въ глаза отсутствіе такъ называемаго Epi-neuralsinus, имѣющагося у всѣхъ Pterygota между нервной системой и желткомъ: у зародышей изотомы, напротивъ, брюшная нервная цѣпочка все время плотно прилегаетъ къ желтку (см. рис. 59 и 60). Виновата ли въ этомъ фиксировка или же это является особенностью Collembola, сказать довольно трудно: лично я склоняюсь въ пользу перваго предположенія. Съ переходомъ въ стадію Н на мѣстѣ каждаго сомита ясно уже видны его производныя, т.-е. мускулатура и жировое тѣло, и ихъ расположеніе въ это время и даетъ возможность заключить, что процессъ дифференцировки сомитовъ протекаетъ здѣсь, какъ у Pterygota. Для этой цѣли лучше всего пользоваться поперечными разрѣзами въ родѣ изображенныхъ на нашихъ рис. 68 и 69. Мы видимъ на нихъ прежде всего прилегающіе къ эктодермѣ латеродорзальные мускулы (msk), которые происходятъ, очевидно, изъ соматическихъ стѣнокъ сомитовъ; болѣе медианно лежитъ жировое тѣло (fk) и еще медианнѣе зачатокъ вентральныхъ продольныхъ мускуловъ (vmp): и этотъ зачатокъ и зачатокъ жирового тѣла происходятъ изъ медианнаго отдѣла соматической же стѣнки сомитовъ. Спланхническая стѣнка ихъ даетъ muscularis средней кишки (не изображенъ на нашихъ рисункахъ) и, какъ мы дальше увидимъ, участвуетъ въ образованіи гонадъ. Кромѣ этихъ образований въ самой дорзальной части уже дифференцировавшагося и растущаго наверхъ сомита на стадіи Н замѣтны крайне мелкіе, но довольно рѣзко выделяющіеся элементы (cbl). Какъ видно на другихъ разрѣзахъ (рис. 69), они, повидимому, участвуютъ въ образованіи сердца (hz), т.-е. являются кардіобластами.

Такимъ образомъ, какъ показываютъ эти картины, дифференцировка сомита происходитъ по тому же типу, который имѣетъ мѣсто у Pterygota: спланхническая стѣнка сомита даетъ кишечную мускулатуру и участвуетъ въ образованіи гонадъ, соматическая производитъ мускулатуру тѣла, а въ ея медианной части и жировое тѣло; на мѣстѣ перехода спланхнической стѣнки въ соматическую образуются тѣ элементы, изъ которыхъ возникаетъ сердце.—Для болѣе детальнаго изученія развитія всѣхъ этихъ органовъ мой матеріалъ былъ совершенно непригоденъ; къ тому же въ виду совпаденія выше изложенныхъ данныхъ съ данными по эмбриологіи высшихъ насѣкомыхъ подобное изученіе представляло уже мало интереса.

Крайне интересно возникновеніе еще одного производнаго

сомитовъ, отсутствующаго у Pterygota, а именно трубчатыхъ головныхъ железъ.—Прежнимъ изслѣдователямъ Collembola были извѣстны лишь послѣднія, но затѣмъ благодаря работамъ Willem et Sabbe (1897), Folsom'a (1899), Willem'a (1901), Беккера (1903) и Hoffmann'a (1904) было открыто въ ихъ головѣ еще три пары подобныхъ образований. То же самое было обнаружено затѣмъ мной (1905a, 1908) и Bruntz'емъ (1908) у Diplura и Thysanura. Большинство головныхъ железъ Apterygota носитъ тотъ же характеръ, что и у Pterygota, т.-е. онѣ являются несомнѣнно эктодермальными образованиями; исключеніе составляютъ упомянутыя выше трубчатые железы. Впервые Bruntz (1904a и b) установилъ у Machilis, что каждая изъ нихъ состоитъ изъ тонкостѣннаго концевго пузырька („sacculе“) и длиннаго сильно извитого въ началѣ отдѣла или „labyrinthe“, переходящаго въ выводной протокъ, при чемъ оказалось, что пузырекъ выделяетъ вспрыснутый въ тѣло животного амміачный карминъ, а лабиринтъ индиго-карминъ. Въ силу этого Bruntz призналъ ихъ за такія же „reins labiaux“, какія имѣются и у нѣкоторыхъ другихъ членистоногихъ (Crustacea, Diplopoda). Затѣмъ мной подобное же строеніе этихъ железъ было обнаружено у Campodea, Japyx, Machilis и Lepisma, т.-е. почти во всѣхъ семействахъ Diplura и Thysanura, при чемъ тогда же я отмѣтилъ, что въ лицѣ этихъ трубчатыхъ железъ, присутствующихъ и у Collembola, мы имѣемъ дѣло, какъ показываетъ ихъ строеніе и выдѣлительная способность, съ головными нефридіями лабиальнаго сегмента: такимъ образомъ, низшія насѣкомыя и многоножки (а именно Apterygota и Diplopoda) сохраняютъ еще въ головѣ выдѣлительные органы, построенные по типу нефридеевъ, какъ у Crustacea и Peripatus, а болѣе высокоорганизованныя Tracheata (Chilopoda и Pterygota) уже утратили ихъ (1908).

До настоящаго времени эта точка зрѣнія на одну пару головныхъ железъ Apterygota основывалась исключительно на физиологическихъ опытахъ съ инъекціями амміачнаго и индиго-кармина, произведенныхъ Bruntz'емъ и затѣмъ мной, и не была подтверждена эмбриологическими данными. Развѣтіе Isotoma cinerea доказываетъ ея полную справедливость.—Отмѣтимъ, что у Collembola (именно у Tomocerus plumbeus) присутствіе такого же тонкостѣннаго отдѣла на концѣ трубчатой железы, независимо отъ работъ Bruntz'a и моихъ, было констатировано Hoffmann'омъ (1904): онъ называетъ этотъ отдѣлъ резервуаромъ. Мы сохранимъ за нимъ названіе концевго пузырька, а извитой отдѣлъ

трубчатой железы (вплоть до ее несцедрнирующего выводного протока) будем называть просто каналомъ.

Первый зачатокъ трубчатой железы появляется очень рано, задолго до описанной выше дифференцировки сомитовъ, а именно на стадіи Е, послѣдней стадіи третьяго періода развитія. На рис. 51 мы видимъ разръзъ черезъ первый максиллярный сегментъ; его сомиты (so) ничѣмъ не отличаются отъ остальныхъ. Напротивъ, въ сегментѣ вторыхъ максиллъ (рис. 52) отъ каждого изъ его сомитовъ на уровнѣ ганглія отдѣляется пузырекъ (tdr) съ ясно выраженной эпителиальной стѣнкой, въ полости котораго можно обыкновенно подмѣтить мельчайшую зернистость. По всей вѣроятности, у живого зародыша въ этомъ пузырькѣ имѣется какая-нибудь жидкость, свертывающаяся при фиксировкѣ, отчего и получается указанное явленіе. Пара этихъ пузырьковъ въ лабіальномъ сегментѣ и является первымъ зачаткомъ трубчатыхъ головныхъ железъ.

Столь же ясно видны эти образования въ области второго максиллярнаго сегмента и на слѣдующей стадіи—F. Съ переходомъ въ стадію G, какъ уже было отмѣчено выше, въ ротовыхъ органахъ наступаютъ сильныя измѣненія; они превращаются въ энтотрофные, отчего и топографія всѣхъ органовъ головы пріобрѣтаетъ нѣсколько иной характеръ. Найти въ это время зачатокъ трубчатой железы не такъ легко, но тѣмъ не менѣе и здѣсь онъ выступаетъ довольно ясно, особенно на нѣсколько косыхъ разръзахъ. Часть такого косога разръза (имѣ захвачена и первая пара ножекъ — th₁) черезъ заднюю часть головы зародыша на стадіи G изображена на рис. 64. На немъ мы снова ясно видимъ зачатокъ трубчатой железы (trd), который сохранилъ прежній характеръ въ видѣ замкнутого эпителиальнаго пузырька.

Замѣтное измѣненіе въ его формѣ наступаетъ лишь на стадіи H, при чемъ въ это время трубчатая железа особенно хорошо бываютъ замѣтны на сагитальныхъ разръзахъ чрезъ латеральныя части головы. Какъ хорошо видно на нашемъ рис. 70, зачатокъ каждой изъ нихъ не имѣетъ теперь уже вида болѣе или менѣе шарообразнаго пузырька, какъ раньше, а принимаетъ ретортообразную или бутылчатую форму, такъ какъ внизъ отъ болѣе широкой верхней части его (etd) идетъ узкій протокъ (ktd), направляющійся къ эктодермѣ нижней части головы. Не трудно видѣть, что въ лицѣ концевое расширеніе (etd) мы имѣемъ дѣло съ зачаткомъ концевой пузырька трубчатой железы, а идущій внизъ отъ него протокъ не что иное, какъ зачатокъ покуда еще прямого канала.—Сходство элементовъ, образующихъ

и тотъ и другой отдѣлы будущей железы, точно также какъ постепенный переходъ концевой расширенія въ зачатокъ канала говорятъ безусловно за то, что оба этихъ образованія развились изъ того же общаго зачатка, который имѣлъ на предыдущихъ стадіяхъ видъ круглаго пузырька, путемъ удлиненія одной изъ его стѣнокъ внизъ въ видѣ узкаго протока. Такъ какъ въ это время зачатокъ канала (ktd) только подходит къ эктодермѣ, не открываясь еще наружу, то приписывать ему эктодермальное происхожденіе нѣтъ никакихъ основаній.

На стадіи J зачатокъ канала принимаетъ уже извитую форму; въ это же время образуется, вѣроятно, и несцедрнирующий выводной протокъ железы: прослѣдить способъ его возникновенія мнѣ не удалось, но едва ли можетъ быть какое-либо сомнѣніе въ томъ, что онъ возникаетъ путемъ простого впячиванья эктодермы.

Способъ закладки и развитія трубчатыхъ головныхъ железъ, а именно происхожденіе ихъ большей части изъ сомитовъ, вполне подтверждаютъ высказанный мною раньше взглядъ на эти железы, какъ на сохранившіеся у *Apterygota* нефридіи лабіальнаго сегмента. Важно также отмѣтить, что производнымъ сомита является не только концевой пузырекъ („saccule“) железы, выделяющій амміачный карминъ, но и ее извитой каналъ („labyrinthe“), выделяющій индиго-карминъ. Это находится въ полномъ согласіи съ тѣмъ, что мы знаемъ о развитіи нефридіевъ, сохранившихся у другихъ членистоногихъ, которые повсюду за исключеніемъ незначительной выводной части образуются сплошь изъ мезодермы, т.-е. изъ матеріала сомитовъ.—Для нефридіевъ *Peripatus* это установлено еще Sedgwick'омъ (1885—88), а противорѣчившія ему данныя Kennel'я (1885—86) не нашли себѣ подтвержденія въ болѣе новой работѣ Evans'a (1902), который согласенъ съ наблюденіями перваго изслѣдователя. Такъ же обстоитъ дѣло у головныхъ нефридіальныхъ железъ Crustacea: укажу хотя бы на наблюденія Ю. Вагнера (1896) надъ развитіемъ антеннарной железы *Neomysis* (въ этой же работѣ приведены аналогичныя наблюденія Kingsley и Бучинскаго надъ другими ракообразными). Относительно коксальныхъ железъ паукообразныхъ достаточно указать на такіе же наблюденія Brauer'a (1895) надъ скорпіономъ, съ которыми согласуются и данныя Шимкевича (1911) о характерѣ коксальныхъ железъ у зародышей *Tetrapneumones*. Словомъ, всюду, гдѣ мы встрѣчаемъ у тѣхъ или другихъ членистоногихъ нефридіи, развитіе показываетъ, что не только ихъ концевой пузырекъ является остаткомъ целома, но и весь почти нефридій за исключеніемъ короткой выводной части является

производнымъ сомита. — Трубчатая головная железа *Apterygota* вполне подходитъ подъ это правило.

Что касается до другихъ головныхъ железъ — слюнныхъ, ацинозныхъ и щечныхъ, то у зародышей почти до самаго выплыванія ихъ изъ яйца онѣ совершенно не замѣтны. Сомнѣваться въ ихъ эктодермальномъ происхожденіи, не смотря на отсутствіе прямыхъ наблюдений, однако едва ли можно: еще Беккеръ (1903) на основаніи изученія ихъ строенія пришелъ къ заключенію, что всѣ эти три пары „слѣдуетъ разсматривать какъ производныя первоначально обыкновенныхъ смазочныхъ кожныхъ (одноклѣточныхъ разбѣянныхъ или скученныхъ) железъ, которыя мы встрѣчаемъ въ сегментальномъ распредѣленіи у прочихъ насѣкомыхъ“. Я считаю эту точку зрѣнія вполне примѣнимой лишь къ двумъ парамъ — ацинознымъ и щечнымъ железамъ, слюнные же железы *Collembola*, какъ мнѣ кажется, вполне гомологичны слюннымъ же железамъ многихъ *Pterygota*. Этому вопроса я касался уже раньше въ другой работѣ (1908).

Развитіе половыхъ органовъ. Въ теченіе второго и третьего періода развитія половой зачатокъ сохранялъ все время то же положеніе, какое онъ имѣлъ еще по окончаніи дробленія и образованія бластомеры (рис. 14 g), т.-е. представлялъ изъ себя кучку клѣтокъ въ желткѣ ближе къ заднему концу зародыша (см. рисунки табл. II и IV g). Съ началомъ четвертаго періода развитія, т.-е. уже на стадіи F, наступаютъ измѣненія и въ половомъ зачаткѣ.

На этой стадіи начинается расплываніе отдѣльныхъ клѣтокъ полового зачатка, которыя до тѣхъ поръ довольно плотно прилегали другъ къ другу, выходятъ ихъ изъ желтка и виѣдреніе въ ткани зародыша. Яснѣе всего этотъ процессъ выступаетъ на фронтальныхъ разрѣзахъ черезъ брюшной конецъ зародыша: одинъ изъ нихъ изображенъ на нашемъ рис. 56. Мы видимъ здѣсь въ желткѣ кромѣ желточныхъ ядеръ (dk) попрежнему и половой зачатокъ (g), но отъ него къ прилегающимъ къ желтку соматамъ брюшныхъ сегментовъ (so) идетъ какъ бы струя или потокъ отдѣльныхъ половыхъ клѣтокъ, на которыя этотъ зачатокъ раздѣляется. Рис. 56 изображаетъ нѣсколько косою разрѣзъ, на которомъ сомиты имѣются лишь слѣва, почему и отъ полового зачатка потокъ отдѣльныхъ половыхъ клѣтокъ идетъ лишь на лѣвую сторону. На болѣе прямыхъ, вполне фронтальныхъ разрѣзахъ видно, что часть клѣтокъ полового зачатка ползетъ черезъ желтокъ въ сомиты одной стороны, другая часть въ сомиты другой, и это продолжается въ теченіе всей стадіи F и даже въ самомъ началѣ

слѣдующей стадіи G, покуда весь половой зачатокъ не распадется и всѣ его клѣтки не выберутся совершенно изъ желтка въ ткани зародыша. Разумѣется, подобныя картины можно объяснить лишь тѣмъ, что на стадіи F клѣтки, составлявшія до того половой зачатокъ, начинаютъ активно (вѣроятно, амѣбовидно) двигаться — одни направо, другія налево, пока не переберутся изъ желтка въ сомиты.

Какъ видно на рис. 56, виѣдреніе половыхъ клѣтокъ происходитъ не во всѣ брюшные сомиты, а лишь въ тѣ, которые лежатъ ближе всего къ половому зачатку, т.-е. въ сомиты третьего и четвертаго брюшного сегментовъ (so). Только въ сомитахъ этихъ двухъ сегментовъ и можно найти половыя клѣтки въ началѣ стадіи G, когда желтокъ, наконецъ, больше уже не содержитъ половыхъ элементовъ. Какъ хорошо видно на поперечныхъ разрѣзахъ черезъ задній конецъ зародыша (напримѣръ на рис. 60, изображающемъ такой разрѣзъ черезъ третій сегментъ брюшка), половыя клѣтки (gz) виѣдряются въ висцеральную стѣнку сомитовъ и остаются въ ней, образуя здѣсь впослѣдствіи гонады. Отъ элементовъ самого сомита эти клѣтки рѣзко отличаются, во первыхъ, своей нѣсколько болѣею величиной, а затѣмъ и болѣе свѣтлой окраской, особенно ядра. Последнее, какъ легко это выяснитъ при большихъ увеличеніяхъ (см. рис. 61, изображающій половыя клѣтки при увеличеніи въ 1100 разъ), происходитъ благодаря малому количеству хроматина въ ядрахъ. Та же особенность отличаетъ половыя клѣтки отъ соматическихъ по Neumons'у (1895, 1897a) у *Lepisma* и *Orthoptera* и, вѣроятно, присуща многимъ другимъ насѣкомымъ (см. наблюденія Schwangart'a (1905) надъ *Lepidoptera*, Hasper'a (1911) надъ *Chironomus* и др.).

Съ перемѣщеніемъ изъ желтка въ сомиты половыя клѣтки однако не теряютъ своей способности къ активному движенію, и оно продолжается и въ сомитахъ. — Въ концѣ стадіи G въ сомитахъ четвертаго брюшного сегмента половыхъ клѣтокъ наблюдается уже гораздо меньше, чѣмъ раньше, но зато теперь мы находимъ ихъ не только въ этомъ и въ третьемъ сегментѣ, а и во второмъ, гдѣ ихъ до того не было. На слѣдующей стадіи H въ четвертомъ абдоминальномъ сегментѣ половыхъ клѣтокъ совсѣмъ не оказывается, но ихъ можно найти теперь уже не только въ сомитахъ второго, но и перваго брюшного сегмента (см. разрѣзъ черезъ послѣдній на рис. 69 — gz). Словомъ, въ началѣ половыхъ клѣтки сосредоточены лишь въ сомитахъ четвертаго и третьего сегмента, а затѣмъ ихъ можно найти съ перваго по третій брюшной сегментъ, что, конечно, опять таки объяснимо

лишь их активным переползанием вперед. На этом движение половых клеток заканчивается, и в первых трех абдоминальных сегментах из них формируются на стадии Н гонады.

На фронтальном разрезе через заднюю часть брюшка, изображенном на рис. 67, мы видим уже обр сформировавшиеся гонады (gon). Каждая из них не имеет внутри никакой полости и представляет плотное скопление половых клеток, окруженных обычно крайне нбжными и далеко не всегда замбтными клетками, произошедшими из той спланхической стбнки первичных сегментов, в которую и вбдрались из желтка половые клетки. Эти произошедшие из стбнок сомитов элементы (на нашем рисунке они не изображены) представляют из себя, очевидно, фолликулярные клетки гонады. Как видно на том же рис. 67, от заднего конца правой гонады отходит половой проток (gd), проходящий через весь четвертый брюшной сегмент. Его положение и строение показывает, что он образуется из висцеральной же стбнки сомита четвертого брюшного сегмента, в которую раньше вбдрались половые клетки из желтка. Для Pterygota характерно, что их половые протоки являются первоначально плотными (как и гонады): как обстоит дблo у *Isotoma cinerea*, в виду крайне незначительной величины этого образования я затрудняюсь сказать. Точно также мнб не удалось ничего выяснить относительно соединения половых протоков правой и лбвой стороны друг с другом и закладки непарного концевой отдблa полового аппарата, который у Pterygota возникает из эктодермы.

Такой вид половой аппарат сохраняет и при вылуплении изотомы из яйца: в первых трех брюшных сегментах расположена пара плотных гонад, лежащих вентрально от кишечника (что отличает Apterygota от Pterygota), в четвертом же сегменте пара идущих от них назад половых протоков, имбющих общее происхождение с фолликулярной стбнкой гонады, т.-е. развивающихся, как и она, из спланхической стбнки сомитов. Концевой непарный отдбл половой аппарата ни на стадии J, ни у только что вылупившихся личинок не был совсем замбтен, что однако не говорит обр его отсутствию, а скорее объясняется разрушением при фиксировке этого нбжного образования. По крайней мбре Miss Claypole наблюдала у *Anurida* эктодермальный половой проток, образующийся путем впячивания на заднем конце пятого брюшного сегмента.

Нельзя не отмбтить различия между строением гонад у только что вылупившейся личинки и их строением у взрослой формы.

Как известно, для семейства Entomobryidae, к которому относится наша изотома, характерно присутствие двойных гонад, образованных каждая из двух лопастей: lobus externus и lobus internus, как называли их в свое время Tullberg (1871). Кроме того эти гонады доходят обыкновенно до конца четвертого брюшного сегмента, на границе которого с пятым и происходит соединение их коротких парных протоков (oviductus или vasa deferentia) в общий непарный проток (vagina или ductus ejaculatorius). Напротив, в низшем семействе Collembola, у Poduridae, гонады простые и кончаются нбсколько раньше: обыкновенно уже в начале четвертого брюшного сегмента. Таким образом, строение гонад у только что вылупившейся изотомы гораздо более похоже на их строение у низших Collembola, Poduridae, стадию которых она в это время как бы проходит, а особенности, свойственные семейству Entomobryidae, появляются позже. В этом я вполне могу подтвердить наблюдения над постэмбриональной дифференцировкой гонад у Collembola Willem'a (1900), согласно которым развитие их в этих двух семействах начинается с общей начальной стадии. На чисто внешнее сходство вылупившейся из яйца изотомы с представителями таких родов, как *Achorutes* и *Onychiurus* (*Lipura*), указывал в своей работе о развитии *Isotoma walkerii* еще Packard.

В общем, развитие половых органов у *Isotoma cinerea* крайне напоминает этот процесс у высших насекомых, где он впервые был детально изучен Heumons'ом (1891, 1895), наблюдения которого были подтверждены и другими исследователями. Подобно изотоме у многих Pterygota имбется рано обособляющийся и независимый от пластов половой зачаток, клетки которого у нбкоторых форм также чисто активно переползают из желтка в ткани зародыша и активно же странствуют из задних сомитов в передние. Вбдрение половых клеток у Pterygota, как и у нашей изотомы, происходит в спланхическую стбнку сомита, в тот ее отдбл, который Heumons называл Geschlechtsleiste. Наконец, и парные половые протоки у Pterygota тоже являются производными сомитов, развиваясь из висцеральной стбнки задних сомитов. Последнее обстоятельство, как уже не раз отмбчалось, дблает довольно вброятным взгляд на них, как на гомологи нефридиев. Описанное нами выше развитие головных нефридиев изотомы также вполне говорит в пользу этого взгляда. Единственным отличием Apterygota от Pterygota является отсутствие у первых связи

между зачатком гонады и перикардальной септой при помощи так называемого подвѣска гонады (Endfadenplatte). Объясняется это, конечно, тѣмъ, что у низшихъ насѣкомыхъ, точно также какъ у *Diploroda*, гонады лежатъ вентрально отъ кишечника, тогда какъ у высшихъ насѣкомыхъ и *Chiloroda* дорзально отъ него.

Совпадая, такимъ образомъ, съ данными о развитіи половых органовъ *Pterygota*, наши наблюденія во многомъ расходятся съ наблюденіями Miss Claypole надъ развитіемъ половых органовъ у *Anurida maritima*. Такъ какъ послѣднія были до сихъ поръ единственными данными о развитіи полового аппарата у *Collembola*, то мы должны на нихъ остановиться.

По наблюденіямъ Miss Claypole половыя клѣтки образуются у зародышей *Anurida* въ стѣнкахъ сомитовъ второго и третьяго абдоминальныхъ сегментовъ, при чемъ судьба ихъ можетъ быть двойной. Въ одномъ случаѣ онѣ остаются въ самомъ сомитѣ и, размножаясь въ немъ, даютъ гонаду, первоначально отдѣленную отъ желтка спланхническимъ слоемъ мезодермы. Въ другомъ случаѣ такая клѣтка выходитъ изъ сомита и превращается въ кучку клѣтокъ между мезодермой и желткомъ: часть этого скопленія („stationary germ cells“) остается попрежнему на этомъ мѣстѣ, другая же часть („migrating germ cells“) уходитъ въ желтокъ. Затѣмъ у автора имѣлся перерывъ въ наблюденіяхъ, но онъ утверждаетъ, что и изъ этихъ кучекъ клѣтокъ въ свою очередь образуются гонады (быть можетъ, мужскія въ отличие отъ женскихъ, возникающихъ первымъ путемъ?—это осталось для меня совершенно неяснымъ). Въ результатѣ гонады вылупившейся изъ яйца *Anurida* содержатъ въ своей полости желтокъ, идущій на питаніе половыхъ элементовъ; кромѣ того онъ попадаетъ и въ кровяныя тѣльца, но совершенно не содержится въ средней кишкѣ, лишенной его, какъ у зародышей *Diploroda*.

Хорошіе рисунки, которыми иллюстрируется это довольно неясное описаніе, позволяютъ разобраться въ наблюденіяхъ Miss Claypole и отличить въ нихъ вѣрное отъ ошибочнаго. —Первый путь развитія половыхъ клѣтокъ въ сомитахъ и возникновеніе изъ нихъ тамъ гонадъ (рис. 50, 52, 53, 58 въ ея работѣ) совершенно совпадаетъ съ тѣмъ, что мы видѣли и у *Isotoma cinerea*. На рисункахъ же 55—57, иллюстрирующихъ второй путь развитія половыхъ клѣтокъ внѣ сомитовъ и ихъ внѣдреніе въ желтокъ, мы видимъ не что иное, какъ описанное уже нами у изотомы расползаніе клѣтокъ заключеннаго раньше въ желткѣ полового зачатка и ихъ внѣдреніе въ брюшныя сомиты. Ошибка Miss Claypole заключалась въ томъ, что она была увѣрена въ

возникновеніи половыхъ клѣтокъ изъ стѣнокъ сомитовъ, почему и приняла расползаніе клѣтокъ полового зачатка и внѣдреніе ихъ въ сомиты за описанный ею второй способъ развитія половыхъ клѣтокъ внѣ сомитовъ. На самомъ дѣлѣ ея рисунки 50—58 изображаютъ тотъ единственный путь развитія гонадъ, который имѣетъ мѣсто и у нашей изотомы: рисунки 55—57 относятся къ первой фазѣ этого процесса — внѣдренію клѣтокъ полового зачатка изъ желтка въ сомиты, а остальные ко второй, т.-е. образованию въ этихъ сомитахъ гонадъ. —Эти рисунки служатъ между прочимъ и доказательствомъ высказанной нами раньше мысли, что такой же половой зачатокъ, какъ у *Isotoma cinerea*, имѣется, вѣроятно, у многихъ другихъ *Collembola*, въ томъ числѣ и у *Anurida maritima*.

Что касается до желтка въ гонадахъ вылупившагося животного, то у изотомы я ничего подобнаго не наблюдалъ. Отрицать на основаніи этого его присутствіе тамъ и у *Anurida* было бы слишкомъ смѣло, но все же я долженъ оговориться, что и это наблюденіе мнѣ кажется сомнительнымъ. Miss Claypole окрашивала свои препараты оранжемъ G, который краситъ не только желтокъ, но и всевозможныя оксифильныя (альбуминоидныя) зерна, распространенныя довольно широко у *Collembola* [о нихъ смотри одну изъ моихъ прежнихъ работъ (1906)]. На рис. 64 въ работѣ Claypole изображены несомнѣнно эти зерна (f. g.), но авторъ считаетъ и ихъ остатками желтка. Быть можетъ, подобныя же желточныя зерна были и въ половыхъ органахъ вылупившейся изъ яйца ануриды? —Наблюденіе Miss Claypole объ плотномъ зачаткѣ средней кишки, какъ у *Diploroda*, и объ отсутствіи въ ея полости желтка, какъ видно изъ того же рис. 64 въ ея работѣ, глубоко ошибочно, такъ какъ на этомъ рисункѣ какъ разъ изображена средняя кишка, еще густо наполненная желткомъ. Въ текстѣ авторъ называетъ ее „a large irregular sac filled with yellow material“ и ставитъ въ какую-то (не вполне понятную мнѣ) связь съ половымъ аппаратомъ. —Словомъ, всѣ рисунки въ работѣ Miss Claypole (при томъ очень тщательно исполненные) самымъ рѣшительнымъ образомъ говорятъ противъ того, что она пишетъ въ ней о развитіи полового аппарата, и изъ нихъ, напротивъ, можно легко заключить, что его развитіе у *Anurida* протекаетъ, какъ у *Isotoma*, т.-е. по тому же типу, который имѣетъ мѣсто и у *Pterygota* и у *Apterygota*.

При развитіи гонадъ *Anurida* въ нихъ рано дифференцируется узкое „cephalic elongation“ или лигаментъ, который является продолженіемъ гонады впередъ и, не заключая въ себѣ половыхъ

клетокъ, состоитъ изъ однихъ мезодермальныхъ элементовъ. Miss Claupole видитъ въ немъ остатокъ передняго полового протока гонады, открывавшагося когда то, какъ теперь у *Symphyla* и *Diplopoda*, въ первомъ брюшномъ сегментѣ.

У нашей изотомы подобная особенность не выражена, но тѣмъ не менѣе мысль эта кажется мнѣ очень вѣроятной. Теорія о присутствіи у предковъ насѣкомыхъ двухъ паръ половыхъ отверстій—одной въ концѣ брюшка, другой въ четвертомъ туловищномъ сегментѣ была высказана уже давно Grassi (1888), который указывалъ для доказательства ея на присутствіе у *Camptodea* между ея рудиментарными ножками перваго брюшнаго сегмента зоны особыхъ волосковъ, являющихся вторичнымъ половымъ признакомъ самца. Позже мнѣ удалось обнаружить у этой формы присутствіе подъ означенными волосками скопленій своеобразныхъ одноклеточныхъ железъ, присутствующихъ тоже лишь у самцовъ (1905а). Сопоставляя эти факты съ наблюденіями Miss Claupole о ранней закладкѣ лигамента *Anurida*, нельзя не признать теоріи Grassi довольно вѣроятной.

VII. Общая часть.

1. О раннемъ обособленіи полового зачатка у насѣкомыхъ.

Двадцать лѣтъ тому назадъ въ классическомъ учебникѣ эмбриологии безпозвоночныхъ Korschelt u. Heider'a (1892) для насѣкомыхъ было указано лишь два случая ранняго обособленія полового зачатка, именно у *Diptera* и у *Aphidae*: случаи, открытые еще Мечниковымъ въ 1866 году и подтвержденные затѣмъ рядомъ позднѣйшихъ изслѣдователей. Авторы двухъ специальныхъ изслѣдованій по развитію половыхъ органовъ у насѣкомыхъ, вышедшихъ приблизительно въ это же время, Heymons (1891) и Wheeler (1893) также поддерживали взглядъ о мезодермальномъ происхожденіи ихъ половыхъ клетокъ, какъ у аннелидъ. Однако въ настоящее время описано уже столько случаевъ ранней и независимой отъ зародышевыхъ пластовъ дифференцировки этихъ клетокъ, что скорѣе можно считать именно этотъ способъ правиломъ, а случаи мезодермальнаго происхожденія исключеніемъ, тѣмъ наоборотъ.

Въ 1895 году Heymons устанавливаетъ раннее происхожденіе полового зачатка у *Forficula* и *Orthoptera* и измѣняетъ свой прежній взглядъ, считая теперь, что половыя клетки—образованія *sui generis* и не относятся ни къ одному пласту. По дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ того же автора (1896а, 1897а) столь же рано онѣ обособляются у *Lepisma*, а, можетъ быть, и у стрекозъ.

Немного позже Lécaillon (1898) находитъ совершенно тѣ же отношенія при развитіи жуковъ-листоѣдовъ (*Chrysomelidae*), что было затѣмъ подтверждено Friederichs'омъ (1906), Hirschler'омъ (1909) и Hegner'омъ (1909). Очень вѣроятной раннюю закладку полового зачатка считаетъ и Saling (1907) для *Tenebrio molitor*.

У бабочек то же самое было описано еще в старой работе Woodworth'a о развитии *Vanessa antiopa* (1889), а затем найдено Schwangart'ом (1905) у *Endromis*, *Sphinx* и *Zygaena*.— Сюда же относятся наблюдения Петрункевича над происхождением половых клеток у трутня (1903), хотя описанный им случай (происхождение из направительных тѣлец) стоит совершенно особняком среди всѣхъ другихъ.

У *Isotoma cinerea*, какъ мы видѣли выше, половой зачатокъ совершенно ясно обособленъ къ тому времени, когда яйцо покрывается бластодермой, при чемъ дифференцировка послѣдней на первичные зародышевые листы происходитъ позже. Этотъ зачатокъ остается здѣсь долгое время въ видѣ самостоятельной кучки клетокъ въ желткѣ, и лишь въ началѣ четвертаго періода развития происходитъ внѣдреніе половых клетокъ въ сомиты. Выше же было отмѣчено, что весь половой зачатокъ, очень возможно, происходитъ изъ одной опредѣленной клетки 16-или 32-клеточной стадіи, хотя вполне точно мнѣ и не удалось этого установить. Если подобное допущеніе справедливо, мы имѣли бы у *Isotoma* почти столь же раннее обособленіе половых клетокъ, какъ описанное недавно Hasper'омъ у *Chironomus* (1911).—Наконецъ, сравненіе прежнихъ данныхъ по развитію *Collembola* съ эмбриологіей нашей *Isotoma* позволяетъ думать, что и у нѣкоторыхъ другихъ представителей этого отряда имѣетъ мѣсто столь же раннее обособленіе полового зачатка, какъ и у этой формы.

Collembola заканчиваютъ собой въ этомъ отношеніи рядъ подобныхъ же случаевъ въ другихъ группахъ, и теперь съ полнымъ правомъ можно сказать, что нѣтъ ни одного болѣе крупнаго отряда насѣкомыхъ, въ которомъ не было бы извѣстно одного или нѣсколькихъ случаевъ обособленія половых клетокъ до обособленія зародышевыхъ пластовъ и совершенно независимо отъ нихъ. Въ этомъ вопросѣ отрицательныя данныя больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, лишены всякаго значенія: если у зародышей того или другого насѣкомаго половыя клетки замѣчены лишь послѣ образованія сомитовъ, то, опираясь на рядъ противоположныхъ положительныхъ данныхъ, гораздо правильнѣе предположить, что или изслѣдователь не обратилъ на нихъ вниманія на раннихъ стадіяхъ развитія, или же сами клетки въ это время еще неразличимы отъ другихъ. Оба этихъ предположенія относятся къ числу вполне допустимыхъ: достаточно вспомнить, какую роль часто играетъ та или иная фиксировка или окраска, безъ которой во многихъ случаяхъ извѣстныя особенности строенія

остаются совершенно незамѣтными, чтобы признать первое предположеніе вполне допустимымъ для работъ даже наиболѣе выдающихся изслѣдователей. Что касается до второго предположенія, то разъ намъ извѣстны неразличимые морфологически „физиологическіе“ виды, очевидно, болѣе чѣмъ возможны случаи полного внѣшняго сходства уже дифференцированной половой клетки съ окружающими ее соматическими.

Въ настоящее время, какъ мнѣ кажется, вполне возможно формулировать вопросъ о происхожденіи половых клетокъ у насѣкомыхъ слѣдующимъ образомъ: правиломъ для всѣхъ насѣкомыхъ является обособленіе половых клетокъ еще до дифференцировки зародышевыхъ слоевъ изъ клетокъ бластодермы, а иногда даже изъ опредѣленныхъ клетокъ дробленія; въ нѣкоторыхъ случаяхъ дифференцированныя, вѣроятно, уже раньше половыя клетки становятся замѣтными лишь въ стѣнкахъ сомитовъ.

Однако весьма вѣроятно, что эту формулировку можно распространить не только на всѣхъ насѣкомыхъ, но и на другіе классы членистоногихъ. Укажемъ на многочисленныя данныя подобнаго рода для ракообразныхъ, а именно на наблюденія Grobben'a (1879), Шимкевича и Педашенко (1893—цитир. по Шимкевичу), Ю. Вагнера (1896), Näcker'a (1897) и Педашенко (1899), относящіяся къ представителямъ самыхъ различныхъ отрядовъ этого класса. Для паукообразныхъ имѣются совершенно аналогичныя данныя по отношенію къ сѣнокосямъ [Фаусекъ (1891) и исправленіе этого наблюденія Шимкевичемъ (1898)], скорпиону [Brauer (1894)] и сольпугѣ [Neumons (1905)]; здѣсь же можно упомянуть объ интересныхъ соображеніяхъ Шимкевича (1906) по поводу значенія stimulus primitivus у зародышей пауковъ. Наконецъ, раннее обособленіе полового зачатка очень вѣроятно и для одного изъ представителей многоножекъ, именно для сколопендры, по наблюденіямъ Neumons'a (1901). Совершенно отсутствуютъ подобныя данныя для *Onychophora*, но ихъ развитіе, не смотря на довольно большое число работъ, изучено еще не вполне достаточно.

Такимъ образомъ, во всякомъ случаѣ для насѣкомыхъ, а вѣроятно, и для всѣхъ членистоногихъ раннее и независимое отъ пластовъ обособленіе полового зачатка является правиломъ, и этотъ случай нужно считать первичнымъ, на что указывали уже въ своихъ работахъ, между прочимъ, Neumons (1895), Ю. Вагнеръ (1896) и Педашенко (1899).

Обсужденіе вопроса о развитіи половых клетокъ въ дру-

гихъ типахъ животнаго царства выходить уже изъ рамокъ настоящей работы, но все же я не могу не отмѣтить, что распространение этого взгляда и на всѣхъ Metazoa кажется мнѣ наиболѣе вѣроятнымъ и наиболѣе гармонирующимъ со всѣмъ, что известно вообще о половыхъ клѣткахъ и объ ихъ отношеніи къ соматическимъ. — Правда, въ другихъ типахъ известно значительно меньшее число случаевъ ранней дифференцировки полового зачатка [я не привожу ихъ списка, такъ какъ сводка по этому вопросу имѣется во второмъ изданіи учебника Korschelt u. Heider'a (1902)], но при этомъ нужно имѣть въ виду слѣдующее. Во-первыхъ, эти случаи разбросаны положительно по всему животному царству, встрѣчаясь у столь далеко стоящихъ другъ отъ друга животныхъ, какъ *Sagitta*, *Ascaris*, *Teleostei* и *Selachia*, *Mollusca* и, повидимому, даже *Coelenterata*. Во-вторыхъ же, вопросъ этотъ по отношенію къ цѣлому ряду формъ, о развитіи которыхъ имѣются лишь работы, сдѣланные 20—30 лѣтъ тому назадъ, еще ждетъ своего переизслѣдованія. Что такое переизслѣдованіе съ помощью болѣе новыхъ методовъ можетъ дать очень многое, видно изъ сравненія того, сколько случаевъ ранняго обособленія полового зачатка у насѣкомыхъ было известно до 1895 года и сколько ихъ мы знаемъ теперь.

Мы остановились здѣсь болѣе подробно на этомъ вопросѣ, хотя взглядъ, что раннее обособленіе полового зачатка есть явленіе первичное, имѣетъ уже довольно много сторонниковъ, отчасти и потому, что возраженія противъ него дѣлались какъ разъ въ нѣкоторыхъ работахъ по эмбриологіи членистоногихъ. На этихъ возраженіяхъ слѣдуетъ немного остановиться.

Мы отмѣчали уже, что Heymons въ своей работѣ о эмбриональномъ развитіи *Dermaptera* и *Orthoptera* (1895) поддерживалъ теорію о независимости половыхъ клѣтокъ отъ пластовъ и у насѣкомыхъ и во всемъ животномъ царствѣ. Его дальнѣйшія работы дали рядъ новыхъ примѣровъ подобнаго же рода, но въ одной изъ послѣднихъ онъ, какъ мнѣ кажется, снова рѣзко мѣняя свой взглядъ, пишетъ: „Es unterliegt keinem Zweifel, dass es bei denn letztgenannten Insekten (съ раннимъ обособленіемъ полового зачатка) wohl erst secundär zu einer solchen Beschleunigung in der deutlichen Absonderung und Differenzierung der Fortpflanzungszellen gekommen sein wird, denn die Verlegung der Genitalzellenbildung in die frühesten Stadien des Embryonallebens hinein kann unmöglich als eine ursprüngliche Eigenschaft aufgefasst werden“ (1901 S. 186). — Мнѣ тѣмъ болѣе непонятна причина этой новой точки зрѣнія автора, что у зародышей той же

сколопендры, къ которой относится эта работа, онъ считаетъ очень вѣроятнымъ присутствіе на заднемъ концѣ зародышеваго диска особой кучки клѣтокъ, обособляющихся ко времени образованія зародышевыхъ пластовъ и играющихъ роль „Träger des Keimplasmas, welches... bei den Eiern aller oder doch wenigstens der Mehrzahl der Arthropoden am vegetativen Eipole oder dem Hinterende der Keimanlage gelegen ist.“ (S. 187).

Въ цитированной уже не разъ работѣ Hirschler'a о развитіи *Donacia* (1909b) мы также находимъ взглядъ, что раннее обособленіе половыхъ клѣтокъ и у этой формы и у другихъ насѣкомыхъ — явленіе вторичное. Авторъ считаетъ его новообразованиемъ въ классѣ насѣкомыхъ, такъ какъ оно отсутствуетъ у *Onychophora*, *Myriopoda* и *Apterygota*. — Однако послѣднее утвержденіе явно неправильно, такъ какъ уже задолго до появленія работы Hirschler'a имѣлись наблюденія подобнаго рода Heymons'a надъ сколопендрой и ленизой. Что *Apterygota* характеризуются скорѣе раннимъ обособленіемъ полового зачатка, чѣмъ отсутствіемъ этой особенности, было показано выше. Среди многоножекъ достаточно хорошо изслѣдована въ эмбриологическомъ отношеніи пока только сколопендра, новыя же изслѣдованія надъ развитіемъ *Onychophora* тоже въ высшей степени желательны, хотя, конечно, если даже здѣсь и не будетъ обнаружено этого явленія, то это еще ничего не будетъ говорить противъ нашей точки зрѣнія.

Довольно интересный взглядъ на раннее обособленіе половыхъ клѣтокъ принадлежитъ Шимкевичу: онъ былъ высказанъ имъ еще въ 1896 году и болѣе подробно развитъ въ его работѣ о развитіи телифона (1906). Согласно этому взгляду, на всѣ случаи подобнаго рода слѣдуетъ смотрѣть, какъ на переходъ къ телобластической закладкѣ половыхъ органовъ: „berücksichtigt man jedoch die Fälle von noch frühzeitigerer Differenzierung der Genitalanlage, so kann man diese als Anzeichen einer teloblastischen Anlage der Genitalanlage betrachten“ (S. 15 отдѣльнаго оттиска)¹⁾. Это воззрѣніе было принято и сторонниками *Genitocöltheorie*—Е. Meyer'омъ (1901) и Lang'омъ (1903).

Нѣкоторые случаи ранняго обособленія половыхъ клѣтокъ у насѣкомыхъ, напримѣръ у *Diptera* въ видѣ нѣсколькихъ полярныхъ клѣтокъ на заднемъ концѣ яйца, дѣйствительно, напоминаютъ развитіе при помощи телобластовъ. Однако къ другимъ

¹⁾ Отмѣтимъ, что въ рядѣ другихъ статей цитируемый авторъ склоняется къ взгляду на половыя клѣтки, какъ на нѣчто независимое отъ зародышевыхъ пластовъ или какъ на особый пластъ—генитодерму.

случаямъ того же рода трудно прилагать этотъ взглядъ, не дѣлая большой натяжки: укажу хотя бы на *Forficula* и *Orthoptera*, гдѣ происходитъ погруженіе въ желтокъ при помощи половой бороздки (*Genitalgrube*) сразу цѣлой кучки клѣтокъ, на подобныя же отношенія у зародышей бабочекъ по *Schwangart'y* (1905) или на многоклѣточный половой зачатокъ у нашей изотомы. Такъ же обстоитъ дѣло по *Bräuer'y* (1894) у скорпіона и, если вѣрны соображенія Шимкевича о значеніи *simulus*, и у пауковъ.

Правда, не исключается возможность, даже пожалуй болѣе вѣроятно, что во всѣхъ этихъ случаяхъ многоклѣточный зачатокъ беретъ свое начало отъ одной опредѣленной клѣтки известной стадіи дробленія и, быть можетъ, даже локализованъ уже въ известной части яйца. Однако подобное развитіе можетъ быть названо детерминативнымъ, а отнюдь не телобластическимъ: эти же два понятія, конечно, другъ съ другомъ не совпадаютъ и не являются синонимами. — Детерминація полового зачатка отнюдь не препятствуетъ смотрѣть на его раннее обособленіе, какъ на первичное явленіе, такъ какъ считать, что и мозаичное развитіе подобно телобластическому выработалось въ цѣляхъ ускоренія развитія и носить вторичный характеръ, послѣ работъ послѣднихъ лѣтъ, мнѣ думается, едва ли возможно. Теперь скорѣе можно поддерживать какъ разъ обратное воззрѣніе.

Что касается до тѣхъ случаевъ, когда при ранней дифференцировкѣ полового зачатка его развитіе напоминаетъ телобластическій способъ, то правильнѣе предполагать, что послѣдній развился здѣсь уже въ предѣлахъ бывшаго еще до того ранняго же обособленія этого зачатка. Въ пользу именно такого взгляда я могу указать на другое сходное явленіе при развитіи насѣкомыхъ, именно на образованіе ихъ нервной системы всегда по телобластическому способу, изъ невробластовъ. *Wheeler* (1893) пытался провести гомологію между ними и невротелобластами *Oligochaeta* и *Hirudinea*, но *Heymons* (1895) доказалъ полную неприемлемость такой точки зрѣнія и установилъ, что въ данномъ случаѣ можетъ быть рѣчь лишь о двухъ аналогичныхъ процессахъ. Какъ телобластическая закладка нервной системы произошла у насѣкомыхъ чисто вторично и, несомнѣнно, позже и независимо отъ другихъ особенностей ея развитія, общихъ и насѣкомымъ и другимъ членистоногимъ, такъ и полярныя клѣтки *Diptera* и подобные имъ половые телобласты у другихъ *Arthropoda* возникли независимо другъ отъ друга и уже послѣ общей для всѣхъ членистоногихъ особенности — ранняго обособленія полового зачатка.

Что касается до отношенія этого явленія къ *Genitocöltheorie*, то мы не будемъ здѣсь останавливаться на этомъ вопросѣ: послѣдняя кажется мнѣ только гипотезой, а раннее обособленіе полового зачатка — фактъ, истолкованіе значенія котораго нельзя ставить, конечно, въ зависимость отъ той или иной гипотезы. — Признаніе же въ настоящее время независимости половыхъ клѣтокъ даже отъ первичныхъ зародышевыхъ пластовъ (что дѣлаютъ, между прочимъ, и *Korschelt* и *Heider* во второмъ изданіи своего учебника) является, какъ мнѣ кажется, вполне обоснованнымъ имѣющимися наблюденіями.

2. Значеніе желточныхъ клѣтокъ у членистоногихъ.

Говоря выше о развитіи средней кишки, мы коснулись и взгляда на желточные клѣтки, какъ на энтодерму. Пользувавшийся раньше полнымъ признаніемъ, на время почти оставленный и затѣмъ снова возродившійся въ теоріи *Heymons'a* взглядъ этотъ по отношенію къ насѣкомымъ не можетъ уже болѣе поддерживаться въ настоящее время. Первичной энтодермой ихъ является нижній листъ, и средняя кишка беретъ всюду начало не изъ желточныхъ клѣтокъ, а изъ элементовъ этого нижняго листа. — Наши наблюденія надъ *Isotoma cinerea* интересны въ томъ отношеніи, что они доказываютъ подобное же происхожденіе средней кишки и у *Apterygota*, служившихъ до тѣхъ поръ главной цитаделью для теоріи *Heymons'a*. „Für die Gruppe der Insekten durch die Untersuchungen an *Lepisma saccharina* zum erstenmal mit Sicherheit und Bestimmtheit das Entoderm als solches nachgewiesen worden ist“, пишетъ послѣдній въ своей работѣ о развитіи *Scolopendra* (1901 S. 202). Выше мы видѣли, что эта точка зрѣнія едва ли правильна.

Правда, въ эмбриологіи *Pterygota* имѣется нѣсколько болѣе новыхъ изслѣдованій, подтверждающихъ взглядъ на участіе желточныхъ клѣтокъ въ образованіи *mesenteron*: сюда относятся работы *Tschuproff'ой* (1903), *Dickel'a* (1904) и *Schwangart'a* (1904, 1905). Однако первый авторъ описываетъ въ то же время происхожденіе передней и задней трети средней кишки въ видѣ выростовъ *stomo-* и *proctodaeum*, и это заставляеть насъ вообще отнестись съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ ко всѣмъ его наблюденіямъ, такъ какъ всѣ случаи подобнаго рода теперь можно считать основанными на ошибкѣ. *Dickel* и *Schwangart*, признавая желточные клѣтки энтодермой, основываются главнымъ

образомъ на косвенныхъ данныхъ, а не на прямыхъ наблюденияхъ и затѣмъ на теоретическихъ соображеніяхъ. Такъ, Schwangart указываетъ при этомъ, на то, что онъ наблюдалъ всѣ переходы отъ „blasige Zellen“, образующихъ кишку, къ настоящимъ желточнымъ клѣткамъ, что заставляетъ его допустить участіе въ образованіи mesenteron и послѣднихъ. Наличие подобныхъ переходовъ не была подтверждена затѣмъ Hirschler'омъ (1906), но если даже они и существуютъ, ихъ, конечно, гораздо легче объяснить происхожденіемъ части желточныхъ элементовъ насчетъ „blasige Zellen“, а отсюда до признанія желточныхъ клѣтокъ за энтодерму еще далеко. Нельзя вообще не отмѣтить, что въ работахъ Dickel'я и Schwangart'a чувствуется слишкомъ большое вліяніе Coelomtheorie, которое заставило ихъ описать столь странное образованіе, какъ „дорзальный blastopore“, оказавшійся затѣмъ по наблюдениямъ Hirschler'a (1909a и b) просто рудиментомъ спинного органа Collembola и другихъ Arthropoda. — Нельзя не согласиться теперь поэтому со словами Nusbaum и Fulinski въ ихъ послѣдней работѣ, которые пишутъ: „Die Vitellophagen der Insecten als Entoderm zu bezeichnen, halten wir für ganz urberichtigt“ (1909 S. 347), и наблюдения надъ развитіемъ изотомы лишь подтверждаютъ этотъ взглядъ.

Выше мы говорили уже о томъ, что и для Myriopoda и Arachnoidea участіе желточныхъ клѣтокъ въ образованіи средней кишки нужно считать теперь совершенно исключеннымъ, такъ какъ она и у нихъ возникаетъ по новымъ наблюдениямъ изъ элементовъ нижняго листка, какъ у насѣкомыхъ.

Довольно большое число данныхъ объ образованіи средней кишки изъ желточныхъ клѣтокъ имѣется до сихъ поръ по отношенію къ Crustacea [см. хорошую сводку во второмъ изданіи учебника Korschelt и Heider'a (1910)]. Однако здѣсь бросается въ глаза, что число такихъ данныхъ возрастаетъ въ болѣе старыхъ работахъ и замѣтно убываетъ во всѣхъ болѣе новыхъ, гдѣ происхожденіе кишки описывается уже иначе, и это обстоятельство сильно говоритъ въ пользу того, что и у Crustacea послѣ переислѣдованія всѣхъ этихъ отношеній, какъ это было у Insecta, придется оставить старое воззрѣніе, будто вителлофаги образуютъ среднюю кишку. По крайней мѣрѣ и теперь Nusbaum, отказываясь въ приведенной выше цитатѣ видѣть въ желточныхъ клѣткахъ насѣкомыхъ ихъ энтодерму, находитъ возможность мотивировать это тѣмъ, что „auch bei sehr vielen Crustaceen ausser den gut ausgesprochenen Entoderm- und Meso-

dermelementen undifferenzierte und zugrunde gehende Vitellophagen in Dotter hervortreten“. Отмѣтимъ, наконецъ, что и у Onychophora прежніе авторы видѣли энтодерму въ желточныхъ клѣткахъ, между тѣмъ въ болѣе новой работѣ Evans (1902) говорить уже о самостоятельной энтодермѣ, изъ которой лишь возникаютъ позже вителлофаги [принимающіе все-таки по его наблюдениямъ участіе въ образованіи средней кишки, сомнительность чего указана уже Heider'омъ (1910)].

Словомъ, имѣющіяся у насъ теперь данныя сильно говорятъ за то, что не только у насѣкомыхъ, многоножекъ и пауковъ (гдѣ это можно считать вполне доказаннымъ), но, вѣроятно, и у всѣхъ членистоногихъ желточные клѣтки не принимаютъ никакого участія въ построеніи средней кишки, слѣдовательно, не являются и энтодермой. Признавъ это, мы должны теперь выяснить, какъ все же нужно смотрѣть на эти элементы.

Взглядъ на желточные клѣтки, какъ на энтодерму, возникъ главнымъ образомъ благодаря стремленію найти у насѣкомыхъ типичную двуслойную гастралу, за эктодерму которой была признана бластодерма, а за энтодерму желтокъ. Даже Neumons (1901) для иллюстраціи своихъ взглядовъ исходитъ изъ эпиболической гастралы аннелидъ и даетъ цѣлую схему превращенія ея макромеровъ и части микромеровъ въ желточные клѣтки и т. д. Мнѣ кажется, что въ области эмбриологіи подобныя филогенетическія спекуляціи даютъ очень мало, такъ какъ если мы и можемъ считать довольно вѣроятнымъ происхожденіе одной группы животныхъ отъ другой, то отсюда еще отнюдь не слѣдуетъ, что онтогенію первыхъ можно прямо производить изъ онтогеніи ихъ предковъ. Въ частности, происхожденіе насѣкомыхъ и вообще всѣхъ членистоногихъ отъ аннелидоподобныхъ формъ вполне вѣроятно, но откуда мы знаемъ, что послѣднія имѣли такую же гастралу, какъ современные аннелиды и т. д.? Результатомъ подобныхъ „филогеній онтогеній“ и является созданіе такихъ понятій, какъ „двойная гастралія“, „дорзальный blastopore“ и пр., польза которыхъ для эмбриологіи болѣе чѣмъ сомнительна. Между тѣмъ для установленія происхожденія и значенія желточныхъ клѣтокъ мы имѣемъ совершенно неоспоримыя фактическія данныя, къ разсмотрѣнію которыхъ и слѣдуетъ обратиться.

Присутствіе вителлофаговъ у членистоногихъ стоитъ несомнѣнно въ связи съ богатствомъ ихъ яицъ желткомъ и съ наличиемъ у нихъ поверхностнаго дробленія. Происхожденіе послѣдняго изъ полного тоже совершенно несомнѣнно, такъ какъ

имѣется рядъ формъ, у которыхъ дробленіе въ началѣ полное, а затѣмъ становится поверхностнымъ: эти именно случаи и являются особенно пригодными для выясненія значенія желточныхъ клѣтокъ. — Именно такой случай имѣетъ мѣсто у большинства *Collembola*, въ томъ числѣ и у нашей изотомы. При описаніи ея дробленія мы видѣли уже, что первоначально получается плотная морула, затѣмъ начинается выползаніе плазматическихъ массъ, т.-е. клѣтокъ дробленія, на поверхность яйца, а часть ихъ остается въ желткѣ, превращаясь въ вителлофаги (табл. I). Такимъ образомъ, послѣдніе являются просто оставшимися въ желткѣ бластомерами, которые въ дальнѣйшемъ не строятъ уже подобно выпедшимъ на поверхность тѣлу зародыша, а служатъ лишь для резорпціи желтка. Считать, что остаются въ желткѣ только будущіе энтодермальные элементы, нѣтъ рѣшительно никакихъ данныхъ, тѣмъ болѣе, что дифференцировка зародышевыхъ слоевъ наступаетъ гораздо позже и никакой разницы между бластомерами до этого незамѣтно.

Мнѣ кажется, что здѣсь онтогенія полностью повторяетъ филогенію: у предковъ современныхъ членистоногихъ дробленіе было полнымъ, но по мѣрѣ обогащенія ихъ яицъ желткомъ оно стало на своихъ послѣднихъ стадіяхъ (какъ еще теперь у *Collembola* и многихъ другихъ) переходить въ поверхностное и, наконецъ, превратилось въ типичное поверхностное. При этомъ клѣтки дробленія должны были уже выползати изъ желтка на поверхность яйца для образованія на ней тѣла зародыша, но въ то же время необходимо было, чтобы и въ желткѣ оставалось нѣкоторое количество клѣточныхъ элементовъ для его резорпціи. Послѣднее условіе было достигнуто тѣмъ, что часть бластомеровъ какъ бы застревала въ желткѣ и совсѣмъ не выползала на поверхность яйца, превращаясь въ вителлофаги. Съ этой точки зрѣнія, которая кажется мнѣ самой простой, а потому и наиболѣе вѣроятной, желточные клѣтки являются какъ во время онтогеніи, такъ и съ точки зрѣнія филогеніи просто застрявшими въ желткѣ бластомерами: такъ какъ это происходитъ до обособленія зародышевыхъ слоевъ, когда нѣтъ еще различія между продуктами дробленія, то связывать желточные клѣтки съ какимъ-нибудь пластомъ или видѣть въ нихъ энтодерму совершенно неправильно. Холодковский (1891) уже давно называлъ желточные клѣтки парабластомъ, понимая подъ этимъ продукты дробленія, не идущіе ни въ одинъ изъ пластовъ, и къ этому взгляду можно и теперь всецѣло присоединиться.

Таково морфологическое значеніе вителлофаговъ; что касается до ихъ физиологическаго значенія, то оно никогда не возбуждало особенныхъ сомнѣній. Правда, были попытки видѣть въ нихъ „Schützgerüst“ зародыша (Noack), но во всякомъ случаѣ большинство изслѣдователей считаетъ, что эти клѣтки играютъ главнымъ образомъ роль въ процессѣ усвоенія желтка, т.-е. являются эмбриональными трофоцитами, какъ очень удачно назвалъ ихъ Heymons.

Намъ остается теперь только сказать нѣсколько словъ о томъ, какой способъ происхожденія желточныхъ клѣтокъ слѣдуетъ считать за первичный. Какъ извѣстно, у однихъ насѣкомыхъ, какъ у нашей изотомы, желточные клѣтки образуются только изъ оставшихся въ желткѣ клѣтокъ дробленія, но гораздо чаще число ихъ кромѣ того пополняется отдѣленіемъ новыхъ элементовъ отъ бластодермы; наконецъ, у очень немногихъ формъ (напримѣръ, у *Campodea*, *Grylotalpa* и др.) всѣ продукты дробленія выходятъ на поверхность, и одно время желтокъ совершенно лишенъ клѣточныхъ элементовъ, при чемъ всѣ желточные клѣтки образуются затѣмъ отщепленіемъ отъ бластодермы. Первичнымъ явленіемъ, можетъ быть, конечно, или послѣдній способъ или первый, имѣющій мѣсто у *Isotoma cinerea*: наиболѣе распространенный случай — происхожденіе вителлофаговъ и изъ оставшихся въ желткѣ бластомеровъ и изъ бластодермы — является во всякомъ случаѣ переходомъ отъ одного изъ этихъ крайнихъ типовъ (первичнаго) къ другому (вторичному).

Долгое время за первичныя отношенія считались тѣ, которыя имѣютъ мѣсто у *Campodea* и *Grylotalpa*, т.-е. образованіе желточныхъ клѣтокъ исключительно насчетъ бластодермы. Этотъ взглядъ фигурировалъ и въ учебникѣ Korschelt u. Heider'a (1892) и въ работахъ многихъ позднѣйшихъ изслѣдователей; такъ же смотрѣлъ на это въ работѣ о развитіи *Dermaptera* и *Orthoptera* и Heymons (1895). Однако въ своей болѣе поздней работѣ о развитіи *Scolopendra* онъ мѣняетъ этотъ взглядъ и считаетъ, что удаленіе не всѣхъ, а только части бластомеровъ изъ желтка на поверхность является болѣе первичнымъ явленіемъ: „der ursprüngliche Entwicklungstypus, пишетъ онъ, besteht vermutlich darin, dass der Dotter bereits bei den ersten Teilungen abgefurcht wurde, dass die Dottersubstanz nicht intercellulär, sondern intracellulär verblieb, und das mithin die Segmentation eine totale war“ (1901, S. 22).

Я всецѣло присоединяюсь къ той точкѣ зрѣнія, которую выдвинулъ Heymons. Дѣйствительно, если считать желточные клѣтки

за энтодерму, то ихъ возникновение есть процессъ гастрюляции, и тогда тотъ случай, когда всѣ желточные клѣтки отдѣляются отъ бластодермы, есть явленіе первичное. Въ этомъ отношеніи Neumons дѣлаетъ все же маленькую непослѣдовательность, считая вителлофаги энтодермой и не признавая за ихъ отщепленіемъ отъ бластодермы первичнаго характера. Однако, если отрѣшиться отъ этого несостоятельнаго, теперь взгляда, то совершенно ясно, что Neumons вполне правъ и что за болѣе примитивное явленіе слѣдуетъ считать именно тотъ случай, когда не всѣ бластомеры выходятъ на поверхность, а часть ихъ остается въ желткѣ, превращаясь въ вителлофаги.

Происхождение поверхностнаго дробленія изъ полного благодаря существованію ряда переходовъ между ними, есть фактъ, стоящій внѣ всякихъ сомнѣній. Этотъ фактъ заставилъ насъ уже признать, что желточные клѣтки возникли филогенетически, какъ постоянно возникаютъ теперь во время онтогеніи, изъ оставшихся въ желткѣ продуктовъ дробленія. Считать при этомъ отдѣленіе вителлофаговъ отъ бластодермы первичнымъ явленіемъ совершенно невозможно, такъ какъ это бы совершенно противорѣчило и нашему взгляду на происхождение желточныхъ клѣтокъ и даже болѣе основной предпосылкѣ — происхожденію поверхностнаго дробленія изъ полного. Можно, конечно, было бы сдѣлать еще одно допущеніе, что при переходѣ полного дробленія въ поверхностное первоначально всѣ бластомеры выходили на поверхность, а потомъ часть ихъ снова внѣдрялась въ желтокъ. Однако этому противорѣчатъ такіе случаи переходнаго дробленія, какъ у *Collembola*, *Muriopoda*, пауковъ и т. д., а главное, это предположеніе само по себѣ мало вѣроятно, такъ какъ при наличности полного дробленія сильное обогащеніе яицъ желткомъ должно неминуемо приводить къ тому, что часть бластомеровъ останется въ немъ и будетъ функционировать въ роли вителлофаговъ. Словомъ, мнѣ кажется, что ихъ физиологическая функція, какъ таковыхъ, возникла уже позже, а первымъ поводомъ къ ихъ дифференцировкѣ у зародыша послужило то обстоятельство, что часть бластомеровъ просто застревала въ желткѣ.

Резюмируя все сказанное выше, мы считаемъ, что желточные клѣтки насѣкомыхъ и другихъ членистоногихъ отнюдь не являются ихъ энтодермой и вообще не имѣютъ никакого отношенія къ зародышевымъ пластамъ: это просто остающіеся въ желткѣ продукты дробленія, которые служатъ для его резорпціи и не принимаютъ участія въ построеніи тѣла зародыша; возникновение

ихъ во время онтогеніи изъ остающихся въ желткѣ клѣтокъ дробленія нужно считать болѣе первичнымъ явленіемъ.

3. Зародышевые пласты насѣкомыхъ.

Наша точка зрѣнія на желточные клѣтки приводитъ насъ и къ совершенно опредѣленному взгляду относительно того, какъ слѣдуетъ смотрѣть на яйцо насѣкомыхъ, уже покрытое бластодермой и съ желточными клѣтками въ желткѣ (рис. 14). Разъ послѣднія, какъ и половой зачатокъ, не являются частью того или другого зародышеваго листа, то подобная стадія есть стадія бластулы, или *periblastula*, какъ ее давно называлъ Haeckel. Напротивъ, съ точки зрѣнія Neumons'a и его сторонниковъ эта стадія отвѣчаетъ гаструлѣ другихъ формъ; такъ же смотреть на это и Hirschler (1909 b), предлагающій даже замѣнить термины бластодерма и желточные клѣтки терминами эктодерма и энтодерма. Нашъ взглядъ на желточные клѣтки совершенно исключаетъ для насъ возможность присоединиться къ этой точкѣ зрѣнія.

Процессъ, отвѣчающій гастрюляціи другихъ формъ, т.-е. образованіе нижняго листа (считаемаго Neumons'омъ лишь за мезодерму), наступаетъ нѣсколько позже. Мы видѣли уже, что у *Isotoma cinerea* его обособленіе отъ эктодермы происходитъ нѣсколько иначе, чѣмъ у другихъ насѣкомыхъ, т.-е. не при помощи первичной борозды, а путемъ мультиполярной иммиграціи подъ всей поверхностью яйца (рис. 14, 15, 16). Выше же было отмѣчено, что этотъ способъ развитія первичной энтодермы кажется намъ болѣе примитивнымъ, а процессъ гастрюляціи съ образованіемъ первичной борозды слѣдуетъ производить изъ него.

Въ пользу этого говорить прежде всего одно общее соображеніе, именно, что я вполне присоединяюсь къ точкѣ зрѣнія Мечникова (1886), согласно которой мультиполярная иммиграція является болѣе первичнымъ способомъ обособленія энтодермы, а инвагинація и другіе способы гастрюляціи произошли вторично изъ нея. По отношенію къ насѣкомымъ мысль о томъ, что гастрюляція съ образованіемъ первичной борозды не имѣетъ филогенетическаго значенія, а развилась чисто механически, была выдвинута уже Neumons'омъ (1895), при чемъ онъ указывалъ на сходство съ подобной инвагинаціей половой бороздки и другихъ такихъ же процессовъ, гдѣ влияніе играетъ роль лишь для ускоренія развитія. Диффузное отдѣленіе клѣ-

токъ нижняго листа („мезодермы“) считаетъ первичнымъ способомъ и Knowler (1900), но въ то же время онъ находитъ возможнымъ видѣть въ примитивной бороздѣ настоящую гастралу.

Кромѣ чисто общихъ соображеній первичность мультиполярной иммиграціи у насѣкомыхъ и вообще у Tracheata доказывается и тѣмъ, что этотъ способъ присущъ какъ разъ наиболѣе низко стоящимъ формамъ. Кромѣ Collembola онъ имѣетъ мѣсто у *Scolopendra* (Heymons) и, повидимому, у *Polydesmus* (Lignau), т.-е. у представителей двухъ главныхъ группъ многоножекъ, затѣмъ у *Phyllodromia* и *Gryllotalpa* (Heymons, Nusbäum u. Fulinski) и, наконецъ, у *Eutermes* (Knowler), т.-е. у представителей низшихъ отрядовъ Pterygota. — Все это заставляетъ насъ видѣть въ этомъ процессѣ первичное явленіе, а въ инвагинаціи (тамъ, гдѣ она не является артефактомъ, что, вѣроятно, нерѣдко имѣло мѣсто) только особый способъ для сокращенія развитія, при томъ возникшій, вѣроятно, независимо въ различныхъ группахъ.

Такимъ образомъ, у всѣхъ насѣкомыхъ, и въ томъ числѣ у нашей изотомы, оба первичныхъ зародышевыхъ листа, эктодерма и первичная энтодерма, или нижній листъ, какъ ее удобнѣе здѣсь называть, хорошо выражены. Дальше должна идти дифференцировка первичныхъ зародышевыхъ листовъ на вторичные — вторичную энтодерму и мезодерму, которая дѣйствительно и фигурируетъ въ работахъ всѣхъ изслѣдователей. Однако я предпочелъ въ своемъ изложеніи избѣжать этихъ терминовъ и обойтись безъ нихъ, имѣя дѣло лишь съ первичными пластами, верхнимъ и нижнимъ листкомъ, и затѣмъ съ зачатками отдѣльныхъ органовъ, соединенными первоначально въ комбинированные первичные зачатки, каждый для нѣсколькихъ органовъ. Причина, побудившая меня къ этому, заключается въ томъ, что у *Isotoma cinerea*, какъ, вѣроятно, и у многихъ другихъ насѣкомыхъ, по моему мнѣнію, нельзя провести никакой границы между вторичными пластами, вторичной энтодермой и мезодермой, которая у нихъ другъ отъ друга не различима.

Если обратиться къ описаннымъ выше отношеніямъ во время развитія нашей изотомы, то мы увидимъ, что первая дифференцировка нижняго листка заключается въ образованіи на стадіи В сомитовъ. Никакихъ сомнѣній въ томъ, что сомиты представляютъ собой мезодерму, быть, конечно, не можетъ, но далеко не такъ обстоитъ дѣло съ не участвующей въ ихъ образованіи медиальной частью нижняго листка. — Взглядъ, что послѣдній согласно схемѣ братьевъ Hertwig (1881) дѣлится на три части —

непарную медиальную полоску энтодермы и двѣ латеральныхъ полоски мезодермы, существуетъ уже давно и нашелъ себѣ какъ будто полное подтвержденіе въ работахъ Nusbäum u. Fulinski (1906) и Hirschler'a (1909 b). Однако при этомъ упускаютъ изъ вида, что непарный медиальный отдѣлъ нижняго листка между сомитами можно съ одинаковымъ правомъ считать и вторичной энтодермой и мезодермой и въ то же время нельзя признать ни за одну изъ нихъ исключительно.

Въ самомъ дѣлѣ, и у *Isotoma cinerea*, и у многихъ другихъ насѣкомыхъ въ этомъ непарномъ отдѣлѣ можно отличить три части: переднюю около stomodaeum и верхней губы, заднюю у proctodaeum и среднюю въ видѣ описаннаго выше межсомитнаго тяжа („mittlere Strang“ Nusbäum u. Fulinski). На стадіи F мы назвали ихъ уже зачатками средней кишки — переднимъ, заднимъ и среднимъ или диффузнымъ, оговорившись однако, что пользуемся этими названіями, лишь чтобы избѣжать введенія новыхъ терминовъ. На самомъ дѣлѣ каждая изъ этихъ частей непарнаго отдѣла нижняго листка не является чистымъ или простымъ зачаткомъ кишки, такъ какъ содержитъ въ себѣ зачатки и другихъ органовъ. Такъ, изъ передняго скопленія кромѣ передняго зачатка mesenteron происходитъ и мускульный слой stomodaeum, изъ задняго скопленія — задній зачатокъ mesenteron и muscularis proctodaeum, а межсомитный тяжъ (по крайней мѣрѣ у Pterygota) заключаетъ въ себѣ не только клѣтки диффузнаго зачатка средней кишки, но и кровяныя клѣтки. Раздѣленіе каждого изъ нихъ на составныя части происходитъ лишь на стадіяхъ F и G, а до того мы имѣемъ предъ собой комбинированные первичные зачатки (zusammengesetzte Primitivanlagen), какъ называлъ ихъ Meisenheimer.

Такими же комбинированными первичными зачатками являются, конечно, и сомиты, такъ какъ они производятъ и мускулы, и жировое тѣло, и сердце, и перитонеальный слой средней кишки и гонады. Однако въ послѣднемъ случаѣ это все образованія мезодермальные, между тѣмъ каждый изъ трехъ зачатковъ непарнаго отдѣла нижняго листка даетъ и мезо- и энтодермальные производныя. — Средній или межсомитный тяжъ кромѣ эпителия кишечника даетъ и кровяныя клѣтки: Schwangart (1906) и Hirschler (1909b) связываютъ этотъ фактъ съ новой Hämosötheorie Vejdovsk'аго (1905), согласно которой энтодермальный вазотелій у членистоногихъ далъ начало кровянымъ тѣльцамъ. Хотя этому и противорѣчитъ рядъ фактовъ почти у всѣхъ другихъ формъ, гдѣ кровяныя тѣльца обычно имѣютъ мезодермальное

происхождение, но все же эта поправка какъ-будто сводитъ межсомитный тяжъ къ энтодермѣ. Однако переднее и заднее скопление нижняго листка даетъ опять-таки не только элементы *mesenteron*, но и *muscularis* передней и задней кишки, а въ мезодермальномъ происхождении мускуловъ у всѣхъ животныхъ не можетъ быть никакихъ сомнѣній. Между тѣмъ у изотомы въ началѣ нѣтъ никакой возможности опредѣлить, какіе элементы передняго и задняго скопления пойдутъ на среднекишечный эпителий, т.-е. являются энтодермой, а какіе на мускулатуру, относясь поэтому къ мезодермѣ, и, судя, главнымъ образомъ, по рисункамъ во многихъ работахъ, такъ же обстоитъ дѣло и при развитіи многихъ другихъ насѣкомыхъ. Если ограничиться работами, появившимися лишь за послѣдніе годы, то въ качествѣ примѣра этого я могу указать на наблюденія Schwangart'a (1904), Hirschler'a (1909 b) и Hammerschmidt'a (1910). Schwangart приходитъ къ заключенію, что у *Endromis* въ общемъ нѣтъ рѣзкаго раздѣленія мезодермы отъ энтодермы: въ средней области зародыша большая часть элементовъ нижняго листка превращается въ мезодерму, въ области „*Gastrulakeil*“ въ энтодерму. На рисункахъ Hirschler'a, относящихся къ развитію *Donacia*, совершенно нельзя подмѣтить какого-либо различія между элементами нижняго листка, окружающими переднюю и заднюю кишку (будущій *muscularis*), и зачатками средней кишки, примыкающими къ ихъ внутреннимъ концамъ. Hammerschmidt у *Phasmatidae* называетъ весь нижній листъ мезодермой и производитъ изъ него и среднюю кишку, почему и получается „энтодерма мезодермальнаго происхожденія“. Словомъ, у этихъ трехъ формъ, относящихся къ различнымъ отрядамъ (*Lepidoptera*, *Coleoptera*, *Orthoptera*), нижній листъ такъ же мало дифференцированъ на мезодерму и вторичную энтодерму, какъ и у *Isotoma cinerea*. Еще болѣе тѣсная связь между энтодермальными и мезодермальными элементами имѣетъ мѣсто по Heymons'у (1901) у *Scolopendra*, гдѣ энтодермальныя клетки отдѣляются вмѣстѣ съ мезенхиматозными, при чемъ тѣ и другія совершенно неотличимы другъ отъ друга.

Всѣ эти факты убѣждаютъ меня, что у многихъ насѣкомыхъ (какъ, вѣроятно, и у многихъ другихъ членистоногихъ) два вторичныхъ зародышевыхъ пласта настолько не дифференцированы другъ отъ друга, что ихъ можно отличать лишь чисто искусственно. При этомъ нижній листъ распадается въ процессѣ своего развитія на такіе зачатки, которые даютъ начало органамъ, возникающимъ у другихъ формъ частью изъ мезодермы, частью

изъ энтодермы. А разъ это такъ, то гораздо естественнѣе, описывая развитіе насѣкомыхъ, говорить лишь о двухъ первичныхъ зародышевыхъ слояхъ—эктодермѣ и нижнемъ листѣ, а затѣмъ при дифференцировкѣ послѣдняго различать просто комбинированные первичные зачатки. Такими зачатками являются, во-первыхъ, сомиты, затѣмъ непарныя переднее и заднее скопление элементовъ нижняго листка и, наконецъ, межсомитный тяжъ. Въ дальнѣйшемъ процессѣ развитія каждый изъ этихъ комбинированныхъ первичныхъ зачатковъ распадается на простые зачатки для отдѣльныхъ органовъ.

Среди насѣкомыхъ имѣются формы, у которыхъ по описаніямъ различныхъ авторовъ мезодерма и энтодерма закладываются независимо другъ отъ друга (случай, который едва ли можно считать первичнымъ, такъ какъ дифференцировка сперва на два первичныхъ, а лишь затѣмъ на вторичные зародышевые листки есть общее правило). Къ такимъ формамъ относится *Chalicodoma* [Carrière u. Bürger (1897)], нѣкоторыя *Muscidae* [Escherich (1900), Noack (1901)], *Phyllodromia* [Nussbaum u. Fulinski (1906)]. Въ такихъ случаяхъ можно, конечно, говорить о вторичныхъ листкахъ, хотя и здѣсь (по крайней мѣрѣ у *Phyllodromia*) „энтодермальный“ межсомитный тяжъ даетъ и кровяные элементы.

Какъ бы то ни было, у *Isotoma cinerea* и, повидимому, у очень многихъ другихъ насѣкомыхъ мезодерма и вторичная энтодерма настолько смѣшаны другъ съ другомъ, что гораздо удобнѣе различать въ нижнемъ листѣ лишь примитивные зачатки. Я не отрицаю, впрочемъ, возможности говорить и здѣсь о вторичныхъ пластахъ, но не могу не признать этого чисто искусственнымъ, специально подогнаннымъ къ теоріи пластовъ. Послѣдніе, какъ и всякое широкое обобщеніе, полезны лишь до тѣхъ поръ покуда на почвѣ этой теоріи совокупность наблюдаемыхъ нами явленій получаетъ болѣе общее и широкое освѣщеніе; если же этого нѣтъ, то такая теорія можетъ привести лишь къ ошибкамъ и явно предвзятымъ толкованіямъ. Литература по эмбриологіи насѣкомыхъ за послѣднія 20 лѣтъ даетъ не мало подобныхъ, очень ноучительныхъ въ методологическомъ отношеніи примѣровъ, и цѣлый рядъ ошибокъ, выясненіе которыхъ стоило много времени и труда, былъ бы несомнѣнно избѣгнутъ, если бы тотъ или другой изслѣдователь не руководился какой-либо предвзятой идеей. Сюда именно относится взглядъ на желточныя клетки, какъ на энтодерму, стремленіе свести образованіе пластовъ у насѣкомыхъ къ тому типу, который присущъ лишь *Sagitta* и вообще энтероцельнымъ формамъ, не имѣющимъ съ членисто-

ногими ничего общаго, такіа странныя образованія, какъ „дорзальный бластопоръ“, который можетъ лишь служить примѣромъ *contradictio in adjecto*, и многое другое.

Сказаннаго не слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что я считаю теорію пластовъ ненужной и даже вредной. Напротивъ, она несомнѣнно является однимъ изъ наиболѣе цѣнныхъ обобщеній эмбриологіи, и гомологія двухъ первичныхъ зародышевыхъ листковъ во всемъ животномъ царствѣ, установленная еще Huxley (1849), не можетъ вызывать никакихъ сомнѣній. Этого однако нельзя сказать объ установленномъ позже третьемъ зародышевомъ листкѣ—мезодермѣ, ученіе о которомъ разработано, главнымъ образомъ, братьями Hertwig (1881). Тѣ возраженія противъ гомологіи мезодермы у всѣхъ животныхъ, которыя дѣлались уже не разъ [укажемъ лишь на работу Kleinenberg'a (1886) и взгляды, развитые въ его „Allgemeine Embryologie“ Bergh'омъ (1895)] кажутся мнѣ глубоко основательными. Лично мнѣ вообще кажется, что провести гомологію между вторичными зародышевыми листками во всемъ животномъ царствѣ совершенно невозможно и на нихъ гораздо удобнѣе смотрѣть тоже какъ на комбинированные первичные зачатки, при томъ неравноцѣнные у различныхъ формъ. Едва ли можно думать, напримѣръ, что вторичную энтодерму тѣхъ насѣкомыхъ или тѣхъ членистоногихъ, гдѣ она хорошо выражена, можно считать строго гомологичной энтодермѣ позвоночныхъ и иглокожихъ, какъ и мезодерму первыхъ мезодермѣ послѣднихъ; въ этихъ типахъ строго гомологичны другъ другу, какъ мнѣ кажется, лишь ихъ первичные пласты: эктобласть и энтобласть.

Имѣется, конечно, рядъ формъ, въ эмбриологіи которыхъ, какъ напримѣръ Echinodermata и многихъ другихъ, понятія мезодермы, мезенхимы являются совершенно естественными. Зато у другихъ формъ, напримѣръ, у многихъ Mollusca различіе вторичныхъ зародышевыхъ пластовъ чрезвычайно затруднительно и можетъ привести лишь къ ненужной схематизаціи процесса ихъ развитія. Именно изученіе послѣдняго и заставило Meisenheimer'a (1900) замѣнить понятіе пластовъ понятіемъ Primitivanlagen, иногда и совпадающихъ съ тѣмъ или инымъ пластомъ, что однако отнюдь не обязательно. Этотъ взглядъ былъ затѣмъ подробнѣе развитъ имъ въ его краткой эмбриологіи (1908).

Однако Meisenheimer предлагаетъ вообще замѣнить понятіемъ Primitivanlagen понятіе всѣхъ пластовъ (и первичныхъ и вторичныхъ). При этомъ онъ, какъ это отмѣчено и имъ самимъ, примыкаетъ къ старымъ воззрѣніямъ Reichert'a (1840), быв-

шаго въ свое время противникомъ теоріи пластовъ. Я не иду въ этомъ отношеніи такъ далеко и возвращаюсь лишь къ воззрѣніямъ (незаслуженно въ настоящее время забытымъ) основателя эмбриологіи К. Э. фонъ-Бэра (1828, 1837).

Послѣдній различалъ, какъ извѣстно, два первичныхъ или главныхъ пласта (Hauptblätter), изъ которыхъ получается во время дальнѣйшаго развитія рядъ слоевъ (Schichten), превращающихся у зародышей позвоночныхъ въ трубки. „Diese Röhren, пишетъ онъ въ первой части своего классическаго труда (1828 S. 164), nenne ich Fundamentalorgane, da aus ihnen die speciellen Organe sich allmählig ausbilden“. Во второй части этой же работы, появившейся, какъ извѣстно, значительно позже (1837), онъ замѣняетъ терминъ „Fundamentalorgane“ другимъ, еще болѣе близкимъ къ нашей терминологіи, именно говорить о „Primitivorgane“. „Diese Röhren enthalten alle einzelnen Organe, und da sich die letzteren... aus ihnen allmählig herausbilden, so wollen wir Primitivorgane nennen“ (S. 64). Въ общемъ, Бэръ мало останавливался на Hauptblätter, имѣя дѣло все время съ Fundamentalorgane или Primitivorgane.

Нельзя не отмѣтить, что воззрѣнія Бэра излагаются часто очень неправильно (что объясняется, быть можетъ, рѣдкостью его классическихъ работъ). Обыкновенно этому изслѣдователю приписывается взглядъ, будто два главныхъ зародышевыхъ листа дѣлятся каждый на два вторичныхъ, при чемъ понятіе послѣднихъ смѣшивается съ бэровскимъ понятіемъ „Fundamentalorgane“ или „Primitivorgane“. Подобную ошибку дѣлаетъ, напримѣръ, О. Hertwig въ его статьѣ, специально посвященной теоріи пластовъ, въ „Handbuch der vergleichenden und experimentellen Entwicklungslehre der Wirbeltiere“.

На самомъ дѣлѣ, понятіе вторичныхъ пластовъ, установленное значительно позже, совершенно не идентично съ бэровскимъ понятіемъ „Fundamentalorgane“, что подчеркивается и въ общей части учебника Korschelt u. Heider'a (1910). Бэръ относитъ къ числу своихъ Fundamental- (или Primitiv-) organe и нервную трубку; затѣмъ онъ пишетъ напримѣръ: „...die Schleimhautröhre für sich allein keine Umbildungen eingeht, sondern immer nur in Verbindung mit dem sie umgebenden Theile der Gefässschicht. Wir müssen daher beide Schichten als Ein Primitivorgan zusammenfassen und können für dasselbe das längst gebrauchte Wort Darmkanal gebrauchen (1837 S. 64). Въ послѣднемъ случаѣ получается очень большое совпаденіе этого „Primitivorgan“ съ нашими комбинированными зачатками для средней кишки у насѣкомыхъ.

Позже взгляды Бэра подверглись существенному изменению. Понятие „Fundamentalorgane“ или „Primitivorgane“ было забыто, а къ двумъ зародышевымъ листкамъ Remak (1855) прибавилъ третій (mittleres oder motorisch-germinatives Blatt), и вмѣстѣ съ тѣмъ возникло понятие первичныхъ и вторичныхъ зародышевыхъ листковъ, разработанное особенно подробно братьями Hertwig. Возраженія Kleinenberg'a (1886), Bergh'a (1895) и нѣкоторыхъ другихъ противъ понятія мезодермы не имѣли особеннаго успѣха.

Однако въ настоящее время знакомство съ эмбриологіей животныхъ настолько подвинулось впередъ, что даже самые горячіе сторонники теоріи пластовъ должны признать, что дѣло въ этомъ отношеніи обстоитъ теперь далеко не такъ просто, какъ во время появленія „Coelomtheorie“. Лично мнѣ кажется, что освобожденіе отъ понятія вторичныхъ пластовъ и возвращеніе къ старымъ и болѣе широкимъ взглядамъ К. Э. фонъ-Бэра будетъ значительнымъ шагомъ впередъ, освободивъ насъ отъ великаго множества чисто схоластическихъ спекуляцій о мезодермѣ, полости тѣла и пр. и давъ болѣе болѣе просторъ въ толкованіи сложныхъ процессовъ развитія.

4. О спинномъ органѣ и зародышевыхъ оболочкахъ насѣкомыхъ.

Спинной органъ является образованіемъ, присущимъ лишь зародышамъ самыхъ различныхъ членистоногихъ. Очень широко распространено это образованіе у Crustacea, именно у Malacostraca, затѣмъ у Limulus и нѣкоторыхъ Arachnoidea, среди многоножекъ у Scolopendra, а изъ Apterygota у всѣхъ Collembola, Campodea и Japyx. Недавно Hirschler (1909 a и b) нашелъ рудиментъ этого образованія и у нѣкоторыхъ Pterygota. Словомъ, мы имѣемъ дѣло съ эмбриональнымъ органомъ, присущимъ цѣлому типу животнаго царства: спрашивается, каково же значеніе этого образованія?

Попытокъ отвѣтить на этотъ вопросъ было сдѣлано очень много: Fr. Müller (1864) и Grobben (1879), считая это образованіе присущимъ лишь Crustacea, производили его изъ затылочной железы Phyllopora; Della Valle (1893) гомологизировалъ его амниону насѣкомыхъ; Ю. Вагнеръ (1896) и Nusbaum u. Schreiber (1898) видятъ въ этомъ образованіи лишь скопленія умирающихъ клѣтокъ бластодермы. Впрочемъ, между взглядомъ двухъ послѣднихъ изслѣдователей имѣется существенное различіе: Nusbaum распространяетъ свое воззрѣніе на всѣ спинные органы Crustacea — и на непарные и на парные, а

Ю. Вагнеръ лишь на первые, считая парные цѣногенетическими образованіями въ родѣ почекъ зародыша. Wheeler (1893), впервые подробно описавшій спинной органъ у Anurida maritima, приравнивалъ его и подобныя ему образованія у другихъ Arthropoda, съ одной стороны, своеобразному indusium Locustidae, а съ другой, присасывательному диску сзади головы у зародышей Clepsine. Willey (1899) производитъ спинной органъ Collembola и indusium Locustidae изъ трофобласта, имѣющагося у зародышей Peripatus novae-britanniae. Наконецъ, Heumons (1901) признаетъ послѣднюю гомологію, считая въ то же время, что спинные органы гомологичны зародышевымъ оболочкамъ Pterygota; смыслъ появленія первыхъ заключается въ томъ, чтобы уничтожить часть лишняго эктодермальнаго слоя, сильно разросшагося благодаря богатству яицъ желткомъ.

Изъ этого краткаго и, вѣроятно, неполнаго обзора различныхъ мнѣній видно прежде всего, что рѣчь идетъ о двухъ совершенно отличныхъ другъ отъ друга образованіяхъ. Въ однихъ случаяхъ спинной органъ или парные спинные органы являются, дѣйствительно, просто скопленіемъ умирающихъ и не принимающихъ участія въ образованіи спины клѣтокъ бластодермы: къ этой категоріи принадлежатъ подобныя образованія у многихъ Crustacea (въ частности, непарный органъ Mysidae), о которыхъ писали Ю. Вагнеръ и Nusbaum u. Schreiber; сюда же несомнѣнно относится спинной органъ Scolopendra. Эти образованія, конечно, не заслуживаютъ названія „органа“, и смыслъ и значеніе ихъ понятны само собою. — Другіе спинные органы совершенно не подходятъ подъ эту категорію, такъ какъ закладываются очень рано, задолго до дегенераціи первичнаго спинного покрова и имѣютъ ясно выраженный железистый характеръ: сюда именно относится и описанный нами выше спинной органъ Isotoma, какъ и всѣхъ Collembola. Подобныя же образованія присущи и многимъ Crustacea: укажу лишь хотя бы на описаніе такого органа въ работѣ Россійской-Кожевниковой (1896) у Gammarus pulex, гдѣ, какъ и у Collembola, изъ него происходитъ вытекание клейкаго секрета, посредствомъ котораго зародышъ прикрѣпляется къ оболочкѣ. Ю. Вагнеръ совершенно неправильно, какъ мнѣ кажется, пытается свести и это образованіе къ скопленію умирающихъ клѣтокъ бластодермы, тогда какъ онъ самъ признаетъ железистый характеръ у боковыхъ органовъ Mysidae. Гораздо удобнѣе употреблять терминъ „спинной органъ“ лишь по отношенію къ образованіямъ именно этой категоріи, первую же нужно просто оставить совершенно въ сторонѣ.

Итакъ, попытки произвести спинной органъ изъ того или иного образованія низшихъ формъ уже имѣются, но ихъ трудно считать удачными. Мнѣ кажется вообще неправильнымъ широко распространенное теперь стремленіе сводить каждый эмбриональный органъ непременно на рудиментъ какого-либо органа низшей группы, такъ какъ при этомъ забываютъ, что зародышъ на любой стадіи развитія есть тотъ же организмъ и долженъ изучаться *an und für sich*, а не съ точки зрѣнія взрослой формы. Въ послѣднемъ нельзя не видѣть результата неумѣреннаго примѣненія біогенетическаго закона, который не можетъ, конечно, служить основной предпосылкой эмбриологии, и нельзя не пожелать въ видѣ противовѣса къ этому стремленію возвращенія къ старому правилу К. Э. фонъ-Бара (1828), что зародышей нужно сравнивать другъ съ другомъ, а не съ взрослыми животными.

Что касается до чисто эмбриональных органовъ, то, несомнѣнно, среди нихъ имѣется довольно много рудиментовъ. Однако логически вполне вѣроятно, что новый органъ можетъ зародиться не только у взрослой формы, но и у зародыша (лично мнѣ возникновеніе совершенно новаго органа кажется возможнымъ лишь послѣднимъ путемъ). Такой зародившійся впервые у зародыша органъ можетъ въ однихъ случаяхъ перейти и во взрослую форму, въ другихъ же остаться образованіемъ исключительно эмбриональнымъ и имѣть среди зародышей свою собственную филогенію, не имѣя въ то же время никакого филогенетическаго значенія въ духѣ біогенетическаго закона. Въ тѣхъ случаяхъ, когда мы не можемъ легко и быстро свести эмбриональный органъ на рудиментъ какого-нибудь образованія низшихъ формъ, гораздо правильнѣе, мнѣ кажется, признать его чисто эмбриональнымъ органомъ.

Эта точка зрѣнія какъ разъ особенно приложима къ спиннымъ органамъ членистоногихъ, которые по всей вѣроятности зародились именно у зародышей исходныхъ формъ этого типа, такъ что искать что-либо подобное у *Clepsine* и вообще у аннелидъ—трудъ, довольно бесплодный.—Что касается до фізіологическаго значенія этого образованія, то я вполне присоединяюсь къ точкѣ зрѣнія Ю. Вагнера относительно боковыхъ органовъ *Mysidae*, распространяя ее на всѣ настоящіе, т.-е. железистые, спинные органы зародышей членистоногихъ, и считаю, что здѣсь мы имѣемъ, вѣроятно, дѣло съ чисто эмбриональными выдѣлительными органами. Необходимость существованія подобныхъ образованій у зародышей прекрасно освѣщена въ посмертной работѣ покойнаго Фаусека (1911), но онъ ищетъ ихъ у членистоногихъ

въ сомитахъ насѣкомыхъ и мезодермальныхъ фагоцитахъ пауковъ. Возможность функционированія и спинного органа, какъ эмбриональной почки, этимъ, конечно, не исключается. Вторая функція спинного органа—прикрѣпленіе зародыша при помощи выдѣляемаго имъ клейкаго секрета (т.-е. экскрета) къ оболочкѣ—является, какъ мнѣ кажется, вторичной и возникла позже его экскреторной функціи. Убѣдиться съ полной несомнѣнностью въ послѣдней у *Collembola* съ ихъ микроскопическими яйцами, конечно, едва ли возможно, но для этой цѣли вполне пригодны зародыши такихъ формъ, какъ напримѣръ, *Gammarus* и многія ракообразныя.

Мы видѣли, что спинной органъ связывали кромѣ того и съ зародышевыми оболочками *Pterygota* (Della Valle, Heymons), и теорія происхожденія послѣднихъ изъ спинного органа, развитая Heymons'омъ (1897a, 1905), является самой новой. На старыхъ попыткахъ выясненія значенія этихъ оболочекъ, сведенію ихъ къ панцирю ракообразныхъ, остаткамъ трохофоры и пр., мы можемъ, конечно, не останавливаться.—По Heymons'у изъ зародышевыхъ оболочекъ насѣкомыхъ сероза болѣе древняя, амнионъ же возникъ позже, какъ это можно видѣть при развитіи *Machilis* и *Lepisma*, у которыхъ отношенія носятъ болѣе примитивный характеръ, чѣмъ у *Pterygota*. Что касается до серозы, то она вполне аналогична и гомологична спинному органу, откуда понятно существованіе одинаковыхъ оболочекъ у насѣкомыхъ и у скорпіона.

Эта красивая схема была, однако, разрушена открытіемъ у нѣкоторыхъ *Pterygota* Hirschler'омъ (1909 b) гомолога настоящаго спинного органа, чего ни въ коемъ случаѣ, какъ отмѣчаетъ и этотъ авторъ, не могло бы быть, если бы сероза развилась изъ послѣдняго. Слѣдовательно, мы должны искать для серозы новое исходное образованіе.

Подобнымъ исходнымъ образованіемъ легче всего признать уже описанную нами выше *Hüllenectoderm* *Collembola* и лежащую внѣ зародышевой полосы бластодерму тѣхъ членистоногихъ, у которыхъ образованіе пластовъ приурочено лишь къ зародышевой полосѣ: ее можно назвать *Hüllenblastoderm*, если и она не участвуетъ въ образованіи спины. Въ этомъ отношеніи описанный выше у изотомы процессъ превращенія части ея эктодермы въ *Hüllenectoderm* и другой части въ зародышевую эктодерму несомнѣнно примитивнѣе наблюдающагося у зародышей большинства членистоногихъ различія между зародышевой полосой съ ея двумя первичными пластами и внѣзародышевой бластодермой. Не можетъ быть никакихъ сомнѣній въ томъ, что, какъ это уже было отмѣ-

чено Heymons'омъ (1896 а) и Hirschler'омъ (1909 b), первоначально вся бластодерма шла на образованіе зародыша и лишь благодаря большому переполненію яицъ желткомъ возникло въ концѣ концовъ раздѣленіе ея на зародышевый и внѣзародышевый участки. Развѣтіе нижняго листка подѣ всей поверхностью яйца у *Isotoma cinerea* является какъ разъ остаткомъ этихъ прежнихъ, болѣе примитивныхъ отношеній.

Судьба Hüllenectoderm изотомы подробно описана нами выше. Она происходитъ изъ первоначально всюду одинаковой эктодермы путемъ превращенія части послѣдней въ плоскія, рѣдко разбѣянные по спинной и боковымъ сторонамъ зародыша клѣтки. Эти клѣтки довольно долгое время играютъ роль первичнаго покрова спины и боковъ, но не переходятъ въ качествѣ такового во взрослую форму, вытѣсняясь во время четвертаго періода развитія растущей навѣрхъ эктодермой зародышевой полосы. Послѣдній процессъ крайне напоминаетъ процессъ вытѣсненія амніона (послѣ редукии серозы) дефинитивной эктодермой у многихъ Pterygota. Слѣдовательно, и Collembola, подобно *Lepisma* и *Machilis*, для которыхъ это установилъ Heymons (1897 а, 1905), не являются въ полномъ смыслѣ слова „Insecta anamnia“, какъ думали раньше: у нихъ нѣтъ, правда, еще настоящихъ клѣточныхъ оболочекъ, какъ у Pterygota, но роль серозы и амніона играетъ Hüllenectoderm, которая также первоначально представляетъ изъ себя первичный покровъ спины, но затѣмъ замѣщается дефинитивной эктодермой. — Происхождение Hüllenectoderm во время процесса развитія такое же, какъ серозы и амніона у высшихъ насѣкомыхъ [смотри особенно наблюденія Hirschler'а надъ *Donacia* (1909 b)], окончательная судьба та же: слѣдовательно, мы имѣемъ передъ собой образованія, вполне гомологичныя другъ другу. Правда, у Pterygota клѣточные оболочки обрастаютъ зародыша, но этого совершенно нѣтъ у *Machilis*, гдѣ все отличіе отъ Collembola заключается, главнымъ образомъ, въ томъ, что внѣзародышевая Hüllenectoderm (здѣсь собственно Hüllenblastoderm) дифференцировалась уже на двѣ части — proserosa и proamnion, гомологичныя, какъ установили супруги Heymons, серозѣ и амніону насѣкомыхъ. Словомъ, въ лицѣ Hüllenectoderm Collembola мы находимъ какъ разъ то исходное звено, которое вполне разъясняетъ происхождение зародышевыхъ оболочекъ насѣкомыхъ, и получаемъ слѣдующій рядъ:

<i>Collembola</i> и, вѣроятно, <i>Diplura</i>	<i>Machilis</i>	<i>Lepisma</i>	<i>Pterygota</i>
Hüllenectoderm {	proserosa proamnion	serosa amnion (своеобразный)	serosa amnion

Hüllenectoderm, образующая первичный покровъ спины, но не переходящая во взрослую форму, не является особенностью однихъ Collembola, а распространена, повидимому, и у многихъ другихъ членистоногихъ, но уже въ видѣ Hüllenblastoderm, или внѣзародышевой бластодермы, такъ какъ здѣсь пласты приурочены лишь къ зародышевой полосѣ. Большинство авторовъ не обращало на эту внѣзародышевую бластодерму особеннаго вниманія, допуская, болѣею частью, что впослѣдствіи она участвуетъ въ образованіи спины взрослой формы. Однако имѣются нѣкоторые наблюденія, прямо противорѣчающія такому допущенію.

Что касается до ракообразныхъ, то здѣсь на этотъ вопросъ было обращено особое вниманіе Ю. Вагнеромъ (1896). Онъ называетъ клѣтки внѣзародышевой бластодермы вителлоцитами и устанавливаетъ, что у *Neomysis* подобные вителлоциты образуютъ лишь первичный покровъ спины, а позже дегенерируютъ и спина взрослого животного образуется изъ разрастающейся навѣрхъ эктодермы зародышевой полосы. Очевидно, всѣ отношенія здѣсь тѣ же, что и у нашей изотомы, при чемъ мѣсто Hüllenectoderm занимаетъ слой вителлоцитовъ (Hüllenblastoderm). Едва ли можно думать, что *Neomysis* является только исключеніемъ среди другихъ ракообразныхъ. — Относительно паукообразныхъ я могу привести совершенно опредѣленное указаніе Шимкевича относительно зародышей телифона, что у нихъ подобные же плоскіе вителлоциты замѣщаются цилиндрическими клѣтками эктодермы (1906, стр. 24 отдѣльнаго оттиска) т.-е. и здѣсь сущность процесса, повидимому, та же самая. — У *Scolopendra*, однако, по Heymons'у (1901) membrana dorsalis, образованная однослойной эктодермой (т.-е. бластодермой), принимаетъ участіе въ построении спины взрослой формы, хотя часть ея клѣтокъ тоже дегенерируетъ.

Во всякомъ случаѣ, мы можемъ признать, что въ связи съ обогащеніемъ яицъ членистоногихъ желткомъ у нихъ наступаетъ раздѣленіе поверхности яйца на regio germinalis, или зародышевую полосу, и regio embryonalis, покрытую у Collembola Hüllenectoderm (что стоитъ въ связи съ развитіемъ у нихъ элементовъ нижняго листа подѣ всей поверхностью яйца), а у боль-

шинства просто бластодермой. Именно изъ этой Hüllenblastoderm у насѣкомыхъ въ процессѣ онтогеніи возникаютъ ихъ зародышевыя оболочки, а у нѣкоторыхъ (если не у большинства) другихъ членистоногихъ она, какъ и Hüllenectoderm Collembola, позже дегенерируетъ и замѣщается дефинитивной эктодермой. Въ этихъ Hüllenblastoderm и Hüllenectoderm и слѣдуетъ видѣть тѣ образованія, изъ которыхъ произошли клѣточные оболочки зародышей насѣкомыхъ, а также скорпіоновъ, при чемъ сходство зародышевыхъ оболочекъ у столь далеко стоящихъ другъ отъ друга формъ съ этой точки зрѣнія совершенно понятно.

Что касается до зародышевыхъ кутикулярныхъ оболочекъ Collembola, то, конечно, онѣ не имѣютъ ничего общаго съ тѣми образованіями, о которыхъ мы говорили выше, и связь ихъ со спиннымъ органомъ установилась уже вторично. Подобныя зародышевыя кутикулы извѣстны и у многихъ другихъ Arthropoda: среди ракообразныхъ у Malacostraca (гдѣ иногда, какъ у *Gammarus pulex*, тоже имѣется связь между такой оболочкой и спиннымъ органомъ), у многихъ паукообразныхъ (пауковъ, клещей, Pentastomidae) и, наконецъ, у многоножекъ. — Интересно отмѣтить, что иногда нѣчто подобное такимъ же кутикуламъ бываетъ и у Pterygota, при чемъ здѣсь выдѣляетъ кутикулярную оболочку сероза, что, между прочимъ, лишній разъ доказываетъ ея гомологію съ Hüllenectoderm. Подобное выдѣленіе серозой кутикулы впервые было описано Graber'омъ у *Melolontha* [цитир. по Heider'у (1892)], затѣмъ его наблюдали Wheeler (1893) у *Xiphidium* и Selys-Longchamps (1904) у *Tenebrio molitor*. То же самое происходитъ по Heymons'у (1897 а) у *Lepisma*.

Въ работѣ о развитіи сколопендры (1901) послѣдній называетъ выдѣленіе ея зародышемъ эмбриональныхъ кутикулъ просто линькой, и съ этимъ можно вполне согласиться. Мы имѣемъ здѣсь, такимъ образомъ, перенесеніе въ эмбриональную жизнь того процесса, который долженъ былъ бы собственно происходить при постэмбриональномъ развитіи: быть можетъ, это говорить о когда-то бывшемъ и теперь уже исчезнувшемъ анаморфозѣ.

Такимъ образомъ, мы приходимъ къ заключенію, что спинной органъ и клѣточные зародышевыя оболочки насѣкомыхъ совершенно независимы другъ отъ друга; первый является чисто эмбриональнымъ (скорѣе всего выдѣлительнымъ) органомъ зародышей членистоногихъ, вторымъ возникли изъ неучаствующей въ построеніи тѣла зародыша бластодермы или Hüllenectoderm у низ-

шихъ формъ; выдѣленіе эмбриональныхъ кутикулъ у Collembola и у многихъ членистоногихъ является просто линькой зародыша.

5. Apterygota и Diplopoda.

Когда большая часть этой работы была уже написана, я познакомился съ только что вышедшей русской работой Лигнау о развитіи *Polydesmus abchasius* (1911 b), про предварительное сообщеніе къ которой (1911 а) упоминалось уже выше. Его данныя, однако, для насъ настолько интересны, что ихъ даже удобнѣе разсмотрѣть отдѣльно.

Обычно ближайшихъ родичей насѣкомыхъ видятъ среди многоножекъ въ *Scolopendrella* и затѣмъ въ Chilopoda; Diplopoda же считаются болѣе далекой отъ нихъ группой. „Die Diplopoden dürften überhaupt wegen ihren entfernten verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Insekten als Vergleichsobjecte kaum geeignet sein“ пишетъ, напримѣръ Heymons (1896 а, S. 13). Эта точка зрѣнія принята обычно и въ учебникахъ. Однако, изучая фагоцитарные органы *Ctenolepisma lineata* (1907), а затѣмъ головныя железы Diplura и Thysanura (1908), я пришелъ къ совершенно обратному заключенію, а именно, что всѣ отношенія (и при томъ болѣе примитивныя) у Apterygota гораздо болѣе напоминаютъ Diplopoda, чѣмъ Chilopoda. Этотъ взглядъ находитъ себѣ полное подтвержденіе въ работѣ Лигнау, который, хотя онъ и не могъ учесть при этомъ данныхъ по развитію Apterygota, все же приходитъ къ выводу, что „классъ Diplopoda тѣснѣе связанъ съ классомъ Insecta, въ то время какъ классъ Chilopoda крайне своеобразенъ и одинокъ въ своей позиціи“. Справедливость такого заключенія станетъ еще яснѣе изъ сравненія данныхъ о развитіи *Isotoma cinerea* съ наблюденіями Лигнау надъ *Polydesmus*.

Прежде всего здѣсь бросается въ глаза громадное сходство въ дробленіи лицъ обѣихъ формъ, которое распространяется даже на мельчайшія детали. Какъ и у *Isotoma*, дробленіе у *Polydesmus* полное и равномерное, приводящее къ образованію плотной морулы изъ наружныхъ и внутреннихъ бластомеровъ, при чемъ первое возникновеніе послѣднихъ и здѣсь приурочено къ стадіи 16 клѣтокъ. Благодаря выползанію плазматическихъ массъ наружныхъ бластомеровъ на поверхность возникаетъ бластодерма, а главнымъ образомъ изъ внутреннихъ образуются желточные клѣтки. Такимъ образомъ, у Diplopoda и Collembola въ отличіе

отъ другихъ многоножекъ и насѣкомыхъ имѣется несомнѣнно болѣе примитивный типъ дробленія.

Столь ранняго полового зачатка, какъ у нашей изотомы, Лигнау не наблюдалъ, но во всякомъ случаѣ и у *Polydesmus* имѣется раннее и независимое отъ пластовъ обособленіе кучки половыхъ клѣтокъ въ заднемъ концѣ зародыша изъ бластодермы брюшной стороны: самъ авторъ отмѣчаетъ, что процессъ этотъ крайне напоминаетъ тѣ отношенія, которыя найдены Neumons'омъ у Orthoptera. Этотъ новый случай ранней дифференцировки половыхъ клѣтокъ, при томъ у многоножекъ, служить лишнимъ доказательствомъ развитой нами выше точки зрѣнія.

Крайне интересно у *Polydesmus abchasius* образованіе пластовъ. Сперва образуется мезодерма въ видѣ двухъ болѣе или менѣ локализованныхъ участковъ по бокамъ яйца: какъ видно и изъ описанія и изъ рисунковъ автора, эти участки охватываютъ въ общемъ почти все яйцо. Ея элементы образуются изъ бластодермы путемъ дѣленія и „выклиниванія“ клѣтокъ послѣдней въ этихъ мѣстахъ, въ результатѣ чего она и распадается на два слоя. Энтодерма возникаетъ по медіальной линіи брюшной стороны въ видѣ „срединной полоски“ и, отдѣляясь быстро отъ бластодермы, видѣдряется въ видѣ плотнаго тяжа въ желтокъ. Элементы, образующіе срединную полосу зародышеваго пятна, возникаютъ на всемъ ея протяженіи путемъ дѣленія бластодермическихъ клѣтокъ: кромѣ того въ ея передней части имѣется слабый намекъ на инвагинационную борозду. Изъ плотнаго энтодермального тяжа и возникаетъ позже средняя кишка.

Если мы на одинъ моментъ оставимъ дѣленіе на мезодерму и энтодерму въ сторонѣ и будемъ говорить лишь о нижнемъ листкѣ, то, несомнѣнно, процессъ его обособленія у *Polydesmus* совершенно тотъ же, что и у нашей изотомы. И здѣсь нижній листъ образуется диффузно подъ всей поверхностью бластодермы [въ послѣднемъ меня убѣждаютъ слова Лигнау: „съ появленіемъ мезобласта и энтодермы весь наружный покровъ яйца долженъ быть названъ эктодермой“ (стр. 67)], при чемъ его обособленіе происходитъ путемъ дѣленія и выклиниванія клѣтокъ бластодермы, т.-е. путемъ мультиполярной иммиграціи. Короткая инвагинационная борозда въ переднемъ концѣ „средней полоски“ этому взгляду отнюдь не мѣшаетъ, такъ какъ она, видимо, играетъ очень малую роль и, какъ мнѣ кажется, какъ бы находится еще въ процессѣ возникновенія. Словомъ, мы имѣемъ у *Polydesmus* новый случай образованія нижняго листа путемъ мультиполярной иммиграціи, о значеніи которой было сказано уже выше.

Дѣйствительно существеннымъ отличіемъ *Polydesmus* и отъ нашей *Isotoma cinerea* и отъ большинства другихъ насѣкомыхъ является рѣзкая разграниченность во времени и пространствѣ двухъ вторичныхъ зародышевыхъ листковъ, такъ что здѣсь съ полнымъ правомъ можно говорить объ энтодермѣ и мезодермѣ. При этомъ легко можетъ получиться впечатлѣніе, будто у *Diplopoda* имѣеть мѣсто какъ бы первичный случай по сравненію съ насѣкомыми: у первыхъ энтодерма и мезодерма независимы другъ отъ друга, у вторыхъ чисто вторично сливаются въ общій нижній листокъ. Такимъ образомъ, современнымъ отношеніямъ при развитіи насѣкомыхъ должно было, вѣроятно, предшествовать рѣзкое обособленіе вторичныхъ зародышевыхъ листовъ, какъ теперь у *Polydesmus*.

Если даже подобный взглядъ правиленъ, то это не исключаетъ, конечно, нашей точки зрѣнія на болѣе удобное различать при развитіи большинства насѣкомыхъ вмѣсто вторичныхъ пластовъ комбинированные первичные зачатки. Однако лично я считаю болѣе вѣроятнымъ, что у *Polydesmus* при развитіи пластовъ имѣютъ мѣсто скорѣе вторичныя, чѣмъ первичныя отношенія. Въ качествѣ послѣднихъ нужно всегда, мнѣ кажется, считать первоначальное обособленіе двухъ первичныхъ пластовъ — верхняго и нижняго листка, послѣ чего лишь слѣдуетъ дифференцировка трехъ вторичныхъ — эктодермы, энтодермы и мезодермы. Здѣсь же послѣдніе возникаютъ отдѣльно, при чемъ мезодерма обособляется раньше энтодермы, и я думаю, что такія отношенія (какъ совершенно аналогичныя имъ среди насѣкомыхъ, напримѣръ, у *Chalicodoma*) возникли чисто вторично, и имъ предшествовала стадія съ первоначальнымъ раздѣленіемъ бластодермы на два первичныхъ листка. — Въ энтодермѣ и мезодермѣ *Polydesmus* я вижу лишь первичныя зачатки, на которые распадается его нижній листъ, вполне совпадающіе, быть можетъ, съ такими же зачатками у *Chalicodoma*, но не вполне гомологичные первичнымъ зачаткамъ у многихъ другихъ насѣкомыхъ.

До сихъ поръ считалось, что искривленіе зародышей у *Diplopoda* является совершенно инымъ, чѣмъ у *Chilopoda* и у *Apterygota*; крайне важнымъ наблюденіемъ Лигнау слѣдуетъ признать установленіе имъ того факта, что у *Polydesmus* (а, вѣроятно, судя по прежнимъ работамъ, и у другихъ формъ) никакого различія отъ *Chilopoda* въ этомъ отношеніи здѣсь нѣтъ. Зародыши *Polydesmus* имѣютъ первоначально дорзальное искривленіе, но затѣмъ появляется поперечная борозда и оно замѣняется вентральнымъ. Очень важно также полное подтвержденіе данныхъ Неу-

mons'a (1897 c) и Silvestri (1898) о присутствіи постмаксиллярнаго сегмента, благодаря чему получается полная аналогія между составомъ головы у *Diploroda*, съ одной стороны, и насѣкомыхъ, съ другой.

Относительно развитія головныхъ железъ Лигнау, какъ мнѣ кажется, впадаетъ въ ошибку. Мезодермальное происхожденіе одной ихъ пары, именно трубчатыхъ, строеніе и выдѣлительная способность которыхъ такіа же, какъ у трубчатыхъ головныхъ железъ *Apterygota* [Bruntz (1904 a)]; было отмѣчено еще въ старой работѣ Heathcote (1886). Лигнау не видѣлъ первыхъ стадій развитія этихъ железъ, но на основаніи косвенныхъ соображеній принимаетъ, что вся трубчатая железа возникаетъ изъ эктодермы, являясь лишь протокомъ задней слюнной железы, возникающей изъ мезодермы. Этому противорѣчатъ, во-первыхъ, чисто анатомическія данныя Krug'a (1907), Effenberger'a (1909) и Wernitzsch'a (1910), изучавшихъ головныя железы у различныхъ *Diploroda*: обѣ пары железъ здѣсь (какъ и у *Apterygota*) совершенно независимы другъ отъ друга и характеръ задней слюнной говоритъ противъ ея мезодермальнаго происхожденія, тогда какъ трубчатая железа крайне похожа на нефридіальныя слюнные железы *Peripatus*. Во-вторыхъ, первый зачатокъ трубчатой железы, который наблюдалъ Лигнау (см. стр. 162, 163 и рис. 2 въ текстѣ его работы), крайне похожъ на зачатокъ трубчатой железы нашей изотомы, изображенный на рис. 70. Происхожденіе послѣдняго изъ сомита второго максиллярнаго сегмента нами вполне установлено, откуда можно думать, что старое наблюденіе Heathcote вполне правильно, а Лигнау ошибся, считая трубчатую железу *Polydesmus* эктодермальнымъ образованіемъ.

Итакъ, сравненіе данныхъ Лигнау о развитіи *Polydesmus abchasius* съ нашими наблюденіями надъ развитіемъ *Isotoma cinerea* вполне подтверждаетъ его точку зрѣнія на большую близость къ насѣкомымъ не *Chilopoda*, а *Diploroda*, показывая въ то же время, что особенно много общаго у послѣднихъ съ *Apterygota*. Этотъ фактъ вполне понятенъ, если мы признаемъ, что не только *Apterygota*—низшія изъ насѣкомыхъ, но и *Diploroda* (вмѣстѣ съ *Symphyla* и *Pauporoda*) являются низшими изъ многоножекъ, тогда какъ *Chilopoda*—болѣе высоко стоящая и специализированная группа. Въ пользу же большей примитивности *Diploroda* говоритъ помимо ихъ эмбриологіи цѣлый рядъ анатомическихъ данныхъ и ихъ появленіе въ геологіи въ болѣе древнихъ пластахъ. Очевидно, мы имѣемъ предъ собой фактъ болѣе

близости другъ къ другу низшихъ представителей двухъ группъ (многоножекъ и насѣкомыхъ), развившихся изъ общаго корня.

Я считаю нужнымъ подчеркнуть послѣднее, не смотря на то, что теорія происхожденія этихъ членистоногихъ отъ общихъ предковъ въ родѣ *Onychophora* и пользуется почти полнымъ признаніемъ. Теперь интересъ къ филогенетическимъ спекуляціямъ почти исчезъ, въ чемъ нельзя не видѣть въ общемъ довольно отраднаго явленія, но зато филогенія изъ рукъ морфологовъ перешла въ руки систематиковъ, которые, мало считаясь съ анатомическими и эмбриологическими данными, нерѣдко создаютъ въ этой области болѣе чѣмъ смѣлыя и очень маловѣроятныя гипотезы. Сюда именно относится гипотеза Handlirsch'a (1908) о происхожденіи насѣкомыхъ отъ трилобитовъ, при чемъ онъ не стѣсняется производить прямо отъ послѣднихъ въ качествѣ самостоятельныхъ рядовъ не только многоножекъ, но даже *Cam-podeoidea* и *Collembola* (sic!).

Прегрѣшенія старой филогеніи были, конечно, велики, но и она дала рядъ цѣнныхъ и неоспоримыхъ данныхъ, которыя должны считаться прочными завоеваніями зоологіи и которыя нужно отстаивать отъ попытокъ замѣнить ихъ такими спекуляціями, какъ филогенія членистоногихъ по Handlirsch'у. Къ такимъ цѣннымъ вкладамъ со стороны стараго филогенетическаго направленія относится, напримѣръ, ученіе объ эволюціи позвоночныхъ, сюда же слѣдуетъ отнести *Cam-podea*- (лучше *Insekten*-)—*Myriopoden*-*Peripatus*-theorie, какъ называетъ ее Handlirsch.

Мюхенъ.
Февраль 1912 года.

Карело-Финская База
Академии Наук СССР
БИБЛ. ОТЕКА

СПИСОКЪ ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1828. Baer. Ueber Entwicklungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion. I Theil. Königsberg.
1837. — II Theil. Königsberg.
1879. Barrois. Développement des Podurelles. Assoc. Franc. p. l'avance des Sciences. 7 sèss.
1903. Беккеръ. Къ сравнительной анатоміи головныхъ железъ у Collembola. Изв. И. О. Л. Ест. 98.—Дневн. Зоол. отд. 3.
1895. Bergh. Vorlesungen über allgemeine Embryologie. Wiesbaden. (Русскій переводъ: Курсъ общей эмбриологіи. Спб. 1900).
1909. Berlese. Monografia dei Myrientomata. Redia. 6.
1901. Börner. Zur Kenntnis der Apterygoten-Fauna Bremen und der Nachbar-distrikte. Abh. Ver. Bremen. 17.
1904. — Zur Systematik der Hexapoden. Zool. Anz. 27.
1906. — Das System der Collembolen nebst Beschreibung neuer Collembolen des Hamburg. Naturhist. Mus.—Jahrb. wiss. Anst. Hamburg. 23.
- 1894-95. Brauer. Beiträge zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte des Scorpions. Z. w. Z. 57, 59.
- 1904 (a). Bruntz. Contribution à l'étude de l'excrétion chez les Arthropodes. Arch. Biol. 20.
- 1904 (b). — Les reins labiaux des Thysanoures. Arch. Zool. Exp. (4). 2.
1908. — Les reins labiaux et les glandes céphaliques des Thysanoures. Arch. Zool. Exp. (4). 9.
1897. Carrière u. Bürger. Die Entwicklungsgeschichte der Mauerbiene (*Chalcidoma muraria*) im Ei. Nova Acta Ac. Leop. Car. 69.
1891. Холодковский. Эмбриональное развитие пруссака (*Phyllodromia germanica*). Тр. Спб. Общ. Ест. 22.
1895. — Къ эмбриологіи двупарныхъ многоножекъ (*Diplopoda*). Тр. Спб. Общ. Ест. 26.
1898. Clappole. The embryology and oogenesis of *Anurida maritima*. Journ. of Morph. 14.
1904. Czerski. Die Entwicklung der Mitteldarmanlage bei *Meloe violaceus*. Poln. Arch. Biol. Med. Wiss. 2.
1900. Deegener. Entwicklung der Mundwerkzeuge und des Darmkanals von *Hydrophilus*. Z. w. Z. 68.
1893. Della Valle. Gammarini. Fauna u. Flora Golf. Neapel. 20.
1904. Dickel. Entwicklungsgeschichtliche Studien am Bienenei. Z. w. Z. 77.
1909. Effenberger. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Polydesmus*. Jena. Zeitschr. Naturw. 44.
1900. Escherich. Ueber die Bildung der Keimblätter bei den Musciden. Nova Acta Ac. Leop. Car. 77.
1902. Evans. The development of *Eoperipatus weldoni*. Quart. Journ. Micr. Sc. 45.
1891. Фаусекъ. Этюды по исторіи развитія и анатоміи *Phalangidae*. Тр. Спб. Общ. Ест. 22.
1911. — Vergleichend-embryologische Studien. (Zur Frage über die Bedeutung der Cölomhöhlen). Z. w. Z. 98.
1899. Folsom. The anatomy and physiology of the mouth-parts of the Collembolan, *Orchesella cincta*. Bull. Mus. Comp. Zool. 35.
1900. — The development of the mouth-parts of *Anurida maritima*. Bull. Mus. Comp. Zool. 36.
1906. Friederichs. Untersuchungen über die Entstehung der Keimblätter und Bildung des Mitteldarms bei Käfern. Nova Acta Ac. Leop. Car. 85.
1884. Grassi. Intorno allo sviluppo d'api nell'uovo. Atti Acad. Gioenia. (3). 18.
1886. — I progenitori degli Insetti e dei Miriapodi. L'Japyx e la Campodea. Atti Acad. Gioenia. (3). 19.
1888. — Anatomia comparata dei Tisanuri. Atti Acad. Lincei. (4). 4.
1879. Grobben. Die Entwicklungsgeschichte der *Moina rectirostris*. Arb. Zool. Inst. Wien. 2.
1889. Haase. Die Abdominalanhänge der Insekten mit Berücksichtigung der Myriopoden. Morph. Jahrb. 15.
1897. Haecker. Die Keimbahn von *Cyclops*. Arch. mikr. Anat. 49.
1910. Hamburger. Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der *Argyroneta aquatica*. I. Die Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Darmapparates und seiner Anhangsgebilde. Z. w. Z. 96.
1910. Hammerschmidt. Beiträge zur Entwicklung der Phasmatiden. Z. w. Z. 95.
- 1906-908. Handlirsch. Die fossilen Insekten. Leipzig.
1893. Hansen. Zur Morphologie der Gliedmassen und Mundtheile bei Crustaceen und Insekten. Zool. Anz. 16.
1911. Hasper. Zur Entwicklung der Geschlechtsorgane von *Chironomus*. Zool. Jahrb. Anat. 31.
1886. Heathcote. The early development of *Iulus terrestris*. Quart. Journ. Micr. Sc. 26.
1909. Hegner. The origin and early history of the germ-cells of some Chrysomelid Beetles. Journ. Morph. 20.
1889. Heider. Die Embryonalentwicklung von *Hydrophilus piceus*. Jena.
1881. Hertwig O. u. R. Die Cölomtheorie. Versuch einer Erklärung des mittleren Keimblattes. Jena.
1891. Heymons, R. Die Entwicklung der weiblichen Geschlechtsorgane von *Phyllodromia (Blatta) germanica*. Z. w. Z. 53.
1895. — Die Embryonalentwicklung von Dermapteren und Orthopteren. Jena.
- 1896 (a). — Grundzüge der Entwicklung und des Körperbaues von Odonaten und Ephemeriden. Abh. Ak. Wiss. Berlin.
- 1896 (b). — Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Insecta apterygota. Sitzber. Akad. Berlin. 51.
- 1897 (a). — Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an *Lepisma saccharina*. Z. w. Z. 62.

- 1897 (b). — Über die Bildung und den Bau des Darmkanals bei niederen Insekten. Sitzber. Ges. Naturf. Berlin.
- 1897 (c). — Mitteilungen über die Segmentierung und den Körperbau der Myriopoden. Sitzber. Ak. Wiss. Berlin.
1901. — Die Entwicklungsgeschichte der Scolopender. Zoologica. 33.
1905. — Sur les premières phases du développement de *Galeodes caspius*. C. R. 6 Congrès Intern. Zool.
1905. — R. u. H. Die Entwicklungsgechichte von *Machilis*. Verh. D. Zool. Ges. 15.
1906. Hirschler. Embryologische Untersuchungen an *Catocala nupta*. Bullet. Acad. Cracovie.
- 1909 (a). — Über die Entwicklung der Keimblätter und des Darmes bei *Gastroidea viridula*. Bullet. Acad. Cracovie.
- 1909 (b). — Die Embryonalentwicklung von *Donacia crassipes*. Z. w. Z. 92.
1904. Hoffmann. Ueber den Ventraltubus von *Tomocerus plumbeus* und seine Beziehungen zu den grossen unteren Kopfdrüsen. Ein Beitrag zur Kenntnis der Collembolen. Zool. Anz. 28.
1905. — Ueber die Morphologie und die Funktion der Kauwerkzeuge von *Tomocerus plumbeus*. II Beitrag zur Kenntnis der Collembolen. Z. w. Z. 82.
1908. — Ueber die Morphologie und die Funktion der Kauwerkzeuge und über das Kopfnervensystem von *Tomocerus plumbeus*. III Beitrag zur Kenntnis der Collembolen. Z. w. Z. 89.
1911. — Zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte der Collembolen. (Die Entwicklung der Mundwerkzeuge von *Tomocerus plumbeus*). Zool. Anz. 37.
1849. Huxley. On the anatomy and the affinities of the family of the Medusae. Phil. Trans. R. Soc. London. 139.
1909. Kautsch. Ueber die Entwicklung von *Agalaena labyrinthica*. Zool. Jahrb. Anat. 28.
- 1910 (a). — Ueber die Entwicklung von *Agalaena labyrinthica*. II Teil. Zool. Jahrb. Anat. 30.
- 1910 (b). — Ueber die Entwicklung von Spinnenembryonen unter dem Einfluss des Experiments. Arch. Entw. Mech. 30.
- 1885-86. Kennel. Entwicklungsgeschichte von *Peripatus edwardsii* und *Peripatus torquatus*. Arb. Zool. Inst. Würzburg. 7, 8.
1886. Kleinenberg. Die Entstehung des Annelids aus der Larve von *Lopadorhynchus*. Z. w. Z. 44.
1900. Knower. The embryology of a termite, *Eutermes* (Rippertii?). Journ. Morph. 16.
1892. Korschelt u. Heider. Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte der wirbellosen Tiere. Jena. Spec. Teil. II.
- 1902-1910. — Allgem. Teil. Lief. 1-4.
1871. Kowalevsky. Embryologische Studien an Würmern und Arthropoden. Mém. Ac. St.-Petersb. (7). 16.
1886. — Zur embryonalen Entwicklung der Musciden. Biol. Centbl. 6.
1907. Krug. Beiträge zur Anatomie der Gattung *Iulus*. Jen. Zeitschr. Naturw. 42.
1903. Lang. Beiträge zu einer Trophocöltheorie. Jena. Zeitschr. Naturw. 38.
1898. Lécaillon. Recherches sur le développement embryonnaire de quelques Chrysomélides. Arch. Anat. Micr. 2.

1883. Lemoine. Recherches sur le développement des Podurelles. Assoc. Franc. Congrès de la Rochelle.
- 1911 (a). Lignau. Ueber die Entwicklung des *Polydesmus abchasius*. Zool. Anz. 37.
- 1911 (b). — Исторія эмбріонального развитія *Polydesmus abchasius*. Къ морфологіи diplopoda. Зап. Новорос. Общ. Ест. 38.
1900. Meisenheimer. Entwicklungsgeschichte von *Dreissensia polymorpha*. Z. w. Z. 69.
1908. — Entwicklungsgeschichte der Tiere. I. (Göschel).
1866. Metschnikoff. Embryologische Studien an Insekten. Z. w. Z. 16.
1886. — Embryologische Studien an Medusen. Ein Beitrag zur Genealogie der Primitivorgane. Wien.
1901. Meyer, E. Studien über den Körperbau der Anneliden. Mitth. Zool. St. Neapel. 14.
1909. Montgomery. The development of *Theridum*, an Aranead, up to the stage of reversion. Journ. Morph. 20.
1864. Müller, F. Für Darwin. Leipzig.
1842. Nicolet. Recherches pour servir à l'histoire des Podurelles. Nouv. Mém. Soc. Helv. 6.
1901. Noack. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Musciden. Z. w. Z. 70.
1891. Nusbaum. Przyczynek do embryologii *Meloe proscarabaeus*. Lemberg.
1898. Nusbaum u. Schreiber. Beiträge zur Kenntnis der sogenannten Rückenorgane der Crustaceenembryonen. Biol. Centbl. 18.
1906. Nusbaum u. Fulinski. Ueber die Bildung der Mitteldarmanlage bei *Phyllodromia* (Blatta) germanica. Zool. Anz. 30.
1909. — Zur Entwicklungsgeschichte des Darmdrüsenblattes bei *Grylotalpa vulgaris*. Z. w. Z. 93.
1871. Packard. Embryological studies on *Diplax*, *Perithemis* and *Thysanurous* genus *Isotoma*. Mem. Peabody Acad. 1.
1899. Педашенко. Эмбріональное развитіе и метаморфозъ *Lernaea branchialis*. Тр. Сиб. Общ. Ест. 26.
1903. Petrunkevitch. Das Schicksal der Richtungkörper im Dronenei. Zool. Jahrb. Anat. 17.
- 1905 (a). Филиппенко. Къ анатоміи *Campodea staphylinus*. Тр. Сиб. Общ. Ест. 35.
- 1905 (b). — Нижнія наѣкомыя окрестностей Бологова. Тр. прѣсн. биол. ст. Сиб. Общ. Ест. 2.
1906. — Anatomische Studien über *Collembola*. Z. w. Z. 85.
1907. — Beiträge zur Kenntnis der Apterygoten. I. Ueber die excretorischen und phagocytären Organe von *Ctenolepisma lineata*. Z. w. Z. 88.
1908. — Beiträge zur Kenntnis der Apterygoten. II. Ueber die Kopfdrüsen der Thysanuren. Z. w. Z. 91.
1912. — Zur Kenntnis der Apterygotenembryologie. Zool. Anz. 39.
1900. Prowazek. Bau und Entwicklung der Collembolen. Arb. zool. Inst. Wien. 12.
1898. Rabito. Sull'origine dell'intestino medio nella *Mantis religiosa*. Natur. Sicil. 2.
1840. Reichert. Das Entwicklungsleben im Wirbelthierreiche. Berlin.
1855. Remak. Untersuchungen über die Entwicklung der Wirbelthiere. Berlin.
- 1911 (a). Rimsky-Korsakow. Ueber die systematische Stellung der Protura *Silvestri*. Zool. Anz. 37.

- 1911 (b). — Обь организации Protura Silvestri. Тр. Спб. Общ. Ест. 42.
 1896. Rossijskaya-Koschewnikowa. Etude sur le développement embryonnaire du Gammarus pulex. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. (2). 10.
 1886. Ryder. The development of Anurida maritima. Amer. Natur. 20.
 1907. Saling. Zur Kenntnis der Entwicklung der Keimdrüsen von Tenebrio molitor. Z. w. Z. 86.
 1898. Шимкевичъ, В. О развитіи кишечнаго канала нѣкоторыхъ арахидъ. Тр. Спб. Общ. Ест. 29.
 1906. — Ueber die Entwicklung von Telyphonus caudatus, verglichen mit derjenigen einiger anderer Arachniden. Z. w. Z. 81.
 1911. — W. u. L. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Tetrapneumones. Bull. Ac. Imp. Pétersb.
 1904. Schwangart. Studien zur Entodermfrage bei den Lepidopteren. Z. w. Z. 76.
 1905. — Zur Entwicklungsgeschichte der Lepidopteren. Biol. Centrbl. 25.
 1906. — Ueber die Beziehungen zwischen Darm- und Blutzellenbildung bei Endromis versicolor. (Ein Beitrag zur Endothelfrage). Sitzber. Ges. Morph. Phys. München. 22.
 1899. Schwartz. Zur Kenntnis der Darmentwicklung bei Lepidopteren. Z. w. Z. 66.
 1885-88. Sedgwick. The development of the Cape-species of Peripatus. Quart. Journ. Micr. Sc. 25—28.
 1904. Selys Longchamps. Recherches sur le développement embryonnaire du premier segment abdominal chez Tenebrio molitor. Bull. Ac. Sc. Belge.
 1898. Silvestri. Sulla morfologia dei Diplopodi. III. Sviluppo del Pachyiulus communis. Atti Acad. Lincei. 7.
 1907. — Descrizione di un nuovo genere di insetti Apterygoti. Boll. Lab. Zool. Scuola Agric. Portici. 1.
 1909. — Nuova specie di Acerentomidae (Protura). Atti Acad. Lincei. 18.
 1902. Toyama. Contributions to the study of silk-worms. 1. On the embryology of the silk-worm. Bull. Coll. Agric. Tokyo. Univ. 5.
 1903. Tschuproff. Ueber die Entwicklung der Keimblätter bei Libellen. Zool. Anz. 27.
 1871. Tullberg. Sveriges Podurider. K. Sv. Akad. Handl. 10.
 1875. Ульянинъ. Наблюденія надъ развитіемъ подуръ. Изв. И. О. Л. Ест. 16.
 1897 (a). Uzel. Vorläufige Mitteilung über die Entwicklung der Thysanuren. Zool. Anz. 20.
 1897 (b). — Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von Campodea staphylinus. Zool. Anz. 20.
 1898. — Studien über die Entwicklung der Apterygoten Insekten. Königgrätz.
 1905. Vejdovsky. Zur Hämoctheorie. Z. w. Z. 82.
 1891. Viallanes. Sur quelques points de l'histoire du développement embryonnaire de la Mante religieuse (Mantis religiosa). Ann. Sc. Nat. (7). 11.
 1896. Вагнеръ, Ю. Нѣкоторыя наблюденія надъ эмбриональнымъ развитіемъ Neomysis vulgaris, var. baltica. Тр. Спб. Общ. Ест. 26.
 1910. Wernitzsch. Beiträge zur Kenntnis von Craspedosoma simile und des Tracheensystems der Diplopoden. Jena. Zeitschr. Naturw. 46.
 1889. Wheeler. The embryology of Blatta germanica and Doryphora decemlineata. Journ. Morph. 3.
 1893. — A contribution to insect embryology. Journ. Morph. 8.
 1888. Will. Entwicklungsgeschichte der viviparen Aphiden. Zool. Jahrb. Anat. 3.

1897. Willem et Sabbe. Le tube ventral et les glandes céphaliques des Sminthures. Ann. Soc. Ent. Belg. 41.
 1900. Willem. Recherches sur les Collembolles et les Thysanoures. Mém. Ac. R. Belg. 58.
 1901. — Les glandes céphaliques des Orcheselles. Arch. Biol. 17.
 1899. Willey. Trophoblast and serosa. A contribution to the morphology of the embryonic membranes of insects. Quart. Journ. Micr. Sc. 41.
 1889. Woodworth. Studies on the embryological development of Euvanesa antiopa. Butterflies Eastern Unit. States. Cambridge.
 1883. Зографъ. Матеріалы къ познанію эмбриональнаго развитія Geophilus ferrugineus и Geophilus proximus. Изв. И. О. Л. Ест. 43.

ОБЪЯСНЕНИЕ РИСУНКОВЪ.

Значение буквъ:

a—anus	ggl—ганглий
Abd ₁ , 2, 3, 4, 5, 6 — сегменты брюшка (1-й, 2-й...)	ggl. abd—брюшной ганглий
abd ₁ , 3, 4—брюшные конечности (1-го, 3-го, 4-го сегмента)	ggl. th—грудной ганглий
aDO—зачатокъ спинного органа	gon—гонада
ah ₁ —выделяющаяся 1-ая зародышевая оболочка	gz—половые клѣтки
ant—усикъ	h ₁ —1-ая кутикулярная зародышевая оболочка
bl—бластодерма	h ₂ —2-ая кутикулярная зародышевая оболочка
cbl—кардиобласты	hDa—задний зачатокъ средней кишки
ch—хорионъ	he—Hüllenectoderm
D—средняя кишка	hgl—hintere Grenzlamelle
db—участки желтка	hyp—гиподерма
Dc—deutocerebrum	hz—сердце
dDa—диффузный зачатокъ средней кишки	isb—медиальный тяжъ нижняго листка между сомитами
dk—желточные ядра	Kl—головные лопасти
dki—желточные шарики	ktd—каналъ трубчатой головной железы
DO—спинной органъ	lbr—верхняя губа
dz—желточные клѣтки	l. sub—laminae subanales
e—выклинивание клѣтки нижняго листа изъ бластодермы	Md—сегментъ мандибулъ
ect—эктодерма	md—мандибула
etd—концевой пузырекъ трубчатой головной железы	mf—ротовая складка
f—борозда	mm—зачатокъ мускульнаго слоя передней или задней кишки
fh—полость дробления	msk—мускулы
fk—жировое тѣло	Mx ₁ —сегментъ 1-хъ максиллъ
frc—вилка	mx ₁ —1-ая максилла
fz—клѣтки дробления	Mx ₂ —сегментъ 2-хъ максиллъ
g—половой зачатокъ	mx ₂ —2-ая максилла
gd—половой протокъ	n—нервная система
	nbl—невробласты

oc—глазки	so—сомиты
osg—надглоточный ганглий	so. ics—сомиты интеркалярнаго сегмента
owe—растущая изъ зародышевой полости наверхъ (на спинную сторону) эктодерма	std—stomodaeum
pa—скопление плазмы въ желткѣ бластомера	tdr—зачатокъ трубчатой головной железы
par—парациты	tf—фигура дѣленія
pi—центральное скопление плазмы (Plasmainsel) яйца	Th ₁ , 2, 3—сегменты груди (1-й, 2-й, 3-й)
plp—palpus	th—ножка
Prc—protocerebrum	th ₁ , 2, 3—ножки 1-го, 2-го, 3-го грудного сегмента
prd—proctodaeum	Trc—tritocerebrum
prgl—paraglossae	tv—tubus ventralis
pst—фибрилярное вещество (Punktsubstanz) нервной системы	ub—нижний зародышевый листъ
ret—retinaculum	usg—подглоточный ганглий
segm—формирующиеся сегменты зародышевой полосы	vDa—передний зачатокъ средней кишки
sks—окологлоточная комиссура	vgl—vordere Grenzlamelle
	vmp—вентральная мускульная пластинка

Таблица I.

Первый періодъ развитія.

- Рис. 1. Внѣшній видъ яйца до дробления. 300/1.
 Рис. 2. Внѣшній видъ стадіи 4 клѣтокъ. 300/1.
 Рис. 3. Внѣшній видъ стадіи 8 клѣтокъ. 300/1.
 Рис. 4. Внѣшній видъ стадіи 16 клѣтокъ. 300/1.
 Рис. 5. Внѣшній видъ болѣе поздней стадіи дробления (около 64 клѣтокъ). 300/1.
 Рис. 6. Разрѣзъ черезъ яйцо до дробления. Окраска по Гейденгайну. 350/1.
 Рис. 7. Часть разрѣза черезъ яйцо на стадіи перваго дѣленія. 500/1.
 Рис. 8. Разрѣзъ черезъ стадію 2 клѣтокъ. Окраска по Гейденгайну. 350/1.
 Рис. 9. Разрѣзъ черезъ 8-клѣточную стадію. 350/1.
 Рис. 10. Разрѣзъ черезъ 16-клѣточную стадію. 350/1.
 Рис. 11. Разрѣзъ черезъ стадію 32 клѣтокъ. 400/1.
 Рис. 12. Разрѣзъ черезъ стадію, изображенную на рис. 5 (около 64 клѣтокъ). 400/1.
 Рис. 13. Разрѣзъ черезъ слѣдующую стадію: выползаніе клѣтокъ дробления на поверхность яйца. 400/1.
 Рис. 14. Разрѣзъ черезъ яйцо по окончаніи дробления съ бластодермой, желточными клѣтками и половымъ зачаткомъ. 400/1.

Таблица II.

Второй периодъ развития.

- Рис. 15. Часть разръза черезъ яйцо во время образованія нижняго листка. 500/1.
 Рис. 16. Разръзъ черезъ двуслойную стадію („грушевиднаго“ зародыша). 500/1.
 Рис. 17. Верхняя часть разръза черезъ зародыша съ зачаткомъ спинного органа. 500/1.
 Рис. 18. Разръзъ черезъ зародыша со спиннымъ органомъ 500/1.
 Рис. 19. Разръзъ черезъ зародыша съ меридіональной бороздой. 400/1.
 Рис. 20—21. Два послѣдовательныхъ разръза черезъ зародыша, покрытаго множествомъ складокъ и со смѣщеннымъ спиннымъ органомъ (оба изъ одной серіи). 400/1.
 Рис. 22. Разръзъ черезъ верхнюю часть зародыша передъ самымъ разрывомъ хоріона. 500/1.

Третій периодъ развитія.

- Рис. 23. Внѣшній видъ зародыша на стадіи А сбоку. 300/1.
 Рис. 24. Поперечный разръзъ черезъ его переднюю часть (головныя лопасти и одинъ изъ сегментовъ). 350/1.
 Рис. 25. Поперечный разръзъ черезъ заднюю часть такого же зародыша. 350/1.
 Рис. 26. Спинной органъ на стадіи В въ поперечномъ разръзѣ. 800/1.

Таблица III.

Внѣшній видъ зародышей во время третьяго и четвертаго періода развитія.

- Рис. 27. Стадія В—видъ сбоку. 300/1.
 Рис. 28. Стадія С—видъ сбоку. 300/1.
 Рис. 29. Стадія С—зародышевая полоса съ брюшной стороны. 300/1.
 Рис. 30. Стадія D—видъ сбоку. 300/1.
 Рис. 31. Стадія D—съ брюшной стороны (en face). 300/1.
 Рис. 32. Стадія E—видъ сбоку. 300/1.
 Рис. 33. Стадія E—задній конецъ зародыша съ брюшной стороны. 300/1.
 Рис. 34. Стадія G—видъ сбоку. 300/1.
 Рис. 35. Стадія H—видъ сбоку. 300/1.
 Рис. 36¹⁾. Стадія J—видъ сбоку. 300/1.
 Рис. 37. Молодая *Isotoma cinerea*, вышедшая изъ яйца. 140/1.

¹⁾ На стр. 59 упоминается, что этотъ рисунокъ сдѣланъ съ зародыша, заключеннаго въ бальзамъ безъ окраски. Къ сожалѣнію, при репродукціи таблицъ не былъ переданъ тотъ блѣдный голубой цвѣтъ, который свойственъ зародышамъ на стадіи J и былъ изображенъ на нашемъ рисункѣ.

Таблица IV.

Третій периодъ развитія.

- Рис. 38. Сагитальный разръзъ черезъ зародыша на стадіи В. 350/1.
 Рис. 39. Нижняя часть поперечнаго разръза черезъ такого же зародыша въ области одного изъ сегментовъ. 500/1.
 Рис. 40. Сагитальный разръзъ черезъ зародыша на стадіи С. 350/1.
 Рис. 41. Нижняя часть поперечнаго разръза черезъ такого же зародыша въ области одного изъ сегментовъ. 500/1.
 Рис. 42. Сагитальный разръзъ черезъ зародыша на стадіи D, прошедшій черезъ конечности и сомиты. 300/1.
 Рис. 43. Сагитальный разръзъ черезъ заднюю часть такого же зародыша въ области proctodaeum. 400/1.
 Рис. 44. Сагитальный разръзъ черезъ переднюю часть зародыша на стадіи D, прошедшій черезъ stomodaeum. 400/1.
 Рис. 45. Часть поперечнаго разръза черезъ зародыша на стадіи D въ области сегмента мандибулъ. 500/1.
 Рис. 46. Часть такого же разръза изъ той же серіи черезъ одинъ изъ грудныхъ сегментовъ. 500/1.
 Рис. 47. Сагитальный разръзъ черезъ заднюю часть зародыша стадіи E, прошедшій черезъ брюшныя конечности, сомиты и proctodaeum. 400/1.
 Рис. 48—50. Три послѣдовательныхъ фронтальныхъ разръза (изъ одной серіи) черезъ переднюю часть зародыша на стадіи E, прошедшіе черезъ мозгъ, антеннальный и интеркалярный сегментъ. 400/1.
 Рис. 51. Поперечный разръзъ зародыша этой же стадіи черезъ сегментъ первыхъ максиллъ. 400/1.
 Рис. 52. Часть поперечнаго разръза изъ той же серіи въ области второй пары максиллъ. 800/1.

Таблица V.

Четвертый периодъ развитія.

- Рис. 53—55. Части трехъ послѣдовательныхъ сагитальныхъ разръзовъ черезъ зародыша на стадіи F, прошедшихъ черезъ зачатокъ средней кишки. 500/1.
 Рис. 56. Фронтальный разръзъ черезъ заднюю половину такого же зародыша, прошедшій черезъ брюшныя конечности и половой зачатокъ. 500/1.
 Рис. 57. Косой разръзъ черезъ переднюю часть головы зародыша на стадіи G, прошедшій въ области мандибулъ. 500/1.
 Рис. 58—60. Поперечные разръзы черезъ такого же зародыша, прошедшіе черезъ голову, первый и третій брюшной сегментъ. 500/1.
 Рис. 61. Половые клѣтки на стадіи G. 1100/1.
 Рис. 62. Сагитальный разръзъ черезъ переднюю часть зародыша на стадіи G. 400/1.
 Рис. 63. Такой же разръзъ черезъ его задній конецъ. 500/1.
 Рис. 64. Косой разръзъ черезъ заднюю часть головы зародыша на стадіи G, прошедшій черезъ зачатокъ трубчатой железы. 500/1.

- Рис. 65. Часть сагитального разреза через зародыша на стадіи Н (спинной органъ и грудные ганглии). 500/1.
 Рис. 66—67. Фронтальные разрезъы черезъ переднюю и заднюю часть такого же зародыша, прошедшіе черезъ зачатки средней кишки. 500/1.
 Рис. 68. Поперечный разрезъ черезъ переднюю часть груди изъ той же серіи. 500/1.
 Рис. 69. Поперечный разрезъ черезъ первый брюшной сегментъ зародыша на стадіи Н. 500/1.
 Рис. 70. Сагитальный разрезъ черезъ латеральную часть головы такого же зародыша (зачатокъ трубчатой железы). 500/1.
 Рис. 71. Косой (почти фронтальный) разрезъ черезъ переднюю часть груди зародыша, переходящаго изъ стадіи Н въ стадію J. 500/1.
 Рис. 72. Сагитальный разрезъ черезъ stomodaeum такого же зародыша. 800/1.
 Рис. 73. Сагитальный разрезъ (передняя и задняя половина нарисованы съ двухъ разрезовъ одной серіи) черезъ зародыша на стадіи J. 400/1.

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

Стр.	Строка.	Напечатано:	Должно быть:
7	30	поверхности	поверхность
11	25	(dk)	(dku)
12	37	(dk)	(dku)
34	17	предшествуетъ	предшествуетъ
41	36	рѣзко	нерѣзко
44	42	superlingae	superlinguae
48	27	50	51
60	11	72	71